

1.2.34/B

SUPPLEMEN
DI GIORGIO LEWIS
AL 1.2.34
DIZIONARIO UNIVERSALE
DELLE ARTI E SCIENZE
DI EFRAIMO CHAMBERS
CHE CONTIENE

LE FIGURE, LE SPEZIE, LE PROPRIETA', LE PRODUZIONI,
LE PREPARAZIONI, E GLI USI DELLE COSE
SI' NATURALI COME ARTIFICIALI:

*l'origine, il progresso, lo stato delle cose Ecclesiastiche, Civili, Militari,
e di Commercio: co' varj Sistemi, con le varie Opinioni &c. tra'*

FILOSOFI,
TEOLOGI,
MATEMATICI,

MEDICI,
ANTIQUARI,
CRITICI, &c.

La sua utilità è divisa a servire per un Corso d'Erudizione, e di Lettere antiche e moderne.

*Tratto da' migliori Autori, da' Dizionarij, da' Giornali, dalle Memorie, dalle
Trasfazioni, dall'Efemeridi &c. scritte prima d'ora in diverse Lingue.*

TRADUZIONE ESATTA DALL' INGLESE.

TOMO TERZO.

GAB = MUS



IN VENEZIA

MDCCCLXIII.

Per GIAMBATISTA PASQUALI.

CON LICENZA DE' SUPERIORI, E PRIVILEGIO DELL'ECCELLENTISSIMO SENATO.

27 77



SUPPLEMENTO A L DIZIONARIO UNIVERSALE

GAB

GAB



GABINETTO. Questa voce *gabinetto* viene talvolta usata particolarmente per dinotare un luogo esistente nel fondo, od estremità di una galleria, nel quale soglionfi conservare le pitture dei più celebrati Maestri (a), dicevolmente distribuite, ed accompagnate con busti, e con figure di marmo, e di bronzo, ed insieme con altre curiosità, galanterie, ed anticaglie (b).

(a) Veggasi Felib. *Principi dell' Architettura*, pag. 346. (b) Davil, *Spiegazione dei Termini dell' Architettura*, pag. 438. & seg.

In questo senso i gabinetti importano la cosa medesima, che vien disegnata da
Suppl. Tom. III.

Vitruvio colla voce *Pinacotheca*. Alcune volte hannovi parecchi luoghi, o camere destinate per uso sì fatto, le quali tutte insieme appellansi gabinetto, o galleria. Veggasi Vitruv. de *Architect.* Lib. 6. c. 5. Davil. loco citato Veggasi l'articolo *GALLERIA*, *Ciclopedia*.

Per la voce medesima gabinetto viensi di pari a dinotare una specie di cassetta o custodia per ivi conservare delle cose di valore, e che viene a un tempo stesso ad ornare, ed abbellire una camera, una galleria, od altro appartamento. Così noi sogliamo dire un gabinetto aperto, un gabinetto di noce, un gabinetto del Giappone, o della China, e somiglianti.

A Veg-

Veggasi *Savon. Dizionar. Commere. T. 1.* pag. 506.

Nelle Camere della Società Reale havvi un gabinetto Chinesè tutto pieno d'Instrumenti, e di Semplici, che si usano dai Cerusici di quelle Regioni. Gi assai considerabili sono quelli per grattarsi, per menare, e per solleticare le orecchie, nel che i Chinesi provano piacer grande. Veggansi le *Trasfazioni Filosofiche* sotto il n. 246. pag. 390. & seq.

GABINETTO, nella Giardiniera viene a significare una picciola fabbrichetta isolata in foggia di casa da estate, costruita in alcuna avvenente, ed appariscente forma, ed aperta per ogni verso. E questo ad altro non serve, che per luogo di ricovero, e per prendere il fresco al coperto. Veggasi *Davil, Corso d'architettura, Parte 2.* pag. 439.

Secondo Monsieur Miller un gabinetto è una specie di Salone piantato nell'estremità, o nel centro di un lungo arboreto. Veggasi l'Articolo *ARBORETO, Cyclopaedia.*

Differisce questo da un' arboreto, che è lungo in forma di una galleria e fatto a volte sopra la testa: dove per lo contrario il gabinetto, od è quadrato, o circolare, o ad angoli, o cantoni, componenti una specie di salone. Veggasi *Miller, Dizionario del Giardinier* in voce *Cabines*, gabinetto.

Dierli di pari gabinetto ai di nostri in parlando dei più scelti e più segreti Consigli di un Sovrano, o del Ministero.

Così noi vogliamo dire tutto di gli arcani, i segreti, le massime, e somiglianti, del gabinetto.

Per ischivare i disordini, ed inconvenienti di un consiglio numeroso la Polizia Italiana, di pari che la pratica della Francia, hanno introdotto i Consigli di gabinetti, rimedio, a dirittamente pensare, assai peggiore del male. Veggasi *Bacor., Mor. Ess. 21. Opere Tomo 3. pag. 330. Trev. Dizionario. Univ. Tom. 1. pag. 1307.*

Il Re Carlo I. cadde in uso simigliante in Inghilterra col primo stabilimento. Oltre il suo Consiglio privato, crebbe quel Principe, e piantò una specie di gabinetto, o dire la vogliamo giunta sotto la denominazione di Consiglio di Stato, composta dell' Arcivescovo Land primate della

Provincia di Stafford, e del Nobil Uomo Collington con i Segretari di Stato. Veggasi *Clarend., Hist. Rebell. Tom. 1. l. 2. Biblioteque Choise Tom. 18. pag. 68.*

Nientedimeno non manca chi pretenda di trovare la sostanza di un Consiglio di gabinetto d'epoca assai più antica, ed ezian- dio ammesso dal Parlamento medesimo, il quale da tempo assai antico stabilì una ferie di personaggi, in cui grandemente confidava, senza la presenza de' quali non doveva essere determinata nè ultimata cosa alcuna di momento, ed a queste date persone conceduta aveva il Parlamento la facoltà d'operare senza consultare il rimanente del Consiglio. Non più recentemente dell'anno vintottesimo d'Enrico III. una Scrittura passò in affermazione degli antichi Dritti del Regno (a), in vigor della quale venne provveduto, che quattro Uomini sommi scelti per consentimento comune, dovessero essere i Conservatori del Regno (b), i quali fra le altre cose vedessero di disporre del danaro somministrato dal Parlamento, ed appropriato ad usi privati; e che i parlamenti dovessero essere secondo l'avviso lor intimati, e convocati (c). Ma ezian- dio di quelli quattro (d), due potessero deliberare; e generalmente il corpo di Giustizia dell'Inghilterra, ed il Cancelliere, erano del numero dei quattro divisi Conservatori (e).

(a) Veggasi *Mart. Par. 28. Henr. III.*
(b) *Per visum, & testimonium eorum tra-*
detur thesaurus Domini Regis, & pecunia
ab universis specialiter concessa, ad com-
modum Domini Regis, & Regni, expend-
atur, &c. (c) Nec sine ipsis, sed cum ne-
cesse fuerit, & ad eorum instantiam iterum
conveniant universi (d). Eisi non omnes,
duo ad minus presentes sint, &c. (e) Et
quia frequenter debent esse cum Rege, po-
terunt esse de numero Conservatorum.

L'anno primo d'Enrico VI. provvide il Parlamento, che la Giunta, o l'a quorum per Consiglio privato dovesse esser composta di sei Personaggi, od onninamente di quattro per lo meno; e che in tutte le cose di momento grande dovessero trovarsi presenti i Duchi di Bedford, e di Gloucester, Zii del Re, la qual cosa mostra l'erezione di un gabinetto per politica Legge (g).

Rot.

(f) *Rot. Parl. 1. Parl. 1. Henr. VI. numero 30. 31.* (g) *Act. Land. Forc. Engl. pag. 54.*

GALLERIE. Le gallerie dei giardini debbono esser fatte nell'appresso maniera. Dovrassi alla bella prima tirare una linea alla lunghezza, della quale dee essere la galleria; e questa dovrà piantarsi di cornioli, che far dovranno il fondamento della galleria. Questi d'altra fattura non abbisognano, salvo che d'essere alcun poco potati, ed alcuna volta scappati intorno, quando può portarlo l'occasione. Ma la principale destrezza consiste nel regolare, ed ordinare l'esterne parti della galleria, od il suo principio o testa, e nel formarne le arcate. Le colonne dei portici, o sieno arcate, forzi è che vengano piantate alla distanza di quattro buoni piedi l'una dall'altra, e conviene, che la galleria sia alta dodici piedi, e dieci larga; affinché tre persone possanvi passeggiare alla larga. Cresciuti, che i cornioli faranno all'altezza di tre piedi, e che sia ben regolata la distanza delle colonne, e che sia ultimato il lavoro del pavimento della galleria, la cosa che dee prestò di questo formarsi, si è la testata, o dir lo vogliamo il frontespizio, o facciata. Per effettuare questa bisogna, che i cornioli sian chiusi nell'altezza fra due colonne, e conviene che siavi fatta scorrer sopra una specie di grata fatta per tale effetto, la qual grata, o graticola venga a formare un'arco. Via via, che questa va crescendo, quei rami che colle loro vette soverchiano gli altri converrà troncarli, e pareggiarli con gli altri col potajo. Il Portico delle gallerie può esser coperto con dei tigli.

Le gallerie sono state sempremai in Inghilterra poco avute in pregio. Erano queste un tempo avute in conto grandissimo nei Giardini Italiani, ed in altre regioni calde; ma di presente anche in quelle contrade sono andate in disuso. Veggasi *Milner*, Dizionario del Giardiniere.

GAMBA. Nelle fratture delle due ossa della tibia, e della fibula, o dell'una, o dell'altra separatamente, il membro dee essere esselo ed allungato da due, o più ajutanti chirurgici sì dall'una parte, che dall'altra, mentre il Cerusico stassi riallogando, e rimpiazzando le ossa medesime;

fatto che ciò sia, il membro offeso dovrà essere colle duevoli falciature legato, e circondato e collocato in assai acconcia situazione. Allorchè son rotte tutt'e due queste ossa, radissime volte avviene, che sieno ambe rotte nel luogo medesimo, ma un'ossa alcun poco più in su dell'altro. In evento, che sia rotta la sola tibia, ciò viene agevolmente conosciuto dal suo diarsi così vicino alla cute; e da quella il paziente viene ad essere assai meno tormentato, a segno, che alcuna fiata può ezianzi camminare, senza grave dolore.

In evento, che una frattura della tibia venga accompagnata da una ferita esterna, è giuoco il nettarla innanzi a tutto ben bene, ed insieme cavar fuori con estrema diligenza, ed oculatezza la scheggia tutte dell'osso, e poscia coll'ajuto di un'acconcia, e propria estensione od allungamento rimettere, e riattar l'osso al suo proprio luogo, fermare interamente lo sgorgo del sangue, e finalmente fasciare per diecevol modo la parte tutta con una fasciatura da diciotto capi: ma in evento, che alcuna scheggia, o frammento dell'osso sporga in fuori, ma rimangasi tuttavia al corpo dell'osso medesimo attaccato, in guisa, che renda impossibile il suo riattamento, fa di mestieri, che questo staccarsi, e si levi via con un paio di tanagliette acute, e taglienti, oppure, s'è sia espedito, con una picciola sega. Quando la parte sarà convenientemente aggiustata, dovressi armare con una propria incassatura, e dovrà ogni giorno immancabilmente rinnovarsi la medicatura, e la fasciatura, fino a tanto che la ferita siasi perfettamente rammarginata. Veggasi l'*Esistero*, pag. 136.

Ulceri nelle gambe. Tutto che non abbiavi parte alcuna del corpo umano, la quale trovisi a coperto d'essere infestata da ulceri invecchiare oltinatissime; nulladimeno vien toccato con mano pur troppo per la quotidiana esperienza, come le gambe sono a sì alto male più soggette di qualsivoglia altro membro del corpo umano medesimo. Le cagioni generali delle ulcersi nelle gambe sono a capello le medesime,

A 2 che

che quelle delle ulcere delle altre parti del corpo, vale a dire, un pravo abito di corpo, una sottigliezza soverchio grande, e trasmodatamente acrimoniosa dei sughi, e nelle donne il troncamento de' corsi mensurali: a quelle possonsi a buona equità agguingere la callosità delle labbra delle ferite, e le interne carie delle ossa.

Nelle persone bene avanzate in età, e che sono di lor natura di un abito di corpo non buono, fa onninamente di meliorarli il badar bene di non tentar mai di chiudere, e rammarginare queste ulcere, avvegnachè quasi costantemente l'effetto della cura venga ad essere di grandissima lunga peggiore del male stesso, e venga non di rado a cagionare la morte stessa del paziente. Conciosiachè si fatte ulcere in parecchi casi debbano essere considerate non altrimenti, che un sollievo della natura ajutantesi, anzichè un malore, come quelle, le quali servono di istrumento, per caeciar fuori, ed espellere un'abbondevolissima copia di umori peccanti, e nocevoli, dal corpo. Questo però non dovrebbe praticarsi in gente di fresca età, e d'abito robusto, e rigoroso, quantunque pravo, avvegnachè questi rei sughi, ed umori peccanti in al fatti temperamenti possano benissimo correggersi, e la prima cagione della ostinatezza, e caparbietà delle ulcere, possano essere dilungata a forza d'astinenza, o con un tenore regolato di vivere, o con aprire ai peccanti amori medesimi delle uscite coll'ajuto d'interni adeguati medicamenti; e la cagione medesima per somigliante modo dilungata, puossi benissimo estinguer l'ulcera con tutta la maggior sicurezza, e senz'ombra menoma di pericolo d'alcun tristo effetto, dal procurato dilungamento, e medicatura dell'ulcera. E quantunque nei vecchi queste ulcere non debban'essere per modo alcuno ferite, e rammarginate; nulladimeno possonsi con essi assai convenientemente praticare i metodi palliativi, con sollievo, e conforto grandissimo delle ammalate persone, con diminuitamento considerabilissimo di dolore, e possonsi allontanare tutti i violenti afflittivi sintomi, ed impedire a un tempo stesso, che l'ulcera non si dilati viemmeggiamente, e che da essa ne nascano nuovi tristi sintomi sempre più.

La massima cura sanola l'astinenza, ed

un severo governo, e regola; ed a quelle di tratto in tratto dovranno unire soavi doferelle di medicine catartiche, ed altri interni medicamenti somigliantemente potranno prescrivere, e questo colla giusta intenzione producente sempremai l'effetto ottimo, di mitigare e migliorar l'indole della cagione dell'ulcera. Di questa spezie sono l'escenza di mirra, il balsamo del Perù, e somiglianti. Esternamente poi fa onninamente di meliori il mantenere soprattutto nettissima l'ulcera medesima con ogni maggior cura; perlocchè dovrebbe essere sfacciata due volte il giorno, e eaduna di quelle due volte purgata, e mondata dal marciume: ciò fatto dovrebbero risacquare, o con asciutissime fila, o pezzette asciutte, oppure inzuppate in un decotto di foglie di noce, o d'aristologia, e sopra queste dovrassi applicare un'impiastrò di piombo, come, a cagion d'esempio, quello del minio, od altro, qualunque siasi, di spezie somigliante. Si fatte ulcere trattate, e maneggiate nella divisa pianissima guisa farannosi d'indole sommamente benigna, di leggerissimo incomodo, e di servizio non concepibile rispetto alla sua bontà, e valore nel conservare la vita del paziente.

Allorchè in casi somiglianti alzan la testa le infiammazioni, ed i violenti, ed acuti dolori, come assai spesse fiate avviene da un colpo, da freddo, dal tener le gambe entro l'acqua fredda, o da violentissime passioni d'animo, o finalmente da stravizzo e fregolaterza in rapporto alla dieta, in quello caso fa onninamente di meliori applicarvi sopra un buon piumaccielo di pezze di lino ben inzuppate in perfettissima acqua della Regina d'Ungheria, od io perfettissimo spirito di vino canforato; oppure, con una misura di porzioni uguali d'acqua di calceina, e dell'ungo, o dell'altro de' divisi liquori spiritosi. Questo piumaccielo inzuppato dovrebbe essere applicato caldo, ed il paziente dovrebbe onniamente giacere in letto, e la parte dovrebbe essere con ogni maggior cautela tenuta difesa dagli urti dell'aria esterna, e di tratto in tratto dovrebbero fargli bere dei piccioli liquori ben caldi per promuovere in esso un sudore mezzano, e soave. Allorchè l'infiammazione alza grandemente la testa, e che minacci una can-

crena, dee veramente avervi cura grande, e debboni onninamente porre in pratica i metodi tenuti regolarmente nelle infiammazioni, e nelle cancrene, altramente vi ha sommo pericolo, che ne forga uno sfacelo, del quale la morte farà la conseguenza.

Allora quando nelle persone assai avanzate in età le ulcere per se stesse s'asciugano, e si dileguano, ne foggiono comunemente succedere ad esse, nausea, orrori, e somma debolezza, che fanno veder la morte non gran fatto lontana. In questi tristi casi fa di mestieri il sorreggere, e rinforzare più, che sia mai possibile le forze del paziente, e gli spiriti di quello; e fa similantemente di mestieri, che vengano applicate alla ferita le polveri di genziana, e di radice d'Iride Fiorentina; ed in evento, che queste non sieno di una forza, che basti, applicheravvi la radice d'elaboro nero od in polvere, od in forma di pallottoline; ed ultimamente vi s'applicheranno le polveri di canterelle, o piccioli pezzetti d'impialtro da vescicatori. In evento, che si fatte applicazioni riescan bene, e che vengano di nuovo a produrre un'ulcera purgante, farà di mestieri ripigliare, e rimettere in pratica i sopradescritti metodi, ed osservargli colla più scrupolosa esattezza, e cautela; ma qualora questi manchino fra mano, non vi ha che leggerissima speranza di vita. Veggasi l'*Esistero*, Chirurgia, pag. 253.

GAMBE di mosche. Le gambe delle mosche, e de' moscherini, ed altri insetti volanti, ci somministrano molte e molte distinzioni per questa abbondevolissima Classe d'insetti. Tutte le mosche hanno veramente sei gambe, ma quantunque rispetto al numero sieno quelle le medesime, tuttavia differiscono infra se quanto basta per molti altri rispetti. Alcuni di questi insetti volanti hanno delle gambe lunghissime, ed altri per lo contrario hannole sommamente corte in guisa assai osservabile.

Le zanzare comuni, e le tipule sembra, che sieno montate su i trampoli, e quindi differiscono da altri volanti infettucci, la forma del corpo de' quali è la medesima a capello. Ma quello, che è ancora vie maggiormente osservabile, per rapporto alle gambe di questi insetti, si è, che feb-

bene trovansi d'ordinario tutte affide alla pancia, o torso dell'animaluccio, nulladimeno havvi alcuna specie di questi insetti, che tengono il paio posteriore, o detratto delle loro zampoline attaccate agli anelli del loro corpicciuolo. Veggasi *Reaumur*, *Historia Insectorum*, tom. 4. pag. 143.

Sono le zampe delle mosche ec. bene spesso non solamente grosse, o picciole, secondo la grossezza della creatura, ma cadauna porzione d'esse zampe compresa fra due delle articolazioni, differisce assai sovente dall'altra non meno in lunghezza, che in grossezza. Quello, che a tutti esse è comune, si è, che il piede, od esterna parte delle zampe, su di cui la creatura si regge, vedesi costantemente provveduta per lo meno di due artigli, od unghie, od uncini, i quali terminano in punte sì estremamente fina, che son capaci a trovarsi in quei dati corpi, che compariscono a' nostri occhi i più uguali, ed i più levigati.

La mosca azzurra della carne, ed altre specie parecchie posseggono di pari, per così esprimermi, due piante dei piedi: cadauna di queste della figura di una barchetta, o navicello, e compariscono all'occhio non altrimenti che due pallottoline: queste vengono a toccare in quella parte, ove son congiunte al piede, e dopo vengono a lasciare infra esse un'intervallo angolare. Lo loro esterna superficie inferiore è alquanto convessa, e tutta gremita, e coperta di cortissimi peli strettissimamente piantati. Questi peli, di pari, che le punte dei due artigli divisi, possono aprire un passaggio pereotro i pori di quelle sostanze, che a noi compariscono di sommamente levigata superficie, e sono d'uso grandissimo a quelle creature nel loro piantarsi sopra verticali piani di cristallo.

Monfieur Homberg venne alcuna fiata a trovare delle mosche, le quali non potevano per modo alcuna camminare sopra cristalli collocati nella divisa guisa verticale: ed egli porta opinione, che quelle tali mosche sien quelle, che a cagione di loro età abbiano perduto quei peli, che sono attaccati alle deferite pallottoline de' loro piedi. Quelle similamente, e gli artigli, od uncini de' piedi delle quali sieno loro od ammorbiditi, o spuntati, for-
che

che trovinsi nel caso medesimo. Tuttavia dannosi parecchie spezie di mosche, le quali sono totalmente prive delle divise patollogiche, quali sono quelle della Classe delle pecchie, e malgrado ciò sono valevoli a esaminarsi sulle vetrate delle nostre finestre bravamente e con somma facilità, e sveltezza. Veggasi *Reaumur*, Hist. Insect. Tom. 4. pag. 295.

GANGLIONE. Quegli Autori, i quali hanno trattato in general del ganglione, lo hanno riportato alla classe dei tumori infaccati, sendosi fatti a supporlo racchiuso entro una borsa, o sacco membranoso, nella guisa appunto, che trovansi i tumori infaccati, ateromati, vale a dire, e steatomati. Monsieur Eller nelle Memorie dell' Accademia di Berlino ci somministra un piano, od istoria di questo tumore sommarmente diversa, e tutt'altra dalla tessè accennata. Fecesi questo valentuomo ad osservare come dopo l'estrappazione di sì fatto tumore ne solevano bene spesso avveire de' rei, e tristi sintomi; e massimamente se il ganglione veniva divolto nella maniera usata, colla quale estraggoni d'ordinario i tumori infaccati, per via cioè di coltello; e quindi il dotto Professore conchiude che è giuoco forza che il gorgoglione sia un tumore d' indole e natura differentissima, e che riconosca tutt'altra origine da quella dei tumori infaccati. La materia nel ganglione contenuta vien toccata con mano, essere universalmente di una tessitura gelatinosa, fomigliantissima alla gelatina di corno di cervo, non gittante tristo odore, e non avente sapore acuto; e la membrana, che lo contiene, si contrae nella balle costantemente in una spezie di collo, e stavvi intimamente connessa, ed unita col tendine, nel quale si trova piantato. L'apparenza però del tendine nel luogo, ove il ganglione stassi attaccato, non comparisce nè poco, nè molto viziata, nè per alcun rispetto differente dalle altre parti del medesimo. Veggansi le Memorie dell' Accademia di Berlino dell'anno 1748. pag. 109.

Per intender poi, e conoscere dirittamente, ed a dovere l'origine del ganglione, noi dobbiamo farci a considerare, come cada una fibra del muscolo, al quale il tendine è affisso, e le fibre del quale altro, a ve-

ro dire, non sono, che uno slungamento, di una forma più stirata, trovasi coperta con una delicata finissima membrana, che lascia sotto che il muscolo lascia d'entrare nella composizione del tendine; e che tutte queste membrane insieme formano la coperta, od incamiciatura generale del tendine, il quale va a perdersi nella giuntura di quella parte coll'osso. Si fatta membrana verrebbe ad essere ai tendini anziché una vantaggiosa incamiciatura, un'ingombro ed infarcimento ai medesimi, se ivi non separasse un fugo limpido, e viscoso, che velle al di sopra tutta la superficie del tendine e va agevolando i suoi movimenti comuni. Gli Anatomici hanno generalmente trascurato d'investigare, come fanno per lo più nelle cose utili alla Medicina, la Natura e l'uso di sì fatta membrana, che cuopre, ed incamicia i tendini, e perciò hanno equivocato grandemente, e presa una per altra cosa rispetto all'origine del ganglione, la quale esser non può intesa, e conosciuta, senza la previa cognizione della parte, alla quale è il medesimo intieramente dovuto.

Allorchè questa membrana soffre insieme col tendine alcuna eterna violenza da percossa, o da violente estensioni, viene a screpolarsi bene spesso in alcuna parte, e quindi ne seguita di necessità, che il liquore, cui prima conteneva, forz'è, che sgorgi fuori per la spaccatura, e quindi viene a stanzarsi nella tunica adiposa della pelle; e siccome il liquore va progressivamente aumentandosi rispetto alla quantità, questa tunica, o membrana, viene a formare una parte di un sacco per ricevere il liquore medesimo. Siccome il viscoso liquore continua a vuotarsi per la descritta apertura, così le parti più sottili di esso vanno gradatamente scappando fuori, e ciò, che rimane, forma appunto la materia tenace, e viscosa, la quale trovasi in aprendo il ganglione. In alcuni casi ove lo screpolo o crepatura della membrana è stata incompleta, la superficie della medesima si alza e viene a formare l'incamiciatura della gonfiatura; ed in questo caso rappresenta in un'arteria l'aneurisma.

GAROFANI. Viene questa droga, e spezieria ad acquillar peso per via d'imbeverarsi dell'acqua, lochè ella fa eziando pos-
sta.

fia in alcuna considerabile distanza dall'acqua medesima. Gli Olandesi, che fanno il traffico dei garofani, dalla cognizione, che tengono della divisa proprietà della droga, ne traggono un vantaggio di somma considerazione. Coloro vendono i garofani sempre a peso, e quando vien loro ordinata una borsa di quelli, tengonla per parecchie ore sospesa, innanzi di pesarla, sopra un vaso pieno d'acqua, distante dalla borsa due piedi d'altezza. Procurano coloro di cogliere appunto il tempo con ogni maggiore accuratezza, in cui i garofani sienosi imbevuti di un'adeguata quantità dell'umido, affinché la frode non possa essere scoperta. Questa umidità verrà ad aggiugnere immancabilmente parecchie libbre al peso, che lo sconsigliato compratore paga con suo grave scapito. Questa frode vien praticata con soverchia frequenza nelle Droghie dell'Isola, ed alcune fate eziandio in Europa; ma è giuoco forza, che il grado della divisa umidità sia con maggior diligenza investigata, ed osservata nella prima piazza, o mercato; conciossiachè ivi una borsa, o sacco di garofani nel tratto di una notte, verrà ad attrarre tanta quantità d'acqua, che premendo colla mano, featurirà fuori sensibilmente.

GAS. Questo termine *Gas Sylvestre* viene usato dal Van-Elmonzio per esprimere un sottilissimo spirito galleggiante, o nuotante, che è appena lontano da qualsivoglia luogo, ma che impregna di se l'aria; e quantunque ei non sia pregiudiziale, allorchè trovasi nell'aria aperta, tuttavia qualora venga ferato, e così racchiuso, e confinato, a cagion d'esempio, in una caverna, ha forza di smorzare una grossa candela accesa, ed eziandio in un grado più avanzato di giugnere a soffogare gli animali. Osserva il Neumann, come questo *Gas* sempre, e costantemente rimansi in certa data porzione, entro i liquori fermentati, quantunque non possa, o debba separarsi dai medesimi, e più di quello separasi da qualsivoglia altro, che venga ad esserne impregnato in una forma sensibile. Viene osservato da questo Autore, come la birra ritiene sempremai una porzione considerabile di questo *Gas Sylvestre*, al quale elemento egli attribuisce la qualità ubriacante, e narcotica della birra

medesima, assai più, che allo spirito comune, che in se questa contiene.

GASTROCNEMII. Sono nell'Anatomia i *Gastrocnemii* due ben fatti, ampissimi, e bislungi muscoli, situati lateralmente in rapporto dell'uno all'altro nel piano medesimo sotto le polpe, e formati una buona parte di quello, che addimandasi effettivamente la polpa della gamba. Quello, che è situato vicino alla tibia è denominato interno, e quello distante presso alla fibula, esterno. Cadsun muscolo vien fissato sopra, da un tendine piatto, o compresso, alla parte posteriore della estremità più bassa dell'osso del femore, dietro al rigonfiamento laterale di cadaun condilo, aderente ferratamente ai ligamenti posteriori della punta del ginocchio: quindi questi scorrono, o portansi all'ingù, venendo cadaun d'essi a formare un grosso, e ben dilatato, ad ampio corpo carnoso irregolarmente ovale. L'esterno cuopre il popliteo, essendo più grosso e più ampio, spandendosi più lateralmente, e portandosi, o scorrendo più all'ingù di quello facciasi d'intorno; il corpo carnoso del quale comincia più in su dell'altro. Intorno il mezzo della gamba terminano i *Gastrocnemii* in un tagliardo, ampio tendine comune, il quale via via che va discendendo si contrae alcun poco in larghezza, e viene ad esser innestato nella estremità posteriore dell'osso del calcagno, insieme col tendine del solco. I tendini superiori di questi muscoli vanno facendosi gradatamente cartilaginei nelle persone avanzate in età, ed alla perfine vanno ossificandosi in vicinanza dei condili; e le porzioni ossee compariscono somigliantissime alle ossa sesamoidi. Sono questi talvolta grossissimi prima, che vengano ad indurirsi nella maniera divisa, e bene spesso uno d'essi indurisce prima dell'altro. Veggasi *Winslow*, Anatomia, pag. 218.

GELARE. Un grado di freddo, che sia sufficiente, e valevole a ciò produrre, può essere procurato in qualsivoglia anima, ed eziandio in tutte le stagioni dell'anno per via del metodo seguente.

Procurerai che venga rinchiusa in un vaso di vetro un'acconcia quantità di sale ammoniacale afeittissimo ridotto in polvere, ed in altro vaso somigliante separata.

tamente una dievole porzione d'acqua comune. Farai, che tutt'e due questi vali di Vetro siano collocati entro una soluzione in acqua d'altra porzione di sale ammoniac, mentre appunto il sale stesso stavvi feiogliendosi: non meno il sale confinato, che l'acqua per simigliante mezzo verranno ad esser ridotti allo stato medesimo di freddo colla soluzione; ed allora venendo mescolati insieme, verranno a formare questi due corpi prima posti in vasi separati una seconda soluzione, assai più fredda della prima. Questa poi può servire di liquore per un'altra quantità di sale ammoniac, e d'acqua, per collocarvi sopra come nella prima preparazione, e questi essendo dopoi mescolati, ed essendo la faccenda stessa ripetuta, il freddo può essere alzato ad un grado tale da essere benissimo valevole a gelare, in qualsivoglia clima non meno, che in qualunque stagione. Veggasi *Shaw*, Lezioni, pag. 78.

Non vi ha cosa, la quale sia più comunemente conosciuta, quanto lo si è il metodo di gelare i liquori, a segno di fargli divenire ghiaccio effettivo, per via di un gelo artificiale nelle più calde stagioni e zinzandio. Ma sembra, non essere peranco conosciuta, quali sieno quei sali, i quali abbiano per produrre un'effetto somigliante maggiore, e più energica efficacia, oppure, per esprimerti in altri termini, quale sia quel sale, che sia valevole a produrre il grado massimo di freddo artificiale, oppure quale siasi la maniera migliore, e più acconcia di metterlo in opera, e qual proporzione rispetto alla quantità debba essere osservata fra il ghiaccio, o neve, o la polvere ec. in occasione somigliante. Sono, è vero, i comuni metodi oggimai conosciuti da chiunque, ma non vi è stato finora, chi siasi preso il pensiero di meditare più intensamente sopra la natura di questo fenomeno per migliorarlo.

Monfieur de Reaumur pertanto si fece alla perfine a considerare tutta questa faccenda, e diessi ad esaminare i diversi gradi di freddo per via di un somamente esatto termometro, il quale venendo collocato nel liquore, che doveva essere congelato, mostrò con estrema accuratezza il grado del freddo per la calata del suo spirito.

Il sal petra passa comunemente per un sale, il quale esser possa sommamente adattato e proprio per quelli congelamenti per arte procurati; ma le esperienze fatte da questo Valentuomo provano a maraviglia bene, questa essere un'erronea opinione. Il salpetra in grado più perfetto raffinato, venendo impiegato in simigliante operazione, fa calare lo spirito nel termometro, è vero, ma tre gradi e mezzo sotto il punto fissato.

Del salpetra, che egli mise in opera, il non raffinato tirava lo spirito considerabilmente più basso: e la cagione di questo si è, che il salpetra rozzo contiene una copia abbondevole di sal comune, o sia sal marino; e questo essendo valevole a cagionare un grado maggiore di freddo di quel sale, con cui trovavasi mescolato, unisce con esso la propria azione, e vien perciò a produrre un grado maggiore di freddezza: dove per lo contrario nel salpetra raffinato, il sal marino vien tratto fuori e separato da esso salpetra, e per conseguente divenendo il nitro più puro, agisce soltanto nel suo proprio principio, e viene a cagionare, un grado di freddo minore, quale appunto è proprio di se.

Essendo mescolate due parti di sale comune con tre parti di ghiaccio polverizzato nella stagione più calda, lo spirito nel termometro discende istantaneamente pel tratto di quindici gradi, che viene ad essere un mezzo grado più basso di quello, che calato esso spirito nel termometro medesimo farebbe nell'orrido intensissimo freddo dell'Inverno dell'anno 1709. Dopo di ciò il prode Monsieur de Reaumur diessi a far prova, e sperimentare tutti i sali, che abbiamo, e fecesi ad osservare con estrema regola, ed esattezza, quale si fosse il grado di freddo, che venisse da ciascuno d'essi sali cagionato in una data fissata dose. Fra i sali neutri neppur uno vi fu, che producesse un grado di freddo maggiore del prodotto dal sal comune marino. Fra gli alcali il sale ammoniac, tuttochè venga riputato un sale d'estrema efficacia in simigliante occasione, nulladimeno non fa calare lo spirito del termometro niente più in giù del grado decimotercio. Le ceneri da sapone fannolo calare alla stessa basshezza a capello, di quello profondando il

sal.

falpetra raffinato. Così per via di porre a cimento parecchi sali, il grado proprio, e dievole di freddo da cadaun d'essi producibile viene ad essere agevolmente conosciuto con sicurezza, ed accertato, e possono essere composte delle effatissime tavole di numeri. Dopo di ciò, nel descrivere qualifvoglia dato grado di freddo in una stagione particolare, vi farà una maniera molto migliore d'esprimerlo, di dire, egli era uguale a quello prodotto da un tale, o tal sale, che a nominarlo per via dei gradi del termometro.

Per gli uiccomuni della tavola, il ghiaccio ricercato non dee aspettarsi, che sia sommamente duro, o tale, che sia stato prodotto da una lunga continuazione di freddo violento, ed inteso, ma piuttosto a da desiderarsi, che sia simigliantissimo alla neve. Il falpetra, il qual non è un potentissimo ghiacciante, rendesi perciò più acconcio, e più al caso per questa faccenda, di quello sia un sale più potente, ed energico. Non vien ricercato, che i congelamenti vengano prodotti in un subito; ma allorchè questi son fatti, il loro ritenere per più lungo tratto di tempo, che sia possibile la loro forma, è la cosa di massimo rilievo a chi ha interesse in faccende di tal natura; nè il prezzo dei sali, che debboni mettere in opera per tale effetto, è cosa punto indifferente.

In evento, che altri desideri d'avere de' ghiacci sommamente duri, e consistenti, e preparati in un baster d'occhio, in tal caso il sale più acconcio per ottenere sì fatto intento degli altri sali tutti, si è il sal marino comune. I ghiacci nella divisa guisa procurati riusciranno durissimi, ma conservcrannosi brevissimo tratto di tempo senza squagliarsi. Le cencri di fermenti, o da sapone, somministrano un ghiaccio della consistenza, e durezza che viene d'ordinario a un dipresso ricercata. Questo ghiaccio, a vero dire, vassi formando assai lentamente; ma prodotto ch'è sia manterrassi nel suo stato perfetto per tratto di tempo lunghissimo. Ed havvi un'altra sostanza, che ultima questo lavoro nella guisa a capello la stessa, che lo producano le cencri da sapone divise, e questo in un principio medesimo. E' questa una sostanza semplicissima, e di buonissimo mercato, av-

Suppl. Tom. III.

vegnachè altro non sia che le cencri comunissime di legname da fuoco; ma per questa faccenda le legna, che dovranno abbrugiare, dovranno esser verdi.

I gagliardissimi spiriti verdi dei sali neutri nei gelamenti divisi agiscono in guisa grandemente più energica, od, a vero dire, più di quello faceansi i sali stessi, o più di quello far possa qualunque semplice sale. Così lo spirito di nitro mescolato col doppio di sua quantità di ghiaccio polverizzato in un'istante farà calare lo spirito nel termometro al grado diciannovesimo; che è quanto dire, verrà a produrre un freddo maggiore di quattro gradi di quello, che viene ad ottenersi per mezzo del sal marino, che è, come accennammo, il più potente, ed il più energico di qualsivoglia altro sale nel procurare le gelare artificiali. Un grado assai maggiore di freddo può essere somministrato a questa misura per mezzo d'ammucchiarsi intorno intorno maggior quantità di ghiaccio polverizzato mescolato col sal marino. Ciò viene a dare un freddo raddoppiato, e nella esperienza del termometro venne trovato calarsi lo spirito fino al grado ventiquattresimo, che è quanto dire, venne per sì fatto modo ad esser prodotto per arte un grado di freddo, che trovisi in proporzione al massimo freddo naturale conosciuto, quello cioè della crudelissima Invernata dell'anno 1709. di dodici a sette, o ad un dipresso tale. Se tutta questa divisa materia venga coperta con una mistura recente di spirito di nitro, e di ghiaccio, verrà simigliantemente a generarsi un grado di freddo anche maggiore, e così in seguito; conciossiachè il freddo per simigliante metodo di recenti aggiunte possa essere condotto a segno, che non ammetter termini: ma cadauna aggiunta, come è stato bene osservato, viene a produrre un'accrecimento di freddo più picciolo della prima.

Ella è cosa sommamente osservabile negli spiriti acidi, che quantunque il sal marino comune sia grandemente più efficace, ed energico del nitro in sostanza nel produrre il freddo, nulladimeno lo spirito di nitro è in grado sommo più potente ed energico del sal marino: ed altro niente meno maraviglioso fenomeno si è quello di-

dello spirito di vino, che è un liquore, il quale è poco meno di un fuoco liquido, che venga, cioè, a produrre un'effetto efficacissimo nei congelamenti, e presso che il medesimo, che il prodotto dallo stesso spirito di nitro. E che mai fuori, che l'esperienza, avrebbe potuto indurre la gente ad immaginarsi, che questi due liquori in grado estremo fra se differenti possedessero, siccome possiedono realmente, quella proprietà in comune?

La mescolanza di qualsivoglia altra materia col ghiaccio polverizzato non ingenera un nuovo freddo per via di qualsivoglia altro mezzo, se non se con quello di squagliarsi il ghiaccio, col quale è mescolata. Il momento di sì fatto squagliamento si è perciò il punto di tempo, in cui il freddo trovasi nel suo massimo grado di forza, di modo che dopo di quello il tepore dell'aria esterna non può se non se essere continuamente dileguata dal nuovo freddo generato. Quindi è piano, ed evidente che quanto più vivace sarà questo squagliamento, forz'è, che il ghiaccio sia più duro, oppure, che è la cosa stessa, il grado massimo del freddo. Adunque importa moltissimo, che venga riflettuto, che dovrebbe procurarsi, che lo squagliamento fosse istantaneo, siccome in questo caso le particelle del ghiaccio agirebbero tutte in una volta, ed in un tempo medesimo sopra la materia, che dee essere gelata. In ordine a questo pertanto egli è necessario, che cadauna particella di ghiaccio abbia una particella di sale, che agisca interamente sopra essa. Ciò richiede perciò, che non meno il ghiaccio, che il sale medesimo vengano ridotti ad una polvere di una certa determinata finezza. Quindi può essere dedotta una regola, la quale tutto che non sia a capello, e perfettamente precisa, nulladimeno può essere quanto basti per determinare la propria, ed adeguata proporzione del sale, che dovrà essere mescolato con qualsivoglia quantità di ghiaccio determinata. Noi tocchiamo con mano per l'esperienza, come è necessaria un'abbondevole quantità d'acqua per isquagliare una certa data quantità di sale di qualunque specie questo siasi, ed esperienze ripetute ci potrebbero spianar la via per arrivare a conoscere l'altra

soluzione con una certezza a un di presso così grande. Sarebbe perciò ottima cosa il por tutto a prova, e cimento col sal marino comune con estrema diligenza, ed accuratezza; e quando sieno ben conosciute, e comprese le proporzioni di quello, non riuscirebbe certamente malagevole materia dalle medesime il dedurre le proprie quantità degli altri sali, secondo le loro conosciute differenze, per rapporto alle quantità dell'acqua necessaria per discioglierli.

Le parecchie sostanze liquide, dalle quali il freddo vien generato, e prodotto, nella maniera medesima, che i sali asciutti si fanno in essendo mescolati col ghiaccio, sono molto più spedite, e preste nella loro azione di quello i sali stessi lo sieno; avvegnachè le divise sostanze liquide immediatamente, ed aliai più intimamente vengono in contatto colle particelle del ghiaccio, di quello far possano i sali. D'indole e natura somigliante sono lo spirito di nitro, lo spirito di vino, e simili, e simili per produrre il grado desiderato, ed aspettato di freddo; e rendesi mai sempre necessario, che il ghiaccio, e la materia aggiunta, qualunque questa siasi, scorrano, e precipitino tutt'e due insieme, e che la loro intima unione venga a formare un fluido chiaro: quindi è appunto, che non viene ad esser prodotto coll'olio un nuovo freddo, il qual olio; tuttochè squagli, e disaccia il ghiaccio, nulladimeno non può col medesimo mescolarsi, e formare di conserva uno stesso, e solo liquore; ma è giuoco forza, che rimangasi costantemente a galla, e sospeso nella superficie dell'acqua dal ghiaccio squagliatosi prodotta. Veggansi *Memoires Acad. Ray. Scienc. Paris* an. 1734.

Nel gelare dei vini, e di somiglianti altri liquori, le parti acquose dei medesimi sono quelle, che gelansi prima, e vengono per somigliante mezzo ad essere separate, e disgiunte dalle prete veraci parti vinose: osservazione che può riuscire d'uso grande nel traffico, e nelle comprer dei vini. L'esperienza coll'ajuto dell'arte può esser fatta in qualsivoglia tempo, ed in qualunque luogo: Prenderai un quartuccio di vin rosso Portoghese, o come: poni-lo in un fiasco da vino di Firenze, e sotterra questo fiasco in una mistura di una parte di sal comune, ed in due parti di

ne-

neve, o di ghiaccio pellato; e la conseguenza di ciò sarà, che tutta la parte acquosa del vino in un batter d'occhio passi un ghiaccio effettivo, e la massa fissa e ricca, che rimane delle parti vinose vere, può esserne tutta inclinando il fiasco tratta fuori, e separata. Il freddo naturale però nel gelare, che fa i vini, fa l'effetto medesimo in guisa assai più perfetta, e migliore. Per similante mezzo i vini, gli aceti, ed i liquori per la birra, possono esser tutti ridotti alla quarta parte di loro quantità pel trasporto senza alcuna perdita considerabile delle loro parti essenziali alcun poco di più della pura acqua ghiacciata; e la parte essenziale del vino rimaner per sì fatta guisa mirabilmente purificata, e renduta attissima a conservarsi egregiamente bene intatta per anni, ed anni.

Ella è cosa agevole il vedere, come può esser fatto di ciò uno grandissimo nei traffichi dei vini, come che quantità di floribanti di vini poverissimi e sommamente deboli possono per similante modo esser convertiti in vini ricchissimi, e potentissimi; e puossi altresì procurare la quintessenza dei vini più ricchi per rinfrancare, e per dar polso ai vini languidi, e sbrattati; ed i vantaggi che potrebbero raccogliere da questo nel vino possono sono infinitamente grandi, ed assai più di quello altri per avventura si pensì.

I vini, e gli aceti concentrati a forza di gelargli, tutto che si conservino per tratto considerabilissimo di anni senza alterarsi, nulladimeno sono ad alcuni accidenti sottoposti coll'andar del tempo.

Così i vini nell'esser concentrati pare che vengano ad acquistare un sapore più austero di quello avessero originalmente; e ciò non è sorprendente, avvegnachè il condensamento venga a ridurre la materia salina, e ruvida in una massa, che viene ad essere più picciola, e più ristretta della massa in cui originalmente stanziava di tre quarti, o di quattro quinti: di modo che, se vogliamo dir la cosa, come realmente è, un sì fatto condensamento non vien già ad essere un'aggiunta, od accrescimento del sapore ruvido, ed austero, ma per lo contrario assai probabilmente un mitigamento del medesimo in qualche proporzio-

ne per rapporto alla ristrettezza, in cui vien ridotta quella medesima ruvida materia, la quale per se stessa dovrebbe anzi moltiplicar l'effetto in una proporzione maggiore.

Il cambiamento può concepirsi, esser dovuto a questo, che viene osservato come tutti i vini vecchi, e che hanno per lungo tratto di tempo riposato, divengono morbidi, vellutati, e dolci, il quale effetto viene in essi ad essere grandemente premesso da una separazione successiva del loro tartaro, e da un gentile svaporamento d'alcuna porzione di loro acqua occasionante quella necessità, in cui ci veggiamo nei mesi più caldi dell'Estate di dover bene spesso riempire i vasi da vino: ma nel nostro vino concentrato, quantunque il tartaro medesimo venga ad essere successivamente nella guisa medesima separato, tuttavia si tocca con mano non avervi luogo il tardo svaporamento, perchè il vino concentrato salì morbido, e vellutato in un vaso di vetro ermeticamente chiuso, in cui non vien ravvivato diminimento menomo della quantità del liquore: ed effetto somigliante deriva in quello caso similmente da una più fissa, e più intima combinazione della parte spiritosa colla parte più grossa, e più terrena. Veggasi Stahl de Concentratione.

Oltre al finor divisato sembra, che avvenga nel vino concentrato un'altro cambiamento assai considerabile non solamente nel gusto, ma in grado più abbondante nel suo odore. Conciossiachè se un vino ruvido, ed austero, ed avente l'odore, che aver sogliono comunemente similanti vini, sia infascato, o messo in bottiglia, il suo sapore, passati, che sieno due, o tre anni, non solamente divien più maturo, e più vellutato, ma il suo odore in quello tempo assomiglia a capello al vino, che ci viene dalle Canarie. E questo un grado altissimo di miglioramento, e darà ad un poverissimo vino austero Tedesco, avvegnachè tali appunto si fossero i vini, sopra i quali il dotto Stahl fece le sue esperienze, l'odore medesimo del vino purissimo delle Canarie il più generoso, e più ricco, e questo con tal perfezione, che i migliori bevoni, che sono i veri giudici di cose sì fatte, non verranno a cono-

scervi la menoma differenza rispetto all'odore, tutto che il sapore differisca da quello grandemente. Qualunque siasi il vantaggio che il compratore possa prevedere in questi vini dalla riuscita di simiglianti esperienze, avrassi sempre miglior modo d'indurvelo a praticarle in copie, e quantità abbondevoli di liquori, avvegnachè così le cose tutte corrisponderanno sempre in guisa migliore, e non mai peggiore di quello si corrispondano nelle piccole quantità. Tutte le esperienze divise sono state fatte con picciolissime porzioni, le quali è conosciuto egregiamente bene, come non conservarsi con quella perfezione medesima, colla quale mantengono nelle porzioni abbondevoli, e grandi; ed è evidentissimo non meno per la ragione, che per l'esperienza, che le masse grandi di liquori, sono molto meno soggette a cambiamento, ed alterazioni prodotte dagli effetti eterni dell'aria, e del calore, i quali sono i due gran promotori de' moti fermentativi; ed in evento, che le picciole porzioni non facciano cambiamento, e non peggiorino, come in fatti succede, molto meno dovranno temere questi cattivi effetti nelle masse, e porzioni infinitamente più piene, ed abbondevoli. Vegg. *Shaw*, Saggio Chimico.

Piogge gelate.

I nostri propri Annali d'Inghilterra ci somministrano parecchi racconti del danno grande prodotto nei nostri alberi dalle piogge gelate, allorchè sono accadute: poichè quando queste vengon giù in questa guisa, vengono per conseguente a formare delle focaccette di ghiaccio intorno ai rami tutti degli alberi, le quali vanno accrescendosi gradatamente, ed ingrossando a segno, che i rami stessi non son più valevoli a reggere il peso. L'anno 1672. cadde una somigliante pioggia in Bristol, che cuoprì tutto quel vasto contorno, e tutte quelle campagne. Quasi tutti gli alberi fruttiferi, che trovavansi esposti verso la tramontana Orientale, furono da questa meteora distrutti, la quale se fosse continuata per più lungo tratto di tempo, e che fosse stata accompagnata da venti impetuosi, appena rimasa vi sarebbe cosa, che avesse potuto far testa a questo male. Un pezzo d'acero, che esser non doveva più che tre quarti di una libbra, venne pesato colla sua

incrostatura di ghiaccio sopra esso prodotta appunto dalla divisa pioggia gelantesi; peso sedici buone libbre, oltre quella porzione, che erasi squagliata dall'essere stato maneggiato da varie persone. I gambi dell'erbe vedevansi tutti vestiti d'incamiciature di ghiaccio, alcuni de' quali erano ingrossati in tondo cinque buone dita. Per tutto quel tratto di tempo, che gli alberi da frutti, i broli, le ragoaje, i boschetti, e simiglianti campagne alborate andavano così rompendosi sotto il sopracarico del ghiaccio, le acque scorrevano libere per ogni verso, o disfacevansi in morbida melma, la quale non ghiacciavasi, nè induravasi nè poco nè molto nella sua superficie. Le strade, ed i sentieri vennero perciò renduti affatto impraticabili in ogni e qualunque parte trovavansi questi alberi, che con gl'incrociamenti dei rotti rami attraversavansi per ogni verso, ed il frastuono e rumor grande del ghiaccio, o delle masse ghiacciate percuotenti, ed urtanti l'una contro l'altra, allorchè il vento soffiava, era in vero cosa orribile, e spaventosa. In quei dati luoghi, ove quell'acqua cadde sopra la neve, divenne incontaente ghiaccio, non altrimenti, che fatto avesse su gli alberi.

Essa è cosa degna di grande osservazione, come quelle persone, le quali trovavansi per le contrade, e che pativano un eccessivo freddo, nell'entrare, che facevano in stanze tepide, assaliva loro male così grande, che trovavansi all'agonia; benchè in quel tempo in alcuni luoghi cadde soltanto una specie di picciolo nevisio, il quale bagnava benissimo i piedi, e sopra al terreno non avevi la menoma apparenza di gelo.

Si strana temperie dell'aria precedette similantemente le piogge gelate, in quei luoghi medesimi, ove queste accadde. Tutto che questa severissima stagione s'affacciasse nel principio di Dicembre, tosto che passate furono sei giornate del mese medesimo, videsi un'istantaneo cambiamento non solo in stagione più benigna, e più mite, ma effettivamente calda. Tutta la gente bagnavasi d'un sudor perpetuo non meno in tempo di notte, che nel decorso della giornata, e gli alberi tutti da frutto, e da bosco germogliarono, e gir-

taron foglie, e fiori non altramente che nel mese d'Aprile. Alcuni meli fecero la perfetta loro fiorita prima di Natale; e mostravano i loro novellini frutti innanzi il primo di dell'anno. Veggasi il Dottor Beal nelle Trasfazioni Filosofiche sotto il numero 90.

GELATA. Nelle Regioni sommamente fredde le carni per l'usual cibo possono esser benissimo conservate mangiabili, e sane dalla gelata pel tratto di buoni sei, od anche sette mesi, ed in mangiandole hanno tuttavia un tollerabilmente buon sapore. Veggansi le osservazioni del famoso nostro Capitano Middleton fatte nella Baja di Hudson, e registrate nelle nostre Trasfazioni Filosofiche sotto il numer. 465. Sezione 2.

Sembra, che in quel clima la gelata non abbandoni il terreno, nè si sghiacci giammai, essendovi stato veduto tutto indurito dal gelo nei due mesi più caldi dell'Estate.

L'acquavite comune, e qualsivoglia spirito di vino, posto ivi all'aria aperta, diviene un solido pezzo di ghiaccio nel breve tratto di tre, o di quattr' ore al più. I laghi, e le acque paludose e stagnanti fino alla profondità di dieci, ed anche di dodici piedi, sono ghiacciate a segno, che sembrano solido sasso nell'Invernata, e tutti i pesci nelle divise acque stanzianti si muojono infino ad uno.

Ma in quei Fiumi, ove la corrente del letto è forte e rapida, il ghiaccio non si forma in un' altezza, o profondità tanto considerabile, e per conseguente i pesci vi si conservano vivi.

Neppure le stesse acque forgive sono ivi state trovate libere dal gelarsi, quantunque trovinsi assai profonde; di modo che l'acqua, che in quelle contrade vien messa in opera per i bisogni della vita, altro non è che neve, o ghiaccio disfatto, e squagliato ad arte da quella gente. Veggasi l'antecedente Articolo **GELARE**.

La gelata nella faccenda degli Orti, de' Giardini, ed in rapporto alla Coltivazione, ec. è cosa di somma considerazione degna per ogni rispetto.

Gli antichi nostri Scrittori ci hanno somministrato numero grande di ridicoli, ed affatto inutili, ed insufficienti consigli, ed

avvisi intorno al tenere a coperto gli alberi da frutto dagl' insulti delle nimiche gelate, alcuni de' quali avvertimenti vengono da parecchie persone di grossa palla anche ai di nostri pienamente, e creduti, e praticati. Uno di questi si è il collocare un vaso d'acqua sopra alcuna parte dell'albero, affinchè la gelata possa afferrar l'acqua stanziente nel vaso, e così lasciar l'albero intatto. Bella cosa, se fosse vera, e non ripugnasse tanto apertamente alle leggi tutte della Fisica. Altri poi mettono in pratica un metodo assai pernicioso, e pregiudiziale, in vece della pur ora descritta ridicoleria, e goffaggine, il quale si è lo zappare, ed il formare un solco intorno alle radici dei loro alberi, e il mantenerla piena d'acqua per tutto il tratto di tempo, che durano le gelate. Si fatto improprio metodo distrugge, e rovina parte massima d'ottimi alberi.

La forza grande della gelata sopra i vegetabili, è cosa bastantemente conosciuta; ma le differenze fra le gelate d'una rigida, e severa Invernata, e quelle, che accadono nelle mattine di Primavera, nei loro effetti sopra le piante, e sopra gli alberi, non sono state mai ben conosciute, nè spiegate a perfezione prima, che cid abbiano fatto da loro parti quei due valenti Filosofi Franzesi Monsieur Du Hamel, e Monsieur De Buffon, le cui osservazioni si leggono nelle Memorie della Reale Accademia delle Scienze di Parigi.

L'elatta, ed accurata cognizione dei vegetabili, che è una parte tanto materiale dell'Agricoltura, e che è tanto degna della più seria attenzione, e cura di tutti coloro, i quali bramano il bene, ed il vantaggio del proprio paese, ella si è malgrado cid una cosa soltanto da essere appresa colla lunghezza del tempo, e per via di un numero grandissimo d'esperienze; di modo che la via di un' uomo solo non può in vèron conto somministrargli le necessarie opportunità per condur l'affare al suo compimento bramato. Ed oltre a cid quei tali Uomini, i quali sembra, che s'innoltrino col tal pensiero, ed abbianvi speso tutta la cura, e studio immaginabile in un dato particolar paese, ed abbiano percid stabilito delle regole rispetto anche a gli altri paesi, in questo particolare sono

andati errati; avvegnachè se queste regole riuscivano, come in fatti riescono, in quel dato paese particolare, sono state queste regole stesse sperimentate tutt'altre, ed hanno prodotti effetti totalmente diversi, e somministrare delle idee differentissime in altri paesi, ed in altre persone.

Le gelate d'alcune Invernaie sono state a segno crudeli, e severe, che son giunte a distruggere presso che tutti i teneri vegetabili; e quella orridissima dell'anno 1709. diè al Mondo prove tali di pregiudizj maggiori nelle campagne di quello possa esser suppollo essere stato per innanzi dalle gelate stesse mai cagionato. Il grano, che era seminato, e molte altre biade, che trovavansi sotterra, perirono intieramente. I mandorli, ed i nocciuoli vennero estinti, niuno quasi eccettuato; e moltissimi alberi da frutto d'indole più resistente, e più dure morirono nelle parti stanti sopra il terreno, ma gittaron poi nella benigna stagione rampolli nuovi dalle radici, o dal più basso pedale, mentre alcuni degli alberi più grossi, che erano sommamente forti, vigorosi, e nerboruti, gittarono le foglie nell'apparir di Primavera quasi da tutti i loro rami, e mostrarono d'aver patito pochissimo, tuttocchè realmente sofferto avessero parecchi danni irreparabili, che allora non apparivano. I geli, e le brine delle Invernaie severe, ed orride sono per somigliante guisa grandemente valevoli a danneggiare i vegetabili tutti. Quelle però, che accader sogliono nello spuntare di Primavera, sono molto meno terribili. Danneggiano queste alcuna fiata le pianterelle tenerissime ulcenci dal seme quell'anno; ma non sono valevoli a danneggiare le parti solide degli alberi, od a pregiudicare ai tronchi, o grossi rami di quelli, quantunque distruggano bene spesso i loro occhi, o gemme di fresco da essi gettate, e faccian perire l'embrione del frutto, che dovea venir su, e maturarsi in quell'anno. Si fatte brine non sono già di minor danno alle boscaglie, ed agli alberi da selva, di quello esso lo sieno agli alberi fruttiferi, come quelle, che vengono a troncargli, ed uccidere la crescita dei loro germogli novelli, che dilatarsi, e svilupparsi dovevano in rami nella veggente Estate.

Le gelate, ed i ghiacci delle Invernaie severe, sono assai più terribili di quelle, che accader sogliono in tempo di Primavera, come quelle, che vengono a cagionare una privazione intiera di tutti i prodotti delle parti più tenere del Mondo vegetabile. Ma allora quando questi geli vernini non sono frequenti, e che queste orride Invernaie non accadano, che una sola volta in un'insiera età, allora le gelate, ed i ghiacci di Primavera riescono a noi di pregiudizio maggiore, che le vernine non sieno, come quelle, che producono a noi danni rilevantissimi, tutto che non così terribili, come i primi, e perchè queste vengono ad accadere per avventura in ogni annata.

Rispetto agli alberi la somma differenza è quella, che le gelate, ed i ghiacci delle orride Invernaie danneggiano perfino la sostanza loro legnosa, i tronchi loro, o pedali, ed i loro grossi rami: dove per lo contrario le gelate di Primavera non vagliono ad intraccare se non se i loro soli germogli. Queste due diverse stagioni di gelo agiscono in circolante sommamente diverse, e quelle situazioni, od esposizioni, ove i vegetabili hanno grandemente patito nelle gelate dell'Invernata, viene bene spesso trovato esser meno assai pregiudicate dai geli della Primavera. E' questa una verità, la quale può soltanto essere accertata da frequenti osservazioni, le quali però non debbon per modo alcuno esser risguardate non aliramente che mera materia di semplice speculazione, ma aver possono benissimo l'uso loro nei porci in guardia contro i pregiudizj, che queste gelate ci racano, e farci strada a prendervi i dicevoli, e convenienti appropriati ripari. Avvenendo i ghiacci, e le gelate vernine in tempo, che moltissimi alberi delle nostre boscaglie non meno, che dei nostri Campi, Orti, e Giardini, non hanno sopr' essi perancora nè foglie, nè fiori, nè frutta, e che hanno le loro gemme, ed occhi così duri, che vagliano a far testa alle leggiere ingiurie della stagione, massimamente se la precedente Estate non sia stato soverchio umida; in istato somigliante se non vi sieno unite ree, e maligne circolanze, gli alberi tutti universalmente sotterrano egregiamente bene:
gli

gli urti delle benigne, o moderate Inver-
nate: ma i duri geli, che oggimai da tem-
po non molto accadono nelle Invernate,
vengono a cagionare danni grandissimi a
quelli alberi, che non sono state valevoli
a totalmente distruggere. Quelli danoi so-
no. 1. Lunghi screpoli, e spaccature le
quali seguitano, ed accompagnano la dire-
zione delle fibre. 2. Porzioni di legno mor-
to racchiuse in tondo col legno, che tro-
vasi tuttora in istato di vita. 3. Quella
malattia degli alberi, che i forestieri ad-
dimandano *bianco doppio*, che è un circo-
lo perfetto di bianco, o sia legno morbi-
do bianco, il quale quando l'albero è po-
scia tagliato, vien trovato coperto da un
circolo di duro, e solido legno. E' il bian-
co nel suo stato naturale un circolo este-
riore di bianco, ed imperfetto legno, fa-
sciente tutt' all'intorno il legno duro, e
più perfetto dell'albero, e che viene ad es-
sere circondato dalla corteccia; ed in pa-
recchie specie d'alberi viene ad essere age-
volmente distinto dal legno duro, o dir-
lo vogliamo cuore dell'albero medesimo
non meno pel suo color differente, che per
la sua morbidezza.

Il legno sano, e perfetto negli alberi,
nello stato lor naturale, è tutto d'un co-
lor medesimo, e d'una stessa durezza, dal-
la sua circonferenza fino al suo centro;
ma in questi alberi intaccati, o pregiudica-
ti dal gelo, il divisato circolo di bianco
fascia, e circonda il cuore, e più del cuore
circonda il bianco, il quale comparisce,
e farsi vedere di nuovo in un esterior
circolo intorno a quello, e che vien co-
perto dalla corteccia. E' questo lo stato
di uo' albero, e prima, che venga dal ge-
lo danneggiato, e dopo d'aver ricevuto il
danno; ed io questo stato trovati vengono
gli alberi nel tagliarli in gradi differenti,
secondo il differente suolo, e la situazione
od esposizione diversa, in cui trovansi pian-
tati. Nei forti terreni, e nei coperti del-
le foreste, e de' boschi, ove gli alberi han-
no gittate molte, e profonde radici, e
che trovansi bene ombretti, e difesi, la so-
praddescritta malattia è meno frequente,
ed in grado assai minore, di quello venga
trovata in quei dati alberi, che trovansi
isolati, od assai allo scoperto, e che son
radicati in terreno più molle e più sfocio.

La sola ispezione dei divisati circoli di
falso bianco, come anche il circolo inte-
riore del legno bianco, che così può esse-
re con somma proprietà appellato, fa ve-
dere, e toccar con mano, questi alberi
esser sommarmente deboli, e vecchissimi;
e la verità di sì fatta opinione vien pur
troppo confermata dalla quotidiana esperien-
za. I travi tagliati, e tratti fuori d'una
groschezza medesima dal vero bianco, e dal
bianco falso divisato, per via dei pesi, che
voglionvi per rompergli, mostrano eviden-
tissimamente la somma differenza, che pas-
sa infra essi. Il bianco naturale sostiene il
doppio del peso, od è d'una forza, che
riesce a capello doppia di questo bianco
medesimo nel suo stato non naturale. Qua-
ntunque il bianco migliore non abbia una
forza gran fatto valutabile messa a fronte
di quella del legno perfetto dell'albero.

La gravità specifica del bianco vero è
simigliantemente molto maggiore, di quel-
la del bianco della specie falsa; ma il cir-
colo esteriore del legno sano fasciante, e
circondante questo falso bianco vien tocca-
to coo mano, essere d'un peso uguale, e
d'una durezza medesima di quello del cuore,
o sia legno del centro; dimodochè qual-
sivoglia perfetto legno venga trovato nell'
albero, apparisce esser tutto d'una stessissi-
ma qualità. Malgrado però tutto questo,
havvi questa grandissima differenza fra i
due divisati bianchi degli alberi, essendo il
bianco interiore sempre, e costantemente
più leggiero, e più debole, tuttochè sieno
oggimai veuti, ed anche trenta anni, che
sia stato formato, per come puossi conosce-
re a maraviglia bene dai circoli annuali,
che appariscono nell' esterior lato del me-
desimo.

Il numero delle osservazioni fatte dal pro-
de Monsieur Reaumur intorno al divisato
bianco degli alberi delle differenti parti del-
la Francia, tutte, niuna eccettuata, gli ve-
nnero a mostrare il falso descritto bianco
sotto il numero medesimo di circoli an-
nuali della successiva crescita dell'albero;
e questi circoli annuali venendo esattamente
contati, vennero a corrispondere a ca-
pello al numero degli anni scorsi fino al
suo tempo dell' orridissima Inverrata dell'
anno 1709. Quindi quel valentuomo con
somma dritture, e giustezza ebbe a con-
chiu-

chiudere, che tutto il falso bianco da esso trovato negli alberi di presso che tutte le parti del Regno di Francia, fosse unicamente l'effetto della orridissima Invernata da noi più e più fiate mentovata dell'anno 1709. Ed è sommamente evidente, che questo falso bianco è quella parte dell' albero, che nell'anno 1709. era il bianco vero e naturale, e che dalla severità del gelo di quella Invernata erale stato impedito fin da allora il divenire sano, e solido legno; ma lasciavasi per divenire più debole, e più difettoso per una serie successiva d'anni; durante il qual tratto di tempo, i parecchi annuali circoli del bianco sopravveniente divennero tutti sano, e perfetto legno nel corso lor naturale, non inenacato.

Apparisce con estrema chiarezza, come forz'è, che il bianco sia quella parte del legno, che è grandemente soggetta a patire, come quella, che è il legno più esteriore di tutto il resto, e perchè esso stesso viene a far l'ufficio di coperta per la parte interiore: ed aggiugnasi a questo, come quella parte è per se stessa d'una tessitura molto meno fissa, e compatta, e più piena di fughi, e per conseguente più acconcia a provare con suo danno sopra di se l'azione del freddo, e del gelo. Venne osservato in Francia l'anno dopo questa orridissima Invernata del 1709. come gli alberi tenerelli, e giovani erano stati assai meno danneggiati degli alberi vecchi. Ma non è improbabile, che la ragione di sì fatto fenomeno sia, che i vasi del sugo essendo in questi tenerissimi, e sommamente pieghevoli, e dilegini, e per lo contrario, duri, ed intirizziti negli alberi d'età provetta, la forza medesima la quale altro non faceva negli alberi giovani, che dilatarvegli, negli alberi vecchi veniva a spezzargli, ed infragnergli. Veniva da taluno supposto, che il bianco da noi già deferito di tutti gli alberi vecchi in questa severa Invernata stato fosse assolutamente ucciso. Ma sembra non esser ciò effettivamente avvenuto. Le esperienze fatte venivano a far toccar con mano, come in esso erasi continuato a mantenere un corso di fucchio per servizio della parte rimanente dell'albero, tutorchè patito avesse la divisata rottura, od infrangimento ne'

suoi vasi, ma non tale da esser convertibile, secondo il corso dovuto, ed adeguato della natura, in solido legno; e finalmente, che quella era stata una malattia non sanabile, ma non già una morte effettiva.

Nelle accuratissime difamine fatte dopo l'anno 1709. il falso bianco non fu trovato nello stato medesimo in tutti gli alberi, che vennero esaminati, ma comparve aver patito dall'orridissimo gelo in varj gradi sommamente diversi. Alcuni alberi somministraronlo assai più compatto, e più fiso in un dato lato, che in un'altro, che viene ad essere uno stato ad esso totalmente non naturale. Altri poi avevano tutt'intorno così sottile, che venivano a mostrarsi, come non aveva patito tutto il bianco, ma che la parte interiore di esso erasi salvata dall'ingiuria, e come erasi fin da quel tempo costantemente convertita in legno secondo l'adeguato, e coerente corso della natura, mentre le parti esteriori soltanto patito avevano la malattia divisata, ed erano rimaste, tutorchè grandemente danneggiate, nulladimeno non totalmente convertite in sostanza legnosa.

I falsi bianchi di moltissimi alberi non erano punto simili nel colore, nè avevano sofferta la malattia in un grado medesimo, ed uguale, ed in quelli, che avevano patita in grado così grande, in iszappando all'indietro verso le loro radici, quella parte di bianco, che trovavasi sotto terra, fu trovata aver bravamente campato l'ingiuria degli orridissimi geli, ed essersi fin da quel tempo, secondo le ordinarie non alterate leggi della Natura, convertita in ottima sostanza legnosa regolarissimamente; e per conseguente si vede come la coperta della terra venne ad essere a quella parte un'ottima difesa contro gli affalti della tremenda gelata.

I danni pertanto arrecati dalle crudeli, e severissime gelate agli alberi vecchi sono veramente grandi; e non sono già nè una, nè due particolari specie quelle, che ad essi danni sono soggette; ma farà presto che impossibile il nominarne una, la quale siane a coperto. Simigliante difetto nel legname può essere sempremai scoperto dall'occhio, allorchè venga esaminato tutto l'albero; ed ove scorgasi in esso albero non let-

to di falso bianco, la sua robustezza dee essere stimata minore coerentemente in proporzione della grossezza, e del fracidume di questo bianco medesimo.

Un' altro difetto cagionato negli alberi dalle severissime gelate di quest'anno 1709. e probabilmente in un maggiore od in un minor grado da quelle di molti altri, si è, che il bianco, ed unitamente ad esso la corteccia, sono in parte periti, ed il suo rimanente, od è rimasto intieramente intatto, oppure per lo meno in una condizione, e stato molto migliore di quello. Questo viene a scuoprirsì allorchè parecchi anni dopo gli alberi veggono tagliati per farne del legname da potte in opera. Nel segare questi alberi orizzontalmente nel corpo loro vieni trovato un pezzo di bianco morto tutto coperto d'una scorza secca patita; che è sotterrato non altramente che se si trovasse nella sostanza legnosa dell' albero, essendo coperta da parecchi circoli di legno vivo. Questa materia patita occupa universalmente intorno ad una quarta parte della circonferenza del corpo dell' albero, ed è talvolta molto più bruna, e tal' altra molto più bianca del rimanente del legoo; ed è un' osservazione generale, che queste parti patite, o scadute vengono d' ordinario trovate in quel lato dell' albero, che trovavasi in faccia allo Scilocco, od alla parte meridionale. Il numero grandissimo d' alberi, che vennero esaminati dopo il taglio loro in differenti parti della Francia, venne trovato, come avevano questo bianco morto diviso, e la mentovata scaduta corteccia secca tutti coperti sotto un numero uguale d'annui circoli di legno sano; e questi circoli essendo conteggiati venne trovato accordarsi a capello col numero medesimo d' anni, che crano scorsi, facendosi dalla eruditissima Invernata del 1709., e per conseguente forza è, che tutt' essi si fossero l' effetto delle terribilissime gelate di quella medesima Invernata. Essendo perita per il gelo una porzione della corteccia insieme, e del bianco degli alberi, ed il rimanente seodo rimasto vivo, questa parte forza è che siavi cresciuta sopra, e sia stata ricoperta dal successivo aumentarsi delle altre parti dell' albero. La ragione del trovarsi la desiderata porzione verso Scilocco sembra essere,

Suppl. Tom. III.

che i fughi ghiacciati essendo allora sghiacciati ogni giorno dal Sole, venivano a patire la violenza ogni notte di un novello ghiacciamento. Radissime volte fu trovato, che questo difetto scorresse per la lunghezza tutta del tronco; ma lasciavane d' ordinario una porzione sana, o talmente libera, che tale appariva.

Ultimamente un' altro male, che avviene agli alberi dalle orride gelate, si è, che vengano bene spesso dalle medesime spaccati secondo la direzione delle loro fibre, e ciò bene spesso con un lunghissimo, e profondo screpolo.

Ella non è cosa rara l' imbattersi nelle ampie fesse in alberi, che sono stati per simigliante guisa spiccati, e che avendo campata la vita nell' Invernata, che ha prodotto in essi questo male, vien trovato avere una lunghissima costola contrassegnante il luogo ove si era fatto lo screpolo, e formante questa costola una specie di cicatrice sopra la divisa ferita. Cicatrice, o costola simigliante è però soltanto superficiale, e per ogni verso, e luogo questa si trovi, seguita di pari a trovarsi lo screpolo, o spaccatura rammarginata sotto essa costola nell' albero, conio sfacchè quantunque la corteccia, ed il bianco possano in sì fatta maniera assodarsi, e venire a formare una coperta per una ferita, le fibre del legno solido qualunque volta, che sieno state rotte, o disgiunte, non vi è caso, che possano serrare di bel nuovo. Ella si è un' opinione generale degli Operaj, che tutte queste spaccature, e screpoli nel legname sieno meri effetti dei geli; ed è cosa sommamente agevole il concepire, che sia naturalissimo alle gelate medesime il ciò produrre, essendo oggimai cosa notissima dal gran Galileo in qua, che tutti i liquori gelati prendono più luogo, e si dilatano più di quello facciano allorchè trovansi oello stato loro fluido naturale. Ella non è però cosa certa, che tutti gli screpoli, o spaccature, che veggionsi nel legname, riconoscano questa sola cagione, avvegnachè parecchi e di queste possano essere state cagionate unicamente da copia soverchio tramodante di fugo.

In esaminando gli alberi tagliati in Francia nell' anno 1736. numero grandissimo de' medesimi venner trovati colle divise spac-

C cau-

cature , e queste non già in alcuna parte particolare , siccome avviene nelle altre malattie , e malori cagionati dai geli negli alberi , che sono d'ordinario nella parte d'essi esposta a mezzo giorno , ma bensì in qualsivoglia esposizione , ed in alberi cresciuti , e venuti su in qualsivoglia terreno . Queste spaccature però trovansi con maggior frequenza in quegli alberi , che trovansi piantati in terreni umidi , ed esposti od a Tramontana , o ad Occidente . Questo pare , che sia avvenuto dall' avere le gelate operate con forza , e con violenza maggiore di contro Borea , ed in faccia ad Occidente ; e perchè la tessitura delle fibre del legno è molto più rilasciata , e rara in questi alberi , che son piantati in un terreno acquoso , e melmoso , che in quelli piantati , e venuti fu in altro suolo , ed il loro succo essendo più abbondevole , e più acquoso , per conseguente gli effetti del gelo verranno ad esser maggiori ; a misura , che viene ad esser maggiore la quantità dei fughi sopra de' quali il gelo agisce , e le fibre altresì di questi dati alberi sono capaci d' assai minor resistenza . Che la natura acquosa dei fughi degli alberi , sia quella , che gli rende soggetti a ricevere dai geli sì fatti danni , apparisce sommaramente probabile da questo , che il pino , e l' abete , ed altri alberi , i cui fughi sono d'una natura resinosa , vien toccato con mano non essere a queste ingiurie soggetti . Noi sappiamo benissimo , come gli oli , ed i fughi resinosi non sono così soggetti ad esser gelati dal freddo , siccome lo è l' acqua , e che quando questi si gelano , contraggonsi , e ristringonsi , non già aumentansi , nè si dilatano in congelandosi , e per conseguente i danni prodotti dal gelo , che dipendono dal gonfiarsi del succo congelantesi , non possono aver forza sopra gli alberi divisiati .

Negli alberi , che sono stati spaccati dalle gelate , trovansi sempremai nello scerpello , o spaccatura appunto sotto la cicatrice un maluglio o del legno , o del succo patito , e scaduto ; e l'apparenza non è per conto alcuno da quei difetti diversi che sono originati da un patimento delle fibre legnose prodotto dalla semplice , e mera ridondanza trasudante del succo medesimo , o da malattia , e pecca di quel-

lo ; altra differenza non ravvisandosi salvochè quelli secondi non son coperti con alcuna cicatrice .

Egli è possibilissimo , che i geli forti nelle Invernae orride , e crudeli sieno valevoli a produrre negli alberi altri danni , e malori , oltre i divisati finora ; ma i da noi descritti , egli è indubitato , come sono ai geli medesimi unicamente , ed interamente dovuti . Nè dee altresì esser supposto , che le brine , ed i geli , che accader sogliono bene spesso in tempo di Primavera , tuttochè assai meno violenti , ed intensi , ci cagionino un danno minore ; conciossiachè investano questi i vegetabili appunto in un tempo , in cui quelli trovansi meno atti a far loro fronte , e a sostenergli ; e ciò , che da essi non dee temersi rispetto all' impeto , e forza loro , dee temersi nullameno dalla loro troppo certa frequenza .

Le opinioni degli Autori intorno alle esposizioni degli alberi ai diversi aspetti dell' emisfero , sono state sommarmente diverse infra loro , e la maggior parte di quelle opinioni medesime sono state piantate sopra fondamenti nulla affatto ragionevoli . Molti portano parere , che gli effetti delle gelate , e de' ghiacci , sieno violentissimi in quegli alberi , che trovansi esposti a Tramontana ; ed altri per lo contrario si fanno ad opinare , che sieno da esse assai più pregiudicati e danneggiati quelli che sono esposti al Mezzodi , e ad Occidente . Non vi ha il menomo dubbio , che l'esposizione a Tramontana sia soggetta a massimo freddo . Vienvi negato il beneficio del Sole , il cui solo calore è valevole a temperare , ed a rintuzzare il rigore dei severissimi geli ; ed oltre a questo trovansi ivi le cose esposte ai venti boreali , non meno boreali orientali , che boreali occidentali , che sono sempremai i venti più freddi degli altri tutti , siccome viene più che a sufficienza provato non meno dalle nostre proprie sensazioni , ma cizianilo dall' infallibile prova del Termometro ; ed assai sovente il terreno di basse bolcaglie esposto a Tramontana vien trovato perfettamente ghiacciato , mentre quello , che stassi esposto a Mezzodi , è morbido e tenero a segno , che dà luogo ai Contadini di lavorarlo . La neve trovata all' apetto Bo-

reale

reale fu i fianchi delle montagne, allorché non trovavene altrove, è similmente un'altra infallibile prova di ciò; e soprattutto egli è certissimo, che l'aspetto Boreale è il più freddo degli altri tutti, e che ivi il gelo è fortissimo. Ciò non ostante non ne viene da questo, siccome peravventura altri farebbero ad immaginare, che i danni prodotti negli alberi dalle gelate debbano per necessità essere maggiori in faccia a Tramontana; che anzi per lo contrario noi abbiamo prove abbondevolissime fra le osservazioni precedenti, che gli alberi vengono in grado assai maggiore pregiudicati dai geli, allorché trovansi esposti a Mezzo giorno; e questo universalmente: ed è certissimo per esperienze più, e più spesse ripetute, che hannovi degli accidenti particolari, sotto i quali un gelo più moderato può viemaggiormente infestare, e far danno più grave ai vegetabili, di quello possa fare un gelo severissimo, che avvenga ad essi sotto circostanze più favorevoli, e più propizie.

Dai precedenti racconti dei danni ricevuti dagli alberi nei severissimi geli dell'Invernata del 1709, apparisce chiaro, che i massimi dei danni tutti furono onninamente dovuti ai falsi sghiacciamenti più e più spesse caduti, che venivan poscia seguitati da nuove gelate; ma i geli di Primavera ci somministrano esempi assai più numerosi di una sì fatta verità; ed alcune esperienze fatte da Monsieur de Buffon danno prove ampissime incontestabili, come non è già il severissimo freddo, od i geli i più forti quelli non sono che arretrino il danno maggiore, e più considerabile ai vegetabili tutti.

Proccurò questo Gentiluomo, che venisse atterrato a forza di scure nell'Invernata dell'anno 1734, un pezzo di folto bosco del tratto di sette in otto jugeri, trovandosi in una spaziosa aperta pianura, circondato tutto all'intorno di terre coltivate. Volle, che parecchi mucchi quadrati d'alberi fossero lasciati intatti: furono questi lasciati in forma quadrata, ed accomodati in guisa, che le loro quattro facciate venissero a rimanere a capello esposte ai quattro aspetti del globo, Tramontana, Merzod, Oriente, ed Occidente, e tutto l'altro rimanente legname tagliato, atter-

rato, e condotto via, egli osservò nella veggente Primavera, quale si farebbe la maniera del girare i polloni non meno dei vecchi ceppi, che degli alberi dei sopradescritti mucchi lasciati intatti nel luogo medesimo. Verso il dì ventesimo d'Aprile, ebbe quel Valentuomo ad osservare, come aveanvi vivacissimi, e fortissimi rampolli in cadauno de' divisati mucchi d'alberi nel lato ed'essi esposti al merzod, ove il corpo tutto degli alberi era stato difeso nel mucchio dai venti settentrionali, ed ove il Sole dell'aspetto meridionale aveva molta forza. In questi luoghi appunto i teneri rampolli fecero la loro prima mostra, e eranvi forti, rigogliosi, e somamente appariscenti. I lati esposti ad Oriente dei mucchi medesimi d'alberi, sbocciarono in secondo luogo; dopo di questi gittarono i lor germogli quegli esposti ad Occidente; ed in ultimo luogo affacciaronsi i rampolli medesimi alla banda esposta a Tramontana. Una settimana dopo il deferito germogliamento sopraggiunse loro addosso una severa brinata a ciel sereno; e fattosi il Valentuomo ad esaminare i primi rampolli delle bande risguardanti il merzod, ebbero a trovare tutti appassiti, e grandemente danneggiati, ed a segno, che comparivano neri, mentre quelli, che trovavansi di fronte al vento Boreale, il quale in quel tempo severissimamente soffiava, ed imperverava, vedevansi pochissimo patiti. I lati esposti ad Oriente, e ad Occidente furono presso che ugualmente danneggiati; e lo stato dei germogli nei lati medesimi di tutti i mucchi d'alberi quadrati trovavasi a capello lo stesso. I dì quattordicesimo, quindicesimo, e venticimo secondo di Maggio furono la mattina gagliardissime brine; ed essendo di bel nuovo esaminato lo stato dei rampolli, la faccenda fu trovata essere accaduta a capello come nel primo gelo del dì venti d'Aprile restè deferita; conciossiachè tutti i germogli trovantisi nei lati dei mucchi, che erano a coperto di Tramontana, o de' venti boreali occidentali, che allora soffiavano, rimasero grandemente pregiudicati, e malmenati, mentre tutto ciò, che trovavasi esposto al vento medesimo, fu trovato averne appena sofferto il menomo danno.

Si fatte osservazioni fanno prova incon-

trafiabile, che quantunque il gelo sia violentissimo, e sommamente energico alla volta di Tramontana, ciò non ostante il danno fatto ai vegetabili dalle gelate è per lo meno minore di quello prodotto in qualsivoglia altra esposizione, od aspetto.

E' questa un'osservazione opposta direttamente all'opinione comune, ed eziandio ella è tale, che non è niente meno vera, e niente affatto discordante dalla ragione. Noi tocchiamo con mano per via di numero grandissimo d'esperienze, come l'umido è quello, che rende fatale il gelo ai vegetabili; e per conseguente qualsivoglia cosa, che in essi vegetabili possa cagionare umidità, viene ad esporli ai soprammentovati malori, e di pari qualunque cosa, la quale, o possa impedire, o dilungare dai medesimi una porzione adeguata d'esso umido, qualsivoglia cosa, che possa asciugargli, quantunque sempremai con un freddo così accresciuto, forza' è, che venga ad impedire i malori divisi dai vegetabili, ed a tenernegli a coperto. Esperienze, ed osservazioni numerosissime tendono a provare questa verità. Ella è cosa molto ben conosciuta, come i vegetabili vengono senza riparo divorati, e sterminati dalle gelate nelle bassure, e nei baci, massimamente ove regnano le nebbie. Quelle piante, che sono piantate alle rive dei Fiumi, vengono assai sovente trovate interieramente distrutte dalle gelate di Primavera, e d'Autunno, dove per lo contrario quelle della specie medesima, che trovano piantate in luoghi più asciutti, infinitamente meno patiscono, o non risentono il menomo danno peravventura dai divisi geli: e le parti basse, ed umide delle foreste, e dei boschi, è cosa a chiacchiera notissima, come producono legname di grandissima lunga peggiore di quello, che vien prodotto dai luoghi eminenti, ed asciutti; e le ragnaje, o boschaglie di legname basso, e minuto in luoghi umidi e bassi de' nostri boschetti comuni, quantunque gettino rappolli alla bella prima più rigogliosi di quello facciano gli alberi degli altri luoghi, tuttavia non giungono a far buona, e perfetta crescita giammai: conciossiachè le brine, ed i geli di Primavera uccidendo assai per tempo le vette dei tenerelli germogli, forzano la parte più

bassa degli alberi a lanciarsi in ramificazioni laterali: e la cosa medesima in grado, o maggiore, o minore ai boschi di legname basso, che vien su sotto la copertura dei grossi alberi nelle ampie boschaglie; conciossiachè non essendo in questi dati luoghi portati via i vapori dal vento, ed afforbiti dal Sole, stagnanti, e si gelano, e vengono nella maniera medesima a distruggere i rappolli teneri, e giovanetti, non altrimenti che le nebbie li facciano nei terreni bassi, e galudosi. Ella si è somigliantemente una generale osservazione, che il gelo non arreca pregiudizio nè danno agli ultimi getti della vite, od alle gemme, o bottoni dei fiori degli alberi, le non se allora quando ne viene dietro un pesante, e grasso tempo umido, ed un tempo a lungo piovoso, ed allora non falla il gelo di recar danno grande, tuttochè sia sempre così leggero.

Viene osservato, come i geli riescono sempre assai più pregiudiziali nelle loro conseguenze in un terreno di fresco coltivato, di quello riescano in altri luoghi; e ciò avviene, perchè i vapori, che continuamente sorgono dalla terra, trovano un varco più agevole, e meno contrastato in quelli dati luoghi, di quello trovino in altri. Simigliantemente gli alberi, che sono stati di fresco tagliati, o potati, patiscono assai più degli altri dalle brine, e dai geli di Primavera, la qual cosa dee interieramente ascriversi al loro germogliare con maggior vigore, e rigoglio.

Producono di pari le gelate danno maggiore nei terreni sottili, leggieri, e sabbionosi, di quello si facciano in suolo fisso, e gagliardamente consistente, supponendo però quelli terreni, leggiero, e forte di pari asciutti; e questo pare, che in parte sia dovuto al loro essere più pronti nelle loro produzioni, ed in parte alla durezza, e rilasciata loro tessitura, come quella, che lascia aperto il varco, e l'uscita ad una massima quantità di traspiranti vapori.

E' stato similmente assai sovente osservato, come i rappolli laterali degli alberi sono assai più soggetti a perire per le gelate, e per le brine di Primavera, di quello sienolo i rappolli trovantisi nella vetta dell'albero; ed il valentissimo Mon-

ficur

fleur de Buffon, il quale fecesi ad esaminar questo fatto con accuratezza, a vero dire, estrema, ebbe sempremai a toccar con mano, come gli effetti dei geli di Primavera erano molto più forti, e maggiori in vicinanza del terreno, che in altre parti. I rampolli tutti trovantisi un solo piede alti da terra periscono totalmente nelle brine diviate. I germogli trovantisi due, o tre piedi distanti dal terreno soffrono il gelo molto meglio; e finalmente quei germogli, che trovansi quattro, cinque, e più piedi alti da terra, d'ordinario non vengono a patirne il menom danno, mentre i più bassi rimangono per intero distrutti.

E' questa una serie d'osservazioni, che ha fuor d'ogni dubbio provato, come non son già i duri, e erudelissimi geli quelli, che fanno così gran male alle piante, ma bensì le brine, e gelate di Primavera, e d'Autunno, qualunque assai meno severe, ed intense, le quali appunto accadono, allorchè i vegetabili, e la piante tutte trovansi piene abbondevolmente d'umidità. Quello poi ci spiega, ed appiana chiarissimamente l'istoria di tutti i gravissimi danni prodotti dai severissimi geli nelle parti trovantisi esposte al Mezzodì, e di quelli alberi di tale esposizione dai geli medesimi pregiudicati, tantochè questo aspetto sia stato evidentemente in essi geli assai meno battuto dal freddo, che il lato rivolto a Tramontana, grandissimo di pari sì è il danno, che vien prodotto nei lati Occidentali degli alberi, e delle piantagioni, allorchè dopo la caduta di una pioggia con un vento spirante da Ponente, il vento si muta, e verso il tramontar del Sole spira, e soffia da Tramontana, siccome avviene bene spesso in tempo di Primavera; oppure allora quando un vento levantino soffia sopra una fitta e grossa nebbia innanzi che il Sole si levi. Veggansi *Memoires Acad. Roy. Scienc. Paris. an. 1737.*

GEMELLI. Sono i *Gemelli* oell' Anatomia due piccioli, piatti, e stretti muscoli situati in guisa, che vengono presso che ad attraversarsi l'uno sopra l'altro, fra la prominenza dell'Ischio od osso Scio ed il Trocanter grande; immediatamente sotto il Piriforme, e divisi da un tendine dell'interno Otturatore.

Il Gemello superiore, o sia il più picciolo è affisso alla parte inferiore della spina dell'osso scio alla parte superiore del picciolo nodo sciatico, ed alla ruvida, ed aspra linea, che scorre incrociocchiata per l'esterior lato dell'osso scio, cominciando nella spina, e continuando fin sotto l'acetabolo, ove viene a piegarsi all'ingù.

Il Gemello inferiore, o sia massimo, è affisso alla parte superiore, e deretana della prominenza dell'osso scio, e ad una ruvida impressione, che scorre incrociocchiata sul lato esteriore dell'osso scio dall'estremità più bassa del nodo sciatico, e viene a sporgersi all'ingù verso l'altra linea, insieme colla quale viene a formarvi una spezie di semicircolo irregolare. Ambedue questi muscoli hanno similantemente una picciola innestatura nel lato inferiore dell'osso scio, ove essendo uniti insieme per via di una membrana particolare, uno d'essi congiunge il lato superiore, e l'altro il lato inferiore dell'Otturatore interno, un picciolissimo tratto dopo esser passato sopra l'annodatura. Questi muscoli chiudono non altramente che in una borsa, e continuano ad essere attaccati ad esso per via di fibre carnose trovantisi per ogni verso nella sua estremità. Il muscolo superiore viene a terminare interamente col tendino dell'Otturatore interno; ma l'inferiore, essendo più ampio, e più dilatato, viene ad essere similantemente innestato, per via di fibre carnose, nel ligamento orbicolare, e tutto il tendine dell'Otturatore medesimo. Veggasi *Winslow, Anatomia, pag. 210.*

GENERAZIONE. Credevano i buoni Antichi, che i Maschi, e le Femmine avessero parte uguale nell'opera grande della generazione, e che il feto venisse ad esser formato nella matrice, od utero per via d'una mescolanza dei fughii feminali d'entrambi i sessi; senza pensar tampoco di conoscere, o di desermar per mezzo d'alcun silema, la maniera onde operava in affare di così gran momento la Natura. I moderni Filosotanti si son fatti ad immaginare di saperne più degli Antichi, e così in tempi, ed in età differenti hanno adottati i due sistemi di generazione, di cui ragionasi a lungo sotto questo Capo nella *Ciclopedia*.

Ma

Ma le ultime esperienze de Monsieur de Buffon, e di Monsieur Needham, se non si son fatte a piantare, e stabilire un sistema nuovo, sembra per lo meno, che rovesciato abbiano fino dai fondamenti i vecchi sistemi.

Monsieur de Buffon adunque si è ingegnato a tutta sua possa di provare, come le uova credute stanziar nelle Donne, e nei quadrupedi, sieno prete chimere, e che gli spermatici animalucci esser non possono il Feto. Non venne fatto a questo valentuomo di trovare mai uovo alcuno, che si fosse staccato dall'ovaja, e che pel tubo Falloppiano passato fosse nella matrice. Ma egli ebbe a scoprire bensì un corpo glandulare nel testicolo femminile, che dagli Anatomici per errore è stato preso per un di quest'uova: il qual corpoglandulare in certi dati tempi gonfiavasi, si apriva, e mandava fuori un liquore pieno zeppo degli animalucci medesimi, i quali dal Levenecchio furon presi per creature viventi stanziati nello sperma maschile. Monsieur de Buffon poi aggiunge, come egli trovò dei corpi in tutto e per tutto analoghi a quelli non solo nei semi d'animali sommaramente differenti, ma eziandio nelle infusioni delle piante, dei granelli, e nei luoghi delle carni, cucinate e lessate per mezzo del fuoco di modo che non potevano lasciare entro di se alcuno animale vivente. Quindi conchiude questo ingegnabilissimo Gentiluomo, che questi presetti animalucci non sono in conto veruno i futuri animali della specie del padre: nè egli vuol'indursi tampoco a concedere, che sieno veracemente animali; ma falsi ad asserire, come essi sono alcuna cosa di una natura di mezzo fra la materia bruta, e gli animali; parti animate, ed organizzate, l'unione, o congerie delle quali venga a formare il Feto. Veggansi *Lettres de Monsieur de Maupertuis, Lettre 17.*

Ma la difficoltà principale consiste nel concepire, come il Feto venga ad esser formato da questi elementi. Falso Monsieur de Buffon ad immaginare, che cadauna parte del corpo in ambi i sessi somministri queste molecole organiche, le conserve delle quali sono i liquori seminali, spermatici d'entrambi i sessi: che questi liquori vengano ad unirsi, ed accozzarsi

insieme per via d'attrazione in certe date forme interne in una maniera la quale quello dritto Autore si è ingegnato di spiegare ampiamente: ma che non sembra tale, che possa ammettere un' estratto, o compendio, a coloro, i quali non amano d'incorrere il rischio di rappresentare malamente i sentimenti di lui in un soggetto così tenebroso; che perciò noi rinunciamo di buon grado i curiosi di sì fatte materie all' Originale, vale a dire all' *Historia sua Naturale* stampata in Parigi nel 1749. ove il soggetto della Generazione fa la parte massima del secondo Volume.

Il sistema di Monsieur de Maupertuis nella sua *Venere Fisica* si avvicina grandemente a quello di Monsieur de Buffon, e tende ugualmente, e di conserva a rovesciare e distruggere i sistemi dell'uova, e degli animalucci spermatici, che hanno dominato tanto, e dominano tuttora presso i moderni Fisiologi.

Il primo di questi v'entuomini per confermare non meno la propria opinione, che quella di Monsieur de Buffon, aggiunge un' istoria d'una Famiglia dalle sei dite, come egli la appella, di Berlino, molti della qual Famiglia hanno un dito di più ne' piedi, ed alcuni sì nelle mani, che nei piedi. Egli dice, come questo fessigitismo, o qualità d' avere un dito di più, sia stata di pari tramandata, e trasmessa nella prole sì dal Padre, che dalla Madre; e che questa venne poi perduta per i matrimoni, che queste date persone fecero con tali altre, che avevano soltanto il numero delle dita comune a tutti. Aggiunge di vantaggio, come egli non può credere, che dar si possa alcuno il quale sia per attribuire al mero caso la continuazione del fessigitismo in un' intera Famiglia. Queste parti soprannumerarie state sarebbono varietà accidentali dapprima; ma in evento, che si fossero confermate e stabilite una volta da un numero sufficiente di generazioni, ove avute le avessero entrambi i sessi; questi in tal caso diverrebbero un fondamento per una specie di creature ragionevoli distinte; e per avventura tutte le specie differenti distinguibili in animali della specie medesima, sonosi per questa unica via moltiplicate. Quello, che noi possiamo osservare negli altri animali, ci per-

porge argomenti per sì fatte congetture, o sospetti; avvegnachè noi non ci azzarderemo mai a caratterizzare cose di somigliante natura con più precisa espressione. Veggasi la Lettera tellè citata.

GENERE. Per la voce *genere*, *genus*, nell'Istoria Naturale noi venghiamo ad intendere una certa analogia d'un numero di specie, che fa, che esse accordinsi, e convengano insieme nel numero, nella figura, e nella situazione delle loro parti in una sì fatta maniera, che vengono ad essere agevolmente distinte da qualsivoglia altro genere, per lo meno per via d'alcuno articolo. Questo sì è il proprio, adeguato, e determinato senso della voce genere. L'hanno alcuni estesa alle Classi, sotto le quali sono formati i generi, facendosi ad appellare la Classe *genere sommo*, *genus summum*, e quello *genere subalterno*, *genus subalternum*.

Un genere nella Istologia, a cagion di esempio, è un certo accordo, o conformamento fra le parecchie specie, fondato nella somiglianza di loro eterne parti essenziali, riguardanti generalmente la loro situazione, il lor numero, la loro figura, e la loro proporzione. Su questo fondamento, se fosse trovato, che un pesce fosse differente da tutti i generi conosciuti in alcun punto essenziale, ne dovrebbe l'Istologo intrudere forzevolmente quello pesce negli ordini d'alcuno dei primi generi, ma darne uno speciale al medesimo; ed è estremamente probabile, che alcuni altri pesci possan dopo scuoprre appartenenti al genere medesimo, al quale questo appartensi, e che non sieno più riducibili di quello esso siasi ad alcuno dei generi formalmente stabiliti. Veggasi *Arte di Ichthyolog.*

GENERE nella Musica. Era il Genere nell'antica Musica una divisione del *Diatessaron*, o Quarto (*a*), contenente quattro tuoni, in tre intervalli (*b*).

(*a*) Euclid. *Introd. Harm. part. 1. Edit. Neibom.* (*b*) *Transf. Filosof. num. 481. pag. 271. Gaudenr. Par. 5. Edit. Neibom.*

Fabbricarono i Greci tre generi di tal natura che vengono conosciuti sotto i nomi seguenti, vale a dire, *Enarmonico*, *Cromatico*, e *Diatonico*. Veggansi gli Articoli **ENARMONICO**, **CRAMATICO**, cc.

Il genere *Enarmonico* non veniva suddiviso; ma il *Cromatico* era diviso in tre specie; ed il *Diatonico* in due; di modo che avevano gli Antichi sei specie, o divisioni differenti del *Diatessaron* nell'uso, e pratica loro.

I moderni ne conoscono soltanto quattro (*c*); ed uno di questi, vale a dire l'*Enarmonico*, appena incontrasi alcuna volta colla loro pratica. Non apparisce, che i medesimi antichi definissero accuratamente queste diverse divise specie. Aristosseno lasciò all'orecchio, ed alla pratica; nè pretese d'assegnarne alcuna proporzione in numeri. Tentò egli però di introdurre alcuna idea di questi generi, e di queste specie per via di farli a supporre il *Diatessaron* diviso in trenta parti. Che è quanto dire (siccome lo intende Tolomeo) egli suppone la differenza d'una corda, ed il suo quarto, doverli dividere in trenta parti; e poscia falsi ad assegnare un numero certo di queste parti a cadauno intervallo, o sia divisione delle varie specie. Quindi contenendo il Quarto (*d*), o *Diatessaron* due toni, ed un mezzo tono, cadauno di essi toni verrà ad avere dodici parti, ed il semitono tre parti.

(*c*) Veggansi le *Transf. Filosof. num. 487. pag. 272.* (*d*) Wallis, *Appendix ad Ptolem. Harmoniam, pag. 164.*

Nel genere *Enarmonico* egli fa che l'intervallo fra l'*hypate*, ed il *parhypate*, come altresì fra il *parhypate* ed il *lichanus*, sia un *diefis* quadrante, oppure $\frac{1}{2}$; e dal *lichanus* al *nete*, ci fa un ditono, oppure $\frac{2}{3}$; di modo che le divisioni enarmoniche verranno ad essere $3 + 3 + 24 = 30$.

Nel molle *cromatico* (*e*) ci fa, che l'intervallo fra l'*hypate*, ed il *parhypate*, come altresì dal *parhypate* al *lichanus* sia un *diefis* triente, oppure $\frac{1}{3}$; e dal *lichanus* al *nete* $\frac{2}{3}$, vale a dire, un intervallo indiviso uguale al tono, ad un semitono, e ad un *diefis* triente. Quindi gl'intervalli di questa specie saranno rappresentati dai numeri $4 + 4 + 22 = 30$. (*f*).

(*e*) *Μολδος*. (*f*) Wallis *ibidem*.

Nel *Emiolo Cromatico* (*g*), o sia *scusquialtero* (*h*), egli fa, che l'intervallo dall'*hypate* al *parhypate*, e quindi al *lichanus*, sia un *diefis* scusquialtero, che è quanto di-

dir e $\frac{1}{2}$ del diefis enarmonico, oppure $4\frac{1}{2}$ parti della sua divisione del Quarto o sia Diatessaron. Il rimanente intervallo indiviso è di parti 21, essendo uguale ad un tono, ad un emitono, ed al diefis quadrantele. Questa spezie verrà ad essere rappresentata dai numeri $4\frac{1}{2} + 4\frac{1}{2} + 21 = 30$. (i) oppure per iscrivere le frazioni, $9 + 9 + 42 = 60$.

(g) *Ἰσίδωρος*. (h) *Τρανζαζ. Filosofo. n. 481. pag. 272.* (i) *Wallis ibidem.*

Nel tonico cromatico, o sia tonico (k), ci pone l'intervallo fra l'hypate, al parypate, e da esso al lichanus, d'un emitono, oppure $\frac{1}{2}$, e quindi al nete, un tono, ed un semitono, oppure $\frac{1}{2}$. Quindi le spezie verranno ad essere comprese dai numeri $6 + 6 + 18 = 30$. (l).

(k) *Tonico.* (l) *Wallis, ibidem.*

Nel Molle Diatonico (m) ci fa, che l'intervallo fra l'hypate, ed il parypate sia un emitono, oppure $\frac{1}{2}$, quindi al lichanus $\frac{1}{2}$; e da questo al nete $\frac{1}{2}$, di modo che questa spezie verrà ad essere rappresentata dai Numeri $6 + 9 + 15 = 30$. (m) *μαλακόν.*

(n) *Wallis, ibidem.*

Nel Diatonico inteso, o sia Sintono (o), l'intervallo fra l'hypate, ed il parypate è, secondo questo Autore, un Emitono; e fra il parypate, ed il lichanus, come altresì fra il lichanus, ed il nete, è un tono. Quindi l'espressione di questa spezie verrà ad essere, $6 + 12 + 12 = 30$. (p).

(o) *Σύντονος.* (p) *Wallis, ibidem.*

Le stesse stessissime divisioni sono in Euclide (q); e Tolomeo (r) dà le proporzioni medesime, e simiglianti tolte da Aristosseno, altro non facendo, salvo che raddoppiare i numeri per isfuggire le frazioni.

(q) *Introducit. Harmon. p. 10. tt. Edit. Meibom.* (r) *Harmon. Lib. 1. cap. 12.*

Non pretende Aristosseno, che le divisioni, cui egli propone sieno esatte, ed ac-

curate. Pare, ch'ei si faccia a dubitare del Diatessaron, che questo cioè sia due toni, ed un semitono; come anche del suo essere totalmente misurabile per via di qualsivoglia picciolo intervallo, quali sono l'emitono, ed il diefis. Fatti cgli a rievocare in questione, se il diefis enarmonico sia precisamente la quarta parte di un tono; oppure se il diefis cromatico sia la sua terza parte. Questi suoi dubbj sono di pari benissimo fondati. E sembra, a vero dire, non altrimenti, che quello famosissimo Musico abbia soltanto proposto le sue divisioni del tetracordo, come meri approssimamenti per introdurre alcuna idea nell'immaginazione delle spezie differenti; e non già come un' esempio, canone, o prova esatta, ed accurata per regolare la voce, e la mano nel cantare, e nel suonare. Veggasi *Wallis*, Append. ad *Harmoniam Ptolem.* pag. 169.

E' questa la Dottrina de' buoni Antichi in rapporto alle loro spezie, o quarti.

Rispetto poi ad accordare, ed a conciliare questa dottrina medesima colle Nazioni moderne, è cosa non isperabile gran fatto; avvegnachè l'accorda questa colle diviate nazioni, e con i veri Principi della Musica, ella farebbe un'opera sommamente difficoltosa, e malagevolissima. Il Dottor Pepulch ci ha presentato la sua opinione rispetto a ciò, che queste sei spezie dovrebbero accuratamente essere. Quanto poi, e come questa sua opinione sia deducibile da ciò, che ci resta degli antichi Musici, non per anche ei lo ha fatto vedere al Pubblico. Noi abbiamo fatto parola della costui Dottrina sotto gli Articoli CROMATICO, DIATONICO, ed ENARMONICO, in questo nostro Supplemento; e qui gli porremo sotto un breve, e compendioso aspetto. Veggansi le *Tranfaz. Filosofo. num. 481. pag. 266. & seq.*

Intervalli dell' Enarmonico, IV. = f + d + III.

del Cromatico molle, IV. = f + f + (3 + d)

del Cromatico Squaltero, IV. = S + f + 3;

del Cromatico Tonico, IV. = S + S + (T + f)

del Diatonico molle, IV. = S + 2f + (T + d)

del Diatonico inteso, IV. = S + r + T.

Per intender questo egli osserva, come d
fra in luogo del diefis enarmonico, f pel
semitono minore, S pel semitono maggio-

re, r pel tono minore, T, pel tono maggiore; 3. per la terza minore; III. per la terza maggiore; IV. pel quarto, o diatessaron; -

ron; ed allorchè due intervalli son piantati entro una parentesi, viene a significare un solo intervallo uguale a due intervalli congiunti per via del segno, od aggiunta +. Così $(3 + d)$ viene ad essere un intervallo uguale alla terza minore, ed al diesis enarmonico: $(T + f)$ viene ad essere equivalente al tono maggiore, ed al semitono minore, appellato comunemente un tono superfluo: ed ultimamente $(T + d)$ importa un tono maggiore, ed un diesis enar-

monico, il quale intervallo niente più di $(3 + d)$ non ha nome particolare. Veggasi le Transf. Filosof. num. 481. p. 272.

Ci ha il Dottor Wallis somministrato una Sinopsi dei generi, e delle specie secondo Aristosseno; ed a noi piace il qui collocarla, come quella, che somministra del lume per intendere la Dottrina degli antichi tetracordi. Veggasi Wallis, Append. ad Ptolem. Harmon. pag. 164.

Sinopsi dei Generi, secondo Aristosseno.

Genere Enarmonico.	Genere Cromatico			Genere Diatonico	
	molle	Emiolio	Tonico	molle	intenso
30	Nete.	Nete.	Nete.	Nete.	Nete.
24				15	12
18	24	21	18		Parenete
15					Lichanus
12				Parenete	
9				Lichanus	12
6				9	
3				6	
	Parenete	Parenete	Parenete		
	Lichanus	Lichanus	Lichanus		
	4	$4 \frac{1}{2}$	Trite	Trite	Trite
	Trite	Trite	Trite	Trite	Trite
	Parypate	Parypate	Parypate	Parypate	Parypate
	4	$4 \frac{1}{2}$	6	6	6
	Hypate	Hypate	Hypate	Hypate	Hypate

Il graduale approssimamento del parane-re al nete nelle spezie differenti, fa vede-re, onde quella corda sia denominata li-chanus. La lunghezza di questa Figura, oppure il lato diviso in tre parti, vien supposto, che sia la differenza di qualsivoglia corda, e del suo quarto. Tolomeo prende quelle divisioni in un quarto ascen-dente; vale a dire, la più lunga delle due corde, oppure il tutto, d'una corda vien terminato nell' hypate; e la terminazione della corda più corta, o di quella parte della lunghezza della corda suonante un quarto al tutto, è in nete. Di modo che ei è giuoco forza l'immaginare novanta parti aggiunte all'insi di questa Figura di là dal nete; ed allora, a cagion d' esempio, le lunghezze delle corde, o seno parti di una corda, rappresentanti il diatonico in-renso d' Aristosseno, secondo Tolomeo, ver-ranno ad essere 120, 114, 102, e 90. Veggasi *Ptolem. Harm.* pag. 92. Edit. *Wal-lis* in *Oper.* Tom. 3.

Ma ci fa di meliori osservare, come le novanta parti verrebbero ad essere aggiun-te all' ingiù nella precedente espolla Figu-ra, e Tavola dall' hypate; ed allora noi verremo ad avere un quarto discendente espresso dagli appresso numeri, cioè, 90, 96, 108, e 120, che riesce perfettissima-mente nel tono, e ci dà un semitono mag-giore, il tono maggiore, ed il tono mi-nore. Perchè $\frac{90}{96} = \frac{5}{6}$ è la proporzione delle lunghezze di corde esprimenti il se-mitono maggiore; $\frac{90}{108} = \frac{5}{6}$ è nella ma-niera medesima un tono maggiore; e $\frac{90}{120} = \frac{3}{4}$ è l'espressione del tono minore. Dall'altra parte i numeri di Tolomeo so-no grandemente fuori di tono, e tali, che un Musico somigliante ad Aristosseno di-videndo una corda colla sua orecchia, non sarebber caduto sopra. Noi non conosciamo

mo fra i Comentatori de' buoni antichi uno, che abbia fatto somigliante osserva-zione; ma se noi ci faremo a tenerle die-tro per tutte le spezie, noi verremo a tro-vare una differenza sensibilissima nelle espres-sioni delle proporzioni dei varj intervalli ritrovati, secondo la maniera di Tolomeo, e fra quelli ritrovati nella guisa qui men-tovata, ed esemplificati nel diatonico in-tenso. Aristosseno, ed i suoi seguaci si fe-cero a determinare le parecchie spezie, o seno divisioni del quarto per via d' inter-valli, facendo tutto il diatessaron uguale a due toni, ed un semitono. Ma i Pittago-rici ponendo al sesto met due da un lato, ne presero un'altro, per cui essi andarono in cerca di tre ragioni, le quali aggiunte insieme venissero a produrre la ragione di 4. a 3., essendo questa l'espressione del quarto, o sia diatessaron. E siccome que-sto potrebbe essere eseguito variamente, così fecerli coloro a piantare diversi generi, o, per meglio esprimersi, varie differenze di generi. Veggasi *Ptolem. Lib. 1. cap. 9.* Edit. *Wallis*, *Oper.* Tom. 3.

Ma non ammettono essi già confusamen-te le ragioni tutte. Fannoli costoro a con-siderare principalmente quelle tali ragioni, che sarebbero multiple, e soprapparticola-ri, e non ne ammettono delle soprappa-zienti, se non se per mera necessità, e mol-to meno ammettono l'espressioni incommen-surabili. Veggasi *Wallis*, Append. ad *Pro-blem Harmon.* pag. 166. *Operum* Tom. 3. Ci somministra Tolomeo (f) parecchie divisioni del tetracordo, in parte del suo proprio, ed in parte d'altri, le quali noi esporremo qui in una breve veduta, cavan-dola dall'appendice del Dottor Wallis agl'i Armonici di Tolomeo (t).

(f) *Ibid. lib. 1. cap. 13. 14. 15. e 16.*
(t) *Pag. 166. Oper. tom. 3.*

$\frac{9}{8}$	$\times$	$\frac{9}{8}$	$\times$	$\frac{1}{2}$	$=$	$\frac{1}{2}$	Enarmonico	} di Archita.
$\frac{8}{7}$	$\times$	$\frac{8}{7}$	$\times$	$\frac{1}{2}$	$=$	$\frac{1}{2}$	Cromatico	
$\frac{7}{6}$	$\times$	$\frac{7}{6}$	$\times$	$\frac{1}{2}$	$=$	$\frac{1}{2}$	Diatonico	
$\frac{6}{5}$	$\times$	$\frac{6}{5}$	$\times$	$\frac{1}{2}$	$=$	$\frac{1}{2}$	Enarmonico	} d' Eratostene.
$\frac{5}{4}$	$\times$	$\frac{5}{4}$	$\times$	$\frac{1}{2}$	$=$	$\frac{1}{2}$	Cromatico	
$\frac{4}{3}$	$\times$	$\frac{4}{3}$	$\times$	$\frac{1}{2}$	$=$	$\frac{1}{2}$	Diatonico	
$\frac{3}{2}$	$\times$	$\frac{3}{2}$	$\times$	$\frac{1}{2}$	$=$	$\frac{1}{2}$	Enarmonico	} di Didimo.
$\frac{2}{1}$	$\times$	$\frac{2}{1}$	$\times$	$\frac{1}{2}$	$=$	$\frac{1}{2}$	Cromatico	
$\frac{1}{1}$	$\times$	$\frac{1}{1}$	$\times$	$\frac{1}{2}$	$=$	$\frac{1}{2}$	Diatonico	

$\frac{4}{3} \times \frac{2}{3} = \frac{8}{9}$	$\frac{2}{3} \times \frac{4}{3} = \frac{8}{9}$	$\frac{4}{3} \times \frac{2}{3} = \frac{8}{9}$	Enarmonico
$\frac{2}{3} \times \frac{4}{3} = \frac{8}{9}$	$\frac{4}{3} \times \frac{2}{3} = \frac{8}{9}$	$\frac{2}{3} \times \frac{4}{3} = \frac{8}{9}$	Croma molle
$\frac{4}{3} \times \frac{2}{3} = \frac{8}{9}$	$\frac{2}{3} \times \frac{4}{3} = \frac{8}{9}$	$\frac{4}{3} \times \frac{2}{3} = \frac{8}{9}$	Intenso
$\frac{2}{3} \times \frac{4}{3} = \frac{8}{9}$	$\frac{4}{3} \times \frac{2}{3} = \frac{8}{9}$	$\frac{2}{3} \times \frac{4}{3} = \frac{8}{9}$	Diatonico molle
$\frac{4}{3} \times \frac{2}{3} = \frac{8}{9}$	$\frac{2}{3} \times \frac{4}{3} = \frac{8}{9}$	$\frac{4}{3} \times \frac{2}{3} = \frac{8}{9}$	Tonico
$\frac{2}{3} \times \frac{4}{3} = \frac{8}{9}$	$\frac{4}{3} \times \frac{2}{3} = \frac{8}{9}$	$\frac{2}{3} \times \frac{4}{3} = \frac{8}{9}$	Diatonico
$\frac{4}{3} \times \frac{2}{3} = \frac{8}{9}$	$\frac{2}{3} \times \frac{4}{3} = \frac{8}{9}$	$\frac{4}{3} \times \frac{2}{3} = \frac{8}{9}$	Intenso
$\frac{2}{3} \times \frac{4}{3} = \frac{8}{9}$	$\frac{4}{3} \times \frac{2}{3} = \frac{8}{9}$	$\frac{2}{3} \times \frac{4}{3} = \frac{8}{9}$	Equabile

di Tolomeo.

GENEVA. Non ebbi giammai al Mondo quantità cotanto abbondevole del liquore con questo nome *Genus* volgarmente chiamato, quanta si è quella, che ne vien fatta al presente: ma questo che oggi abbiamo, e che si battezza con questo nome, è un liquore, che è tutt'altro da quello, che dapprima appellossi Geneva. La Geneva migliore, e più perfetta, che noi di presente abbiamo, è fatta da uno spirito ordinario, distillato per la seconda fiata insieme colla giunta d'alcune poche coccole di ginepro. Ma l'originale liquore di simigliante spezie veniva preparato in una foggia totalmente diversa. Egli si era un costume nel distillarsi degli spiriti dal mosto della birra novella, o da altri fermentati liquori, quello d'aggiungere nella operazione alcune ingrediente aromatico, come, a cagion d'esempio, il gengiovo, o zenzero, la corteccia vinterana, od alcuni granelli d'eri di paradiso a fine di fare svanire, o per reprimere il pravo sapore, ed insieme per dare allo spirito un gusto pungente. Tra le altre cose, che venivano per sì fatto fine messe in opera, alcuni ponevano a prova le coccole di ginepro, e venendo a toccar con mano, come queste non solamente compartivano un sapore gustosissimo allo spirito; ma che di vantaggio impregnavano di virtù medicinali l'omamente valutabili; il costume venne quindi a farsi universale, ed il liquore continuò a venderli sotto il nome medesimo di Geneva. Il metodo d'aggiungere le coccole divise si era di unirle al malto nel macinarlo: n'era assegnata soltanto una porzione adeguata, ed il tutto veniva ridotto insieme in una farina, e lavorato secondo l'usanza comune. Lo spirito per simigliante guisa procurato possiede, siccome esprimonsi i distillatori, *ab origine* il sapore delle coccole, e soverchia-

va qualsivoglia altro spirito ottenuto in qualunque altra guisa, o per qualunque altro metodo. I nostri distillatori comuni lasciano intieramente fuori dal liquore, cui essi ora fanno, le coccole di ginepro, e seguitano a spacciarlo sotto questo nome. I nostri Chimici marioli, ed ingannatori ci vanno tenendo come un segrero, che l'olio delle coccole di ginepro, e quello della trementina, sono somigliantissimi rispetto al sapore, quantunque sien grandemente differenti nel prezzo; ed il metodo comune, col quale fanno, e preparano costoro ciò, che in Londra addimandasi Geneva, si è collo spirito del mosto usale novello per la birra, e con un'adeguata porzione dell'olio di trementina, distillati insieme. Veggasi *Show*, Saggio intorno alla faccenda della distillazione, pag. 7.

GEOMETRICO. Metodo geometrico degli Antichi. Dee essere osservato, come gli Antichi stabiliscono le parti più eminenti di loro Geometria nei principi medesimi, come elementi di questa Scienza, per via di dimostrazioni della stessa spezie: e che sembra essere essi stati sommamente diligenti nel non supporre alcuna cosa fatta, fino a tanto che per mezzo d'un previo problema mostraro non avessero, come ella dovesse essere effettuata. Erano essi, a vero dire, tanto più lontani dal supporre alcuna cosa come fatta, che non poteva per essi esser concepito, come una linea od una serie dovesse essere attualmente continuata all'infinito, oppure, che una grandezza dovesse essere diminuita, fino a diventare infinitamente minore di quello; che ella si era. Gli elementi ne quali risolvevano gli Antichi le grandezze, erano finiti, e tali da poter esser concepiti per cose reali. Le illimitate libertà sono state introdotte, che non ha guari, per le quali la Geometria, che esser dovrebbe, e che realmente sarebbe

D 2

chia-

chiarissima, e sommamente piana, è venuta ad esser tutta piena zeppa d' arcani, e di misteri tenebrosissimi. Veggasi *Mac-Laurin*, Trattato delle Flussioni, Introduzione, pag. 39. & seq.

GERMOGLIAMENTO. Per la voce *germogliamento* viemsi ad esprimere il primo gittare che fanno il tallo le piante dal seme loro. Ella è stata un' opinione universale, che l'aria fosse un' agente sommamente necessario nel germogliamento delle piante: ma Monsieur Homberg tanto astaticolli, e studid di sì fatta maniera per anni moltissimi, finchè gli venne fatto, di provare in faccia all' Accademia Reale delle Scienze di Parigi, come questa opinione era totalmente erronea, e falsa. Falsi egli ad osservare, come il germogliamento d' una pianta, altro non è, che un gonfiamento, ed un dilatamento delle sue parti, le quali trovansi già tutte per intero formate nel seme, e che questo gonfiamento, e dilatamento di esse, altro non è se non se il medesimo a capo: in d' una spugna, allorchè vien fatta imbevverli dell' acqua. Quindi fecesi egli a dedurre, che siccome una spugna, se venga inumidita coll' acqua, verrebbe a gonfiarsi di pari nel vacuo, che nell' aria aperta; così senza ombra di dubbio una pianta gonfierebbe nel seme, che è quanto dire, germoglierebbe nella guisa medesima medesimissima tanto trovantesi nell' aria, che priva, ed a coperto di quella: che perciò i semi nel terreno seminati, forzi è, che gonfissi, e germogliano di pari nel vacuo, che nell' aria aperta; e per conseguente, che l'aria nulla affatto contribuiva all' effetto.

Per simigliante guisa corrispondendo così bene la ragione ai sentimenti di lui sopra il fatto soggetto per analogia; determinossi di ridurre il fatto all' esperienza, lo che egli eseguì nell' appresso guisa.

Si procurò Monsieur Homberg una cassetta di legno lunga quattro dita, e due dita larga: in questa cassetta aggiustovvi cinque divisioni, o spartimenti: tutti questi spartimenti gli riempì di buona terra da orto, e seminovvi cinque varie forti di semi; vale a dire, di porcellana, di crescione, di lattuga, di cerfoglio, e di prezzemolo. Di sì fatti varj vegetabili posene quaranta grancelli, e semi per scomparti-

mento. Il primo dì di Maggio dell' anno 1693. collocò la descritta cassetta così preparata entro il recipiente d' una macchina pneumatica, da cui estrasse l'aria nella maniera la più esatta, che sia mai possibile: ogni tre giorni ei cavò fuori della macchina la cassetta per annaffiar la terra, e colla prestezza immaginabile maggiore ricollocolla entro il recipiente, estraendo ogni volta l'aria coll' elasticità la più scrupolosa; ed oltre a ciò volle eziandio usare ogni mattina la diligenza d' estrar fuori della macchina, che eravisi introdotta in compagnia dell' acqua, di cui erasi servito per inumidire la terra.

Per rendersi poi totalmente valevole a giudicare con tutta la perfezione maggiore del germogliamento di questi semi, e d' altri, che godevano il vantaggio comune dell' aria, ei fecesi a seminare lo stesso numero de' semi medesimi in una cassetta a capello delle medesime dimensioni dell' altra, e questa lasciolla esposta all' aria aperta, ed annaffiolla ogni tre giorni, siccome faceva gli altri semi stanziati nel vacuo: epose eziandio questa seconda cassetta alcune fiato al Sole, lo che però non potette far con frequenza, avvegnachè in quell' anno il mese di Maggio andò per lo più nuvolosissimo. Nella cassetta esposta all' aria il germogliamento del crescione spuntò fuori il dì cinque dello stesso mese di Maggio, quello della lattuga il settimo giorno, quello della porcellana l' ottavo, quello del cerfoglio l' undecimo, e finalmente quello del prezzemolo, il decimoquarto giorno dello stesso mese. Tutti i germogli divisiati continuarono la loro crescita, a riserva di quello della porcellana, che venne ucciso dallo straordinario freddo, che regnò in quell' annata anche in tal mese. Nella cassetta tenuta chiusa nel recipiente della macchina pneumatica senz' aria, durante i primi nove giorni non vi comparì il menomo germogliamento; ma nel desimo giorno fecersi vedere, e spuntaron fuori alcuni germogli di crescita, ed alcuni della porcellana. La lattuga non cominciò a vericare prima del decimoquinto giorno, e deiquaranta semi, che di essa furono seminati, non ispuntarono che soli quattro; ma questi in soli tre giorni di tempo fecero una crescita d' un dito rispetto all' altezza; ma le prime
due

due foglie non si dilatarono, nè crebbero in grossezza. La cosa stessa a capello osservossi nel crescione non meno, che nella porcellana, con quella differenza però, che le foglie della lattuga non venne so dell' esatta configurazione e grossezza di quelle, che vegetarono all'aria aperta; dove per lo contrario quelle della porcellana, e del crescione crebbero, e vanner su della grossezza medesima. Entro la macchina la porcellana non visse più d' una sola giornata, ed il crescione vissevi soltanto cinque giornate; passato quello tratto di tempo le loro foglie annerirono, e marcirono: la lattuga poi continuò a mantenersi vigorosa, e fresca per quindici giorni. In tutto il diviso tratto di tempo, nè il crescoglio, nè il prezzemolo gittò fuori il menomo germoglio: per lo che venne Monsieur Homberg in forte desiderio di vedere in quale stato si trovassero quelli semi, i quali non avevano germogliato, tutto che si trovassero in mezzo alle circostanze medesime di quelli, che ciò fatto avevano, e se fossero per germogliare all'aria aperta, dopo, che ciò fatto non avevano entro il recipiente della macchina vuotata dell'aria; ma quelli, che l'esperienza avesse conformati nelle circostanze medesime determinossi di continuare a tenergli chiusi nel recipiente medesimo, ma col restituir soltanto a quello l'aria, che ne era stata estratta. Diè loro adunque l'aria il dì ventiquattro di Maggio, e chiuse diligentissimamente il valo, e nel dì ventette vi si videro spuntare alquanti germogli di crescoglio, ed alcuni novelli germogli similgiantemente di crescione, e di porcellana; ed il dì trentuno, od ultimo del mese medesimo, saltaron fuori intorno a venti germogli di prezzemolo eziandio. Il dì seguente non produsse altri nuovi germogli; e Monsieur Homberg per provare, se questi germogli, che erano usciti fuori nell'aria chiusa, avessero vissuto poscia nell'aria aperta, cavò fuori della macchina la cassetta, ed esposela all'aria viva; ma ebbe a trovare, come tutti questi germogli in pochissimi giorni appassirono tutti, e perirono, come che fossero stati ogni sera diligentemente annaffiati.

Oltre al fenomeno diviso avvenne di pari altro cambiamento nella terra, che

era stata chiusa entro il recipiente, assai osservabile, nell'esporsi all'aria viva; era questa terra della più fina terra, o terriccio da fiori, e per le prime cinque giornate non diè segno menomo di cambiamento; ma la seconda volta che venne annaffiata, vale a dire il sesto giorno, allorchè l'aria venne ad essere chiusa di fra l'acqua, la terra fermentò, non altrimenti, che una massa di recente lievito pel pane, e rigonfiò grandemente, soverchiando i lati della cassetta per modo, che porzione di questa terra venne a cadere nel recipiente stesso. Dopo di ciò il fenomeno medesimo si fece vedere ogni volta, che la terra medesima venne annaffiata, appunto nell'atto di trar fuori della macchina l'aria stanziate fra l'acqua; e ciò, che è grandemente considerabile, la terra dopo di questo cambiamento divenne morbidissima, e grassa, come si toccò con mano, in maneggiandola, dove innanzi al diviso fenomeno ella era ruvida, ed arsiccia, in toccandola. Si fatto fenomeno è assai probabile, che avvenisse dal disunirsi di certe particelle nella terra medesima, che mentre mantenevasi insieme faceva de' grossi granelli, e riusciva perciò al tatto ruvida, ed arsiccia.

Altro osservabilissimo cambiamento nella terra medesima si fu, che l'ottavo giorno dopo essere stata rinchiusa nel recipiente della macchina pneumatica, comparve essersi mutata di colore, e quando veniva posta a certi aspetti di luce, compariva grigia, e di un'appariscenza lustra lucente. In esaminando col microscopio la cagione di sì fatta apparenza, fu veduto, come la superficie tutta della terra era coperta di finissimi diletissimi filamenti similgiantissimi a quelli delle tele dei ragnateli. La terra tutta compariva non altrimenti che ella fosse muffata, a cagione della divisa coperta di filamenti, alcuni de' quali alzavansi in corte prominenti nella superficie, altri da altre parti, ed incrociandosi gli uni gli altri, venivano a formare una spezie di tela di natura sì fatta, che allora quando la terra veniva annaffiata, l'umido ruotolavasi bene spesso sopra essa tela in grosse goccioline per alcun tratto di tempo, prima d'insinuarsi entro la terra, e di rompere la tessitura di quella. Alla bel-

bella prima venne sospettato, che quello fosse nistro sporgentesi fuori della terra medesima; ma alla per fine toccossi con mano, altro questa non essere, che una sostanza fungosa quivi vegetata, e la quale qualunque volta ne fosse stata tolta via, non rinnuovavasi mai più. Per tutto quel tratto di tempo, che i germogli dei divisi semi vennero tenuti entro il recipiente della macchina, sendone stata cavata fuori l'aria, collantemente conservossi sopra la vetta di cadauno di questi germogli una gocciola d'acqua, la quale via via che andava di tratto in tratto crescendo in grossezza, scorreva giù per i lati del germoglio, e s'internava nella sottoposta terra: ma tosto che questa calata della ingrossata gocciola era seguita, vedevasi immediatamente formarli altra gocciola sulla vetta dello stesso germoglio.

Quotunque simili esperienze non riuscissero con quella forza rispetto alla crescita dei germogli, come altri sarebbero promesso, tuttavia quelle vengono a provare assai bailevolmente, come nè l'elasticità, nè il peso dell'aria, sono punto necessari al germogliamento de' semi, avvegnachè fusonvi, come abbiamo veduto, alcuni semi, i quali gittarono i loro germogli nel vacuo. Forz'è però, che venga conceduto, che l'aria, tuttochè non sia un'ageote essenziale, bisogna, che sia per lo meno un' agente accidentale nella produzione di questo effetto, poichè un numero grande di semi, i quali nel recipiente della macchina vuotata dell'aria non avevano gittato germoglio, germogliarono benissimo poi che vennevi l'aria introdotta. La ragione, che dà Monsieur Homberg della cattiva riuscita dei semi, sembra essere sommamente adeguata. Fatti questo valentuomo ad osservare, come in ogni seme havvi sempre imprigionata una porzioncella d'aria; che quella allargasi, gonfia, e si dilata molto più interamente nel vacuo, ove non vi ha cosa menoma, che faccia testa a suoi movimenti, di quello quella faccia nell'aria viva, ed aperta, dalla quale viene per ogni, e qualunque verso ad esser premuta. In evento pertanto, che un seme venga ad esser seminato nell'aria aperta, quell'aria imprigionata nel seme medesimo incontrandosi colla resistenza

fattale dal di fuori, può spandersi, e distarsi soltanto in una maniera assai tarda, e regolare, e tale, che vaglia ad aiutare, e promuovere lo sviluppamento delle fibre della racchiusa pianta: dove per lo contrario, allorchè il seme trovasi seminato nel vacuo, l'aria imprigionata rompe, e si svaglia fuori in un subito eoo empito, e violenza grande, e d'ordinario si fugge, e dileguasi senza prestare la sua assistenza nell'opera della vegetazione. Se nella violenza del suo lanciarsi fuori, ella venga a lacerare, e squarciare i principali vasi della novella pianta, lochè non vi ha ombra di dubbio, che assai sovente accade, in tal caso, forz'è, che il seme totalmente perisca; ma se ella se ne vola via senza intaccare, e pregiudicare le divise fibre mastiche della pianta, allora i semi possono senza essa aria gittar benissimo il germoglio loro. Così appunto avvenne, che alcuni semi germogliarono nel recipiente della macchina pneumatica, estrarre l'aria. Questa si è la ragione, onde questi semi non germogliano, che lentamente, e debolmente; ed onde si pochi del meteorato nostro germogliassero, e la maggior parte d'essi non già. Veggansi *Memoires Acad. Roy. Scienc. Paris* ann. 1693.

Germogliamento metallico. Il Borrichio, nella sua *Istoria Chimica*, ci somministra alcuni racconti sommamente considerabili di questa specie di germogliamenti, e di una particolare massimamente, per cui egli fa sì a porre io mezzo un testimonio, come egli esprime, di veracità così grande, e di sì scarsa credenza, al quale egli dee onninamente acquiescere, e sottoscriversi. Questa Persona, ci dice egli, vivente in Brusselles, veniva sovente visitata da un forestiero, il quale regalollo di picciola porzioncella di certa polvere del peso di un granello d'orzo, per mezzo della quale dovea effettuarsi l'operazione d'uno di questi germogliamenti, e ebbe ciò ottenuto, dovea se gli restituire immancabilmente. Dovevasi porre in un vaso di cristallo tre, o quattro libbre d'acqua di fiume, e quella polvere essendovi posadentro, il tutto doveva essere insieme agitato, affinchè alcuna parte della polvere potesse esser disciolta nell'acqua. Ciò fatto l'acqua doveva esser colata in un'altro nettissimo vaso, e

la polvere doveva esser fatta seccare. Tardò il forestiero di bel nuovo a prenderli la sua polvere, ed avendo ordinato alla persona, cui prestatò aveva la polvere, e che possedeva l'acqua per somigliante guisa impregnata, a gittarvi dentro alquanto oncia di mercurio crudo, andossene pe' suoi fatti. Questa Persona pose entro l'acqua ott' oncie di mercurio crudo, ed immediatamente dopo videvi cominciare il germogliamento. L'argento vivo gittò fuori per ogni verso moltitudini copiosissime di filamenti, o fila somigliantissime a ramificazioni d'argento, le quali gradatamente andaron crescendo, e dilatandosi sopra tutto il vaso fino ad alzarsi all'ultima superficie dell'acqua: fendone versato fuori il liquore, venne toccato con mano, come l'argento vivo erasi tutto convertito in purissimo argento, il quale fece tella ai crociuoli infuocati, e che dagli Argentieri del paese fu riconosciuto, faggiato, e trovato vero, e genuino argento. Veggasi *Borrichius*, de *Ortu Chemicæ*.

Altra quantità d'argento vivo venne aggiunta all'acqua medesima, e somigliantemente ne venne procurata una nuova vena di finissimo verace argento; e così fino per sei volte: ma in ciascuna di queste operazioni il liquore andava divenendo più languido, ed allappesine venne a perdere totalmente la sua prodigiosa virtù.

Gagliofferie, e ridicolaggini somiglianti hanno numero infinito di persone ingannato, inducendole a sacrificare, e ad a far gito di tutto il loro tempo non meno, che d'ogni loro avere, nell'investigamento di sì fatti germogliamenti, e metamorfosi, non gran fatto dissomiglianti da quelle descritteci da Ovidio nella sua malissima Opera, quanto alla verità; avvegnachè non ci sia finora venuto fatto di rinvenire una sola prova della verità d'alcuna cosa di specie somigliante in effetto avverata. Noi veggiamo come il Borrichio, che è uno de' più forti Avvocati fra gli Scrittori delle cose Chimiche di sì fatta opinione, ci presenta l'Illoria soltanto per seconda mano, essendosi espresso formalmente, che le esso stesso non l'avesse veduta, gli sarebbe stata a grandissimo stento credibile, senza ulteriori prove. Non vi ha cosa, che disonori di vantaggio la mente

umina, quanto il dar fede a sì ridevoli gagliofferie, opponentisi al medesimo buon senso, ed alle invariabili Leggi della Natura. Veggansi le *Trasfazioni Filosofiche* sotto il num. 39.

GESO. Il gesso duro, asciutto, e consistente, o di compatta tessitura, è di tutti il più acconcio, ed il più a proposito per euocerli, e ridurlo in calcina; ma il gesso morbido, ed untuoso è senza paragone il migliore per i terreni, avvegnachè questo secondo sciogliesi colle brine, e colla pioggia, non altramente, che il letame fatto, e maturo. Questa specie di gesso messo in opera in vece di letame, per governo, e concimatura de' terreni, è per alcune specie di essi un miglioramento finissimo, e massimamente la prima fiata, che vienvi gittato sopra. Quello è un governo di una sì fatta natura, che viene a cambiare effettivamente l'indole, e natura stessa del suolo, e farlo abbondante, e ricco per un dato tempo, ma non conserva gran fatto questa sua ottima qualità, che anzi ben presto sibrasti, e s'impoverisce, e ricerca somma cura nei Coltivatori, di rinnovare in quei dati terreni altro nuovo governo. Oltre di questo un secondo governo di gesso riuscirà sempremai di leggerissimo beneficio a quei terreni medesimi, nei quali ha prodotto ottimo effetto la prima fiata, seppure non sarà stato lasciato ai medesimi buon tratto di tempo per ricovrarsi, e rifarsi dopo il ricevuto sibramento, col tenergli in riposo. Quindi ne è uscito quel trito antico detto dei nostri Villani, e Fattori Inglese, cioè, che il gesso arricchisce l'assituale di un'anno, ma impoverisce il Padron delle terre.

Il metodo migliore pertanto di mettere in opera, e far uso del gesso, si è quello di mescolare una toma di gesso con due some d'ottimo terriccio, o letame, e quello verrà a rendere il gesso medesimo non benefico, e proficuo per una sola fiata, ma renderlo vantaggiosissimo ai terreni stabilmente. A vero dire, nella diversa maniera rendesi il miglioramento migliore, che possa immaginarsi a quei dati terreni, che sono d'insolite austerità, e freddezza; e viene costantemente osservato, come fa un bene, e vantaggio grandissimo a quel-

le terre, che trovansi dilungate sommamente da qualsivoglia letto naturale di ella. Il terreno trovansi in vicinanza dei letti, o strati di gesso, della indole, e natura di quello partecipando, tuttochè in essi non abbiasi gesso, che esser possa dall'occhio distinto. Il metodo comune di dare il gesso alle possessioni si è quello di spandere dodici, od al più quattordici fomme di gesso a cadauno jugero, e questo nella sopradescritta forma melcolato, e preparato verrà talvolta a far sì, che i terreni rendano abbondevolissima raccolta per quattordici, ed anche per quindici annate di seguito.

Ella si è cosa migliore il condurre il gesso sopra il terreno, ed ivi distenderlo un'anno, o due prima, che il terreno medesimo debba essere arato: per similante guisa verrà ad addolcire ed appiatevolire la superficie della terra, e non agirà con tanta forza all'ingiù, siccome farebbe se venisse alla bella prima solesato. Fa molto buono effetto nei campi da grano; e quando è girato sopra le praterie, ed altri terreni da erba, e da fieno, ne produce abbondevolissima copia, e sommamente odorosa, e vegeta, e ben pasciuta; e quel bestiame, che sopra essa pascola, ingrassa in brevissim'ora. Similantemente è stato osservato, come le vacche, che si pascono su questi dati terreni, somministrano un latte grandemente più perfetto, e migliore del latte ordinario.

I popoli di Kent hanno un metodo sommamente agevole, e piano di scavare, e zappare il gesso. Trovasi questo nelle fiancate delle colline; ed i lavoratori ogni volta che lo stimano proprio, vanno minandolo: allora scavando costoro una fossa nella vettura tanto distante dal contorno, o fiancata, quanto dal fondo, in cui formano la mina, empiono questa medesima fossa d'acqua, e questa ammolata, che venga pel tratto di una notte, la mattina seguente precipita giù tutta in un subito.

In altre parti del Regno, il gesso stanzia universalmente in siti più profondi, di modo che i contadini, ed altri lavoratori son forzati a zappare assai più, ed a fare dei più profondi scavamenti, ed a portarlo fuori di queste alte buche in corbelletti sulle proprie spalle. Malgrado ciò nulladim-

no anche in questi luoghi bassene la copia necessaria per le concimature. Veggasi *Mortimer*, della Coltivazione.

GESSO NERO. *Gesso nero*, appellasi dai Pittori terra spezie particolare di terra ocreosa, colla quale tingono essi in azzurro la carta, ed altre sostanze eziandeno. Vien questa con lomma impropria denominata gesso, essendo piuttosto della natura, ed indole della terra colognele, che altra qualunque siasi sostanza conoscitura, ma, a vero dire, ella contiene molto minor quantità di materia vegetabile, di quello essa terra di Colonia sommamente nota si contenga.

Viene questo gesso nero, o terra ocreosa trovata nel terreno in assai dilatati, e larghi pezzi piatti, della lunghezza da due fino a dieci piedi, e della larghezza delle quattro, alle venti buone dita: sono questi pezzi, come dicemmo, generalmente piatti, e compressi, ma alcune volte rilevanti, ed alzanti nel loro mezzo, e vanno abbassandosi, e divenendo più sottili verso i loro contorni, e per lo più trovansi uniti insieme in copia, e numero grandissimo negli strati medesimi. Mentre questa materia diacefi, e stanzia nel terreno, ell'è umida, e pastosa, ma venendo a seccarsi diviene di una considerabile durezza, e sommamente leggiera: ma sempremai va rompendosi, e screpolando in qualche direzione particolare; e se ella venga con accuratezza esaminata, allorchè si è spaccata, e rotta di fresco, ella comparisce di una tessitura scannellata. Elle è questa di un color nero sommamente fino, di una struttura uguale, e serrata, e di una superficie ruvida, arficia, e polverosa.

Attaccasi tenacissimamente alla lingua, e riesce alquanto aspra toccandola. Si stritola agevolmente fra le dita, e tigne ed imbratta le mani. Posta nell'acqua va al fondo, nella qual proprietà ella viene a diffire dalla terra di Colonia, e mescolata con gli acidi non forma effervescenza. Posta, ch'ella venga nel fuoco, incontanente arde, ed abbrugiata fino a che diviene una sostanza bianca più dura di quello ella si fosse per innanzi, e sembra non alteramente, ch'ella fosse composta di quella mistura, che vuol farsi di creta da pipe di tabacco, e di cenere di legname.

Qu-

Questa sostanza calcinata in esaminandola chimicamente ci somministra una picciola porzione di un sale alcalico; e le esperienze tutte fanno toccar con mano, che questa materia è in parte d'origine vegetabile, ed in parte di origine fossile. Si trovava in Ispagna, nell'Italia, ed in alcune parti dei Dominj Tedeschi. Veggasi *Hill*, *Istoria dei Fossili* pag. 66.

Gesso rosso. È il *gesso rosso* una terra particolare, della quale fanno uso grandissimo i Pittori non meno, che altri Artisti, e trovasi vendibile in tutte le botteghe de' vendicitori in Londra, ed altrove. Ella non è altro quella terra propriamente, che un'ocra argillosa indurita, e scavata nella Germania, nell'Italia, per la Spagna, ed in Francia; ma in copia assai più abbondevole, che in qualsivoglia altra Regione, trovasi nelle Fiandre. I suoi caratteri, onde ella viene ad essere precisamente distinta dalle altre terre rosse tutte, sono i seguenti: ella è quella terra d'una tessitura finissima, uguale, e consistente, sommamente pesante, e durissima, di un colore rosso pallido nella sua superficie esteriore, ma rotta ch'ella sia, apparisce nelle sue parti interne di un color carico di cioccolata. Attaccasi tenacissimamente alla lingua; è totalmente scevra di sapore, assaggiandola, e mescolata con gli acidi non produce effervescenza. Veggasi *Hill*, *Istoria dei Fossili*, pag. 62.

Terreni gessosi. L'orzo, ed il grano rischiarà costantemente assai bene nei terreni gessosi della specie migliore; come altresì farà egregia riuscita in ogni, e qualunque specie di terreni siffatti ogni sorta di vena.

Il natural prodotto di questa sorta particolare di terreni nelle erbe, si è quella specie di picciola vettura appellata comunemente loglio fottile, papaveri, erba magese, e somiglianti. Il fieno santo, il ruvischio, e somiglianti, fa d'ordinario ottima riuscita in sì fatti terreni, e quando questi saranno d'indole migliore, maggiore farà la raccolta di quelle erbe, ec. Il governo, o concimatura migliore, e più accorcia per cotai sorta di terre è il concio comune, i cenci vecchi, e lo sterco di pecora, o sia pecorino lasciatovi stare dopo, che quelle bestie vi si saranno nei tempi propri di lasciarvele, pascolate. Se av-

Suppl. Tom. III.

venga, che la pioggia venga appunto a cadere sopra simiglianti terreni dopo che stari sono di fresco seminati, la terra diverrà dura per modo, che il seme non potrà romperla per gittar fuori il suo tallo; e per somigliante guisa verrebbe a perdere oltre la metà della raccolta. Nella provincia di Hertford sogliono governare, e concimare questa specie di terreni colla colombina, o sia sterco di colombo, colle ceneri, e colla sfiggine, ed alcuni vi uniscono alcuna porzione di sterco di cavallo: e nella Provincia d'Oxford non usano quei contadini altra concimatura, che il letame mezzo marcito, o non ben maturo, e stagionato, col quale mescolar sogliono l'arena; e dicono, che questo impedisce, che la terra s'induri al diviso legno. Sogliono ivi d'ordinario seminare in terreni di tal natura il grano, il mescolo, o sia serrana, e l'orzo, soltanto però dopo il grano seminarvi i piselli, e le vecce. Nel seminarvi questi legumi son forzati ad annaffiar prima ben bene i terreni medesimi a cagione della soverchia durezza di quelli. Veggasi *Mortimer*, della Coltivazione.

Pietre gessose. Questa espressione viene usata nella Medicina per esprimere quelle concrezioni di materia gessosa, che s'ammassano nelle mani, e nei piedi di quelle persone, le quali sono violentemente attaccate, e tormentate dalla gotta. Si prese il Levenoechio la briga di farsi ad esaminare queste concrezioni col microscopio. Le divide egli in tre parti. È composta la prima parte di varie picciole porzionelle di materia, che appariscono somigliantissime a granelli d'arena bianca: questa parte è la più dura, e più asciutta, come altresì più bianca dell'altre parti. Allorchè questi granelli vengono esaminati con grossi microscopi, vien toccato con mano, esser questi composti di particelle bislunghe, diagonali, e serratamente, ed ugualmente insieme: tuttochè quelle picciole pietruzze sieno opache, le parti componenti le medesime, sono pellucide, e traspaiono, rassomigliandosi a pezzetti di crini di cavallo tagliuzzati, con quella sola differenza, che sono pintute, od aguzze a tutt' e due le loro estremità. Sono questi sì in estremo minute, e sottili, che Monsieur Lewenhock calcolò, che un miglajo di esse messe in-

E

fig-

sime, non verrebbero a far la grossezza di un capello della testa umana. Le pietruzze in questa parte più dura del gesso non sono composte di queste particelle, rusee per intero, ma trovansi alla rinfusa in esse framfischiate alcune parti rotte d'altre sostanze, ed in alcuni pochi luoghi dei sommamente piccioli globuletti di sangue, e de' piccioli avanzi, e rimasugli d' altri luoghi.

La seconda specie di materia gessosa è meno dura, ed insieme meno bianca della prima, ed è composta di frammenti, o sieno particelle irregolari di quei corpicioli bislunghi, i quali compongono la prima specie, o fa la durissima: e questi trovansi mescolati fra la materia rigliosa, e chiara, framfischiate per entro da picciolissimi, e rotti globuletti di sangue, che si scorge nella prima specie, ma in questa seconda in quantità assai maggiore.

La terza specie finalmente all'occhio nudo comparisce rossa; ma allorchè viene osservata col microscopio, vien trovata, altro non essere, che una materia tigliosa, fissa, e viscosa di color bianco, per entro alla quale trovansi qua, e là sparsi picciolissimi globuletti di sangue, che è appunto ciò, che presenta all'occhio nudo la rossa apparenza. Veggansi le Transazioni Filosof. sotto il n. 168, pag. 906.

E' similgiamente la voce *Gesso*, *Gypsum* nell' Istoria naturale il nome di una Classe di Fossili, i caratteri de' quali sono i seguenti.

Sono questi composti di picciole particelle piatte disposte in guisa irregolare, e somministranti alle intiere masse un'apparenza alquanto assomigliante ai marmi più morbidi: sono queste particelle lucide, lustre, ed in alcun picciolo grado trasparenti. Non sono pieghevoli, nè elastiche, nè percuotendole coll' acciarino, danno fuoco; e nei menitruvi acidi nè fermentano, nè si disciolgono; e finalmente nel fuoco si calcinano con grandissima facilità. Veggasi *Hill*, Istoria de' Fossili, pag. 111.

Di questa Classe di corpi ve ne ha due Ordini; e sotto questi quattro generi. Il primo ordine è dei gessi, che sono di una tessitura fissa, e compatta, e considerabilmente duri. Il secondo è di quelli, che sono di una tessitura più molle, dilegine,

e sciolla, e eccellenemente vengono ad esser morbidi, e pastosi.

I generi del primo Ordine di gessi sono gli appresso: 1. Quelli, che son duri, composti di particelle a quanto dilatate, e di un lustro cristallino lucido, detti i *Folidi*, *Phalides*. 2. Quei d' una tessitura più molle, composti di particelle sommamente picciole, e di una apparenza meno rilucente detti *Lebbri*, *Lepra*. Veggasi *Idem*, *ibidem*.

I generi del second' Ordine sono. Quelli di una tessitura più molle, e dilegine, che sono estremamente lucidi, e risplendentissimi, appellati *Timachidi*, *Timachides*. 2. Quelli di una più dilegine, e molle tessitura, che sono oscuri, ed opachi, detti *Ciasmia*.

Le specie tutte di questa intiera Classe ardono con un grado di fortissimo, e vivacissimo fuoco, che vien comunemente detto *fuoco di Parigi*. Ma i più morbidi ricercano gradi più piccioli, e più bassi di fuoco; ed in generale, il più duro, ed il più marmorato viene a fare un fuoco migliore, ed assai più perfetto.

Il metodo comune di brugiare si fatta pietra per fare stucchi è troppo superficiale per darle tutta la durezza, di cui è capace. Vien riferito da molti, che un grado maggiore di calore rendela infinitamente più dura, e viene asserito, che il marmo artificiale, di cui è vagamente ornato il Palazzo di Monaco, e che dall' Elettore di Baviera viene stimato assai più del verace marmo, sendo stato preso per tale da tutti coloro, che l'hanno veduto, è composto del gesso comunissimo, prima abbrugiato col metodo ordinario, e poscia posto di bel nuovo sul fuoco entro un vaso di rame, ed ivi fatto bollire divenuto vi similissimo all' acqua, per tratto di tempo ben lungo. Allorchè questo bollimento cessa per se stesso, la materia vien cavata fuori, e vengono con essa mescolati insieme in varie adeguate proporzioni i colori comuni de' quali servono ordinariamente i Pittori: quella massa poi viene inumidita coll' acqua, e manipolata, e lavorata col metodo comune dello stucco di Parigi, e per tal manipolamento, e lavoro i colori vanno spandendosi, e dilatandosi, e vengono ad imitare colla maggiore elasticità le vene

ne dei marmi naturali. Veggansi le *Trasfazioni Filosofiche* sotto il numero 93.

Nelle Canarie fervono color del Gesso non altramente , che di rimedio per ricovrare il vino patito ; e nelle vicinanze di Malaga nel fare i vini loro ne mescolano una quantità pelato col molto medesimo , allorchè bolle . Veggasi *Boyle* , *Opere* Compend. vol. 1. pag. 146.

GHIACCIO. Pussì conservare il ghiaccio sotterra molto agevolmente in un luogo assai asciutto col coprirlo soltanto ben bene , o con della paglia , o collo strame , o con delle canne . Veggansi le *Trasfazioni Filosofiche* nu. 8. pag. 140. Veggasi altresì l'articolo *NEVE* .

La gravità specifica del ghiaccio all' acqua , è a capello come otto a nove ; quindi essendo il ghiaccio più leggiero dell' acqua , flava , o galla , o nuota sopra essa . Questa rarefazione dell' acqua è dovuta alle vescichette aeree prodotte nel ghiaccio mentre si gela . Queste essendo considerabilmente grosse in proporzione all' acqua ghiacciata , vengono a rendere il ghiaccio tanto più specificamente leggiero . Ella è cosa assai ben conosciuta , che una considerabile quantità d' aria trovasi negli interstizj dell' acqua stanziata , quantunque ella non vi esisteri , od abbiavi alcuna proprietà elastica , in rapporto alla disunione di sue particelle ; ma quelle particelle venendo a lasciarsi più strettamente insieme , e ad unirsi , allorchè l' acqua congelasi , per simigliante guisa vengono ad esser generate le leggiere , espansive , ed elastiche particelle aeree , e vanno crescendo in grossezza via via , che il freddo falli più forte , ed energico ; quindi successivamente il ghiaccio si fa più leggiero , e quelle aeree vescichette acquistando una forza elastica , vengono a squarciare , ed a fare in pezzi qualunque vaso entro di cui l' acqua trovisi strettamente contenuta . Ma l' acqua di neve , oppure qualsivoglia altra acqua , la quale per buon tratto di tempo abbia bollito sul fuoco , viene a somministrare un ghiaccio più solido del ghiaccio ordinario , e per conseguente con quantità minore d' aeree vescichette . Simigliantemente quest' acqua particolare congelasi più lentamente , di quello ghiaccio l' acqua comune ; dove per lo contrario la pura acqua per lungo tratto di

tempo conservata nel vaeuo , e dopoi ivi entro ghiacciata , congelavisi con molto maggiore speditezza ; ed essando esposta al grado medesimo di freddo , più spedatamente dell' acqua , che non è stata purgata della propria sua aria , e che trovasi esposta nella aperta atmosfera . Il ghiaccio poi fatto d' acqua in sì fatta guisa spogliata della propria sua aria , è molto più duro , molto più solido , e trasparente , ed ultimamente più pesante del ghiaccio comune . Veggasi *Borhawe* Chem. Pars 1. pag. 376.

Per fare il ghiaccio il più perfetto , che mai possa averi , noi prenderemo dell' acqua purissima , e quindi la purgheremo perfettamente di tutta la sua aria propria per mezzo di una macchina pneumatica : quindi la porremo a ghiacciarsi nelle più orride brinate , e geli per mezzo della macchina fabbricata da Monsieur Fahrenheit . Per simigliante guisa noi verremo ad ottenere un ghiaccio di una massima durezza , densità , purità , trasparenza , e peso .

Nelle montagne di *Switzerland* trovanfi masse immense di ghiaccio , il quale per la tradizione non meno , che per le litorie del paese , forzi è , che siavi rimasto intatto per parecchi e parecchi Secoli . In certi dati tempi accadono in esse masse di ghiaccio dei grossi screpoli , o spaccature , e da quelle spaccature la vasta grossezza delle masse può essere ad un qualche segno congetturata ; e conciossiachè alcune d' esse spaccature vengono ad esser profonde all' altezza di trecento , ed anche di quattrocento pertiche ; e con tutto questo niuna di quelle spaccature arriva a fendere tutta l' intera grossezza della massa di ghiaccio , in cui segue . Veggasi *Wagner* , *Istoria Naturale Elvetica* .

I vastissimi corpi di ghiaccio , che incontransi a vedere ne' Mari settentrionali in vicinanza della *Baja d' Hudson* , sono , a vero dire , sorprendentissimi ; avvegnachè alcuni d' essi trovansi immersi sotto la superficie dell' Oceano sei cento , e più piedi ; ed una quinta , od una sesta parte sopra' essa superficie , e tre o quattro miglia di circonferenza . Veggansi perciò le *Trasfazioni Filosofiche* sotto il numero 465. Sezione 2.

Quelle nuotanti montagne di ghiaccio
E 2 del-

debbono la loro vastissima grossezza, e loro natura durevole ad una cagione dalla maggior parte degli uomini non considerata; vale a dire, al loro non essere ghiaccio comune, ma bensì ghiaccio d'acqua marina; conciossiachè moltissime esperienze provino, come nei liquori acidi, e spiritosi, allorchè il gelo è tale, che ha forza sopra' essi, le parti acquose quelle sono, che vengono in essi liquori soltanto investate, ed il ghiaccio non ha percib il menomissimo sapore; mentre il liquore rimansi concentrato, e molto più gagliardo e più forte, ed energico di quello per innanzisi fosse, o nel fondo, o nel centro. Veniva generalmente supposto, che i liquori salini, e per conseguente l'acqua del Mare, fosse investita, ed affetta dal gelo nella maniera medesima; vale a dire, che venisse soltanto a ghiacciarsi la sua parte acquosa, e che il sale separato così dalla parte si congelasse. Ma ha provato il dotto Dottor Lister, come il ghiaccio formato dell'acqua marina è realmente sale, e che contiene in se il sale marino, ed ultimamente, che questo ghiaccio, per mezzo di questo sale in esso stanziente, viene ad esser fatto più durevole del ghiaccio comune. Se una caraffa piena d'acqua salata venga in tempo di forte gelata esposta all'aria, indi a non molto troverannosi entro formati de' pezzi di ghiaccio, ed allorchè venga questa caraffa trasportata in una camera calda, ed in una stufa, i divisi pezzi di ghiaccio anehe in questo luogo rimarrannosi per lungo tratto di tempo senza sciogliersi punto, o disfarsi; e se vengono cavati fuori della caraffa, ed esposti in picciola distanza dal fuoco, non iscioglierannosi in acqua, come il ghiaccio comune farebbe, ma grado per grado andranno svaporando, e lasceranno nel luogo, ove erano stati posti, una porzioncella di bianchissimo sale.

Poichè l'acqua marina, allorchè viene ad essere nella divisa maniera ghiacciata, ella forma un ghiaccio consistentissimo, e di lunghissima durata, egli apparisce agevole a concepirsi, come le masse immense di ghiaccio, che trovansi nei mari settentrionali, continuino a rimanersi dure pel corso di tutto l'anno; e ritornando la fredda stagione, rimandandosi quelle del-

la grossezza medesima primiera, elle vengono di necessità ad aumentarsi di mole, e farsi assai più grosse pel nuovo ghiaccio, che a quelle s'unisce nei nuovi geli; e per simigliante guisa continuando a perder pochissimo, e questo per alcuni rari accidenti, e per lo contrario ad aumentarsi grandemente ogni anno per l'aggiunta delle nuove gelate, ella non è maraviglia, che giunga a formare moli di ghiaccio sì sterminate. Veggansi le Trasazioni Filosof. n. 167. pag. 836.

Pianta ghiacciata. Una pianta in grado sommo singolare, ed estremamente bella della specie delle *fioidi*, appellata da Monsieur Tournefort: *Ficoides Africana folio plantagenis undulato, micis argenteis asperso*: oppure, *Ficoides Africana* di foglie ondeggiate simiglianti a quelle della piantagine, e tutta coperta di gocciole argentine. Questa pianta addimandasi comunemente da noi *Pianta diamante*, ed anche *Pianta gelata*, e ghiacciata, e cìd dall'essere non morno le foglie, che i gambi di quella tutti tempestati di gocciole fumigiantissime a globuletti di cristallo sommanente pellucido, non altramente ella fosse tutta coperta di picciolissimi ghiaccioli. I semi di questa Pianta debbono essere seminati nel primo spuntare di Primavera in un buon letto di terra calda: allorchè le piantarelle sono spuntate fuori, ed alcune poco assodate, debbonsi trapiantare in piccioli vasettini pieni di recente terra arenosa lucida, e questi vasettini debbono essere affondati in un'altro letto di terra calda: quando questo letto va diminuendo il suo caldo, debbonsi cavar fuori, e piantare i vasettini medesimi in un terzo letto, e questo condurrà le piante verso la loro fiorita. Nel mese di Luglio, non già tutt' in un subito, ma grado per grado possono esporti all'aria aperta, e tosto che vi saranno state brev'ora, gitteranno i loro fiori. Se altri bramasse u. a. re dalle Pianta di simigliante specie assai grandi, basterà, ch'ei cavi i germogli de' vasettini, e gli ponga in un vecchio letto di corteccia da conca, ed in questo particular concime verranno ad allargare, e stendere grandemente per ogni verso le loro radici, ed insieme i rami di esse cresceranno in proporzione ad esse, dimodo che una sola pian-

ta verrà talvolta a stendersi una buona pertica quadrata, e le sue foglie, di pari che i suoi rami, verranno a crescere in una grossezza sorprendente. I fiori di questa specie di piante non sono gran fatto belli, e appariscenti, ma la loro mostra somigliantissima al ghiaccio, nel cuore dell'Estate, è un fenomeno tanto singolare, che li rende cosa universalmente ammirata.

GHI AJA. La *ghiaja* inglese siccome soverchia di grandissima lunga in bontà quella della Francia, dell'Olanda, e delle Fiandre, e d'altre Regioni, così avviene, che la nostra erba sia di pari a quelle di queste parti grandemente più perfetta. Tanto la *ghiaja* divisa, che l'erba, son gli ornamenti naturali de' nostri diperti Campagnoli. Noi abbiamo parecchie sorti di *ghiaja* nelle diverse parti dall'Inghilterra, ma quella, che è comunissima ne' nostri Scopeti ocri è la specie più prezziabile pe' marciapiedi de' giardini, come quella, che è composta di sassolini, o pietruzze rotonde, lisce, e bellissime, ed allorchè vien mescolata con una terra grassa pastosa, e tegnicia, fa ottima lega, e conservasi bene per più lungo tratto di tempo di quello faccia qualsivoglia altra specie di *ghiaja*.

Passeggiate di ghiaja. Sono queste passeggiate di *ghiaja* a buona equità stimate comunemente un vantaggio grandissimo, che i nostri Giardinieri hanno sopra quelli delle altre Nazioni tutte; ed il metodo di spianare passeggiate, o marciapiedi si fatti è il seguente.

Dovrassi nel fondo, o primo strato distendere un letto di calcinaccio, oppure di grosse pietre focaje, oppure di qualsivoglia altra materia dura, dell'altezza, o grossezza d'otto in dieci dita. Questa dovrebbe esser difesa in guisa, che venisse ad alzarsi alquanto in tondo nel mezzo, avvegnachè per somigliante guisa le pietre più grosse verranno a ruotolarsi giù alle fiancate, e per conseguente col rastrello potranno agevolmente esser raschiate via, imperiocchè la *ghiaja* non può purgarsi prima di porla in opera, senza grandemente impoverirla. Egl' si è un equivoco assai comune quello di stendere questi marciapiedi, o passeggiate soverchio tondeggianti, il qual pravo uso non solo viene a renderle meno agevoli a camminarvi, ma

toglie loro altresì buona parte di loro apparente larghezza. Un solodito in cinque piedi è una proporzione sufficientissima per far l'alzata nel mezzo del marciapiede; di modo che un viale di venti piedi di larghezza soffrirebbe con somma dicavolezza d'essere quattro dita più innalzato nel mezzo, che nei lati, o fiancare, e così in proporzione adeguata. Subito che la *ghiaja* vi sarà stata gettata, sparpinata, e difesa, converrebbe rastrellarla, ed i sassi più grossi di lungarne da essa di bel nuovo: poscia tutto il marciapiede dovrebbe col regolo o spianatojo livellare, e pareggiare per lo lungo, ed in croce; e colui, che maneggia il regolo, o spianatojo, dovrebbe esser calzato di scarpe senza tacchi, affinchè non venisse a farvi su delle buche; conciossiachè le buche, o fosse fatte in un nuovo marciapiede non son rimediabili gran fatto. I marciapiedi, o viali dovrebbero essere uguali, e livellati, o quattro volte costantemente nei tempi assai piovosi, conciossiachè in somigliante guisa verranno a far sempre una presa più gagliarda, più uguale, e più resistente, che in qualunque altra guisa, o con qualsivoglia altra arte, che venga usata per ciò ottenere.

La *ghiaja* mescolata con alcuna terra grassa viene ad incorporarsi assai più tenacemente di quello facciasi con alcun altra terra di specie più eruda; e quando la *ghiaja* è asprissima, e sommamente aguzza naturalmente, ella si è cosa dicciolissima l'aggiungere ad essa un' adeguata mescolanza di terra morbida, e grassa. La *ghiaja* più acconcia per farne de' viali, passeggiate, o marciapiedi, si è quella, che è ben piena di sassolini, o pietruzze rotonde, e lisce, le quali venendo mescolate con una porzione di terra grassa, e pastosa, viec a farne una presa, ed a comporre un corpo di terreno sì consistente, e sodo, e tenace, che non teme polesia d'esser danoccheggiato, sfigurato, e guastato nè da piogge continue, nè da seccori ostinati. Si fatti viali non son soggetti ad essere smossi dal calpestio di chi vi cammina, avvegnachè le pietruzze di forma irregolare rimangansi più stabilmente, e stabilmente in quei siti, ove dapprima venner forzate dal regolo, o spianatojo a darsi.

cerli. Vegg. *Miller*, *Dizionario del Giardiniere*.

GIACINTO. Il *Giacinto* *Linnaeus* 200, nella *Bottanica* è il nome d'un genere di piante, i caratteri delle quali sono gli appressi: il fiore è della specie liliacea; ma è composto soltanto d'un calice diviso alla sua estremità in sei segmenti, ed è della figura medesima tubulare di parecchi altri fiori fatti a foglia di campana. Il puntale, o pistillo alzasi dal fondo del fiore, e finalmente diventa un vasetto tondeggiano da seme, leggermente cantonato in una specie di figura trilobata, e perciò anche diviso in tre cellette, ciascuna delle quali racchiude in se un dato numero di semi, o piatti, o ritondi.

Le specie del giacinto da Monsieur Tournefort noverate, sono le seguenti. 1. Giacinto grande paonazzo dal fiore bislungo. 2. Giacinto grande simile all' *Ametulino* nel colore dal fiore bislungo. 3. Giacinto Inglese carnicino. 4. Giacinto Inglese grigio. 5. Giacinto bianco di *Dodonæo*. 6. Giacinto dai fiori bislungi framischiato di paonazzo, e di bianco. 7. Giacinto dai fiori bislungi scuri. 8. Giacinti dal fiore folco. 9. Giacinto dal fiore folco verdastro. 10. Giacinto folco d'ultima fiorita. 11. Giacinto bianco d'ultima, o seconda fiorita. 12. Giacinto dai fiori gialli interziati di verdastro. 13. Giacinto dai piccoli fiori paonazzi bislungi. 14. Giacinto dai piccoli fiori bianchi bislungi. 15. Giacinto minuto Spagnuolo con fiori mescolati, e coll' apparenza della specie orientale. 16. Giacinto dai fiori rossi incanti bislungi. 17. Giacinto dai fiori a campana, discenti tutti sopra un solo loto del gambo. 18. Giacinto dal fiore a campana, con fiori da ambi i lati del gambo. 19. Giacinto Orientale, o sia *Costantinopolitano*, dai gambi macchiati, o chiazzati. 20. Giacinto Orientale dallo stelo, o gambo chiazzato, con fiori di color violaceo. 21. Giacinto Orientale porporino. 22. Giacinto Orientale dai molti fiori paonazzi aventi calice formamente aguzzo. 23. Giacinto Orientale bianco porporino. 24. Giacinto Orientale dal fiore bianco sudicio. 25. Giacinto Orientale vernino dal fiore candido nerato. 26. Giacinto Orientale dal fiore argentino. 27. Giacinto Orientale vernino, dai fiori azzurri, e

con foglie stirate verso i loro fondi, con macchie porporine. 28. Giacinto Orientale grosso vernino bianco. 29. Giacinto Orientale grossissimo. 30. Giacinto Orientale grossissimo dai fiori bianchi. 31. Giacinto Orientale di maggior grandezza, con calice del fiore rosso lucido. 32. Giacinto Orientale dai molti fiori, con fiori paonazzi. 33. Giacinto Orientale dai molti fiori, dai fiori bianchi. 34. Giacinto Orientale dai molti fiori, con fiori grigi. 35. Giacinto Orientale dai fiori azzurri lontanamente odorosi. 36. Giacinto Orientale grande dai fiori carnicini. 37. Giacinto *Ametulino* dai fiori rossi raddoppiati campaniformi. 38. Giacinto bianco primaticcio. 39. Giacinto Orientale dalle larghe foglie. 40. Giacinto Orientale dai fiori variamente lillati, aventi calici rossi. 41. Giacinto Orientale bianco dai molti fiori grossi. 42. Giacinto Orientale dai molti fiori grandi, con fiori di bellissimo azzurro. 43. Giacinto Orientale ramificato. 44. Giacinto Orientale con fiori rovesciati variamente lillati. 45. Giacinto Orientale dal fiore violetto, con stinfie di bianco. 46. Giacinto Orientale con gambi fogliati. 47. Giacinto Orientale di seconda fiorita. 48. Giacinto Orientale di seconda fiorita, con fiori bianchi attiti. 49. Giacinto Orientale di seconda fiorita, con fiori ritti azzurri. 50. Giacinto Orientale di tarda fiorita, con fiori scanellati. 51. Giacinto Orientale bianco dal fior doppio. 52. Giacinto Orientale azzurro dal fior doppio. 53. Giacinto paonazzo Romano dal fior doppio. 54. Giacinto Orientale doppio, dal fiore azzurro pallido. 55. Giacinto Orientale porporino dal fior doppio. 56. Giacinto Orientale doppio, dal fior grande azzurro biancastro. 57. Giacinto Orientale dai fiori porporini violacei, e dai calici rigonfiati. 58. Giacinto Orientale doppio dal fiore bianconevato. 59. Giacinto Orientale dal fiore doppio carnicino dilavato. 60. Giacinto Orientale bianco dal fior doppio stragrande, affomigliantesi alla rosa, appellato da alcuni Giacinto Italiano. 61. Giacinto Orientale doppio, den minato il Giacinto Cappuccino. 62. Giacinto Cappuccino dal fiore vaghissimo. 63. Giacinto Indiano berniceluto con fiori di Giacinto Orientale. Veggasi *Toxnefort*, *Institut.* pag. 346.

Tutte le spezie di questo bellissimo fiore possono essere propagate, o per via di seminare i loro semi, o per mezzo di piantare le loro bernoccolute radici. Quello secondo metodo si è quello, che è stato grandemente praticato presso di noi, tuttochè il primo si sia evidentemente quello di procurarne delle sommaramente fine varietà dei fiori medesimi, e quello, che è stato sempre mai osservato dagli Olandesi, nell'allevamento dei fiori valentissimi. Quello, che disanima ad usare questo metodo degli Olandesi si è il tempo foverchiamente lungo, che prendonsi le piante venute su dal seme per arrivare alla loro perfezione; avvegnachè vogliansi d'ordinario quattro buoni anni innanzi che il giacinto procurato dal seme fiorisca; ma dopo di ciò, se questi vengano seminati ogni anno, dopo i primi quattro anni, havvi mai sempre cadaun anno dai semi una successiva fiorita.

Farebbe di mestieri, che il seme da seminarli venisse tolto o da fiori semidoppi, o da finissimi fiori semplici, e che si seminassero in un terreno fresco, leggiero, ed alcun poco arenoso, od in ben capaci vasi di terra cotta, od in cassette di legno, cuoprendo essi semi con niente maggior corpo di terra d'un dito e mezzo. Questa semina dovrebbe farsi sul principiare del mese d'Agosto, ed i vasi, o cassette seminate dovrebbero collocare in un luogo, che trovasse ad aspetto tale, che venissero a godere del beneficio del Sole della mattina; e questa diligenza dovrassi continuare fino alla metà del successivo Settembre; allora dovranno questi vasi mutar di luogo, e porgli in una situazione alquanto più calda; e verso il fine d'Ottobre dovranno collocare nella stufa al coperto ec.

Entro il mese di febbrajo vedranno spuntar fuori del terreno le novelline piantate; e queste è onninamente necessario il tenerle con ogni gelosia riguardate dalle brine, e da geli; ma non bisogna per conto alcuno tenerle coperte, salvo che la notte. Nel mese di Marzo converrà cavarle fuori dai copertoi, e collocarle in luogo caldo, e quando corre stagione asciutta, a tempi adeguati dovranno per acconcio modo annaffiare, e soprattutto importar moltissimo il tenerle sempre mai ripurgate, e nette da qualsivoglia erba.

Sullo spirare dell' Aprile, o nel principiar di Maggio, convien far loco mutar luogo, e collocarle in situazione più fresca, comechè in tale stagione cominci il Sole ad esser per esse foverchio caldo. Dopo che le loro foglie saranno appassite, non bisogna più annaffiarle; ma verso lo spirare d'Agosto, converrà alzare il vaso, ove sono queste medesime pianterelle, con un buon dito, e mezzo di fresca terra: e poscia dovranno nella vengente stagione governare, e trattare nella guisa stessa po' anzi additata, e nel venturo Agosto farà di mestieri preparare un letto d'una terra leggiera, ricca, ed arenosa. Allora dee esser cavata fuori dei divisi vasi la terra vecchia, e le radici, che in questo dato tempo faranno della grossezza d'una penna, fa d'uopo, che vengano diligentissimamente separate, e collocate con cura in un letto di terra a parte sotterra due, o tre dita. Queste radici conviene porle colla parte del loro fondo all'ingù, e cuoprirle coll'istessa terra fina per la grossezza di due buone dita. Vuolsi onninamente, che questi letti rimangano al di sopra arcati, e nelle stagioni fredde, e gelate convien cuoprirli con delle stuoie. All'apparire di Primavera, in evento, che la stagione corra asciutta, bisognerà alcun poco annaffiarle. Nell'Estate terrannosi con ogni cura cimonde dall'erbaccie, e nell'Autunno dovrassi sopra esse aggiungere una litta di nuova terra leggiera della grossezza d'uo buon dito. Governo, e trattamento sì fatto è necessario continuarlo alle pianterelle medesime fino a tanto che alla perfine faccian fiori, lo che avviene d'ordinario niente prima, che quattro, ed anche cinque anni dopo, che sono state seminate.

Allorchè portano il fiore, le spezie più fine, e più distinte contrassegnerannosi dal prode Giardiniero con una stecca, affinchè queste possano essere trapiantate, e poste in vasi, o cassette separate.

Allorchè le foglie verdi delle piante cominciano ad appassire, e scadere, fa di mestieri cavar fuori le loro radici; e la terra del letto loro essend'alzata, od ammontata, perchè si liberi dell'umido, dovranno queste di bel nuovo porre entro la terra in una positura orizzontale, la-

fician.

sciando, che le foglie verdi pendano attaccate all'ingù dalle radici, affine d'impedire, che il loro umido venga a colare sulle radici medesime, avvegnachè questo facciale bene spesso marcire. Quando le foglie sono totalmente seccate, le radici, o cipolle debbon essere cavate fuori, ben ben nettate da ogni immondezza, e rimasuglio di terra, e conservate entro delle scatole fino al mese di Settembre, che è appunto la stagione per ripiantarle. Il terreno più acconcio, in cui queste si possono piantare, è l'appresso: Prenderai della terra fresca da orto comune, che è di una natura fabbionosa, grassa, e pingue: questa terra, o porzione di terra non dovrà avere un letto più profondo di nove in dieci dita: a questa v'aggiugnerai la quarta parte di essa di sabbion marino; ed una quarta parte di sterco di vacca ben marcito, e ridotto a perfetto, e maturo letame.

Questi letti dovranno alzarsi dalle tre alle sei dita dalla superficie del terreno, e nel mezzo dovranno esser aggiustate in guisa, che vengano a fare un picciolo tondeggiante rialzo. Allorchè i fiori son presso a sbocciare, dovranno esser fiancheggiati i loro steli col contrafforte di un uncino di filo di ferro unito od attaccato ad una baccelletta, affine di impedire, che vengano a piegarsi all'ingù: e farà di mestieri sul mezzodi, allorchè la sferza del Sole cuoce, e batte veementemente, dovranno esser cuoprite ben alto da terra con alcun copertojo sicchè rimangansi all'ombra; e per somigliante diligenza continueranno bella, e vegeta la lor fiorita per un mese, e più. MILLER, Dizionario del Giardinere.

GIACINTO è somigliantemente il nome, dato dai moderni ad una gemma, il carattere e distintivo della quale si è, ch'ella è rossa con una mescolanza di giallo. E' questa una gemma sommaramente differente da quella conosciuta dagli antichi sotto il nome del *Giacinto*, la quale era una varietà dell'*Ametisto*, con una mescolanza più abbondante, e più piena di un'azzurro carico, pietra a stento grandissimo fra noi veduta. Gli Antichi conoscevano questa gemma, da noi appellata Giacinto sotto il nome di *Lapis Lyneurius*,

Le opinioni comuni degli Autori sono state, che il *Lapis Lyneurius* degli antichi, od era l'ambra, oppure quella pietra, che di presente noi addimandiamo Belemnite. Il racconto di Teofrasto di questa pietra si è questo, che ella era cioè d'una solidissima tessitura: che veniva usata per farne de' sigilli, e che aveva la facoltà e forza attrattiva dell'ambra, ed era d'un colore giallo rosso, oppure di color di fiamma. Forz'è che venga osservato, lo che non è stato fatto finora, come di tutti gli antichi è questo l'Autore, sopra di cui deesi far conto grande in rapporto all'Istoria dei Fossili; ed è evidentissimo dalle sue descrizioni, che il *Lapis Lyneurius*, non poteva esser mai il belemnite; avvegnachè quello particular fossile non è duro, nè adattato ad essere inciso per farne dei sigilli, ma una sostanza morbidissima, e d'una tessitura scannellata: nè tampoco esser poteva l'ambra, avvegnachè l'Autore non l'avrebbe paragonata giammai ad un sì fatto corpo medesimo.

Ell'è quindi cosa patentissima pertanto, come dee esser preso di mira, e considerato un'altro fossile, il quale corrispondere possa al *Lapis Lyneurius* degli Antichi; ed è di pari ugualmente evidente, come la gemma, cui noi di presente addimandiamo giacinto, non era conosciuta da essi per altro nome, tuttochè noi non possiamo se non credere, che una gemma stata sempre così comune sia stata ad esser nota. Ed è somigliantemente patente, e chiaro, come il nostro giacinto, e niuna altra gemma conosciuta, corrisponde a capello a tutti quei caratteri, i quali hanno essi dato a noi del *Lapis Lyneurius*; e quindi sembra ragionevol cosa il conchiudere, che questa, e non altra è la gemma da essi sotto tal denominazione conosciuta.

Questa opinione viene pienamente, ed interamente fermata dalla descrizione di Plinio non meno, che da quella fattane da Teofrasto: tuttochè sembri evidente, che Plinio tolta l'abbia da alcun altro Scrittore. Dice egli, come avevavi una gemma assomigliantesi al carbonchio, che è quanto dire, avente la somiglianza delle gemme rosse: avvegnachè nel tempo suo le gemme rosse di qualsivoglia forte, appellavansi tutte di pari carbonchj, come per una

una denominazione comune; e che solo da quelle sia differente, in quanto all'essere di color di fiamma: espressioni le quali, a vero dire, non convengono per modo alcuno al belemnite, ma che esprimono a maraviglia, e con pienissima coerenza il nostro giacinto.

Ella è quella una gemma meno sfoggiata, ed appariscente a vederli di tutte le altre gemme della specie rossa; ma non è per quello senza la sua non mezzana bellezza; che anzi in quelle della specie più fina ella è grandissima, quantunque non isfavillante; ed è altresì così rara, che se ne trovi de' macchiati, e difettosi, come pur troppo trovanli le altre gemme. E' il giacinto di varie grossezze; ma è cosa sommaramente rara, che se ne trovino de' più piccioli d'un seme di canapa, o dei più grossi d'una noce moscata. Noi leggiamo, a dir vero, d'ille istorie d'alcuni giacinti di grossezze assai maggiori; ma non ci sembrano gran fatto veraci. Non è questa gemma meno irregolare nella sua forma, che nella sua grossezza, trovandosi talvolta certi della figura d'una colonna regolarmente sfangolare terminata da una piramide sfangolare, ed in tutti i rispetti, salvo il colore, e la durezza, assomiglianti ad un ramo di cristallo; ed in altri tempi vien trovato in forma di una pietruzza picciola tondeggiata, o bislunga, universalmente da uno dei lati compressa. Questa gemma ha un'apparenza molto migliore, e fa una mostra assai più vaga nella sua figura cristalliforme; ma le masse di configurazione di pietruzzette, o sassolini sono d'una specie molto più dura, e d'un lustro, e lucentezza assai più fina. Questa gemma è meno dura del rubino, o dello zaffiro, ma ella è assai più dura del cristallo. Veggasi *Hill*, *Istoria dei Fossili*, pag. 392.

Trovansi il giacinto di varj gradi di fondo vario, e di varia pallidezza; ma il suo colore è sempremai un rosso smorto con una mescolanza non mezzana di giallo; ed, a vero dire, talvolta in certi giacinti questa mescolanza, vale a dire, il color giallo trovavisi in così gran copia, che sembra in essi il color principale, e predominante. Questa gemma ella è d'un color così cupo, e carico, che sembra effet-

Suppl. Tom. III.

tivamente nera, seppure non si esponga ad una gagliardissima luce; ed in altri zaffiri per lo contrario i colori son così slavati, che sembrano senza colore; e probabilmente non di rado è intieramente così il giacinto, e perciò essendo privo del suo vero carattere, che è il colore, viene ad esser preso parecchie fiate per un pezzetto di cristallo nel primo caso, e nel secondo per un zaffiro bianco, qualora non venga posto alla prova della ruota per conoscerne la sua naturale durezza. Lo stato suo però assai comune si è il possedere il suo color rosso coll'adequata mescolanza di color giallo, che noi addimandiamo comunemente color di fiamma.

Sono quelli i caratteri, per mezzo dei quali il *lapis hyacinthus* degli antichi, o sia il giacinto dei nostri tempi dee essere dalle altre gemme tutte distinto; ed i nostri gioiellieri, e lapidarij, secondo, ed a norma dei suoi differenti gradi di colore, distinguono soglionlo in tre specie, le quali essi accennano con proprie, e particolari denominazioni, o per mezzo di varj epiteti; ed in una quarta specie del medesimo, la quale d'ordinario, sebbene con somma improprietà, viene dagli Autori noverata nella Classe del rubino.

La prima specie addimandata la *bella Giacinta*, *hyacintha pulchra*. E' questo il nome dato al giacinto trovantesi nel suo stato più perfetto, e più bello, vale a dire, allorchè egli è d'un puro, e brillante color di fiamma, fatto apparentemente di una mescolanza di rosso ciorabino, e di una mezzana proporzione d'un giallo d'ambra finissimo.

La seconda specie si è il *giacinto zaffirano*. Chiamano con tal nome i Gioiellieri quella gemma, allorchè ella ha più del rosso, e che è di un color più cupo, carico, ed oscuro, e che è tinta d'un color giallo smorto, e bruniccio.

La terza specie è il *giacinto ambra*. E questa è la denominazione appropriata a quei giacinti, che son tinti d'un rossolavato con una porzione di un'assai smorto giallo, pendente al bianco.

La quarta specie è la *Rubacella*, *Rubacelle*, nome dato al giacinto, allorchè è d'un dolor rosso profondo, gagliardo, e sommamente carico, mescolato, e vestito d'un

F

d'un profondissimo giallo, ma cupo, ed oscuro. Il forte colore del rosso in quella pietra, è stato il motivo, onde hannola d'ordinario gli Scrittori annoverata fra i rubini; ma un confronto, che facessi di quelle due gemme, sarà evidentemente toccar con mano, come non ha niente che fare col rubino, ma che appartiene unicamente, ed interamente alla Classe dei giacinti.

I Giacinti della prima specie sono i più fini, e perciò sono anche d'un valore considerabilissimo. Ci vengono questi condotti non meno dall'Indie Orientali, che dalle Occidentali. Il giacinto rubacella trovasi unicamente nelle Indie Orientali, ma è di pochissimo valore; e le altre due spezie di giacinti son comunissime, non meno nell'Indie Orientali, ed Occidentali, che nella Slesia, e nella Boemia, come anche in parecchie altre parti d'Europa. Quelli vengono, a vero dire, portati dall'Indie Orientali fra le spezie più fine. Ed il giacinto appellato la bella giacinta, *pulchra hyacintha*, trovasi, sebben di rado, anche in Boemia, ma a petto a quello di quella spezie dell'Indie Orientali, è grandemente più fiacco, ed inferiore. Ella non è maraviglia, che tutti questi giacinti trovinsi di pari in tutti i luoghi divisati, conciossiachè non sieno questi realmente altro, che semplici accidentali varietà di una gemma sola, e medesima: tuttochè però i giacinti Orientali, non altramente che le altre gemme tutte, son sempre i migliori, i più perfetti, ed i meglio coloriti.

GIALLO. Ci avverte Monsieur Boyle, come esser può ottenuto un bellissimo e finissimo giallo, col prendere del perfetto argento vivo, e tre, o quattro volte più del peso di esso d'olio di verriolo, cavandone in una storta di vetro il mestruo salino dal liquore metallico, fino a che rimangavi nel fondo della storta medesima una alcutissima calcina bianca, come la oave. Versandovi sopra una copiosa quantità di limpidissima acqua, il color della medesima cangiasi incontanente in un'egregio lucentissimo giallo.

Atterisce lo stesso Boyle, che questo colore è tanto lontano dal riuscire soverchio sfoggioso per i Pittori; e che non è noto

quale accordo, e lega fosse per fare con qualsivoglia pigmento, massimamente con i colori a olio. Veggasi Boyle, Opere, Compendi, Vol. 2. pag. 91.

Famosissimi sono i Chinesi per i loro gialli da tintori, i quali non ismortiscono, nè perdono un grado menomo di loro forza per esser lavati, e rilavati. Fanno essi tinta somigliante con i fiori dell'Acacia in una maniera, colla quale noi potremmo benissimo far uso dei nostri propri prodotti, con vantaggio rilevantissimo.

La maniera pertanto è la seguente. Colgono i Chinesi i fiori prima, che sieno perfettamente maturi; e gli seccano entro un vaso di terra cotta posso sopra ad un gentil fuoco finovantano che vengano quelli ad incresparsi appunto come le foglie del Tè; ed ottenuto appannogni coloro i semi maturi dell'albero medesimo in proporzioni differenti; e poscia facendogli così bollire in acqua di fiume insieme con dell'allume, vengono ad ottenere tutti quei gradi di giallo, che loro più aggrada.

Hanno i Chinesi tre spezie di giallo, le quali essi distinguono colle denominazioni di *Ngo bang*, *King-bang*, e *Buang* semplice.

Il primo di questi si è il giallo lucidissimo, o sommaramente lustro; per tingere dieci, o dodici braccia Fiorentine di tela di questo lucidissimo giallo, mettono essi in opera una libbra di fiori d'Acacia, intorno a due oncie di semi dell'albero medesimo, e quattro oncie d'allume.

Il *King bang* è il giallo alquanto più carico: per ottenere questa tinta mettono i Chinesi in opera gli ingredienti medesimi colla proporzione stessa divisata nel primo caso; e quando la tela è asciutta devesi esser tuffata in quello colore, danno-le una nuova tuffata in una leggerissima tintura del legno del Brasile; e questo viene ad aggiungerle quel finissimo giallo più carico, che noi veggiamo.

Il *Buang* semplice, o sia giallo pallido è fatto con gli ingredienti medesimi, come innanzi, salvo che, in vece di quattro oncie d'allume, pongonvene soltanto tre oncie: viene sperimentato come per somigliante faccenda l'acqua di fiume è preferibile grandemente a qualsivoglia altra acqua, per l'estrazione cioè di sì fatti colo-

ri; ma qualunque sia la diligenza, che altrove venga usata, i Chinesi son sempre più prodi degli altri tutti in similgiansi maniffature.

Sono i Chinesi in lavori di tal natura, e nel modo di giudicare dell'acqua propria, ed acconcia a far ottima riuscita, esperti a segno, che dal solo affaggiar l'acqua medesima, vagliono a conoscere, se ella siasi atta, o no per ottenere l'intento; e se il sapore è languido, conoscono essere quella disferosa; ed in tal caso, invece di ruffare la roba, che vogliono signere una volta, ve la tuffano due, vale a dire, dopo d'aver dato alla seta con essa acqua una tinta, lascianla asciugare, e la ritengono poscia di bel nuovo, ed allora il colore riesce egregiamente bene.

I fiori dell'Acacia, allorchè sono stati nella maniera divisata preparati per mezzo dell'abbronzatura, possono esser conservati per un'intera ssonata, e messi in opera tutte le fiate, che se ne presentì l'occasione, e null'altro ricercasi per quelli fiori secchi da lungo tempo, salvo il fargli bollire di più, che quegli abbronzati di fresco. Ma viene sperimentato come i fiori freschi danno sempremai un colore più lucido, e più brillante. Veggansi Osservazioni intorno alle Costume dell'Asia, pag. 254.

GIARDINO. Le cose, che innanzi a tutte le altre debbon essere avute in mira, e principalmente considerate nel piantare un giardino, sono la situazione, la forma, il suolo, l'aspetto, e l'esposizione. Quanto alla forma, un quadrato, o forà anche meglio un rettangolo; è la più acconcia ad eleggersi; ed in evento, che sia irregolare, esser può renduto uniforme per arte. Un triangolo è una forma, di pari avvenente e bella, che un quadrato; ed i pezzi più irregolari del terreno, possono egregiamente bene per mezzo d'orature, contorni, e marciapiedi, esser ridotti od all'una, od all'altra delle divisate figure.

La situazione poi del giardino vorrebbe essere nè soverchio alta, nè troppo depressa, avvegnachè in uno di quelli due estremi debbasì lehvare i venti, e nell'altro di pari il soverchio umido, e le nebbie. Le fiancate d'una collina sono luoghi assai discevoli per la scelta; e se il declivio sia

agevole, e dolce, e che abbianvi delle sorgenti d'acqua viva, in tal caso la situazione è così propria, che non può trovarsi la migliore. I giardini in pian terreno, od a livello hanno i loro vantaggi, e sono di minore spesa; ma manca loro il prospecto non meno, che parecchie altre somamente dilettevoli cose, le quali haonosi in quei giardini, che trovansi nelle fiancate delle colline, o sopra colle non soverchiò ripide, ma dolci, e soavi.

Dee similgiantemente averfi sommo riguardo al suolo; avvegnachè non sia per conto veruno riuscibile l'aver un buon giardino, quando questo è di cattiva natura. E' incredibile la grandezza delle orribili spese, che altri incorterebbe in intarsiarli di migliorare il terreno; ed ancorchè ciò venga ad ottenersi, in brevissimo giro d'anni il vantaggio acquistato a forza d'oro è intieramente perduto. E di vrrò in quei giardini piantati in suolo naturalmente cattivo, ove sono stati alzati tre buoni piedi d'ottimo terreno sopra tutta la superficie di quello, è stato con l'avantaggio sommo di chi fatta aveva l'orrenda spesa toccato con mano, come tolto che gli alberi tanto da bellezza, che da frutto son giunti a gittar le radici profonde, e per conseguenza a toccare il fondo cattivo, sonosi tutti seccati, e morti. Quei terreni, che altro non producono, che tignamiche, scope, e simiglianti arbusti, debbonsi totalmente rigettare; ed è sempre segno non buono ove veggiansi degli alberi gossi, e berooccoluti, per piantarvi un giardino. Ove l'erba vien su vegeta, e rigogliosa, e che non vi ha meno di tre piedi di terreno, è cosa certa, che il giardino saravvi ottima riuscita. Fa sommatutto di melieri, che al terreno non sia pierroso, nè d'una specie di terra durissima, tagliosa, ed argillosa; avvegnachè non vi ha suolo peggiore per piantarvi un giardino, di questo. Una terza mira, che deesi avere, si è l'acqua, senza la quale forà è, che un giardino grandemente patisca. Ed a queste cose tutte puossi a buona equità agguagliare un'altra in estremo vantaggio, e dilettevole, quantunque ella non sia assolutamente, ed indispensabilmente necessaria, ed è il prospecto di un' avvenente paese. L'area d'un vago giardino può ab-

bracciare, o comprendere, trenta, od al più quaranta jegeri, ma niente più; e quanto all'accordo, o disposizione della medesima potranno utilmente osservare le regole seguenti.

Dalla abitazione al giardino dovrebbe esservi sempre una calata di niente meno di tre buoni passi: ciò verrà a rendere l'abitazione medesima più asciutta, e più sana, ed insieme farà più estesa la prospettiva nell'entrata del giardino. Veggasi *Miller*, Dizionario del Giardinere.

La prima cosa, che si presentasse all'occhio in un giardino, dovrebbe essere una bellissima spianata di fina erba dell'ampiezza a capello medesima della facciata della fabbrica, e questa stessa spianata dovrebbe essere in tutto il suo contorno guernita di proporzionato vialetto, o marciapiede spianato secondo l'arte di ghiaia; e questo marciapiede aver dovrebbe una continuata orlatura della larghezza di tre, o di quattro piedi per porvi i fiori. Dalla parte destra poi di questi fiori verrà a terminare vaghissimamente tutto il prospetto una proporzionata piantata di verdissimi arbusti facenti le veci d'una gentile siepe, muro verde, o spalliera, che dovraffi tener piana, ed uguale: ma ove tratto tratto vengansi alzate delle vedute, o fabbrichette acconce di matton cotto, bene intonacate, e dipinte, riuscirà sempre più vaga cosa il lasciare affatto aperte le vedute, senza infuocarle della divisa piantata.

I piccioli boschetti fanno sempre una parte al sommo deliziosa, e piacevolissima di un giardino; di modo che non vi riuscirebbero mai soverchi: basterà solo, che questi non trovinsi soverchio vicini al casamento, o palazzina, nè che piantati sieno in guisa, che vengano a cuoprire, ed impedire i colpi d'occhio più dilettevoli, e più appariscenti. Per accompagnar poi i parterre, i boschetti aperti in proporzionati spartimenti, i vasi rialzati, i lavori d'alberi con fontane, i gruppi di statue, e somiglianti renderanno sempre vaghissima mostra, e dilettevole. Bene assai riuscirebbero similmente all'occhio alcuni piani boschetti piantati d'alberi sempre verdi adeguati, come anche alcuni quadrati d'alberi di questa specie infra gli altri alberi.

La tela del parterre dovrebbe essere ar-

ricchita, ed ornata di vascle con giuochi d'acqua, e gruppi di statue; ed intorno intorno a quelle riuscirà sempre egregiamente bene una linea circolare di palizzate, o di lavori di legname, tagliati appunto nel piè del boschetto, e lasciando dentro il viale, o marciapiede maestro.

Questo viale maestro conviene, che corrisponda a capello alla facciata del Casamento, o palagio, e dovrebbe estendersi dal piano verde posto in vicinanza d'alto palagio sopradescritto, fino all'estremità, o fondo del giardino, ed in esso fondo verrà a finire, e terminare il tutto un fossato, onde venga continuata la veduta.

Esser dovrebbero similmente diversificate le varie parecchie parti di cadaun pezzo del giardino: se una vasca sia rotonda, il viale, o marciapiede esser dovrebbe triangolare: ed il medesimo dee essere ommamente osservato a capello nei piani, o spiazzi erbosi, e nei verdi pallottolaj, che trovansi d'ordinario in corpo ai boschetti. In quei casi siti, ove l'occhio domina il tutto in un colpo, le due fiancate dovrebbero sempre essere uguali, e le stesse; ma per lo contrario in tutte le altre situazioni, esser dovrebbero variate, e soprattutto le picciule valchette, gli stretti viali, o passeggiare, ed altre minure cose, e fabbrichette di niun rilievo, dovrebbero in un giardino esser totalmente schivate.

Innanzi, che venga ultimato un giardino, e prima specialmente di farvi le piantate, dovrebbe altri farsi a considerare quello, che farà il medesimo per essere, allorchè gli alberi avranno la crescita d'una ventina d'anni. I cantoni, e gli angoli di cadauna parte d'un giardino dovrebbero essere tagliati concavi.

Le varie sorti di giardini assai dicevolmente potrebbero essere ridotte sotto tre Capi generali, vale a dire, 1. I Giardini perfettamente piani, od a livello. 2. Giardini d'una soave e gentile montata. 3. Giardini, il terreno, ed il livello de quali vengono interrotti da calate, e terrazzi, da rive, siepi, o leggerissime spalliere. I Giardini perfettamente livellati hanno i vantaggi della minore spesa, ed insieme di un agevole passeggiare. Quelli, in camminando pe' quali, vi hanno una picciola salita,

finac

fiaccano la gente, è vero, ma divertono affai più l'occhio con una dilettevole prospettiva. Quelli finalmente, ne quali sono assai spessi terrazzi, hanno il vantaggio di prelentare in differenti luoghi tante differenti vedute di scompartmenti, che vengono a somministrare il piacere d'altrettanti giardini. Veggasi *Miller*, Dizionario del Giardinere.

Giardino da Cucina. Veggasi l'Articolo *ORTO d'erbario*.

Giardini pensili. Veggasi l'Articolo *ORTI PENSIILI*.

GIGANTE. *Osso di Gigante*. Si fatta denominazione con soverchia fretta, per non dire sconsideratezza, è stata data dalla volgar gente a certe ossa, e parti di scheletri d'una grandezza, e grossezza enorme, trovate in Inghilterra, ed in altre parti della terra eziandio. Di tutte le serie di quelle, le quali sono state pubblicamente vedute, e portate attorno, non altrimenti che miracoli, e maraviglie grandissime di natura, neppure una sola ve ne ha, che in esaminandola sia stata trovata altro, che od un'osso di un'Elefante, oppure d'una Balena. Le ossa del primo di questi due animali però sono quelle, che con maggior frequenza vengono trovate, sotterrate nelle viscere della terra, di quello trovinsi le ossa di Balena. Non è molto, che noi abbiamo veduto una pinna esteriore d'una Balena, non fossile, ma recente, cavata fuori, e narrata dalla pelle, e fatta vedere per Londra per una mano d'un gigante.

Il Signore Hans Sloane fa parola d'una vertebra del filetto d'una balena spedita al medesimo da Oxford, ove ella fu scavata in vangando di terra, e poscia messa in opera per una seggetta da fare i propri agi, e creduta comunemente dalla gente di grossa pasta, che nel Mondo fa il massimo numero, una parte dell'osso del dorso umano. Ora se dalla grossezza, e grandezza di questo pezzo fosse stata calcolata la grossezza tutta del corpo, quella avrebbe di grandissima lunga ecceduto le grandezze degli scheletri giganteschi, che ci sono stati descritti dalle Istorie, e raccontati favolosi, de' quali è pieno il Mondo.

Finora noi siamo privi d'un buon trattato d'Anatomia comparativa, il quale ci

guidi a schifare sì grossi errori, allorché ci vengono fatte simili impolture; conciossiachè se avessimo sì fatto vantaggio, la vertebra, di cui nel divisato libro si fa parola, stato farebbe agevolissimamente conosciuto, esser tutt'altro, che parte d'uno scheletro del corpo umano. Il corpo della vertebra è considerabilmente più grosso in proporzione, e tutt'esso è molto più leggero, e più poroso. Le adiacenze, o continuazioni trasversali dell'osso medesimo sorgon dal mezzo sopra cadaun lato, e le continuazioni oblique discendenti mancanvi interamente, e l'archeggiatura, o foro, per cui passa la midolla spinale, vienvi composto dalla continuazione spinale, e soltanto dalle continuazioni oblique ascendenti. Il corpo della vertebra è sommarmente alpro, ed a cadauna estremità disuguale, ed è pieno gremito di piccioli fori, e protuberanze, le quali ricevono i fori, e le protuberanze di un'osso, o tondeggiate, o piatte, che nella vertebra umana corrisponde a capello all'epifisi, de' quali ivi trovansi due fra cadauna vertebra congiunti insieme da una frammazzante gagliarda, e ben fasticcia, e fissa cartilagine, probabilmente per agevolare il moto, e massimamente il piegarsi di simili animali nel mare. Veggansi le *Trasazioni Filosofiche* sotto il numero 404. pag. 500.

Sono stati di tratto in tratto trovati moltissimi scheletri sotterra, i quali, da coloro, che si son fatti a scrivere intorno ai medesimi, sono stati appellati scheletri di giganti, e supposti a un tempo non altrimenti che innegabili argomenti dell'esistenza d'Uomini di sì fatta smisurata grandezza; ma con buona pace di questi gaglioffi Scrittori, altro in sostanza non erano se non le parti di questi grossissimi smisurati animali bruti. In questa specie sonosi senz'ombra di dubbio gli scheletri di Filostrato nei suoi Eroi, ove disesi esser state le ossa d'Uomini alti dodici, venti, ed eziandio trenta cubiti. Plinio ci parla di uno scheletro d'un gigante dell'altezza di quarant' cubiti, trovato in una montagna di Candia, che venne atterrata, e distrutta da un terremoto. E Strabone ci fa similante parola d'uno scheletro d'un gigante, che fu trovato nelle vicinanze di Tingide, ora Tangieri nella Mauritania, cui

cui egli asserisce, che era alto sessanta cubiti, e che veniva comunemente creduto, esserlo scheletro d'Anteo. Negli anni mille cinquecento, noi abbiamo un racconto dello scheletro di Pallade trovato in Roma, il quale soverchiava colla sua altezza le muraglie di quella Capitale. E Simone Maggioli fa parola dello scheletro d'un gigante, trovato nelle rive d'un Fiume dell'Inghilterra gli anni di nostra Redenzione 1171, le ossa del quale egli ci da ad intendere, che trovavasi tutte ben collegate insieme, e che erano lunghe cinquanta buoni piedi.

Sono queste tutte ridicole, e gaglioffe novelle io null'altro fondate, che sopra semplici ossa, o denti d'elefanti trovati nei divinati luoghi, le quali parti dall'immaginazione riscaldata del trovatore sono state così ben combinate insieme a luoghi loro; oppure, che sopra esse fatti sonosi coloro a conteggiare, ed a calcolare la forma, e misura malconosciuta d'un solo umano smisuratissimo corpo. Noi troviamo ai dì nostri delle ossa, che appartenevano ad elefanti, e dalle quali fatti abbiamo i computi, e calcoli medesimi; ma noi viviamo, la Dio mercè, in tempi, nei quali la cognizione della Natura, e dei varj prodotti di quella, è assai più chiara, più largoveggente, ed istantaneamente maggiore, di quello ella si fosse nei tenebroli secoli trapassati. Siccome però esser può, da ciò, che noi troviamo ai dì nostri, congetturato con molta durezza, e giustezza, che queste ossa appartenessero ad Elefanti, così vi sono parecchie altre istorie, le elatte circostanze delle quali dichiareremmo tali per necessità a coloro, i quali sono ioctesi di similianti studi.

Santo Agostino io parlando della esistenza dei Giganti innanzi al Diluvio Universale, descrive, come prova di ciò, un dente macellare, cui egli vide nei lidi in vicinanza d'Utica, la cui grossezza uguagliata avrebbe un centinaio di tali ocelli d'Uomini della nostra usuale grandezza. Quello Santo Padre, tuttochè sommaramente doto, prele per cosa appurata, e certa, che questo dente una parte fosse dello scheletro di un corpo umano; ma la sua propria descrizione medesima ci prova, essere stato realmente un dente d'elefante; e ciò è

evidente a segno, che Girolamo Magi, tutto che sia un Autore invalato, e ostinatamente credulo dell'esistenza de' Giganti, in facendosi ad esaminare la descrizione del dente esposto da Santo Agostino, asserisce, quello essere stato un dente di uo' Elefante. Nella Chiesa di Sao Cristofano in Ispulla, mostrasi un dente della grossezza d'un pugno umano, che vien supposto, essere stato parte della bocca d'un gigante; ed in una Chiesa di Venezia per lunghissimo tratto di tempo vedevasi un'osso d'una spalla d'una mostruosa smisurata grandezza, il quale non vi ha ombra di dubbio, che sarà stato parte, o d'una balena, o di uo' elefante, tuttochè ivi fosse creduto tutt'altra cosa.

Il preteso scheletro d'un gigante, trovato nelle vicinanze di Drapani nella Sicilia, e di cui fa parola il famosissimo Boccaccio, è di pari evidente, che fosse lo scheletro di un'elefante. Vero sì è, che le ossa erano per sì fatto modo calcinate dai vapori sotterranei, che ebbero a disfarsi, e perder la loro natural forma, tolto che furono esposte all'aria aperta. Ma tre denti, che rimasero intieri, pesarono cent'onze, e questi furono appesi in una delle Chiese, non altrimenti che un'eterna memoria del fatto, ove fu manifestamente veduto da persone intendentissime, e toccato con mano essere denti di un'elefante, e nè anche dei più grossi, che sogliansi vedere comunemente. Conservarono similmente coloro porzione del cranio, la cavità del quale conteneva alquanto quartern di grano, ed uno delle ossa delle zampe, il quale in confrontando coll'osso d'una gamba di un Uomo, venne trovato di così smisurata grandezza, che questogiante sarebbe stato di mestieri, che per lo meno fosse alto dugento cubiti. Secondo questo calcolo appunto vien quello gigante figurato, e descritto dal Kirker nel suo Mondo sotterraneo, come il più gran gigante, cui egli collocò nella seguente serie, od ordine, cioè: Il Gigante di Strabone trovato nelle vicinanze di Tangieri, la cui altezza era di sessanta cubiti. Il Gigante di Pinnio trovato in una montagna di Candia alto quarantasei cubiti. Lo scheletro d'Atherio, figliuolo d'Anate, dieci cubiti. Lo scheletro d'Orcile, scavato

di sotterra per comandamento speciale dell' Oracolo, sette cubiti. Il Gigante, le cui ossa furon trovate sotto una sterminatissima quercia non lungi dal Convento di Keyden, nelle vicinanze di Lucerna negli Svizzeri, nove cubiti. Finalmente il Gigante Golia, di cui parla la Divina Scrittura, era dell'altezza di sei cubiti, e mezzo. Veggansi le Filosofiche Trasfazioni sotto il numero 404. pag. 302.

Tutti i soprammentovati Giganti, a riserva di quest'ultimo, cioè di Golia, del quale farebbe empia cosa il dubitare, altro non sono, che mere bugiarde finzioni, fondate nei ritrovamenti meri d'ossa, o parti fossili d'Elefanti. Della specie a capello medesima sono le ossa trovate in Francia l'anno 1456, in vicinanza di un Fiume nella Contea di Crussolo, non gran fatto lungi da Valenza. Le ossa quivivute erano sì sterminatamente grandi, che il Gigante, a cui veniva supposto, che fossero appartenute; bisognava, che stato fosse alto quindici cubiti, ed ivi venne supposto, essere il famoso Briareo: il cranio aveva un diametro di due cubiti, e l'osso della spalla era largo sei cubiti. Fa Cassanio parola di parecchi altri denti, ed ossa trovate poscia intorno al luogo medesimo, le proprie descrizioni stesse delle quali fanno manifestissima prova, altro non essere state, se non le parti d'elefanti; ma siccome non era Cassanio uomo di tal sapere, che valevole fosse a distinguere, così senza confonderli più che tanto, attribuibili alla bella prima tutte a diversi giganti, e poi fessi di più ad osservare, come non è maraviglia, che vi ritrovassero colà tante di sì fatte ossa, avvegnachè fosse quello un paese montuoso, e che vien supposto, che i giganti si dilettassero grandemente d'abitare in luoghi di tal natura.

Giovanni Goropio Becano, tutto che uomo fosse, che viveva in quelle etadi, nelle quali credute veraci venivano comunemente le favole gigantesche, e che trovavano degli avvocati per fino fra i sapienti, e Letterati uomini, nulladimeno non dubitò d'asserire francamente, che il dente conservato, e con tanta riserva, e scrupolo mostrato in Anversa, come un dente di un prodigioso gigante, che venne, com'elli pretendono, vinto, e disfatto

da un figliolo di Giulio Cesare, Re degli Arcadi, e che fu scritto favolosamente, che venne a dare occasione alla fabbrica di quel Castello non meno, che di quella Città, non dubitò d'asserire, io dico, come altro non era, che un dente macellaro di un'elefante; e che però dispiacendo a quella gente somigliante istoria non meno, che a tutti gli altri, ebbe il prode Becano ad aver la consolazione di vederla indi a non molto confermata dalla scoperta di due interi scheletri d'elefanti, dissepolti in vicinanza del luogo medesimo, i quali avevano i denti a capello medesimi ficcati nelle mascelle. Altro scheletro d'immaginario gigante venne similantemente scavato nei contorni di Tunisi, l'anno 1630., ed essendo stato spedito un dente di questo scheletro al dottor Pierese, egli modellollo in cera, e confrontandolo col dente di un elefante, che vedevasi vicino a quel dato luogo, l'ebbe a trovare a capello della grossezza, e configurazione medesima. Trasfazioni Filosof. n. 404. pag. 314.

Ci dà il Lambecio l'istoria di un dente di un Gigante spedito a Vienna da Costantinopoli, ed offerto alla Corte dell'Imperadore pel prezzo di due mila talleri. Veniva asserito, esser questo stato trovato in un'ampissima caverna, sopra la quale leggevasi un'Iscrizione in Lingua Caldea, significante: Qui giace il Gigante Og. Che perciò veniva preteso, che quello fosse un dente del Gigante Og, Re di Babilonia, del quale fassi parola nelle sagre Carte, ma essendo stato scoperto, come tutto ciò, che si vantava del dente, era un pasticcio favoloso, il dente venne rimandato indietro. E quello stesso dente altro non era, senza dubbio, che un dente di un'elefante somigliantissimo agli altri tutti. Il Signore Hans Sloane ci presenta un'accuratissima, e dottissima istoria di parecchi altri errori, e principj presidi dagli uomini intorno al soggetto medesimo, che leggonsi diffusamente nelle testè citate Trasfazioni Filosofiche, alle quali rimettiamo i nostri Leggitori.

GIMNOSOFISTI. Oltre ai *Gimnosofisti* già noti, furonvi dei *Gimnosofisti* Africani, i quali dimoravano sopra una delle montagne dell' Etiopia nelle vicinanze del Ni-

Nilo, senza il menomissimo comodo di calamenti, o di celle. Non formavano colloro corpo socievole, come quelli facevano dell'India; ma cadaun d'essi aveva il suo privato ritiro particolare, ove studiava, e faceva le sue orazioni per le solo. In evento, che alcun uomo avesse ucciso un'altro a caso, ricorreva a questi Sapiienti per riceverne l'assoluzione, e sottrmettendosi a qualsivoglia penitente venissegli da questi barboni imposta. Facevano colloro professione di particolarissima frugalità, e di null'altro cibavansi, che delle sole frutta della Terra. Da Luciano vengono a sì fatta razza di Filosofi attribuite parecchie Astronomiche scoperte. Veggasi *Brougheon*, Dizionario Relig. in voce.

GINEPRO. Il ginepro, *Juniperus*, nella Botanica è il nome di un genere d'alberi, i caratteri dei quali sono i seguenti: I fiori maschi sono della specie mentacea, composti di un dato numero di picciole foglie, caricate di molti apici. Il frutto di questi alberi sono coccole rotonde, contenenti dei angolari sacchetti, o teche, ed in esse dei semi bislunghe. A questo dee essere aggiunto, come le foglie sono piate, e semplici, non simiglianti a quelle del cipresso, che è il carattere, che questo distingue dal cedro.

Le specie del Ginepro noverate dal Tournefort, sono le appresso: 1. Ginepro comune arbusco. 2. Ginepro albero. 3. Ginepro picciolo montagnolo, di larghe foglie, e dalle coccole bislunghe. 4. Ginepro grande dalle coccole paonazze. E 5. Ginepro grande dalle coccole rossicce scure. Veggasi *Tournefort*, Institut. pag. 589.

La confusione nei nomi, che ha avuto origine dall'appellarli alcuni ginepri col nome di cedri, non è meno antica di quello sialo Teofrasto stesso. Nei tempi di questo Autore, i Greci non distinguevano apertamente, fra i nomi ginepro, e cedro, ma si levano applicar quelli nomi stessi promiscuamente ad ambi questi alberi: e tutti gli Autori, chi più, chi meno, sono in tal confusione incappati. Servironsi i Greci simigliantemente della voce *thyon*, come nome comune per esprimere e dinotare sì l'uno, che l'altro di questi due alberi. Questa voce *Thyon* sembra essere stata originalmente il nome di una specie di

Savina, che veniva dai Greci usata nel loro sagnibz; ma la somiglianza fra quest'albero, ed il Ginepro, in quel tempo appellato Cedro, che era probabilmente una cosa medesima, che il nostro ginepro di questi tempi avente le foglie cipressine, diè occasione peravventura al suo esser denominato col nome medesimo, che quello: e quindi tutte le altre specie di ginepro vennero denominate cedri; e questa voce *Thyon*, come anche le altre di ginepro, e di cedro, vennero ad essere promiscuamente, e senza distinzione usate, come nome di tutte le specie di quest'albero. Presso i Greci noi troviamo appellato eziandio il ginepro Cipresso salvatico; e fra gli Arabi veniva denominato cedro salvatico. Servesi il Mirefio delle voci ginepro, e cedro salvatico, non altramente che di sinonimi, e lo fa la cosa medesima, che il *Citrus Romanorum*.

Alcuni Autori fin dalla scoperta dell'America hanno chiamato i ginepri delle Indie Occidentali *Cedrus Atlantica*, e noi di presente appelliamo i ginepri della Virginia, e d'altri luoghi, coi nomi di cedri virginiani, e bermudi. Gli Spagnoli hanno messo a mazzo, e confuso le varie specie di ginepri, e di Cipressi sotto il nome di *enebro*, tuttochè questa voce venisse originalmente soltanto usata per esprimere i ginepri così comunemente appellati, ed i piccioli, o minori cedri eziandio, i quali altro non sono in sostanza che ginepri anch'essi o dell'una specie, o dell'altra; ed in questo senso non viene a farsi una confusione reale sopra il tutto. Dee sempremai il Leggitore esaminare il contesto nel suo Autore, allorchè incontrasi nella voce cedro in qualsivoglia idioma, avvegachè ei vada ad incorrere in infinite picciole variazioni, prima che egli possa arrivare a conoscere, per vedere, le per nome simigliante debba intendersi od il cedro del Libano, oppure il ginepro comune, sotto questo nome.

Teofrasto nel tempo suo, ci dice, che il mondo distingueva due specie di cedri, che essi chiamavano il Licio, ed il Fenicio; ma egli ci avverte, come alcuni ascrivevano in quel tempo, che quelle due specie erano un'arbusco medesimo, e che sì l'uno, che l'altro di questi due erano della

della natura medesima del ginepro. Questo Autore istesso ci dice, come la sola differenza fra il ginepro, ed il cedro, consisteva nelle foglie, e che le foglie del cedro erano dure, aguzze, e pungenti, e quelle del ginepro morbide, e soffici; e che finalmente l'albero del ginepro cresceva molto più alto del cedro. Da tutto ciò egli è evidente, e piano, che i Grecinj una idea avevano dei cedri del Libano sotto questo nome, ma che i cedri loro altro non erano, che ginepri di una specie particolare, e della natura dei nostri cedri Virginiani, e Bermudi. I Greci dopo il tempo di questo Autore, chiamano generalmente tutt' e due questi alberi col nome di cedro, e distinguevagli soltanto alcuna fiata, coll' appellarne uoo, o sia la specie più bassa *Oxycedrus*, il cedro pungente, a motivo delle sue foglie aguzze pungenti.

GIUDICE. Per le nostre Leggi fa di mestieri, che tutti i Giudici abbiano l'autorità loro dalla Corona, per via d'alcuna commissione assicurata, e fiancheggiata dalla Legge. I Giudici della Banca Reale, dei Comuni, o Comunità, e dei Baroni del Fisco, o dell' Erario, son tutti muniti, e creati (a riserva del Capd di Giustizia della Banca, o Tribunal Regio, che è creato per biglietto) con patente. Questi occupavano i posti loro a talento Regio, e fino a che pare, e piace al Sovrano. Ora però per una sicurezza maggiore della libertà del Suddito, per uno Statuto di Guglielmo III. (a) le loro Commissioni sono; *quando se bene gesserint*. Egli è vero però, che per via di un' istanza d'entrambi i Seggi del Parlamento possono essi Giudici esser legalmente levati d'impiego. (b)

(a) 12. e 13. *Guglielmo III. cap. 2.*
(b) *Ibidem.*

Fa di mestieri, che i Giudici esercitino la loro autorità in una maniera legale, e che tengan Tribunale essi stessi; avvegna- ché essi non possano agire per mezzo di Deputati, né trasferire in veruna guisa in altri la lor facoltà, siccome far possono i Giudici dei Tribunali Ecclesiastici.

Sono i Giudici altresì per via di solenne giuramento a dichiarare, che sentenziano secondo le Leggi coofeute delle
Suppl. Tom. III.

antiche costumaoze del Reame. Io ciò è giuoco forza, che si racchiudano le giudiziali decisioni, e le risoluzioni tutte sopra i varj casi, che vanno occorrendo, e non già secondo il loro parere, o talento arbitrario, e nemmeno secondo la volontà, desiderio, o comodamento del Sovrano loro. Veggasi Statut. 13. Eduardo 111. cap. 1. 20. Eduardo 111. cap. 1. & 2.

Sono i Giudici liberi, seuri, ed a coperto di processo per qualsivoglia cosa da essi fatta nel Tribunale, la quale però appartiene essere stata un' errore di loro giudizio. Ma per corrompimento di qualsivoglia sorte sono stati villanamente levati di posto; (a) e di presente possono esser chiamati a render conto di loro procedere dal Parlamento. (b)

(a) Veggasi Vaughan, 139. (b) 1. *Hawk.*
P. C. 139. 12. Coke. 24.

E' stato asserito, come le riflessioni scandalose sopra i Giudici nella Sala di Westminster trovassero peregno lo Statuto di *Scandalum Magnatum*. Veggasi Vaughan. *Ibidem.*

Fu formalmente posto in Atti, statut. 33. Enrico VIII. cap. 24., che niuno potesse tenere Tribunale di Giudicatura, o sia d'Assisa, nel distretto di quella Contea, ove questi fossero nati; ma ciò è stato rinvocato, ed annullato da un' altro Statuto. 12. Giorgio 11. cap. 27.

Per la Legge comune le parenti dei Giudici venivano a spirare per la morte del Re, in cui nome erano fatte. Ma per lo statuto 7. ed 8. di Guglielmo, e di Maria cap. 27. e 1. Annal. cap. 8. fu stabilito, e posto in Atti, che cadaqua commissione, non meno Civile, che Militare, rimarrebbe in pieca forza per lo spazio dei sei mesi scorsi, o da scorrere, dopo la morte del Re medesimo, seppure non venisse fatto soprassedere dal Successore di quello. E' stato formalmente sostenuto, che per un' accettazione di giustizia di qualsivoglia nome di Dignità, veniva ad essere terminata la sua commissione; ma a disordine di tal natura venne apposto riparo dallo Statuto 1. Eduardo VI. cap. 7. Ma egli è stato rinvocato in dubbio, se la Dignità di Baroaggio fino d'allora creata, trovò entro l'equità del soprammentovato Statuto.
Croke, Carra 104.

GIUGGIOLE. Hannovi nei Giardini
G de'

de' curiosi parecchie specie di quest' albero con cura conservate. Vengono questi alberi propagati per via di piantare in vasi di sottilissima terra i loro nocciuoli subito che il loro frutto è maturo, ed in tempo d' Inverno dovrebbero tenere al coperto sotto tepidi copertoj comuni, ove s'incansi a coperto delle più orride brine, e geli; e sull'apparire di primavera dovranno sotterrare in letti di terra moderatamente calda. Allorchè le giovani piantarelle hanno alzato la testa, dovranno avvezzare grado per grado a soffrir l'urto dell'aria viva, ed aperta; e nel mese di Giugno potranno liberamente lasciar fuori esposte all'ombra d'una tepida siepe, o spalliera. Qui vi potranno lasciare stare fino al principin d' Ottobre, ed allora, o porranno sotto una verde capanna, o dentro un copertojo comune per difenderle dai geli. Durante l'Invernata darassi loro quell'aria, che permetterà la Stagione, e di tratto in tratto dovranno annaffiare, quantunque ciò dovrà farsi con somma cautela, allorchè avranno sparso, o gittate via le loro foglie. Nel seguente Marzo, prima, che queste piantarelle gettino il sasso, dovranno ad una ad una trapiantare in un vaso di sottilissima terra, e poscia debbon' esser sotterrate entro un letto di terra moderatamente calda, ed annaffiare, e tenere all'ombra, fino a tanto che avranno gittate, e formate, od affodate le loro radici: nel Mese di Maggio poi dovranno quindi estrarsi, ed esporre sicuramente all'aria viva, ed aperta. Fa di mestieri seguitar a porre queste piantarelle al coperto nell'Invernata fino a che passati non avranno i quattr'anni, ed allora potranno trapiantare in terra nuda, ed allo scoperto, e qui vi resisteranno bravamente allora alle ingiurie del Verno.

Veggasi *Miller*, Dizionario del Giardiniere.

GIUOCO. *Gioco del Gallo.* Nella scelta del giuoco, o sia guerra, o combattimento del gallo, quattro cose debbon esser massimamente considerate; e queste sono la forma della corporatura, il colore, il coraggio, e l'acutezza del tallone. Quanto alla corporatura, dovrasì scegliere un gallo, il quale non sia, nè soverchio picciolo, nè soverchio grosso: i galli assai grossi non semprehan lenti, pesanti, e niente snelli, ed i piccioli riescono costante-

mente pigri, e tediosi nel combattere; oltre l'esser soverchio deboli per resistere alcun tratto di tempo nella battaglia. Altro disavvantaggio, che trovasi in questi estremi di soverchia grossezza e di soverchia picciolezza, si è, che con somma difficoltà riduconsi all'attacco. Perlochè dovranno mai sempre preferire agli altri tutti i galli di mezzana grandezza, come quelli, che esser sogliono generalmente assai svelti, ed attivi colla lor forza, ed è cosa agevole il fargli venire all'attacco. La testa del gallo dovrebbe esser picciola, gli occhi grandi, e slavillanti, ed il becco gagliardo, ed archeggiato nella sua prela. Il suo colore altresì dovrebbe corrispondere a quello del color principale, o generale delle penne, sianzi queste, o gialle, o rossicce, o bigie. Lo stinco delle sue zampe dovrebbe essere fortissimo, e non altrimenti, che la sua pennatura, od azzurro, o bigio, o giallo; ed i suoi sproni esser dovrebbero ruvidi, lunghi, ed aguzzi, alcun poco piegati, e puntuti all'indietro. I tre colori stimati migliori nel gallo da giuoco, sono il bigio, il giallo, ed il rosso, col petto nero. Non è però la perfezione di un gallo da riputarli unicamente ristretta, e confinata ai divisati colori; avvegnachè abbia l'esperienza fatto toccar con mano, come hannovi dei galli d' altri colori, che sono riusciti eccellenti; ma questi sono generalmente i migliori: talvolta i galli picchettati riescon buoni, ma il gallo bianco, ed il bruno rarissime volte sono da alcuna cosa.

Se il collo di un gallo abbia una fascia circolare di color di scarlatto, è un segno, che è forte, e gagliardo, e che ha insieme coraggio grande; ma per lo contrario, se questo circolo sia pallido, e dilavato, è argomento, che il gallo manca dei divisati pregi materiali. Il coraggio del gallo può esser anche in qualche parte congetturato dalla sua mastella, pettoratura, e burbera maniera di camminare; ed è similgiatamente argomento di spirito, ed animosità grande il frequentemente cantare al pollajo. Ciò che i giuocatori di similgiante specie appellano tallone stretto, od aguzzo, dee essere soltanto conosciuto dall'osservazione, che farassi sopra l'animale mentre combatte: il gallo, che ha questo, ad

egni

ogni urto, che dà al suo avversario nel proprio luogo, sempre gli fa grondar fuori il sangue, ed in ciascuna stretta è capace d'ucciderlo.

Viene generalmente accordato, che un gallo col tallone aguzzo, tuttochè questo sia alcun poco falso, tuttavia dovrà esser preferito ad un gallo ottimo per tutti gli altri rispetti, ma avente il tallone ottuso: conciossiachè questo secondo durerà lungissimo tempo a combattere, senza ferire, od affai di rado ferendo, dove l'altro per lo contrario ad ogni momento dà luogo di credere di por fine alla battaglia coll' immediata uccisione del suo antagonista: e quantunque un gallo di tal natura sia così prode, che in brev'ora termini la pugna; nulladimeno il piacere, che farà per arreare agli spettatori, essendo di cortissima durata, non è di tutti i galli per questo giuoco il migliore: per la qual cosa, se noi sceglieremo un gallo, il quale abbia i talloni mezzanamente aguzzi, duri, e grossi, quello farà il più perfetto gallo, che per tale effetto possa trovarsi.

Per preparare, disporre, ed avvezzare un gallo a combattere, il suo cucco dee esser tofato con un pajo di cefoje rasente alla carne tutto allo lungo pel suo collo dalla testa fino alle spalle: similimente segli debbono tofare tutte le penne ferratamente al greppone, e più tofato, e rasato, ch'ci comparisca, troverassi sempre in condizione migliore. Le ale debbono slargare dalla lunghezza della prima penna ascendente, e le altre penne tutte delle ale medesime debbono tagliuzzare in guisa, che vengano ad avere sommamente aguzzate punte, affinchè in alzandosi abbia tutto l'agio di infestare gli occhi del suo antagonista: fa onninamente di mestieri, che nella corona della testa, o cresta non vi sieno lasciate penne, affinchè l'opponente possa afferrarla, e tutta la sua testa dovrà esser inumidir ben bene con dello spato. Allora armerassi degli ufati sproni, e porrassi nel circolo de' conffitto a far prova di sua fortuna.

Per allevare bene dai galli prodi pel combattimento, o giuoco del gallo, dovrebbero prima di tutto procurarsi da gallina ben messa, e di buona razza: ella dovrebbe essere di color nero, bruno, pichettata, bigia, o macchiata di bianco, come canu-

ta; oppure, se mai potesse averli, giallognola: e di vero quest'ultimo colore da molti in sì fatte cose affai sperimentati, vien avuto in conto più degli altri tutti.

Se ella sia ciuffata vicino alla cresta, ella dovrà tanto più stimarsi, conciossiachè questa prometta del coraggio, e della risoluzione maggiore ne' suoi pulcini; ed ottimo segno sarà eziandio in una gallina l'essere armata di sprone. Il corpo della gallina dovrebbe esser grosso, e massimamente nella parte de' dettati, affinchè ella sia buona a covare uova molte. Dovrassi notare altresì il suo portamento fra le altre galline; avvegnachè se si ravvisi d'uno spirito mansueto, e pacato, e che riceva delle insolenze dalle altre galline, senza vendicarsene, o che mostri di temere di chechessia fra le compagne, dee essere rigettata assolutamente, avvegnachè i suoi pulcini riusciranno melenfi, e buoni a nulla.

Una buona gallina da giuoco da un gallo montatore produrrà buoni pulcini; ma il miglior gallo da giuoco del Mondo con una gallina da razza, non produrrà pulcini atti al giuoco medesimo: ma un giuocatore di galli, che vorrà avere un covata d'ottimi pulcini, fa di mestieri che procuri una coppia del miglior gallo, e della miglior gallina, che trovar mai possa; ed allora pochi saranno quei pulcini, che non facciano dai tai genitori buona riuscita.

La stagione migliore per porre le covate dei galli da giuoco si è dal principio di Febbrajo, fino alla metà, od anche alla fine di Marzo: il covo per la gallina dovrà farsi di strame odoroso, e netto, e dovrebbe esser piantato in un cantone di un camerino tepido fuori dagli infusti, o disturbi d'altri uccelli, o d'altro pollame; avvegnachè si fatta sorte d'interrompimento provochi quest'uccello d'indole brigiosa per sì fatta maniera, che viene a danneggiarne le uova. Affinchè ella non abbia occasione d'abbandonare il covo, e che per ciò le sue uova vengano a raffreddarsi, farà cosa affai propria il porle dinanzi qualsivoglia sorte di quei cibi, che le vadano assai a verso, ed insieme mutarle l'acqua ogni giorno, non solamente per bere, ma eziandio per inciuquartarsi, e bagnarsi dentro: potranno altresì spargere in vicinanza del nido delle ceneri, del sabbione, od altra
G 2 cola

cosa simigliante, ove ella abbia agio di rusparsi, e di spolverarsi. In capo a tre settimane in circa i pulcini sbucheranno fuori dell'uova; e perciò fa di mestieri in vicinanza di quello termine farsi con somma diligenza ad esaminare il covò, avvegna- ché sogliarvi sempre esser nati alcuni pulcini prima degli altri: quelli dovrannoosi levar fuori del covò medesimo subito che saranno usciti fuori del guscio, e posli in vicinanza del fuoco, od in alcun luogo caldo sopra della lana, e tosto che gli altri saranno simigliantemente nati, e che sotto la gallina non vi saranno più uova da schinderli, prenderannosi incontanente tutti, e restituirannosi alla Chioccia entro il covò loro. Non dovrannoosi uscire fuori della camera, o luogo, ove son nati questi pulcini per i primi quindici giorni; e fa altresì di mestieri, che il luogo, e camera, ove questi dovranno nascere, e rimanersi per la divisa quindicina di giorni, abbia il pavimento di tavole; conciossiachè qualsivoglia altro pavimento essendo soverchio freddo ed umido per quelle bestioline, verrebbe a grandemente pregiudicarle. Circa ad un mese, che saranno nati, potrali dar loro l'alolo in qualche prateria, o luogo erboso, affinché quivi ausingi ad accattarsi il cibo con piena libertà, e possansi palcare di vermiciuoli, e d'altri insetti; ma fa onninamente di mestieri, che in vicinanza di questo dato luogo non vi sieno nè pozze, nè tregoli, nè altri conservatoi d'acqua, avvegna- ché con somma facilità vengonvi a cadere, e tuffarvisi, e perciò moltissimi rimangonvi affogati. Subito che spunteranno nei galli la cresta, ed i bargigli, converrà con un paio di cesoje tagliarglieli via, e le parti ferite dovranno- segli ungerne con del burro, fino a che sieno assai rammarginate. Potrali permettere, che i pulcini vadano a zonzar strap- pati fino a tanto, che non sieno atti a beccarsi l'un l'altro: allora i galli dovranno- si separare: e fa di mestieri, che cadaun d'essi abbia la sua passeggiata particolare, e quanto questa sarà più solitaria, e libera da disturbi, tanto sarà migliore. Il luogo per dar loro il cibo forz'è che sia od un tavolato, oppure un morbidissimo, ed alciustissimo pezzo di terreno. Se il luogo sia duro, come, a cagion d'esempio, un

pavimento di pietra, o di mattoni cotti, o di terrazzo, il beccarvi sopra in cibandosi danneggerà, e guasterà loro il becco tenerello, di modo che dopoi non saranno valevoli a tenerlo serrato, allorchè saranno grandi. Quallsivoglia grano bianco, o di frumento, o di biade, o di minuti, come miglio, panico, ec. è cibo ottimo per i tenerelli pulcini, e di pari anche la crusca ammollata: di tratto in tratto questa crusca potrebbe loro intridere con dell'orina in vece d'acqua, e questa servirà a purgargli, ed a rinfrescarli egregiamente bene. Ad un gallo nel suo diurno passeggio, ed al suo pollajo non dovrebbero unire, che sole tre galline; avvegna- ché se ne avrà di più verà ad isfincarsi, ed indebolir la sua forza nel montarle; e quantunque la sua animosità, ed il suo coraggio non sia per fallar botta, tuttavia non avrà poi quella forza, quell'agilità, e quel nervo, che ricercasi nel nostro consitto, o pugna gallinacea. Dovrà simigliantemente averli cura, rispetto al suo pollajo, che la pertica non sia soverchio picciola pe' suoi artigli, e che di pari siavi piantata per modo, ch'ei non possa cadervi accavalato, oppure ch'ei possa posarvi, ed aggiustarvi, senza scavalcarsi. Se la pertica medesima sia archeggiata, sarà di pari scomodissima al gallo, avvegna- ché lo anferà a tenere i suoi piedi in un atteggiamento disuguale, lo che farà, che non sarà valevole a dar buone strette allorchè troverassi a combattere. Il metodo migliore di fabbricare un pollajo per questi galli si è d'averne una serie, o filare di corte pertiche, della lunghezza di quelle otto dita; e che le più basse di quelle pertiche sieno almeno dieci dita alte dal terreno, affinch'ei possa con più agevolezza montarvi; e che quando vi è montato sia forzato a starvi su colle zampe ben serrate insieme. Un gallo allevato nella divisa maniera può essere esposto a batterli giovanetto; ma il metodo migliore si è di non azzardarlo a combattere prima ch'egli abbia due anni.

I galli da ginoco vengono comunemente ridotti allo stato di loro massima gagliardigia, ed attività nello spazio di circa dieci giorni, il quale stato dal Dottor Robinson viene appellato il loro peso atletico; ma in istato somigliante a sesto grande con-

tinua.

mano essi per intiere ventiquattr'ore: e di vero è stato sperimentato, che alcuni galli son peggiorati, e divenuti meno atti in sole dodici ore. Veggasi l'articolo *ATLETICO peso*.

GLANDULE. In tutte le mobili articolazioni, massimamente di quelle persone, che terminano la loro vita con morti repentine, o violente, noi troviamo un'umore viscoso, assomigliantisi in qualche forma ad una liquida mucilagine, o ad una chiara d'uovo ben bene sbattuta, che viene comunemente appellato *Synovia*, nome dato dapprima ad una malattia. Questo liquore vien contenuto, insieme colle articolazioni, nelle capsule ligamentose, che lo impediscono dallo sgorgar fuori. Egli è somministrato principalmente da alcuni fardelletti di glandule più, o meno piatti, che sono contenuti entro le capsule medesime, e conosciuti dalla denominazione di glandule mucilaginoso, essendo questi gli organi, per i quali questa mucilagine vien condotta dal sangue. Ella può somigliantemente trasfudare in parte per le porosità dell'interna superficie dei ligamenti capsulari, ed in parte esser generata d'una materia untuosa spremuta dalle sostanze grasse dicentisi in vicinanza delle glandule, dal moto, e dalla frizione delle ossa articolate. Queste glandule sono d'un colore più, o meno rosso, e d'una struttura singolarissima, assomigliantisi a picciole nuotanti frange di differenti grossezze, composte di granelli pelliculosi, o vesciculari, e fornite d'un numero grande di vasi, scorrenti in varie direzioni. Compariscono quelli in alcuni luoghi somiglianti a distinti granelli immobilmemente affissi: Son quelli proporzionati alle ossa, ed alle giunture; e fianziati, o piantati in guisa, da essere assicurati, e difesi dalle frizioni violente, specialmente in vicinanza delle orlature, o contorni delle capsule; oppure fabbricati in particolari concavità fatte a posta per ricevergli.

Il liquore da queste glandule continuamente somministrato con quello, che trasfude per le porosità delle capsule, e peravventura anche con quello, che viene dalle molecole del grasso, vien ad essere sparso fra le ossa articolate, ed il suo uso si è a regolar le loro movimenti, a' impedi-

re, che vengano ad intaccarsi l'un l'altro, e di conservare le loro cartilagini dal seccarsi, e dal portarsi fuor di luogo. Veggasi *Winslow*, Anatomia, pag. 117.

Suppongono alcuni, ed anche s'ingegnano di provare la necessità delle vesciche per l'ammassamento, ed unione delle glandule, in rapporto a ricevere tutte le differenti particelle, che son ricercate nella composizione dei liquori separati, i quali forse è, che vengano condotti in serie differenti di vasi per essere intimamente internati nella vescica, che saranno in grado considerabilissimo aiutati, ed assistiti dalla fistole, e dalla distole, alle quali vien supposto, che la vescica soccomba. Veggasi *Acad. Bonon. Com. pag. 336*.

Le glandule sono per sì fatto modo soggette a patire delle alterazioni, che appena talvolta possono distinguere, e conoscere per ciò, che esse realmente sono: e le loro pecche, e vizj con soverchio spessa frequenza vengono a produrre, ed ingenerare delle perniciosissime conseguenze. Somministranci le Memorie dell'Accademia Reale di Parigi un'istoria d'una Donna, la quale nello sforzarsi che fece d'alzare un grosso pelo, videli nel medesimo giorno una gonfiezza assai grande nella parte inferiore del braccio, la qual gonfiezza continuò a farsi maggiore, ed a crescere, e dilatarsi pel tratto d'intieri diciotto mesi. In capo a questo tempo le comparve un foro nella parte interna della mano, dal quale veniva a sgorgare ogni giorno, ed a scaricarsi una quantità di materia, ma tuttavia la gonfiezza, anzi che scemare, e diminuirsi, continuava a crescere. In capo a due anni contentossi colei, che il tumore venisse aperto. Pochissima fu la materia, che ne fu scaricata, avvegnachè in tutto non arrivava a fare due cucchiainate d'un fluido tenace, fisso, viscoso: tutto il rimanente del tumore era solido, e conteneva intorno a dugento corpi bianchi, d'una figura pressochè rotonda, ma alcun poco bislunga, e non gran fatto dissomigliante da quella de' fagioli. Erano quelli corpiccioli coperti d'una consistente, e solida membrana, e non avevano nel loro interno alcuna cavità; ed alcuni di essi avevano in una delle loro estremità una specie di gambo, o picciolo, per cui mostrava-

stravano d'essere attaccati ad alcun altro *cr. re.* Erano queste le glandule, le quali perdute avevano l'uso lor naturale, e d'erano divenute dure; e ciò che aveva apparenza di picciolo, o di gambo in alcuna di esse, altro non era, che il loro canaletto, o condotto eferetorio, che non era perito. Veggansi *Memoires Acad. Paris. ann. 1708.*

Le glandule, le quali non hanno condotti secretorj particolari, addimandansi glandule cieche, o serrate, *Caca, vel, clausa.*

Vuole il Dottor Quistichius, che queste glandule sieno destinate per preparare il nutrimento per le altre parti, e quello ci l'argomenta dall'osservare, come queste scemano, e diminuiscono dopo che hanno fatto la piena loro crecita, cioè fino a che il fanciullo si è bene affodato; ed allora continuano nello stato medesimo fino a che l'Uomo giugne all'età sua più avanzata; e dopo quella vanno increpandosi, ed aggrinzandosi. Veggansi *Select. Medic. Francosurti Tom. 2. Vol. 1. §. 3.*

Glandule Renali, glandula renales. Osservava Monsieur Du Vernoy, come le glandule renali sono sommamente variabili nella loro grandezza, nella loro figura, e come queste son sempre contigue, e tenacemente attaccate, e connesse agli armonii. In alcuni seti queste glandule compariscono solide, senza la menoma cavità: in altri trovansi rigonfie e dilatate con del sangue sottile. Negli adulti queste glandule son sempre, e costantemente piatte: trovavansi intieramente rigonfie dall'aria, che soffia, od entra in esse dalla loro vena. Allorchè le glandule sono aperte, e che vi si schizzettano dentro l'argento vivo, vi si veggono moltissimi canaletti, per i quali scorre l'argentovivo. A ciascuna glandula appartengono due arterie, ed una vena, ed un numero grandissimo di canaletti, simiglianti a tanti raggi, i quali vengono a formare intorno ad essa un circolo. Un'arteria originante, o forgente dall'Aorta, viene spedita all'ingiù dal costorno inferiore della glandula ai testicoli dell'Uomo, ed all'ovaja della Donna, che dal Valsava per errore fu presa per un condotto, o canale. Veggansi *Comment. Acad. Petrop. Tum. 5.*

GLOBO. I nostri globi comuni, tutto che instrumenti istruttivi per sommo illustrare, e per ispiegare gli elementi primidella Geografia, e della dottrina sferica dell'Astronomia, nulladimeno son pieni di parecchi mancamenti, e difetti, come quelli, i quali veder non fanno, in che modo i fenomeni nascano dal moto della Terra, che è uno dei punti principalissimi, i quali dovrebbero avere innanzi agli occhi i principianti. Monsieur Harris Giuseppe ha perciò inventato un rimedio per simiglianti mancamenti, e quello viene esposto nelle nostre Filosofiche Trasfazioni, sotto il Numero 456. Sezione 7.

Pianta quello Valentinio sotto il Meridiano due Circoli Orarij, uno, cioè, ad un polo, l'altro all'altro, di modo che il globo viene a servire ugualmente bene per isciogliere le questioni non solo nelle latitudini meridionali, che nelle Boreali. Fassi egli simigliantemente a dividere il meridiano di bronzo, in uno dei poli, in mesi, ed in giorni, secondo la declinazione del Sole, contando, o computando dal polo. Adunque se il giorno del mese sia condotto all'Orizzonte, e che il globo venga rettificato secondo il tempo del giorno, l'Orizzonte verrà a rappresentare il circolo separante la luce, e le tenebre; e la metà superiore del globo verrà a rappresentare l'emisfero illuminato, essendo il Sole nel Zenith. Ci somministra di vantaggio Monsieur Harris un piano d'una macchina di pochissima spesa, per mostrare l'annuo moto della Terra nella sua orbita, senza la massima spesa d'una sfera Copernicana. Veggansi le *Transf. Philos. Num. 456. Sezione 7. pag. 323.*

GNOMONICO. La proiezione *gnomonica* si è quella, che rappresenta i Circoli di un'emisfero sopra un piano toccante nel vertice per via di linee, o raggi, che debbon esser progetti dal centro dell'emisfero medesimo a tutti i punti dei circoli.

In questa proiezione tutti i circoli grandi della sfera vengono ad esser progetti in linee rette. Qualivoglia circolo minore parallelo al piano di proiezione viene ad esser progetto in una sezione conica.

La proiezione *gnomonica* è simigliantemente denominata *proiezione orologigrafica*, come quella, che è il fondamento di

un'orologio a Sole. Per altri rispetti ella non è gran fatto usata, avvegnachè i circoli della sfera sieno progetti in Sezioni coniche, che sono sommamente malagevoli a descrivere. Questa proiezione però ha i suoi comodi, e vantaggi nello scioglimento d'alcuni problemi della sfera in rapporto ai circoli massimi, per esser tutti progetti in linee rette.

Monfieur Emerson, che si è acquistato nome per un' assai ingegnoso Trattato, ch'ei pubblicò sopra le Flussioni, ha somministrato al Mondo la Teoria non meno, che la Pratica della proiezione gnomonica, in altro suo Trattato intorno la Presezione della sfera, pubblicato in Londra 1749. in ottavo. Veggasi di pari di Monfieur *Murdoch*, *Newtooi Genesis Curvarum per umbras*, pag. 46. & seq.

GOBBO. *Gobbo* si è, ed addimandasi colui che è arcato, o rialzato nella schiena. E' la gibbosità un' incurvamento preternaturale della spina del dorso, oppure in un lato. A sì fatto disordine sono assai più soggetti i fanciullatti, che gli adulti, e quello sformamento assai più frequentemente proviene da esterne cagioni, che da interne. Una caduta, una percossa, o simile violenza vien così bene spesso a fiorecche le ossa tenerelle dei fanciullini. Allora quando sì fatta deformità ha origine da interna cagione, vien questa generalmente da un rilassamento dei ligamenti, i quali sostentano la spina, o da una carie delle sue vertebre; sebbene può la spina esser piegata all'insuori, ed il dorso spinto in fuori da una soverchio gagliarda, e ripetuta azione dei muscoli dell'addome; ed in evento, che quella non venga raddrizzata in tempo, d'ordinario viene innanzi, e cresce, e si fissa non altrimenti che le ossa indurite, fino a che viene a riuscire negli adulti totalmente non più raddrizzabile: ma allorchè il disordine è fresco, vi ha qualche speranza di guarigione. Il metodo comune si è per mezzo d'una macchina di tavole, o di legno, o d'acciajo, la quale sia fabbricata per il fatto modo, che venga a far pressione principalmente sopra la parte gibbosa, e questa col tenerla sulla persona per tratto lungo di tempo potrà ridurre tutte le parti dritte nella situazione loro sana,

e naturale. Hanno però i Cerusici un' istrumento differente, cui essi chiamano *Croce*, il quale è assai più efficace nel produrre il buono effetto, quantunque non riesca totalmente comodo ad esser tenuto indosso dal paziente. Dall'uso di questo istrumento viene collantemente impedito alle parti il venir su, e crescere in peggior postura, e bene spesso vengono bravamente a raddrizzare. Durante l'applicazione dei divisiati ajuti, sarebbe cosa assai dicevole, e proficua lo stropicciare di tratto in tratto le parti affette con della perfetta acqua della Regina d'Ungheria, con dello spirito di spigo, e simili, e di difenderlo eziandio con degli impiastri corroboranti d'Ossierocce, d'Opodeldoco, o simili. Veggasi l'*Essero*, Chirurgia, Par. 2. p. 21.

GOLPE. Oltre il metodo, di cui fassi parola nella *Ciclopedia* per preservare gli alberi dalla golpe, si è l'uso del tabacco in polvere; oppure quello di lavare, o d'innaffiare le foglie con dell'acqua, entro la quale sieno stati infusi dei gambi, o costole di foglie di tabacco.

Altro metodo si è similmente quello di tirar via le foglie, che sono appassite, e di troncare i piccioli rami, allorchè gittan fuori dei rampolli accartocciati, e non naturali.

Certuni fanno sì ad immaginare, che le golpi, le nebbie, e somiglianti, che grandemente danneggiano, e distruggono gli alberi da frutto, sieno prodotte da piccole spruzzate di pioggia, o da bianche brine cadenti sopra i germogli, e gli occhi, o gemme delle Pianta; le quali venendo poscia leguitate da venti Boreali, od Orientali, oppure da mattine fredde, e ghiacciate, producano questo male negli alberi con tanta frequenza in tempo di Primavera. A fine d'impedire sì fatti disordini è stato suggerito, da un' Autore di conto grande, di fabbricare dei muovimuri, ne quali ad ogni terzo ordine di mattoni debbasi porre un filare di tegole, o d'embrici, i quali vengano a sporgere in fuori, sicchè rimangano sospesi non altrimenti, che piccole tettoie sopra il piano del muro un dito, e mezzo, le quali tegole vengano a condur via le guazze, e la pioggia perpendicolare, lasciando a certe date distanze degli spazi fra le tegole per far

far adito agli alberi di portarsi coi loro rami all'insù.

Stimano alcuni, che la golpe, alla quale assai sovente è soggetto il grano dopo un'Estate umida, a null'altro sia dovuta, che alla foverchia umidità stanziente continuo nelle sue radici, lo che fa, ch'è venga a produrre molta paglia, e strame, e pochissimo grano: i vapori umidi elanti dal terreno nel tempo appunto, che le spighe stanno pec granite, agiscono non altrimenti, che la nebbia su i vegetabili li faccia, ed impediscono la crescita adeguata della spiga. Veggasi *Mortimer*, Art. della Coltivazione, Lib. 7. cap. 1. p. 305.

L'istoria però, che ci dà Monsieur Hales delle golpi, sembra infinitamente giusta, ed adeguata. Secondo questo valentuomo sono queste bene spesso cagionate da un'asciutto vento Orientale continuato per parecchie giornate successive, senza piogge di mezzo, oppure senza alcuna guazza mattutina, dal qual vento viene ad esser troncata, e mozza la perspirazione nei tenerissimi germogli di maniera tale, che in brev'ora viene ad esser mutato il loro colore, e così vengono ad imbianchire, ed a guastarsi: ed in evento che segua una lunga continuazione di stagione somigliante, ed uguale, questa verrà di pari a pregiudicare alle foglie tenerelle, la materia perspirante delle quali farsi fissa, grossa, e collosa, di modo che rimansi strettissimamente attaccata alle superficie delle foglie, e degenera in un propriissimo nutrimento per gl'insetti, i quali trovansi sempremai pascenti sopra le foglie non meno, che sopra i teneri rami degli alberi da frutto, allorchè accaggia somigliante specie di golpe, quantunque gl'insetti non sieno la cagion prima, come peravventura certuni fanno a credere, di questo male. Il rimedio migliore conosciuto finora si è quello di spruzzare di tratto in tratto le foglie, ed i rami degli alberi da frutto con acqua limpidissima; e se i teneti giovinetti rampolli compariscano grandemente danneggiati, e pregiudicati, il lavargli con un pezzo di pannolino in guisa di nettargli, se sia possibile, e liberargli da sì fatta materia glutinosa di modo che non v'ella esserne troncata, ed oltruna la loro necessaria perspirazione, sarà l'unico rimedio.

Aggiungasi, che essendo collocati vicino agli alberi delle larghe piatte padelle o tubi d'acqua, che possano ricevere i vapori elanti dalla terra, verremo ad aiutare gli alberi a conservare le loro tenere parti in uno stato pieghevole; ma qualunque siasi la maniera, colla quale venga effettuata questa lavanda dell'albero, importa, che venga fatta soprattutto la mattina per tempo, o nel tratto primo del giorno, affinchè l'umido possa esser elato, prima che addosso gli venga il fresco della sera, massimamente se le notti sieno a segno fredde, e quiete, che portino brinata. Nè dovrebbero eidi fare allorchè il Sole batte fortemente, e riscalda in grado sommo il muro, avvegnachè eidi sarebbe valevole a fare serepolare i teneri germogli.

Altra cagione delle golpi sono in tempo di Primavera le acute brine, alle quali bene spesso succede un gagliardo calco del Sole nel decollo della giocnata, lo che viene ad essere fra le cagioni conosciute un'assai subitanea, e certa distruzione, e divoramento dei frutti: conciossiachè il freddo della notte intirizisce le parti tenerissime delle gemme, o bottoni, ed il Sole alzandosi, e batendo con calor grande sopra il muro, prima che l'umidità della gemme stesse siasi asciugata, e questa trovandosi sovr'esse gemme in piccioli globuli, viene a caecogliere i raggi Solari, e perciò viene a sfancare, ed a fare serepolare i tenerelli fiori, e le altre parti della Pianta.

Ma che le golpi non sieno niente più assai sovente, che una malattia, od un tenece indietro, indebolendogli, gli alberi, apparisce evidentemente, qualora noi ci facciamo a considerare, quanto spesso egli accada, che gli alberi contro all'anno medesimo, esposti ad uno stesso aspetto, e godendo ugualmente i vantaggi medesimi del Sole, e dell'aria, con qualsivoglia altra circostanza, che vaglia a rendergli ugualmente sani, viene all'assime fiato osservato, come, malgrado ciò, differiscono grandemente, rispetto alla loro robustezza, vigore, e rigoglio; come anche assai sovente noi osserviamo, che gli alberi deboli sono continuamente colpiti, dove i vegeti, e rigogliosi polli, e piantati nella situazione medesima, campano da sì fatto

ma-

malore. Si fatta debolezza negli alberi, o procede da mancanza d'una porzione adeguata di nutrimento, che vaglia a mantenerli in perfetto vigore, oppure da alcune ree qualità del suolo, in cui essi crescono; od anche per avventura da alcuna prava qualità nel pedale, o finalmente da innata malattia nel primo tallo, o germoglio, che abbia ereditata dalla sua prima matrice, oppure dal pravo metodo contratta del potarolo. Veggasi l'Articolo POTARE, *Ciclopedia*.

Vi ha però un'altra sorte di golpe, dalla quale è infinitamente più malagevole il preservare gli alberi fruttiferi: sono queste le acute, pungenti, brinose mattine, le quali benefico accadono appunto in quel tempo, che gli alberi trovansi in fiorita, oppure anche mentre i frutti hanno appena legato, e sono tenerissimi, e queste fanno sì, che o la gemma, od il picciolissimo frutto cadano; e taluna volta le parti tenere dei germogli, e le foglie stesse vengono da similgiante malore grandemente infestate, e danneggiate. Il solo metodo finora rinvenuto per ovviare a sì grave disordine, si è quello di cuoprire diligentissimamente le muraglie, o consueghe, o con grosse tele, o fomigianti, le quali coperte farà di mestieri fermare, e raccomandare in guisa, che non possano essere frastornate, o dilungate dai venti, sicchè rimanganvi tutto il tratto della notte; e quelli copertoj, se la stagione il comporta, dovranno levar via ogni giorno.

Altra specie di golpe, la quale sopravviene alcuna fiata nel mese d'Aprile, ed anche nel Maggio, e che è una vera fatalissima distruzione di tutti i frutti di quegli alberi, che trovansi negli Orti, nelle aperte piantagioni, e nei broli, e contro alla quale noi non sappiamo, che riparo apporre, e che è appunto ciò, che addimandasi *fuego amebbiante*, il quale in pochissime ore non solamente distrugge il frutto, e le foglie, ma assai fiate delle parti eziandio degli alberi stessi; e perfino talora giugne ad interamente inaridirgli, ed uccidergli. Vien supposto esser ciò l'effetto di volumi di volanti trasparenti vapori, i quali, fra le parecchie forme, entro le quali avvolgonsi, possono allora approssimarsi tanto vicino ad un'Emisfera,

Suppl. Tom. III.

od un'Emicilindro, o nella loro superficie superiore, o nell' inferiore, a misura di quello, che i raggi del Sole convergansi a segno di leorzare le piante, o gli alberi, su i quali cadono, in proporzione alla maggiore, o minor convergenza dei raggi medesimi del Sole. Quello avviene con frequenza maggiore nelle piantagioni ferrate, ove i vapori stagnanti dalla terra, e le abbondevoli perspirazioni dagli alberi, vengono ad esser in essi rinchiusi, per mancanza d'asolo libero d'aria per dilungarli, allontanarli, e disperderli; e quello, come dicevamo, segue più spesso, che in quegli alberi, che trovansi piantati in alcuna distanza gli uni dagli altri, oppure che sono tutt' all' intorno circondati da collinette, o da boscaglie. Veggasi *Mill. Dizionario del Giardinere* in voce. Veggasi l'Articolo RUGGINE.

GORGOLLIONE. Questa voce *gorgollione*, che i Toscani dicono anche *Tombio*, è nell' Istoria Naturale il nome d' un picciolissimo animale benissimo conosciuto, e che trovasi assai spesso nei caei vecchi, ed in parecchi altri corpi, e sostanze altresì, non meno fresche e recenti, che muffate, e patite.

All'occhio nudo i gorgollioni nel cacao compariscono null' altro, che particelle, o granellini di polvere se moventi; ma il microscopio ce gli fa vedere perfettissimi animalucci aventi di pari una figura regolare, che effettuanti le funzioni tutte a capello della vita niente meno, che le altre creature tutte, le quali sono infinitamente maggiori di loro quanto alla mole. Veggasi la Tavola degli Oggetti microscopici, Classe 1.

Sono questi animali erustacei, e per lo più sono trasparenti; e le parti principali dei medesimi sono la testa, il collo, ed il corpo. In proporzione al corpo medesimo la testa è picciola, ed ha ungrifo acuto, ed una bocca, cui egli apre questo animaluccio, e ferra nella guisa stessa che fa una talpa. Ha due picciolissimi occhi, e quelli in grado estremo lucidi, e sfavillanti; ed in evento, che uno arrivi a toccarne uno con uno spillo, è incredibile il vedere con quanta destrezza egli senta un secondo tocco, se se gli accosti lo spillo per una seconda fiata.

H

So-

Sono i gorgoglioni di specie differenti; avvengachè alcuni d'essi abbiano lei gambe, ed altri ne abbiano otto. Cadauna di queste loro zampe ha sei giunture tutte fasciate intorno intorno, e vestite di peli, e nella estremità d'esse zampe hannovi due artigli, co quali sollevano quelle bestiole con molta sveltezza qualsivoglia cosa ad esse proporzionata. La parte interiore del corpo è mollosa, e polputa, e termina in una forma ovale, dalla quale escono fuori alcuni pochi peli eccedentemente lunghi.

In questi formamente piccioli animali i maschi vengono con somma facilità a distinguere dalle femmine. Sono le femmine ovipare, non altrimenti che i pidocchi, ed i ragnateli; ed i gorgoglioni si sbucan fuori dalle loro uova nella lor forma propria, senza che debban polcia faggiacere a verun cambiamento. Quelli però allorchè son di fresco usciti dal guscio, sono d'una minutezza estrema; e nel tratto di tempo, che vi vuole fino a che vengano alla lor piena crescita, si mutano di buccia parecchie volte.

Quelle picciolissime creature possono esser conservate vive per molti mesi fra due vetri concavi, ed a quelli puossi con ogni agevolezza applicare a talento il microscopio per osservarli. Per simigliante guisa bene spesso veggionsi *in situ*, attaccati cioè endo con coda; e questa faccenda vien da essi effettuata con un movimento vivacissimo. Le loro uova nelle stagioni calde si schiudono nel tratto di dodici, od al più di quattordici giorni; ma nell'Invernata, e nei tempi freddi la cosa va molto più a lungo. Sono queste uova così picciole, che per un calcolo regolare sembra, che novanta milioni di esse non giungano ad uguagliar la grossezza di un uovo d'un piccion terrajolo. Veggasi *Baker*, Microscopio, pag. 187.

Sono i gorgoglioni animalucci in estremo voraci; non vanno essi soltanto pasceendosi sopra il cacio, ma eziandio sopra tutte le sorti di carne secca, di pesci, di frutta, e di semi; e di quelle cose presto che tutte, le quali hanno alcun grado di umidità, anche senza esser bagnate; nè rare fiate è altresì accaduto il vedergli divorar l'un l'altro per mancanza d'alimen-

to. La loro maniera di mangiare si è collo spingere alternativamente una macella innanzi, e l'altra indietro; ed in simigliante maniera macinando il loro cibo, dopo che hanno ben picciato, sembra, che pongansi a ruminare non altramente, che le bestie bovine si facciano.

Hannovi parecchie minori distinzioni osservabili nei gorgoglioni, i quali vengono trovati in sostanze diverse. Quelli, che si trovano nella vecchia farina d'orzo, o nella farina di vena, sono molto più snelli, e vivaci, di quello sieno i gorgoglioni del cacio, e sono più pelosi, ed i loro peli sono molto più lunghi. I gorgoglioni, che trovansi entro i fichi, sembrano le arafaggi, ed hanno due aile nel grugno, e due lunghissime corna sulla testa. Hanno questi sole sei zampe, e sono più lonzi, ed infingardi di quelli della polvere di farina d'orzo. Quelli, che trovansi nei fichi secchi, hanno simigliantemente lunghissimi peli, e questi a certe piccole distanze afficcati da mucchi di peli molto più corti. Quindi falsi a congetturare Monsieur Lewenhoeck, che quei peli più lunghi, e più grossi sieno congiunti, e piantati in quei luoghi, ove son trovati i peli più corti.

Havvi eziandio una specie di gorgoglioni erranti, i quali trovansi in qualsivoglia luogo, ove si possano palcolare: vengono trovati bene spesso in forma d'una polvere bianca, nè alcuno falsi mai tampoco a sospettare, esser questi mucchi di veri animali viventi.

E' un'animale il gorgoglione attaccatissimo alla vita, o per meglio esprimerci, che muore con estrema difficoltà; avvengachè farà capacissimo di vivere per mesi, e mesi senza il menomissimo cibo; ed il valentissimo Monsieur Lewenhoeck ne ebbe uno, il quale si visse undici intiere settimane sopra la punta d'unospillo entro la quale avealo infilato quel Valentuomo per esaminarvelo col suo Microscopio. Veggasi *Lewenhoeck*, Arcan. Natur. Tom. 4. p. 368.

GOTTA. S'come questa malattia riceve appellazioni diverse, secondo le parti, cui ella afferra, è onninamente giudicato necessario l'espore le seguenti citazioni, a fine di prevenire rispetto a questo Articolo la confusione, che agevolmente nascer potrebbe.

La Voce Artrite è un termine differenzialmente inteso da differenti Autori; avvegnachè alcuni vengano ad esprimersi soltanto con esso ciò, che noi comunemente appelliamo gotta; altri poi lo fanno il nome generale di quella e di parecchie altre infermità, dell'indole, natura, ed origine medesima, e distinguono quella particolare specie di essa, che noi addimandiamo gotta, col termine di podagra. Il Medico Sihal, e da esso il Junkero definiscono l'Artrite un' affezione spastica delle giunture in qualsivoglia parte del corpo, tormentante il paziente con un violento, acuto, durevole dolore, e non giugnente a quel termine salutare, al qual sembra, che tender voglia la natura co' suoi moti nel medesimo. La podagra in particolare vien definita un' affezione spastica dolorosissima del piede, avente la sua origine da un' ammassamento di sangue, che avrebbe voluto sgorgare per le vene morali, e che trovato non avendo aperto il varco per uscirne, nei suoi movimenti fatti penosissimo, e degenera poscia in abito, che ad ogni lieve occasione rialza la testa.

A lorchè vien presa l'artrite nel suo senso generale, ella abbraccia parecchie malattie, suddivise per mezzo dei loro specifici nomi, come, a cagion d' esempio, d'emicrania, di pleurite spuria, di sciatica, di chiragra, di gonagra, ed ultimamente di podagra, o gotta nei piedi.

Alcuni Autori poi prendono la voce Artrite in un senso più specifico di quello, e tuttavia distinguono sufficientemente dalla podagra. Elprimono essi per tal voce quelle spastiche affezioni, che assalgono le membra, e parti superiori del corpo; ed allora ella viene ad esser fatta del genere medesimo della podagra, e distinta da essa, come una specie vien distinta dall'altra per via delle appresso particolarità.

Assale l'Artrite la gioventù, e la podagra le persone più avanzate in età. In quelle persone, che son sottoposte all'artrite, ed alla podagra, l'artrite è sempre la prima ad afferrarle; e quando una persona, che a buon' ora è stata assalita dalla artrite, avanzandosi questa negli anni, l'artrite degenera in podagra. E quella una distinzione d'alcuni sommamente giudiziosi Autori; con tutto questo però

realmente le varie, e molte apparenze dell'artrite, come presa nel suo senso adai generale, in altro non differisce, senonsè nel lungo, cui quella attacca, e nel tempo, in cui fatti sentire: conciossiachè tutte quelle apparenze s'accordino a capello non meno nelle essenziali loro condizioni, che nelle cagioni generali. Nulladimeno l'Artrite vera dee essere diligentissimamente distinta da quella, che addimandasi artrite vagante, *arthritis vaga*, o sia artrite semplice, o scorbutica. Questa in un batter d'occhio volaene da una parte all'altra del corpo umano, e muta luogo dai piedi al torace, e quindi all'anca, e così ad altre parti. Veggasi *Junker, Conspect. Medic. pag. 615.*

Il Reumatismo, e l'Artrite sono similissimamente malattie non differenti gran fatto l'una dall'altra, ma sono propriamente l'una all'altra lubordinate; e bene spesso un'artrite leggera, addimandasi un'acceso reumatico. Altro non è il reumatismo che un ristagno della massa del sangue intorno a particolari parti del corpo; riconoscendo la sua origine da un' ammassamento trasmodante, e copioso del sangue medesimo, dalla Natura diretto specialmente a quella data parte. Ha il reumatismo la sua sede nelle parti muscolari del corpo, e l'artrite afferra massimamente le giunture delle varie membra. Naturalmente il reumatismo precede sempre la gotta, e degenera soventi volte in quella; ed è eziandio certi, che il reumatismo, e l'artrite trovansi non di rado complicate insieme. Le semplici congestioni, ed emozioni, o ribollimenti del sangue sono tutt'altra cosa, che l'artrite. Prima in rapporto ai loro effetti, avvegnachè vadano a terminare d'ordinario in uno sgorgo del sangue medesimo, od eruzione per alcun mezzo, qualunque poi egli siasi, dove per lo contrario l'artrite non giugne giammai a questo termine.

Differiscono in secondo luogo nella loro durata; avvegnachè vengano ad essere comenemente terminate in qualche modo dentro un cortissimo periodo: dove l'artrite è d'una terribissima, e lunghissima durata; ed in terzo luogo differiscono dalle parti, che attaccano. Le semplici congestioni, od ammassamenti attaccano le

parti interne dei vasi sanguiferi, ma l'artrite attacca le fibre esterne, e muscolo-
se. Ultimamente elle differiscono, non me-
no in rapporto all'evento, perchè le sem-
plici congestioni son cagioni d'infiamma-
zioni, e d'esculceramenti, e l'artrite di
stiramenti, sciorciami, e contrazioni del-
le membra.

I segni poi della sciatica sono un dolo-
re veementissimo, ed abbruggiante tra il
fianco, e la coscia, o sia nell'anca, il
quale ivi rimanfi per lungo tratto di tem-
po, e vien sentito principalmente nei ten-
dini, e nelle giunture delle ossa. Spasmo
simigliante attacca i muscoli di tutto il
fianco con tanta violenza, che il povero
paziente vien suo malgrado forzato a cam-
minare incurvato.

Gli altri malori artritici, come l'em-
icrania, e somiglianti, troverannosi espolti
futto i loro articoli rispettivi ed in tutt'
essi il metodo generale della cura è il me-
dicismo, ed il seguente è il trattamento più
dicevole.

Metodo della Cura. La cagione materia-
le, la quale atto non è, che un'abito
pletorico, dee essere dilungata colle oppor-
tune cavate di sangue fatte nei tempi ade-
gnati, e per via d'applicare le mignatte
alle vene moroidali, affine di promuovere
una scarica per somigliante strada; e nelle
persone di un'abito abbondante d'umori è
infinitamente dicevole l'uso delle coppette
a taglio. Dopo di ciò dovranno nettare
le crudesse delle prime vie, massimamente
quelle tali, che sono d'indole, e natura
biliola, procurando di espellerle per gen-
til modo, come quelle, che sono sempre-
mai la cagione occasionale dei dolori spa-
stici, essendo grandemente asperate. I tali
digestivi, quali appunto sono il Tartaro
vetriolato, l'arcano duplicato, e d'indole
somigliante, sieno ottimi, e singolarissimi
astergenti; e l'aconico e proprio metodo
d'evacuare la materia si è per via di soa-
vi, e benigni lassativi, quali esser potreb-
bono le bevute catartiche di senna, e di ra-
barbaro, con una presa di Tartaro solubi-
le. Il sale del Glaubero, oppure il sal co-
mune purgativo, appellato comunemente
sale d'Epium, ed altrove sal d'Inghilterra,
fa somigliantemente ottima riuiscita; e di
pari beneficio grandissimo vien prodotto dai

vinii medicati, impregnati cioè d'ingredienti
d'indole altergente, catartica, e diuretica.
L'emozioni, o ribollimenti violenti del san-
gue, e la sua qualità acre sulfureo-salina,
debbono esser per ogni conto temperati,
e le rigidezze dei solidi ammorbide, e
tolte via. Tale effetto viene eccellentemen-
te ottenuto dai medicamenti nitrosi con-
giunti con gli assorbenti salini; e negli abi-
ti più gagliardi, robusti, e nerboruti, ren-
donfi talvolta necessari gli acidi più ener-
gici: dopo di ciò dee la Natura esser aju-
tata, ed assistita nel fare un'eguale, e re-
golare distribuzione degli umori. Questo dee
esser fatto nelle persone d'abito collico,
per mezzo de' sali neutri, e delle abbon-
devolissime bevute di decocti caldi, e ne-
tanti, quale si è appunto il Tè fatto d'er-
ba Veronica, la quale da non molti anni
in qua è stata celebrata per una medicina
valevolissima a curar per se sola le malat-
tie tutte di natura, ed indole somigliante.
In altri temperamenti i moderati Alessi-
farmaci in siffatta occasione debbon' esser
aggiunti, quali esser possono dicevolmente
i decocti dei legni di sassafras, e di gua-
jaco, e di china, e sassaapariglia, e di ra-
dici di pimpinella. Veggasi *Juncker*, Con-
sp. Med. pag. 623.

Ultimamente lo stato veementemente spa-
stico, e doloroso delle parti, dee esser mi-
sigato, e dilungato dal tormentato pazien-
te. Per tale intento dovranno far pren-
dere al paziente medesimo picciole dosarel-
le di cinabro colla polvere di lombrichi,
e di conserva con queste prescrivannose-
gli i gentili, e benigni diaforetici. Nel
tempo medesimo, che si faranno prendere
al gottoso internamente i medicamenti di-
visati, potressi applicare esternamente alle
tormentate parti dello spirito di vino can-
forato mescolato colla tintura di zafferano.
Lo spirito acido distillato dalle formiche,
e lo spirito di lombrichi. La Tintura
di castoreo può somigliantemente applicarsi
nella divisa maniera, e in alcuni casi
il sapone di Venezia sciolto nello spirito di
vino, oppure il tanto famoso nostro un-
guento Opodeldoc. Un cerotto con un'ab-
bondevolissima porzione di galbano, è sta-
to somigliantemente conolcito produrre
ottimo effetto; ed alcuni di pari applicar
sogliono con riuiscita l'impiastrò di sapone
ca-

comune. Da altri vengono preferiti de' sacchetti con idea di ottenere più spedatamente l'intento, di vegetabili caldi, quali sono il camedrio, l'origano, ed il serpillo, con delle radici di pimpinella, con dell'angelica, e del sigillo di Salomone, e dei semi d'anaci, e di dauce silvestre. Altri far sogliono queste boffe, o sacchetti in una maniera più spedita, servendosi di sola farina di segala, o di vena, di fiori di sambuco, e di zafferano, spruzzando poi di sopra tutto il faccetto con dello spirito di vino canforato, oppure tuffando, ed inzuppando tutto il sacchetto medesimo in generoso vino ben caldo, ed applicandolo immediatamente così caldo all'offese parti.

Raccomandano di pari alcuni grandemente l'applicare alla parte del cacio ben ben pestato, e ridotto in una spezie di pasta, coprendo quella pasta medesima con una pelle di lepre; e molti fanno gran parole degli effetti dei fustumigi fatti per via d'abbrugiare sotto la patte tormentata dei fiori di stecade, e di mallice, e d'oliban insieme con i legni di sassafras, e di guajaco, con i sandali Rodio, e giallo. Il vapore dei decocti di erbe calide, ed aromatiche viene similantemente assai commendato; e da alcuni soglionfi anche prescrivere delle leggerissime fregagioni, e stroppiciamenti sopra la parte coo un morbidissimo fetolino, o con un pezzo di frenella, che sia stata prima ben bene impregnata dei fumi dei pur'ora additati fustumigi.

Sono questi i mezzi più massicci, e principali d'una Cura; ma non vi vuol minor giudizio nel Medico rispetto al tempo, ed alla maniera, di somministrare, e d'applicare i medicamenti medesimi divisi, di quello vogliavi nel saperne fare la scelta.

Nel tempo degli afflari, od accessi, farà assai dicevole, e proprio pel paziente il prendere tre, o quattro volte il giorno una polvere preparata di nitro, e di tartaro vetriolato, di cadauno una mezza oncia, d'occhi di granchio satollati con sugo di limone, tre dramme, di cinabro, quattro scrupoli.

Nel tempo degli afflari, od accessi, farà assai dicevole, e proprio pel paziente il prendere tre, o quattro volte il giorno una polvere preparata di nitro, e di Tartaro

vetriolato, di cadauno una mezza oncia, d'occhi di granchio satollati con sugo di limone, tre dramme, di cinabro quattro scrupoli. Queste sostanze dovranno ben bene mescolare insieme, e di quelle dovranno dare l'elasticissimo peso d'uno scrupolo per ogni dose, e dopo di questa farà cosa benissimo fatta il prendere una buona bevuta d'alcun gentile, e mite diaforetico. Durante l'uso interno di queste dosi, dovranno applicate alle parti delle pezzette ben bene inzuppate in ispirito di vino canforato, bene impregnato di zafferano: e per mantenere il ventre sciolto, e bene obbediente, e piuttosto rilasciato, ogni volta, che richiederà l'occasione, dovrà applicare al grotto un clistero della comune spezie emoliente, con una picciola dosarella di nitro sciolto entro il decocto: e dopo di questo farà un'appropriate medicamento per conservare il corpo nel troppo necessario stato d'obbedienza, il prendere di tratto in tratto delle doselle di sal comune catartico d'Epsum. Dopo la continuazione d'intero quindici giornate dell'ulo delle polveri nitrose, farà cosa in estremo dicevole il prendere ogni di due, o tre dosi d'una mistura di tintura di sal di Tartaro, e di spirito di sale ammoniac, la dose adeguata della qual mistura sono venticinque goccioline per volta; e cadauna sera potrà prendere una dose di pillole di storce, allorchè ha calato la testa la violenza del parossismo. Gli Alessifarmaci d'indole mite, e benigna, debbonfi prendere senza un governo caldo, e le frequenti lavande d'acqua calda ai piedi, o pediluvj in acqua ben calda impregnata di un sale alcalico delle ceneri de vegetabili, od in altra guisa, riescono di sovrano vantaggio, e beneficio per ammorbidente le parti, e per portar via la materia peccante, e per restituire altresì il loro adeguato natural tono alle parti. Veggasi *Junker*, *Compend. Medic.* pag. 623.

Allorchè non vi sieno in campo gli accessi podagrici, non dovrà giammai tralasciare la cavata del sangue sì nella Primavera, che nell'Autunno; e nelle persone di un'abito abbondante di sughi il metter delle coppette a taglio sopra le parti è cosa utile in grado sommo, e benefica. Nelle donne poi innanzi a qualsivoglia

glia cosa degli aver la considerazione ai corpi menstruali, e fa di mestieri il ridurre prima questi ai loro adeguati regolari periodi, e poi sperare di concludere in esse una cura, avvegnachè se ciò manchi, ella non è poco nè punto in esse sperabile. Negli uomini sarà di beneficio estremo l'applicazione delle mignatte alle vene moroidali, e per lo meno quattro volte l'anno il prendere delle adeguate medicine catartiche, di fena, a cagion d'esempio, di rabarbaro, o di somiglianti, in decotti, oppure in infusioni, mescolando con essi quelle tali cose, che siamo eretti, che raddolciscono il sangue. E nel governo generale, dovrasse sempre conservar l'uso delle bevute di liquori deboli in quantità sufficiente, e dovrasse anziandlo immancabilmente praticare un moderato esercizio del corpo. Ed ultimamente, siccome la Primavera, e l'Autunno sono i tempi, ne quali gli accessi di tutte le malattie artritiche sogliono per lo più rialzar la testa, e farsi di nuovo sentire, sarà cosa sempre assai dicevole, per via di preservamento, il prendere in questi tali tempi dei decotti, o delle infusioni di salsafra, o d'altri legni, a foglia de Tè, ed insieme con essi alcune picciole moderate dolerelle d'alcuni dei medicamenti nistrosi.

Ella si è un'osservazione generale in tutti i casi artritici, che le spezie tutte d'evacuazioni moderatamente promosse, abbassano e minorano i dolori, e, che per lo contrario, il troncamento, o soppressione di qualunque di quelle escrezioni, rende i dolori medesimi assai più violenti, ed intensi. Quindi nei parossismi più gagliardi, o sia nel colmo degli accessi, debbon' esserle schisate, e dilungate tutte le oppiate, conciossiachè, sebbene sogliono quelle arrecar per lo più alcun sollievo allora per allora, indi a non molto accrescono sempre, e fanno venir maggiori, e più acuti i dolori. Le astringenti preparazioni acciute, con i bol, e con altri medicamenti di questa elasse, supprimono, e troncano le escrezioni, collipano le viscere, e bene spesso son trisle, e crudeli madri d'idropisie. I sali volatili imprudentemente lummistrati, ed in dosi soverchio abbondevoli collipano le viscere, ed eccitano a un tempo stesso un violento tumulto, ed emozio-

ne negli umori. Quindi sono bene spesso questi tali la cagione occasionale di sconcerti grandissimi di sanità; ed è veramente una sventura somma, che la barbara pratica Medica de' nostri tempi sia così libera e franca nella preferizione di questi sali in casi somiglianti.

Fra le applicazioni esterne, quelle, che sono d'indole astringente, refrigerante, saturnina, e simiglianti, arrecano tutte senza eccettuarne una un sollievo a tempo, ma riescono sempremai di formamente pericolose conseguenze, ed anche bene spesso fatali, come quelle, le quali vengono a produrre nelle giunture, dei nodi, dei tumori, ed in alcuni casi degli accorciamenti, e contrazioni delle parti, ed in altri casi poi spingono in dentro la materia peccante con grandissima forza, facendola prender la strada delle parti interne, ed ingenerano tali tristi, e rei sintomi, che non possono esser da qualsivoglia medicamento dilungati, o diminuiti.

I medicamenti acri, calorosi, e nervini, usati esternamente, quali appunto sono gli olii chimici, ed i balsami naturali, tutti esacerbano i sintomi, e cagionano dei crudelissimi intollerabili dolori non meno, che delle infiammazioni; conciossiachè non abbiavi già in questi casi debolezza di parti, la quale abbisogni d'esser corroborata, ed assodata per via di simiglianti medicine, ma per lo contrario un rigore, sfilamento, e tensione soverchio grande delle parti stesse, i quali rei sintomi è giuoco forza, anzichè produr buono effetto, e scemargli, che tali medicine gli accrescano, e gli facciano più crudeli, a motivo di loro acri qualità.

I gagliardi, e forti purganti somministrati al paziente artritico in tempo del parossismo soventi volte sono stati di riuscita fatale collo spignere la rea, e morbifica materia alle parti interne; e le cavate di sangue negli accessi medesimi rendongli sempre e collantemente più violenti, e crudeli, soggettano l'infelice paziente a più frequenti attacchi, e riducono alla dura necessità d'aprir la vena ogni volta innanzi che le altre opportune medicine possano produrre l'effetto loro. Ma per lo contrario il cavar sangue nella prima fumata, o nei sentori primi della vicinanza dell'

acceso, come altresì nel suo piegare, e declinare, ha il suo uso reale; maissimamente fe quella cavata di sangue ve 'sfeffuata con applicare quattro, o cinque mignatte alle vene morudali, oppure nella feratca con un coppetone a taglio ben profundato nella parte medesima. È di vero sì fatto malore è stato assai volte perfettamente curato con questo solo mezzo in guisa così assoluta, che non si è fatto sentire mai più anche in coloro, che vi erano grandemente sottoposti. Lo spirito di vino canforato, ed i facchetti d'ingredienti asciutti spruzzati con esso spirito di vino canforato, sono dicevolissimi in tutte le spezie, ed attacchi di sì fatta malattia, ed in tutti i temperamenti.

Un cerotto di galbano, e di canfora arrecar suole bene spesso un sollievo istantaneo. Quello dovrebbe essere applicato dopo la cavata di sangue nel principio del parossismo e qualora non produca il suo effetto in tre ore di tempo, dovrai levarla via dalla parte, avvegnachè il lasciarvelo su senza effetto, anzichè far bene, verrebbe a pregiudicare il paziente. L'impastro di sapone, con un' buona porzione di canfora, viene exandlo sperimentato assaissime fiate di beneficio sommo nel principio di casi somiglianti. I bagni d'acqua calda ai piedi, le vengano appunto praticati innanzi l'attacco del parossismo, od in atto, che sia per farlo, rendono la gotta sempre più imperversante, e più acuta, ma le vengano ulati dopo l'attacco medesimo, assaissime fiate producono del vantaggio non mezzano. Il tempo acconcio pe' bagni d'acqua calda si è appunto nella declinazione del parossismo.

Ma sopra tutte le cose, allora quando un' attacco ha cessato, e le ne è partito; debbonfi con ogni maggior cura schifare le cagioni occasionali di farlo risalzar la testa, e di farsi sentir di nuovo. Sono quelle cagioni pertanto una dieta soverchio abbondevole, e copiosa, il bere soverchio vino, l'uso trasmodato matrimoniale, i violenti turbamenti, e commozioni d'animo per ira, o per altre passioni, e gli esercizi violenti, e smoderati. In evento, che quelle cose tutte non sieno temperate, e ristrette, la pice, in cui lascierà la gotta colui, che vuole affermare, sarà certissimamente di cortissima durata.

Da certuni è stato grandemente raccomandato in questi casi l'uso della salivazione: ma noi, a verodire, lo sperimentiamo anzi un sogno, che cosa d'uso reale, e proficuo. Il dotto nostro Medico Stahl fa parola di un caso somamente considerabile, che prova la gotta de' piedi contagiosa, od attaccaticcia. Il caso si è, che un certo Gentiluomo soggetto alla gotta, avendo donato ad un suo calzolaio un paio di stivali, cui egli soleva portare, il pover' uomo sendoseli calzati, dopo avergli portati per alcun tempo, divenne anch'esso gotoso.

Viene asserito, che una severa continuata dieta lactea guarisca radicalmente la gotta. Veggasi l'Egregio Trattato di Monsieur Cheyne intitolato, Metodo naturale di Medicare pag. 266.

Il Medico Dover asserisce, come un paziente gotoso rimarrà libero dal suo crudelissimo male in due, od in tre ore al più, dopo che avrà avvallato una dose di quaranta ai settanta grani dell' appresso polvere.

Prendi di sal petra, e di Tartaro vetrificato, di cadauna di queste due sostanze, quattr'onze: ponile in un mortajo di bronzo rosso rovente: va agitandole con un cucchiajo, fino a tanto che abbiano alzato la fiamma: ciò fatto le ridurrai in finissima polvere: quindi vi taglierai un'oncia d'oppio; lo macinerai poscia riducendolo in polvere, e quindi lo mescolerai con un'oncia di ipeacacua polverizzata, e con altrettanta quantità di polvere di liquirizia. Quella polvere dovrai prender dal paziente stantisi in letto dentro un comune bicchier di vin bianco; e cuoprendo ben ben caldo il paziente, mentre esso sta sudando dovrà seguitare a bere la quarta parte del bicchiere del diviso liquore.

Questo Medico è similamente d'avviso, che l'Elisir appellato Elisir Mynsicht di vetriolo preso bene spesso, quantunque per alcun tempo possa cagionare dei dolori, nulladimeno sia valevole alla perfine a distrigger per intero la materia gotica. Veggansi saggi Medici d'Edimburgo.

Il Dottor Stevens si studia, ed arrabattasi per provare, che gli umori gotosi, anzichè essere d'indole, e natura acida, sieno piuttosto di un' indole alcalica.

Il Medico Gactano Taccioni fece moltissime esperienze colla mucilagine delle giunture degli animali bruti, e d' uomini eziandio, non meno sani, che gottosi, con idea, ed intenzione di rintracciare, se la materia gottosa sia acida, oppure alcalica, ed ebbe a concludere, che la sua materia è talvolta di una di queste due indoli, e tal altra dell' altra. Se la gottia non produce rufi, o nodi, o fa ciò con lentezza grandissima, e massimamente se ella sia accompagnata da gonfiezze edematose, egli asserisce francamente, che ha sua origine da un'umore alcalico. Se poi i nodi son grossi, e che sienosi formati con prestezza, ed in breve tratto di tempo, ci dice essere onninamente dovuto ad un'acido. Monsieur de Saull portando opinione, che la gottia riconosca sua origine da mancanza di perspirazione, propone i bagni caldi, l' esercizio, il tenerli mai sempre il gottoso caldo, e difeso dal freddo: propone bensì lo spesso mutarsi di camicia, e d' abiti, il moderato cibarsi, il non cenare, la tranquillità d' animo, le fregagioni ed una dieta latte, non altramente che preservativi potentissimi contro la gottia. Avendo sperimentato il Santorio Medico famosissimo Veneziano, come l' aglio accresca la traspirazione, vien similmente raccomandato; come anche la China, e le medicine calibeate nell' Invernata. Questo Medico, allorchè viene attaccato lo stomaco, si fa cavar sangue nelle nocca de' piedi, ed applica altresì ai piedi medesimi degli epispastici di specie differenti, e ciò fatto procura di promuovere un sudore universale. Allorchè il dolore è violentissimo, e sommamente arido, egli suole attutrarlo con applicare alla parte dolorosa un panno inzuppato nel laudano liquido, e dopo di lui fatta applicazione eforta il suo ammalato a muoversi, ed a fare dell' esercizio. Veggansi saggi Medici d' Edimburgo.

GRADO. Il grado del Meridiano misurato da Monsieur Picart trovavasi nella latitudine di 49. 21., e fu trovato, essere uguale a 57060. canne Franzesi. Ma i Matematici Franzesi, che si son fatti ultimamente ad esaminare le operazioni di Monsieur le Picart, ci assicurano, che il grado in quella latitudine si è di 57183.

perliche, o canne Franzesi. Essi misurarono un grado in Laplanda nella latitudine di 66. 20., e trovarono 57438. canne. È stato misurato similmente un grado all' Equatore, ed è stato toccato con mano, essere considerabilmente minore di quello della latitudine di Parigi. Da sì fatte misure egli apparisce, come la Terra non è una sfera, ma una sferoide allungata. Veggasi l' Articolo TERRA.

GRADI del fuoco. Veggasi l' Articolo FUOCO. Supplemento.

GRADI vietati nel Matrimonio. Veggasi l' Articolo MATRIMONIO. Supplem.

Gradi nella Legge Civile, e Canonica. Nel calcolare i gradi di parentela, o di Consanguinità, la Regola della Legge Civile è universale, o nella linea diretta, o nella linea collaterale, altramente appellata linea obliqua, *Quot sunt generationes, tot sunt gradus.*

Ma nella Legge Canonica per la linea collaterale, od obliqua, la Regola è diversa. Vienvi fatta una distinzione fra la linea obliqua uguale, e la linea obliqua disuguale. Nel primo caso la Regola si è: *Quot gradibus persona cognata distans a comuni stipite, tot gradibus inter se distans.* Nel secondo caso la Regola si è *Quot gradibus persona remotior distat a comuni stipite, tot gradibus persona distans inter se.* Quindi la sorella d' una persona di un'avo, per la Legge Civile è distante da quella persona in quattro grado, dove per lo contrario per la Legge Canonica ella lo è soltanto in terzo grado. Di maniera tale che ciò, che vien detto nella Ciclopedia de' due gradi nella Legge Civile, che vengono a fare un grado solo nella Legge Canonica, non è universalmente vero, ma avverasi soltanto nella linea obliqua uguale, nella disuguale obliqua non già. Veggasi Heimeccii, Institut. Juris Civilis, §. CLV.

GRAGNUOLA. I danni, che son capaci di produrre i violenti turbini di imperverfanti gragnuole sono appena concepibili da coloro, che veduti non gli hanno, e con gli occhi propri esaminati. Noi abbiamo nelle nostre Tranilazioni Filologiche un' istoria di un turbine grandioso di quella specie seguito nelle nostre proprie contrade, in cui le nuvole dalle quali piombava, e scagliavasi a basso era di circa due miglia

di diametro, e per quello spazio immediatamente sotto nulla venne a salvarsi; accadde questo strano accidente verso la fine del mese d'Aprile, e gli uccelli di qualsivoglia sorta sotto l'effo rimasero uccisi, anche parecchi de' più piccioli animali da pascolo, che imbattonsi in quel tratto di terreno rimasero somigliantemente dalla gragnuola distrutti. Le finestre di tutto quel contorno vennero in minutissimi pezzi stritolate, e tutti i terreni arativi, ove il grano, e le biade verdeggiavano, vennero ridotti deserti desolatissimi. Le praterie poco anzi sì belle, verdeggianti e fiorite, sembravano terreni nudi affatto, e rasi, avvegnachè i colpi della gragnuola così fitta ed energica avevano impastato il terreno, e sotterrato l'erba tutta fino ad un solo filo, e lo stesso destino ebbe a toccare a tutto quel tratto di campagna. I grani di questa gragnuola erano sì fieri, e piombavano giù con tal violenza, e forza, che penetravano più palmi sotto terra. Erano caduti d'essi del peso d'oltre cinque once, ed erano sommamente irregolari nelle loro forme, e figure; avvegnachè alcuni d'essi fossero rotondi, ed altri variamente angolari, e aguzzi: ma quello, che era sommamente osservabile si è, che cadauno d'essi aveva un pezzo di neve a foggia appunto d'un nocciuolo, o baccello entro il suo mezzo. E giuoco forza, che questa gragnuola cadesse da assai considerabile altezza, se ci facciamo a riflettere alla tremenda forza, colla quale piombava giù; e venne osservato, come la nuvola di questo turbine grandinoso passò più di sessanta miglia di lunghezza in disperdendosi. Il Mare, ove ella fu udita, alzossi in forma d'un bosco d'alberi acquosi, e nelle acque minori la superficie venne alzata dal suo letto naturale in parecchi luoghi all'altezza d'una pertica, o due. Gli uccelli marini in questo tremendissimo turbine ebbero la peggio di tutte le altre creature, avvegnachè non avendo da esso il menomissimo scampo, vennero uccisi in copia così prodigiosamente grande, che il dì seguente viderli spinti dalle marine ondate sul lito a monti, e la gente della Provincia di Lanchest ne raccolse numero prodigioso di cestoni di quelli, che son buoni per cibo.

Suppl. Tom. III.

Veggansi le Transazioni Filosofiche sotto il Numero 229. pag. 574.

GRANBESTIA. È la *granbestia* un animale in guise così differenti descritto dagli Antichi, che ella è cosa piana, e certissima, e che essi pochissimo lo conoscevano, od anche, che diversi scrittori sennosi fatti a descrivere sotto questo nome animali differenti. Ci dice Plinio, che la *granbestia* assomigliava al Cavallo, ma che la lunghezza del collo, la grossezza e lunghezza delle orecchie distinguono dal medesimo. Solino poi, il quale altro non è, che un' esatto Copista di Plinio, temendo di dargli una grossezza soverchio grande, dice, esser somigliante ad un mulo. Entrambi questi Autori a ciò aggiungono ciò, che vien detto da parecchi altri scrittori della *granbestia*, vale a dire, che il suo labbro superiore è così grosso, ch'ei non può cibarsi senza tirarsi ogni volta indietro. Plinio medesimo altresì, in un' altro luogo, dice questa cosa stessa del Machide, o sia Machione, che è un animale della Scandinavia, cui egli descrive per averne udito parlare non già per averlo veduto, asserendo, che non era stato veduto in Roma, ma dice che era somigliantissimo alla *granbestia*. Ella è cosa assai probabile, che questo animale fosse la *granbestia* sotto altro nome. Altri Autori fanno a paragonare la *granbestia* ad una camozza, altri poi ad un cerviatto; ma tutti stanno d'accordo nel attribuirle un collo lungo. Dicono alcuni, come la *granbestia* era d'un color semplice gialliccio scuro; e Cesare nei suoi Commentarij, asserisce per lo contrario, che ella era tutta macchiata. Ci dice Pausania, che era somigliante ad una specie di Cetvo; ma rispetto alla lunghezza del suo collo, assomigliavasi ad un Cammello. Ella è cosa grandemente probabile, che la *granbestia* di Cesare, e quella di Plinio, e di Solino, sieno due diversi animali. Veggasi la Tavola dei Quadrupedi, sotto il Numero 6.

GRANAJO. Nella Cura dei pubblici granaj, o sieno magazzini, ove conservasi il grano, una cautela grandissima sommarmente necessaria si è quella di collocare in essi quel tal grano, che sia per essere meno soggetto a patire, e ad andar male, e la

I cosa,

cosa, che singolarmente dee in questo essere considerata, si è di collocarvi, e riporvi soltanto quei taligrani, che sieno il prodotto di regioni calde ed asciutte. Nella Francia il grano delle Provincie meridionali si conserva per moltissimi anni di più di quello di tutte le altre parti di quel Regno: e le storie non meno antiche, che moderne c' informano, che il grano, che vien prodotto nell'Africa, massimamente quello delle Campagne intorno ad Algieri, ed a Tunisi, si manterranno moltissimi anni di più di quello prodotto in altre Regioni. I Romani nel tempo antico facevano venire quantità immensa di grano dall'Egitto; e sperimentavano, come questo grano non solo produceva più abbondevoli raccolte di quello si facessero i grani prodotti dalle proprie loro Campagne, ma che conservavasi altresì per anni parecchi entro i loro vasti granaj senza punto patire. Il Marchese di Santa Croce Autore di moltissime egregie osservazioni intorno allo stato politico, e militare di differenti Nazioni, falli ad osservare, come in Galizia, e nella Provincia, o Principato d'Asturias il grano conservavasi con difficoltà, e s'into grandissimo nei granaj da un anno all'altro, e che ciò dipende unicamente dall'umidità, che in sé contiene, la quale lo guasta, lo riscalda, e lo fa marcire; e che per lo contrario il grano, che viene di Castiglia, conservavasi nei granaj medesimi, senza la menomissima decadenza, egregiamente bene per parecchi anni. Egli dice, come quello è il solo grano, che altri possa azzardarsi a porre nei pubblici granaj Spagnoli, e che tutta la differenza, che è fra questo, e l'altro, consiste soltanto in ciò, che il primo, cioè il grano Castigliano vien prodotto in un paese, in cui meno regnano le piogge in tempo d'Estate. Veggasi *Des Landes*, o sia de' Terreni Trattato Fisico ecc.

Sarebbe cosa agevolissima il farli venire del grano di Barberia in una copia sufficiente per tutte le semine del nostro Regno: ed in quei paesi, ove la gente è soggetta alla carestia anche per aiuto, e s'ha scheggio della Nazione medesima; ed il vantaggio, che quello grano Africano avrebbe sopra il grano Europeo, farebbe molto

maggiore di quello di Castiglia, il quale è osservato, essere il migliore di tutti i grani della Spagna. I vasi di fondo piatto di peso grande, o di soma considerabilmente abbondevole, i quali non abbiano peranche avuta addosso molta acqua, farebbero a vero dire sommarmente acconci per simigliante servizio, ed il viaggio per gli stretti di Gibilterra nella stagione conveniente, e propria dell'anno sarebbe realmente corto, e fatto con leggiera spesa. Noi verremmo ad esser provveduti per simigliante guisa d'ottimi grani da semina infinitamente migliori di quelli, che noi possiamo far venire, e comprare altrove al pre'ente; e la Francia con questa specie di grano potrebbe aver'agio di conservarne tanta copia, che sufficiente fosse a riparare alle miserie della crudelissima carestia, la quale da una lunga guerra vien generalmente cagionata nella sua nazione; ed in evento, che i magazzini pubblici per ricevere, e per distendervi questo grano fossero fabbricati vicino alle imboccature, o foci dei Fiumi più grossi, verrebbe il trasporto per acqua a condurre in tempo quò e là con prefezza il grano in quelle parti del Regno, che ne penuriassero, per quanto quelle dilungate si fossero.

Simigliantemente i Regni di Fez, e di Marocco esser potrebbero per noi ottimi mercati, tuttochè i Franzesi abbiano divieto di negoziare in quegli rispetto ai grani, sopra qualsivoglia condizione, salvo che per farne le provvisioni pe' Campi militari, o in casi di ricatto, che in simiglianti occasioni far debbano sopra' essi Regni. Tuttavia il conservare una buona intelligenza con Algieri, e con Tunisi, è per noi d'un momento, e d'una conseguenza così grande, che noi non dobbiamo avere scrupolo di comprare a sì fatto prezzo la loro amicizia, e buona corrispondenza; e voi pertanto potremmo, se fosse in piacer nostro, andare a fire il traffico del grano in Fez, ed in Marocco coll'arme da fuoco alla mano, niente meno che per gli altri comodi, e vantaggi tutti, quali essi sieno, delle nostre Regioni. Idem, ibidem.

Essendo fatta la scelta del grano, ed essendo regolata la maniera di farne le adeguate

se necessarie provvigioni, la seconda considerazione si è, come quello si mantenga. Per sì fatto intento noi abbiamo testimonj sommamente concordi non meno fra gli Antichi, che fra i Moderni, che le buche, o caverne sotterranee fatte in luogo asciutissimo, e tenute a coperto, e difese dall'ingresso dell'aria umida, e nebbiosa, sono luoghi acconciissimi. Ci dice Plinio, come nel suo tempo conservavano essi il grano per tratto lunghissimo d'anni in questa specie di camere sotterranee dell'abbondanza, cuoprondone il fondo loro d'asciutissimo strame, e che sopra stendevanvi il grano in ispiga. Noi tocchiamo con mano, come il grano in simigliante guisa conservassi egregiamente bene per cinque, sei, ed anche sette anni. Ed un accidente ebbe, non molti anni sono, a scuoprire in Amicos una porzione di grano nella divisa guisa conservato, il quale tuttochè fosse stato difeso un numero grandissimo d'anni in quel dato luogo senza essere stato maneggiato, venne trovato freschissimo, ed ottimo, non furato dai vermi, non patito, o riscaldato, o marcito, e nè tampoco muffato nella sua superficie. Questo non è ad altro certamente dovuto, salvo che all'essersi mantenuta fuori d'esso l'aria umida, e con essa le uova degli insetti, ed i semi di quei minuti Vegetabili, cui noi veggiamo in forma d'una specie di muffa sopra quel tal dato grano, il quale non sia stato colla divisa diligenza conservato difeso dall'ingresso dell'aria.

La Filosofia sperimentale ci ha fatto toccar con mano, e provato ci ha evidentemente, come l'aria è la forgente massima della corruzione; che tenendo questa aria lontana, tutto viene a conservarsi, e che le sostanze stesse grandemente soggette a corrompersi, quali appunto sono la farina, il burro, il latte, la carne, e cose simiglianti, sono per mesi, e mesi mantenute freschissime, e nel suo fiore, e vigor sano entro il recipiente della macchina pneumatica, estrarane l'aria.

L'unica obiezione, che farsi puote a sì fatto piano per i grani pubblici, si è la spesa; ma questa non è tale giammai, che spaventar possa qualsivoglia Monarca, il quale a ciò badar non dee in conto veru-

no; oltredichè è cosa evidentissima, come esser non vi può danaro più utilmente, e meglio impiegato di quello, che impiegasi in pubblico bene, e vantaggio di tanto pelo. Havvi nelle vicinanze del gran Cairo un Magazzino di quella specie fortificato, e difeso da grossissime mura, ed appellato i granaj di Giuseppe. Ella non è cosa puoto probabile che quella vastissima fabbrica sia tanto antica quanto quel santo Patriarca; ma vien però a provare abbondantemente l'utilità somma di fabbriche simiglianti per l'immensa copia di grani, che annualmente viene conservata.

Parecchie parti dell'Africa son piene di sì fatti granaj, vale a dire di camere sotterranee fatte nella sopra descrittiva guisa. Vi ha moltissimi profondi pozzi fatti a forza di taglio nel sodo scoglio, o nella durissima rupe, la calata entro, i quali non è più larga di quanto balti perchè un'uomo vi si possa introdurre, ma tosto che la persona vi si è intanata dentro, vanno queste specie di pozzi allargandosi, e dilatandosi nelle loro interne parti, e sono nelle lor viscere comunemente quadrati, e del diametro di trenta, od anche di quaranta buoni piedi. In questi i potenti, e ricchi Signori di quelle Regioni conservano i loro grani; sogliono coloro far nel pavimento di queste camere sotterranee un buon letto d'asciutissima paglia, o strame, e poscia stendovvi sopra il grano, fino a che questo s'alzi in un monticello, o mucchio, e nelle fiancate intorno intorno a questo mucchio, od alzate di grano piantano un sottilissimo ma ben unito letto simigliantemente di paglia o strame asciutto nella guisa medesima, che fatto avevano nel fondo, o pavimento del pozzo, o camera divisa. In simigliante guisa vanno coloro proseguendo il lor lavoro fintanto che giugne ad esser piena di grano tutta la cavità. Fatto che sia questo, cuopron coloro la bocca della camera con una specie di graticcio di rami verdi d'alberi uno incrociato, ed attraversato sull'altro. Questo graticcio poi lo cuoprono con un'alzata di circa due piedi di sabbione, e sopra questo sabbione alzanvi un monticello di terra, ben ben battuta, e sfilata insieme, col fine d'impedire, che la pioggia vi possa nemmen per ombra penetrare, e per-

chè scollandosi giù dalla alzata non possa fermarsi in quel contornio, e venir tratto tratto a penetrare nel magazzino.

Il grano nella divisa guisa aggiustato, e ferrato, conservasi perfettissimo, ed ottimo per tre, quattro, e cinque anni; e non è cosa rara ad accadere, che essendo i proprietari fatti fuggire, od imprigionati, od uccisi dalla tirannica severità degli empj governatori d'Oriente, sotto dei quali si vivono quei disgraziati, i magazzini vengono ad essere dimenticati, e per alcuno accidente venendo ad essere scoperti moltissimi anni dopo, il grano vienvi trovato quasi sempre in buon essere. Tutta la cura, che coloro si prendono rispetto al grano, si è di tenerlo due, o tre giornate esposto al calor del sole, affinchè venga a perfettamente asciugarsi prima di condurlo entro la buca, o magazzino divinato.

Nel Ducato di Lituania, e nell'Ukreno, la gente conserva costantemente il suo grano nella guisa medesima entro pozzi o buche fatte in luoghi asciutissimi: ma in queste regioni è giuoco forza, che vengavi avuta cura somma nell'aprire questi cameroni sotterranei; conciossiachè, se le persone vi si calano prima che questi abbiano avuta una sufficiente comunicazione coll'aria fresca, vengono assai sovente a rimaner uccise, e soffocate dal grosso interno umidore: questo però è facile ad essere schivato; e non solo da questa, ma eziandio da altri esempi moltissimi della pratica d'altri paesi, apparisce evidentissimamente, che il vantaggio di similanti granaj sotterranei, è incomparabilmente maggiore di tutti gli altri granaj. Idem, *ibidem*, pag. 30.

Ma sebbene questi tali granaj debban'essere sopra gli altri tutti raccomandati, nulladimeno i granaj comuni, colla propria cura, ed attenzione usati, possono esser renduti assai più utili di quello lo sieno di presente. La cautela grande per similante effetto necessarissima, si è di tenergli ben difesi dalla soverchia umidità, la quale è sempre, e costantemente nei luoghi, ove trovasi numero grande di porte, e di finestre. Similantemente debbi rimovere più che sia mai possibile il soverchio libero asfo-

lo dell'aria esterna; conciossiachè questa porti seco, e doponga nel granajo numero immenso d'uova di differenti insetti, i quali pasconsi del grano, e lo distruggono realmente. Una terza cautela importantissima pure si è, che quando il grano è il prodotto di quel paese medesimo, nel quale vien conservato, di non riempire il granajo colla raccolta d'una sola campagna, ma di mescolare le raccolte di due diverse provincie più che sia possibile, come a cagion d'esempio, col grano d'una Provincia asciutta, con quello d'una Provincia umida, o con grano di quelli più differenti, che mai esser si possano fra di loro: e per similante guisa le qualità contrarie d'un grano verranno ad impedire, ed a far testa alla distruzione dell'altro. Sono queste le tre grandi Regole per ovviare alla corruzione, e guastamento del grano; ma una volta, che vi sia entrato un malanno, ella è cosa in estremo difficultosa, e malagevole il rimediarvi, od il troncarli la strada. Adunque tutta la cura dovrà esser quella di procurare ogni mezzo, che i granj non comincino a prendere alcuna rea piega.

Le due grandi cautele, che osservar dovranno onninamente nel piantare, od innalzare i granaj, sono di fabbricargli bastevolmente forti e di alzarli in guisa, che vengano a rimanere esposti ai venti più asciutti.

L'Ordinamento del grano in parecchie parti dell'Inghilterra è nell'appresso guisa: Per separarlo dalla polvere, e da altre mondiglie, dopo che è stato battuto, pongonsi a paleggiarlo, ventandolo cioè collo legarlo a forza di pale da un'estremità all'altra di una gran sala, o camerone; le sostanze più leggiere, che trovansi col grano frammischiate calano nel mezzo della camera, e così il solo grano vien trasportato da lato, a lato, o da estremità, ad estremità del camerone medesimo, in cui fatti questo lavoro. Ciò fatto dannosi a vagliare il grano medesimo, e poscia lo conducono ne' granaj, ove lo spandono in guisa, che venga a rimaner alto dal pavimento la grossezza d'intorno a mezzo piede, e per lo meno due volte la settimana vanno rimiscolandolo, rivoltandolo, e paleg-

gian-

giandolo: foggiono anche una volta la settimana vagliarlo di bel nuovo. Questa sorta di governo fannolo essi al grano pel tratto di due buoni mesi continuati, e dopo, per due altri mesi lo distendono nel grajo alla grossezza d'un piede, ed in questo tempo medesimo vannolo voltando, e paleggiando una volta la settimana, od anche due, in evento, che vogliano la stagione, vale a dire, se questa corra umida, e tanto prima, che dopo, lo vagliano di bel nuovo. Dopo cinque, o sei mesi in circa foggiono ammucciarlo in monticelli di cinque in sei piedi d'altezza, ed allora lo voltano, e lo paleggiano soltanto una o due volte il mese, e lo seguitano anche allora a vagliare. Allorchè trovasi nel grajo da due, e più anni, foggiono paleggiarlo, e muoverlo ogni due mesi una volta, e vagliarlo ogni quattro mesi una volta, e per quanto più lungo tratto di tempo sarà conservato, tanto più frequenti dovranno essere le vagliate, e le paleggiature, e per il fatto guisa operando, il grano verrà sempre a conservarsi in istato migliore.

Essa è cosa assai ben fatta il lasciare un' arca, o spazio di circa una pertica tutt' all' intorno del mucchio, o monticello del grano, come anche altri spazj del grajo vuoti, nei quali possano voltare, e mutare il grano, qualunque volta lo porti l'occasione. In Kent foggiono fare due fori quadrati alle due estremità del pavimento, ed un' altro foro tondo nel mezzo, per i quali gettano il grano dal camerone superiore, in altro camerone sottoposto, e così dall' inferiore lo scagliano di nuovo nel camerone superiore, e così lo traggono in alto, ed a basso con una ventata d'aria migliore. I vagli di questa popolazione son fatti con due spartimenti, per separare la polvere dal grano, la quale cade in un sacco, e quando questo sacco è sufficientemente pieno, lo levano via, ed il grano puro, e netto rimansi indietro.

Nei nostri grajoj colle descritte diligenze a dovere praticate si è conservato, e conservasi buono, e perfetto fino per treot' anni; ed è stato osservato, come più lungamente, che il grano sia stato così ben conservato, somministra più copia di fior di farina in proporzione al grano medesi-

mo, ed il pane fatto di esso somministra più bianco pane, avvegnachè nel luogo tratto di tempo l'umido sia quello, che soltanto da esso grano svapora. In Zurigo fra gli Svizzeri conservano il grano per ott'anni, ed anche di vantaggio con servirli dei metodi medesimi finora descritti.

I granaj pubblici di Danzica sono alti a segno, che hanno sette, otto, ed anche oove ordini di camere, o sieno piani, fatti in guisa, che ogni camerone ha una spezie d'imbutto smisurato nel mezzo per gittar giù il grano da un piano all' altro della vastissima fabbrica. Sono questi con tal fortezza, robustezza, e sicurezza fabbricati, che qualunque per ogn' intorno sieno circondati da fossati d'acqua, il grano non viene a contrarre la menomissima umidità, ed i ballimanti hanno il comodo d'accostarsi alle muraglie o rive di questi granaj per caricarsi del grano. I Russiani poi conservano i grani loro in granaj fabbricati sotterra, e questi granaj sono della figura d' un pane di zucchero, larghi sette, e stretti nella loro sommità. Le fiancate, o lati di questa fabbrica sotterranea son tutte stuccate, e la bocca, o sommità vien coperta con una lapida o semplice, o doppia, non altramente che le sepolture, e ad un di presso tali sono anche i granaj pubblici dei Fiorentini. I Russiani però sono così gelosi di non porre nei lor sotterranei granaj il grano, se prima non è interamente e perfettamente asciutto, che bene spesso innanzi di porvelo, lo tengono nei forni, avvegnachè la loro estate sia soverchio corta per ottenere l'intento loro quanto basti. Veggaasi le Tradizioni Filologiche tomo il Numero 26.

GRANITO. I graniti vengono definiti pietre composte di coecrezioni separate, e sommamente grosse, rozzamente compatte, ed ammassate insieme, di durezza grandissima; facenti fuoco coll' acciaio, non fermentanti con gli acidi, ed assai lentamente calcinantisi in un fuoco energico al sommo. Di questo genere noi ne abbiamo soltanto tre spezie conosciute, cioè, 1. Una pietra comune nei lavori a secco intorno a Londra, durissima bianca, e nera, e dai nostri lapidarij appellata *pietra mora*. 2. Una pietra rossa, nera, e bianca, comunemente

com-

conosciuta pel nome di *Granito Orientale*; e 3. Una pietra rosso-bianchiccio-pallida, con istrisce, o spruzzi di nero, e di giallo. Veggasi *Hill*, Iltoria dei Fossili, p. 498.

Il Granito Orientale dei Moderni è appunto la pietra descritta dagli Antichi sotto i nomi di *Pyropoecilos*, e di *Syenites*, ed a motivo dell' estrema sua durezza, e bellezza, è stata questa pietra sempremai grandemente stimata. Allorchè questa pietra trovasi nel suo stato naturale, cioè tozza, è un' asprissima, ruvidissima, e sommamente irregolar massa, ma d'una struttura sommamente fissa, e composta, ed è di vaghissimo rosso pallido, interfiato di bianco, e di nero: le parti rosse son tutte d'una struttura irregolare, e di un'appariscenza marmorina. Il bianco in essi son tavolati oppure composti di concrezioni piatte, e molte d' esse concrezioni sono lucidissime, e trasparenti, altre di ruvide superficie, e mezzo opache: le prime son composte d'un cristallo talcoso, e le seconde d'un cristallo terrigno. Le parti nere son evidentemente foliacee, e son composte d'un talco cristallino nero. Oltre le divise parti, vi sono in differenti luoghi, o porzioni della pietra medesima molte istrisce di un talco, sì nero, che bianco non alterato. Tutta la pietra presa insieme è d' una singolarissima durezza, ma suscettibile d' assai vaga, ed appariscenza lustratura. Veggasi *Hill*, Iltoria de' fossili, ibidem.

E' questa pietra comunissima nell' Egitto, e nell' Arabia, ed oltre a ciò trovasi eziandio in parecchie altre parti del Mondo. Noi ne abbiamo una specie nelle parti Occidentali dell' Inghilterra, che è pochissimo inferiore a quella che ci viene dall' Oriente.

Il granito rosso b'aochiccio vien trovato talvolta io forma d' ampi strati, ma molto più frequentemente in grossissimi noduli sciolti. Egli è pochissimo inferiore, quanto alla sua bellezza, al granito Orientale, ed è d'una tessitura meno aspra, e meno ruvida. Il suo color terrigno ha differenti gradi della sua tinta rossa, ed è alcune volte anche bianchiccio. E' quistovaghiissimamente spruzzato di nero, di bianco, e di giallo, assai somigliantemente al granito Orientale, ed è di pari duro, e capace d'egualmente bello, e vago poli-

meoto: Trovasi in copia grande io parecchie parti dell' Isola di Minorca, donde noi ne abbiamo a talento, e fanfene de' vaghi tavolati; ed altri somiglianti utili lavori. Le masse rozze di questo medesimo granito trovansi talvolta somigliantemente nei lidi della nostra Isola di Guernsey, donde per via di ballamenti ce lo facciam condurre e fannofene dei pavimenti per le nostre stesse contrade. Veggasi *Hill*, Iltor. de' Fossili pag. 550.

GRANO. Egli è stato con somma dirittura di mente osservato dai buoni Antichi non meno, che dai Moderni, che le parti tutte del mondo, e che, siccome egli si è una pianta all' umana generazione sommamente necessaria, così ella si è ancora la più universale, e la più abbondevole delle altre tutte. Ella vien su bene questa pianta, e cresce non solamente nei climi temperati, ma eziandio sotto i più bollenti, e caldi cieli non meno, che sotto i più rigidi, e ghiacciati; ed allorchè ella è seminata in luoghi, ove non crescerebbe spontaneamente, vi fa di pari la medesima buona riuscita, che fassi in quei luoghi, ove ella vien seminata comunemente, e continuamente.

La riuscita delle nostre semine, e ricolte di grano nell' America sanoo picciolissima prova di questa verità. E nel Perù, e nel Chili in particolare, ove quei paesi erano tutti abitati e ben popolati, e che non vi fu conosciuto il grano, fino a tanto che non veonevi dagli Europei introdotto, vi produce delle ricolte niente meno abbondanti di quello facciasi nelle migliori Campagne dell' Inghilterra. Veggasi *Deslandes*, Trattato Fisico.

Quando il grano è seminato di buon' ora, minor quantità di semenza vi si ricerca per un jugero, che quando egli è seminato tardi, perchè minor parte di esso morirà; ed i terreni poveri e magri richieggono sempre maggior quantità di semi, che i ricchi e grassi terreni, avvegnachè maggiore sarà il numero delle piante, che andranno male nei primi, che nei secondi. Per un terren ricco, ed uberoso, che venga seminato di buon' ora, è necessaria minor quantità di semenza, che per qualsivoglia altro terreno, e ciò non per altra ragione, se non perchè in tal caso pochissimi saranno quei granelli di grano, che non

non produrranno la lor pianta, la quale viverà, e farà la sua fiorita, e la piena sua cresciuta. L' uso del grano grosso cagiona, che cadauna pianta manda fuori un numero grande di talli o gambi dalla radice medesima, ed in questi assai più, che nel numero delle piante consiste l'abbondevolezza, e la pienezza d'una raccolta, comechè in queste le spighe sono sempre grossissime, e sommarmente granite.

Dee esser considerata un'altra cosa, in riguardo a trovare la quantità propria di sementa per seminare, ed è che alcuni grani della specie medesima hanno i lor granelli il doppio più grossi d'altri: in questo caso uno stajo di questi non conterrà, che la metà in numero di granelli; che conterrebbe del grano di granelli piccioli, uno stajo di grano di picciola granellatura basterà per due staji di grano dai grossi granelli; conciossiachè non già la misura della sementa, ma bensì il numero dei granelli sia la cosa, che esser dee considerata in rapporto alla semina. Veggasi *Tull*, della Coltivazione, &c.

Ella si è cosa sommarmente naturale il supporre, che un grano di grossa granellatura, produrrà piante più grosse, e più perfette, ed eziandio granelli più grossi d'un grano di picciola granellatura: ma l'esperienza ha fatto toccar con mano, che non vi ha nulla affatto di ciò; conciossiachè il grano di granelli anche i più minuti produce delle piante grossissime, delle lunghissime, ben nutrite, e granite spighe, non altramente, che faccianli i granelli grossi; ma le giovani pianterelle compariscono più picciole, e più dilegini, e meleschine.

Sei galloni di semi di grossezza mezzana è la quantità, che suol gittarsi d'ordinario sopra un jugero di terreno; ma nei terreni assai ubertosi, e seminati ben per tempo, basteranno soli quattro galloni; perchè allora avrà il grano le radici nella sommità del terreno prima dell'Invernata, e lavorerà, e dilaterassi grandemente senza pericolo dei vermi, e di parecchi altri accidenti, ai quali è sommarmente soggetto il grano seminato tardi. Se sarà coperto con troppo leggiera mano di terra, correrà pericolo di perire, se ciò facciasi soverchio grossamente, vale a di-

re, se si euoprirà con troppa terra, el verrà a spuntar fuori dal terreno, ed a gittare il tallo così tardi nella Primavera, che alcune spighe rimarranno anebbiolate: farà pertanto cosa di tutte migliore il tenere in ciò una via di mezzo. La profondità, in cui dovrebbe piantarsi, esser dovrebbe da un dito, e mezzo, alle tre dita, conciossiachè s' e' venga piantato soverchio profondo corre anche pericolo maggiore d'esser divorato dai vermi appunto nella base del suo tallo, vale a dire fra il granello, ed il germoglio d'esso granello. Una pianta di grano, che non sia stata seminata per tempo non manda fuori radici sopra il granello prima della Primavera, e viene ad esser nutrita in tutta l'Invernata da un semplice filo, procedente dal granello sopra la superficie del terreno: quello è alla pianta il filo della vita durante l'Invernata: e quanto più lungo sia questo filo, tanto maggiore si è il pericolo, che vi ha del verme, avvegnachè l'insetto con facilità molto maggiore troverà un filo, che stendasi per la sua lunghezza per la profondità di cinque o sei dita, che un filo, che allungarsi appena la grossezza di un dito. Oltre a ciò, i vermi nell'Invernata non abitano mai in vicinanza della superficie del terreno, e perciò non incontransi naturalmente in un filo così corto, dove quasi sempre le fila lunghe trovansi loro a portata.

Ella si è cosa in estremo necessaria il prendersi cura, ed il guardarsi dalle cornacchie appunto nel tempo, che il granogitta fuori i suoi talli, e che spunta dal terreno. Questo scaltro, e perniciosissimo uccellaccio s'accorge e vede spuntare il grano, appena spunta dalla terra, e che il Contadino nemmeno s'avvede ancora, che abbia cominciato a spuntare; e questo maledetto uccello lo strappa fuori di sotto il terreno, e fa un danno impareggiabile, e sommo in tristo cortissimo di tempo. Fora' è pertanto, che i contadini tengan dilungati questi uccellacci così dannosi dalle semine spuntanti fuor del terreno per una buona settimana, ed anche per dieci giornate; conciossiachè in capo a tal tempo il gambo, o tallo farà ben cresciuto, ed il granello sottincombente troverassi così chiuso del suo sapore, che quelli uccelli, che ben

ben lo fanno non se ne cureranno di vantaggio, nè daranno il menomo disturbo al grano crescente.

Le Cornacchie non danno alcuna molestia a quei grani, che sono stati seminati per San Michele; e la ragione si è, perchè in questa stagione elle trovano abbondanza di granelli usciti dalle spighe in tempo delle mietiture, e nati pe' campi, e quelli cavan' esse fuori del terreno con maggiore agevolezza, di quel che far debbano, allorchè debbono affondarsi sotto la superficie del terreno, per trovare i granelli del grano seminato. Veggasi *Tull*, della Coltivazione &c.

Moltissime esperienze sono state cimentate per la massima intrapresa di moltiplicare i granelli, molte delle quali leggonsi insieme coll'istoria delle differenti loro riscite, nelle nostre Transazioni Filosofiche. Parla Monsieur Digby d'una pianta d'orzo tutta alzata da un solo grano, la quale essendola annaffiata, o piuttosto posta in molle in certa acqua, nella quale eravi una porzioncella di salpetra, e dopo essendola ogni giorno annaffiata coll'acqua medesima, partorì dugento quarant'zai gambi, ed oltre a diciotto milla granelli d'orzo. E l'ultima Edizione di Cambden fa menzione di cosa sommamente osservabile tuttochè originata da cagione diversa; e questa si è, che il grano seminato in un campo di Cornovaglia, in cui poco tempo innanzi era accaduta una battaglia nelle guerre civili, produsse sopra ogni gamba quattro, o cinque spighe.

Monsieur de la Pryme si è fatto a candidamente, e da ingenuo sperimentatore a far prova non meno del comune, che di parecchi altri metodi, i quali sebbene non avessero prodotto quelle immense raccolte uguali alle da noi testè divise, nulladimeno ha fatto toccar con mano ciò, che il Mondo realmente aspettare e promettere si possa dai differenti universalmente praticati ingredienti, e quale di questi prometta con ingenuità riuscita migliore.

Le esperienze fatte da questo valentuomo sono le seguenti: Furono il dì ventidue di Marzo posti in molle in acqua zolfata un pisello, un granello d'orzo, un granello di grano, ed un granello di

vena. Furono questi similmente posti in molle in acqua d'allume, in una soluzione di sal di Tartaro, nella soluzione del caput mortuum del sale ammoniaco, nell'orina comune, in una soluzione nel niero di muraglia, o sia quel sale, che trovasi nelle muraglie vecchie in una soluzione di tal pietra in acqua; ed ultimamente nella gelatina, che addimandasi stella errante.

Poichè i divisi semi, o granelli furono stati in molle nella maniera divisa nei loro diversi descritti liquori cinque giorni, e cinque notti, furono piantati in un ottimo terreno entro un giardino sotto una muraglia direttamente in faccia al Sole. Furono seminati in una mattina dopo una notte piovosa, ed unitamente ad essi fuvi seminato un pisello, un granello di grano, un granello d'orzo, ed un granello di vena non istati in molle, e come suol farsi comunemente. Quello seguitò appunto nel dì ventettesimo di Marzo, e nel giorno decimo dell'Aprile seguitò, alcuni d'essi spuntaron fuori, altri non comparvero. Quelli, che erano stati in molle nell'acqua zolfata, vennero fuori tutti insieme. Di quelli stati in molle nell'acqua d'allume, i tre granelli delle divise biade gittaron fuori il tallo; ma il pisello, tuttochè fosse grandemente gonfiato, non diede segno di germogliare. Di quei posti nella soluzione di sal di Tartaro, l'orzo, e la vena vennero sopra terra, ed il pisello gittò un picciolissimo germoglio, e l'orzo spuntò appena. Quelli ammollati, e posti in molle nella soluzione del caput mortuum del sale ammoniaco, dell'orina, e quelli di pari stati in infusione nella soluzione di sal di muraglia, vennero tutti fuor di terra. Di quelli posti in molle nella soluzione del salpetra, sì l'orzo, che la vena, vennero su bravamente, ma gli altri semi per lo contrario appena gittarono germoglio. Quelli poi, che furono posti in molle nella gelatina appellata stella errante, oppure *Noisere*, non ispuntarono fuori nè poco, nè punto, ed a mala pena mostrarono un picciol segno di salire. L'orzo, e la vena stati in molle nell'urina mandaron fuori appunto il germoglio; ma per lo contrario il grano, ed il pisello altro sforzo non fecero, che semplicemente mostrare il tallo: ed ultimamente quei semi, i quali non erano stati in

in niun liquore messi in molle venner su, spuntarono, e crebbero con tutta la prestezza, e bravura, e niente meno vigorosi di quei degli ammollati, che venner su bene, a riserva del granello di grano, il quale in paragone degli stati in molle apparve un poco meno robusto, e rigoglioso.

Tutti questi germogli, o tenere piauorelle furon piantate intorn ad un dito profondo sotterra, e ebber tutti veramente una stagione sommamente propizia, e favorevole per aver agio di far buona crescita.

Da tutto ciò egli apparisce, come l'acqua d'allume è sommamente contraria, e rea per i piselli, quantunque ella si addica egregiamente bene eul grano, coll'orzo, e colla vena, e per conseguente anche con simiglianti biade farinose. Che il sal di Tartaro fa gran bene alle vena, ed agli orzi, ma che è sommamente contrario, e pernicioso ai piselli non meno, che al grano. Che è un fuggio, che il salpetra solleva quella virtù, ed efficacia, che per tanto tempogli è stata erroneamente attribuita, di promuovere la crescita buona delle piante; e che finalmente tutti questi divisati ammollamenti non fanno già un beneficio, e vantaggio visibile ai granelli delle biade, e somiglianti, ma che per lo contrariar parecchie di sì fatte infusioni arrecano pregiudizio, e danno formale a parecchie spezie.

Tutte quelle giovani pianterelle vennero vangate, a riserva di soli tre germogli, o talli d'orzo, e questi crebbero in guisa sommamente straordinaria, come quelli, che trovavansi in ottimo suolo, ed in sommamente proprio aspetto, ed alla distanza di due piedi gli uni dagli altri; conciossiachè da un solo semplice granello radicato ne sortiron sessanta, sessantaquattro, ed anche sessantette talli, o gambi diversi. Cadauno di questi gambi ebbe una spiga, e computando l'una spiga coll'altra, cadauna spiga fruttò quaranta granelli. Dalle radici medesime saliron fuori continuamente novi germogli, e siccome gli alberi delle Indie Orientali fanno, e portano in un tempo medesimo foglie, gemme, germogli, e frutti maturi, così, se continuato fosse il calor del sole, vi si farebbono nelle divisate pianterelle per simigliante guisa continuamente veduti nuovi talli

Suppl. Tom. III.

tenerelli, nuove spighe immature, e spighe mature altresì sopra la pianta medesima, e nel tempo stesso, per tutto il giro intiero dell'anno.

Dalla serie tutta delle divisate esperienze apparisce evidentissimamente, che la moltiplicazione non meno del grano, che delle altre biade tutte, dovassi altri piuttosto prometterla dal seminarle in ottimo suolo, ed in una adeguata distanza l'un seme dall'altro, anzichè da qualsivoglia preparata, o medicata acqua, nella quale vengano i semi stessi tenuti in molle prima d'essere seminati, e messi in terra. Siccome però parecchi di sì fatti liquori per simigliante effetto preparati, sono innocenti, nè possono far male alle sementi, così non sarà cosa impropria se il Cootadino ne tenterà la prova ai tempi propri, e per acconcio, e regular modo, seminando diverse parti d'un stesso campo, nella proporzione medesima, ed uguale con semi ammollati nella divisata guisa, e con semi asciutti. L'esperienza di porre a rinveire i granelli delle biade in rimafugli, e fondiglioli di sostanze animali, produce un'ottima riuscita evidentissima; ma noi dobbiamo ricordarci, e riflettere, come in simigliante metodo noi dobbiam mettere in opera soltanto la terza parte di sementa, in seminando uno stesso pezzo di terreno, così ammollata, di quella richiederebbe quel terreno, se la sementa fosse asciutta, come suolsi comunemente seminare: ed è sommamente probabile, e possibilissimo, che l'accrescimento, che somministra questo metodo di semina, possa esser dovuto anzi alla distanza delle pianterelle, che ad alcun buon effetto prodotto dall'acqua grassa de' fundiglioli, o rimafugli delle sostanze animali. Veggansi le Traduzioni Filosof. N. 281. pag. 1212.

E' cosa evidentissima per l'esperienza, che la moltiplicazione del grano, che è quanto dire, la copia, e quantità di grano prodotto da un solo granello, è differentissima in luoghi differenti, e feccando, ed a norma de' varj accidenti.

Egli è stato più, e più state tentato per giungere a rinvenir l'arte di far sì, che cadauno granello di grano somministrasse il suo maggiore accrescimento, che sia mai possibile; ed in evento, che quell'arte po-

K esse

tesse ridursi agevolmente effettuabile anche nelle vaste campagne arative, non vi ha ombra di dubbio, che farebbe questo un beneficio, ed un vanaggio oltre ogni credere considerabile per la società. Quest' arte è stata dal Vallemontin moltissime guise cimentata, e tentata; ma con moltissima riuscita nelle seguenti guise: Procurerai di far la maggior raccolta, ed unione, che ti sarà mai possibile d'ossa, di pelli, di penne, e d'altri parti d'animali, le quali son comunemente gittate via dalla gente, come anche tutti i rimasugli di cibi, fondiglioli, e simiglianti, che foglionfi gittar via, come altresì stracci, e roba, che fogliamo portar indosso, e che lasciamo poi da un lato, o gittiamo su i letamai, come ciabatte vecchie, guanti, e qualsivoglia altra mondiglia di questo genere, che incontrasi per terra nelle pubbliche vie, e finalmente corna, ed unghie d'animali, comechè tutte le divise cose sono eccellenti, ed in una parola, raccoglierai, e porrai insieme quelle cose tutte, le quali abbondino di sali. Fatto che avrai una buona raccolta di tutte le divise ciarpe, e mondiglie, le farai separare in due, od in tre mucchi, secondo le loro differenti indoli, e nature, vale a dire, le sostanze più dure in un mucchio a parte, le meno in un' altro, le morbide in un' altro, e così in seguito. Procurerai, che cadauno di questi mucchi venga posto entro un gran vaso, o bariglione di legno, e vi farai versare un' abbondantissima quantità d'acqua, o piovana, o di fiume per sì fatto modo, che le sostanze, che son nel vaso possanvi nuotare, e galleggiare con tutta libertà. Allorchè l'acqua saravvi stata tanto tratto di tempo che venga a mandar fuori un fortissimo odore, la farai cavar fuori, e la potrai in separati vasi per uso. I corpi morbidissimi daranno quest' odor fetente all' acqua in cinque giornate; le mezzanamente dure somministreranno alla medesima in sette dì; e nel tratto di nove giorni le sommamente dure. Queste sostanze durissime prima d'esser poste nel acqua dovranno esser rotte, e spezzate in varj pezzi. Il liquore dalle divise sostanze procurato, addimandasi *Acqua preparata*.

Prenderai una buona quantità di piante di qualsivoglia specie senz' altra materia,

fa, che questa vengano ad ardere con i loro fiori, e con i loro semi, e procurerai, che dalle ceneri di queste abbruggiate piante venga ottenuto un sale lissivale nella guisa, e col metodo comune. Quindi prenderai tante libbre di salpetra quanti appunto sono i campi, od jugeri di terreno, che debbano esser seminati, e procurerai, che cadauna libbra di questo sale venga sciolta in dodici quattrucci d'acqua, ed alla divisa soluzione aggiungerai una picciola porzione del diviso sale lissivale delle piante. Simigliante liquore vien dall' Autore caratterizzato col' appellazione di *Materia universale di vegetazione*.

Allorchè i due divisi liquori faranno nella descritta guisa procurati, mescolerai insieme una porzione uguale di cadauno d' essi; vale a dire, dell' acqua preparata, e della materia universale di vegetazione; e procurerai, che tutta la quantità sia tale, che servir possa a bagnare, e ad immollare tutta la copia del grano, che dovrà esser seminato: avvegnachè questa esser debba tanta, che rimanga due buone dita sopra il grano medesimo. Allorchè il grano, ed il liquore trovansi in simigliante guisa mescolati insieme, i granelli leggeri, i quali certamente non saliranno, nè gitteranno il germoglio, verranno a galla del liquore medesimo, e così agevolmente potranno schiumare, e così separar dal grano buono, granito, e polpato. Il grano trovato nel fondo del vaso dovrassi smuovere, ed agitare, e rivoltare sottosù ogni due ore: in simigliante maniera il grano dee essere lasciato inzupparsi per lo spazio di dodici ore, e dopo di ciò l'acqua dovrassi fare scolar tutta dal vaso, ed il grano dovrà porsi ad asciugarsi, o sopra delle stoe, oppure sparpanandosi sottilmente sopra un' altissimo pavimento; e dopo che sarà stato ad asciugarsi due o tre ore, dovrassi seminare alla maniera usata.

La quantità della semente necessaria per un' jugero di terreno, allorchè è così inzuppato, è soltanto un terzo della quantità di semente alcuna solita seminar in ugual tratto di terreno nella foggia comune; e questa verrà a produrre copia infinitamente maggiore di granelli, e quella maggior quantità in somma, che sia valevole a produrre un terreno. Il liquore colato fuori della

divi-

divisata quantità di grano , che è stato ad immolarli , non dee esser già gettato via , ma fa di mestieri , che venga salvato , e conservato , avvegnachè potrà benissimo servir di pari col vantaggio medesimo per uguali porzioni di grano , che vorrassi seminare col diviso metodo .

Questo cimento venne fatto l'anno 1706, che fu appunto quell'anno , in cui venne alla luce del pubblico il Libro , in parecchie parti della Francia , e ciò con sì buona , e tanta riuscita , che l'Autore guadagnossi nome , e riputazione grandissima , ed il suo Libro venne in varie Logue forestiè tradotto , e specialmente in Tedesco . Se questo metodo noo sia in progresso mantenutosi colla ottima riuscita medesima , o se sia andato giù per mera sbadataggine , o non curanza , noi nol diremo ; vero sì è che la faccenda da quel tempo io non ho più gran fatto considerata ; ma la maniera di farne uso è , a vero dire , così agevole , e con sì poca spesa , che parrebbe ottima cosa il tentarne l'esperienza di bel nuovo , ed in evento , che reggesse nella buona riuscita , il praticarla comunemente , non produrrebbe che bene grande all'abbondanza di tutti gli Stati . Vegli *Vallemont* , *Curiol* de *Vegetat* .

Vi ha quattro strade d'umentare le raccolte del grano , non già nel numero delle piante , ma bensì nel numero dei gambi o steli d'una pianta medesima , nelle spighe , e nei granelli .

In primo metodo si è quello d'accrescere i gambi dai due , o dai tre , fino ai trenta , ed ai quaranta in una medesima pianta nei campi delle terre ordinarie arative : e la raccolta viene accresciuta con far sì , che tutti questi gambi giungano a produrre , ed a portare cadaun d'essi la propria sua spiga , che è il secondo metodo : conciossiachè s'e' venga diligentemente osservato ciò , verrà toccato con mano , come oemmeno la metà dei gambi del grano nato seminato coll'uso , e metodo comune , non portano spiga . Ed a vero dire se venga a contrassegnarsi un tratto d'una pertica quadrata di grano seminato , e che ne vengano noverati i gambi esattamente in tempo di Primavera , troverassi , che niente meno di nove in dieci parti non son giunte a portar frutto .

Un'esperienza del vantaggio del diviso accrescimento fu fatta da Monsieur Tull in

varie porche , o filari di grano che erano tutte ugualmente magre e melchine ; uno di questi filari , o porche venne per sì fatto modo ad essere accresciuto , che giunse a produrre maggior copia di granelli di grano d'altri dieci similianti , ed uguali filari , e questo per mezzo soltanto di procurare , che i gambi giungessero a portare tutti la loro spiga , e di pari con accrescere le spighe , facendole veoire ad una maggior grossezza , che è appunto il terzo metodo ; avvegnachè ella sia cosa indubitata , che le spighe faranno , o molto più grosse , o molto più piccole , secondo , ed a norma della quantità del nutrimento , che verrà loro somministrato .

Il quarto , ed ultimo metodo d'aumentare , e di rendere più abbondevoli le raccolte del grano , si è col procurare , che i granelli nella spiga sieno molto più grossi dell'ordinario . Questo non può io altra guisa meglio , e con più sicurezza ottenersi , quanto colla porca a solco ampio e dilatato , massimamente se questo venga fatto appunto nel tempo , che il grano è venuto fuori del seme : per simigliante mezzo i granelli verranno a pesare il doppio di più di quelli prodotti dalla specie medesima di grano , in cui sia stato lasciato questo secondo governo . Il loro numero , nel tempo medesimo , si è tuttavia lo stesso entro la spiga ; e siccome il grano si veode noo a peso , ma a misura , così il guadagno dell'affinuale viene ad essere in questo caso raddoppiato , venendo a capello esso grano a far una doppia misura di quello farebbe il grano medesimo altramente prodotto .

Così per via d'accrescere il numero dei gambi , talli , o steli col procurare , che molti d'essi portino , e maturino la loro spiga , col far sì , che le spighe vengano più faticce , e più grosse ; e finalmente , che i granelli entro le spighe vengano più grossi , più palciuti , più polputi , e più piccioli il metodo del secondo governo , dal qual solo questo vantaggio può esser sicuramente prodotto , farà una raccolta più abbondevole della decima parte del numero delle piante , di quello ottenner si possa col metodo comune . Tutti questi vantaggi rilevantiissimi però faranno interamente perduti da coloro , tutto che inducasi a fare quella faccenda , che appellasi passacavallo , e governo , qualora essi non pongano fra una porca , e l'altra , o sia fra un solco , e l'altro una distanza per lo meno di

fei piedi: conciossiachè a questo solo, ed unico spazio di terreno è dovuto, che il grano venga ad avere tutta quella abbondevole quantità di nutrimento, che per il fatto accrescimento rendesi onninamente, ed indispensabilmente necessaria.

Col metodo dei divisi ampi intervalli noi possiamo ricavare una più copiosa raccolta di grano con minor fatica, con minor quantità di semenza, ma non già senza uoa adeguata, e dicvole quantità di terreno, che la colà di pochissima spesa data al grano. La terra di tutto un buono jugero riuscendo una sola decima parte della spesa, e d' un terreno indifferente intorno alla ventesima.

Una raccolta si prende il terreno tutto per intiera; conciossiachè fra il solco, ed il tratto della sua mietitura, non rimanvi alcuno spazio vuoto nel mezzo degl' intervalli. Gli affittuali non invidiano il valore di tre, o quattro lire sterline nel comprare, e nel far condurre il concio per un jugero; ma fanosi a credere di soccombere ad un danno grandissimo, se vengano a dare uno spazio assai straordinario di terreno agli ampi intervalli d' un campo, non considerando quei mammalucchi, che il Terreo è il migliore sfattamento, e di minore spesa, che somministrar si possa alle piante; conciossiachè in cinque, od in sei soldi di rendita che è comunissima a moltissimi terreni in parecchie parti del nostro Regno, tutto il terreo appartenente a cadaun filare, solco, o porca non viene a costare più di sei soldi; che è quanto dire, un solo per uo piede largo, e lungo sciento sessanta piedi, essendo quella la parte sessantesima sesta di un' Jugero. Ma il conto volgare di questa spesa d' un piede largo di terreno, non è già come essi dovrebbero, ma soltanto come parte di rendita, e come una undecima parte dei loro propri pesi usuali aggiunti, ed addossati alla rendita medesima.

In evento, che gl' intervalli sieno più stretti in un terreno profondo, faranno veramente quanto basterebbe per essi; ma è da considerare, che non vi farebbe poi spazio bastevole per polverizzarvi, o per liberamente pasceggiarvi.

Il passacavallo, come dicono gl' Inglese, vale a dire il viottolo fra una porca, e l' altra, ben piantato, ed applicato, supplisce egregiamente bene in luogo del concime, o

governo, e del maggesi; ma non può già compensare e supplire all' uso della terra, tutto che possa accrescere infinitamente la virtù di quella, ove vi ha una quantità ragionevole.

Il prezzo mezzano del grano, fra il caro, e l' a buon mercato, vien calcolato cinque sellini (moneta Inglese, che val dodici soldi di quel paese) lo stajo; e perciò un' jugero di terreo, che produrrebbe cadaun' anno otto staja, senza alcuna spesa, verrebbe a riuscire d' un vantaggio sommo. Ora un jugero di terreno solcato, ed allargato col suo passacavallo ampio, agevolissimamente verrà a rendere sedici staja di grano colla sola spesa di dieci, o di quindici sellini, e per conseguente viene ad essere vantaggioso d' un terzo di più.

Vien calcolato comunemente, come l' Affittuale non può vivere se venga a vendere il suo grano a cinque sellini lo stajo, gli è pertanto giuoco forza, ch' ei tenga in dietro, e conservi il suo grano, allorchè è a vil prezzo più che quando è più caro: ed il metodo comune di conservarlo si è fra lo strame tenendolo ben conservato, e difeso dai gorgoglioni. Il metodo però di tutti il più sicuro si è di asciugare il grano in granelli, ma ciò atterrisce molti, e gli distorna dal porlo in pratica.

Alcune persone, che hanno conosciuto questo segreto, hanno messo insieme veramente tesori, con far delle immense compré di grani, allorchè nei mercati trovassero a tre sellini lo stajo, e così conservatolo fino a che venga un tempo, in cui si venda a più caro prezzo. Il metodo si è di seccarlo, o ben bene asciugarlo in una fornace da malto per la birra, ma non con altro alimento da fuoco, che con paglia di grano, e col non permettere, che abbia calor maggiore di quello sia il calor naturale del sole. Il tempo più lungo, che possa continuare a starli il grano in questo calore, si è di dodici ore: ma alcune volte bastano benissimo sole quattr' ore, secondo la sua umidità quando vienvi condotto, ed a norma della lunghezza del tempo, per cui altri ha in animo di conservarlo, viene a richiedere un' asciugamento più lungo, o più corto. La sola colà, la quale cagiona il patimento, e peggioramento del grano, e che dà luogo, che v' entrino i fonchi, o gorgoglioni a vuotarlo, ed a divor-

rar-

rarfelo, si è la sua soverchia umidità: questa vien dal grano dilungata da un grado di calore niente maggiore di quello, col quale il sole può riscaldare esso grano. E' da avvertirsi, come da questo calore non viene tuttavia ad esser distrutta nel grano medesimo la forza, o facoltà vegetante; ed i farnaj, e panattieri conoscono bene pur troppo, come il fiore di questo grano nella divisa guisa liberato dall'umido, e seccato, riesce anzi migliore per farne del pane, di quello faciasi il fior di farina di grano fresco.

Quantunque le spezie tutte dei vegetabili ricever possano beneficio grande dal soffetto, come quello, che somministra loro abbondanza d'alimento appunto nel tempo, che più ne abbisognano, nulladimeno non tutti i vegetabili vogliono di pari la fattura medesima. Ma la pianta, che ha l'inghissima vita ricercerebbe, che costantemente una porzione grande di nutrimento venisse provveduto, e procurato, e perciò richiederebbe, che il suo solco, o soffetta, le venisse assai più spesso rinnovata, che qualsivoglia altra pianta. Il grano vive generalmente, o per lo meno viver dovrebbe più lungo tempo, che tutte le altre biade; e conciossiachè, se non venga seminato prima della Primavera, il suo granello sarà minuto, e sottile, ed avrà pochissimo fior di farina, e crusca moltissima; ed allorchè vien seminato tardi nell'Invernata, corre pericolo grandissimo d'esser ucciso dai geli, mentre è soverchio diletigine, e tenerello.

A fine d'impedire sì fatti disordini, ed inconvenienti, il grano vien comunemente seminato nell'Autunno: e per conseguente avendo tre doppi di più del tempo di quel grano, che vien seminato nella Primavera, richiede una maggior copia, o supplimento di nutrizione, ed alimento in proporzione a questo più lungo tempo.

Questa è appunto la ragione, onde il grano richiede tutte quelle brighe e servitù del rimondarlo, dello zapparlo, e di certi altri servigi, che rendono necessari in quel suolo, nel quale è seminato; e tanto, e s'anto malgrado tutte quelle carezze, e quella penosa servitù, e spela eziandio è tanto in proporzione perduta; che in evento, che una porzione del medesimo campo non governata, nè del maggesi rimonda, e somiglianti, venga seminata nel mese d'Aprile, dopo una

buona, ed adeguata soletatura, verrà a produrre una raccolta per ogni parte, ed in ogni rispetto niente a qualsivoglia altra inferiore, soltanto vi farà, che il fiore, che ricaverassi da questo secondo grano, riuscirà in quantità considerabilmente minore, e ciò per mancanza del tempo ricercato nello starsi foriera, perche i granelli del grano si pascano a talento, e graniscano con tutta la loro perfezione.

I terreni magri leggieri, nel metodo comune di coltivar le terre, forz'è, che vengano ben governati, affinchè mantengano il grano adeguatamente un'anno, che è appunto il tempo usale, nel quale suol in esso terreno rimanersi il grano medesimo; ed in evento, che sia seminato tardi, d'ordinario la maggior parte d'esso grano perisce, non essendo valevole a sopravvivere, mentre è così povero, e meschino nell'Invernata, ed in terreni di sì fatta natura: in evento poi che il grano venga seminato assai per tempo in certi tali terreni forti, quantunque sien ricchi, ed ubertosi, lavorati a dovere, e vangati, la raccolta sarà peggiore, e più meschina di quello sia per riuscire in un terreno magro, povero, leggerissimo, ove il grano sia stato seminato di buon'ora. Il nuovo metodo delle porche col passacavallo, o sia soffetta, o solco spazioso, ed ampio, viene a somministrare a qualsivoglia sorta di terreni, sienosi ricchi, ed ubertosi, sienosi magri, e poveri, tutti i vantaggi necessarii, e dilunga a un tempo stesso tutte le peccie, e disavvantaggi sì degli uni, che degli altri terreni, i quali son pur troppo noti alla gente pratica di tali faccende, ed ai proprietari, od Affittuali, i quali malgrado loro provano di similanti disavvantaggi le pur troppo disgiunte conseguenze. Ma pel metodo diviso del solco dilatato, e spazioso, a foggia di picciol soffetto, i terreni robusti, e forti potranno esser seminati di grano più per tempo, che uno voglia, non altrimenti, e di pari, che i terreni poveri, e leggieri, se però vengano arati asciutti, e l'aratolo dall'ampio solco, se venga a dovere, e direttamente applicato, sarà valevolissimo a somministrare un nutrimento uguale a quello della più ricca, ed abbondevole concimatura, non meno al terren forte, che al terren magro, e leggiero.

Le sommità de' rialti pel foraechiare del
gra-

grano fa di mestieri che non vengano lasciate così strette, ed anguste, ed aguzze come quelle appunto sono, che si lasciano per foracchiare le rape; conciossiachè tale sia il grano, che deggiasi seminare in filari, o folchi triplicati, e le rape in filari semplici, e folitari. Nel legare, o mettere il grano così seminato, dovranno i legatori villeschi segarlo più rasente al terreno, che mai si potranno, e questa faccenda è infinitamente più riuscibile, ed agevole a farsi in questo grano, che in quello seminato col metodo comune, avvegnachè nel metodo diviso i gambi, o steli del grano stannosi tutti ben ferrati e stretti insieme. Allorchè il grano vien mietuto così basso, le stoppie non riescono di grande impedimento a preparare i terreni per la susseguente raccolta.

Qualora, che può farsi con tutto il comodo, immediatamente dopo, che sarà stata condotta via la raccolta del grano, se il folco, o la fossietta nel mezzo di cadaun largo intervallo vuoto sia lasciata profonda tanto che basti per ultimo passacavallo, farà poi di mestieri, che il contadino la stabi più vicino che può con un' aratolo comune, e che rivolti due larghi folchi nel mezzo degli intervalli medesimi, lo che verrà a fare una sommità, o rialzata sopra quel luogo, ove innanzi era il folco, o fossietta; ma se questo folco, o fossietta non sia bastantemente profonda, farà sempre meglio andare alla bella prima col folco in mezzo alla medesima: questo con due altri di più presi dalle rialzate verranno ad essere tre folchi, o porche in cadauno intervallo; e questa faccenda dell' arare dovrà continuare per tutto il tratto di tempo, che la stagione corre asciutta; e poscia tutto il lavoro dovrà esser condotto o terminato con ritondare, ed uguagliare tutti gli spartimenti, nei quali l' ultimo grano venne su, in nuovi rialti, lo che viene d' ordinario a farsi in due gran folchi. Questi ultimi folchi, i quali compiono i rialti, possono essere arati anche correndo stagione umida. Per similgiante metodo di manipolazione villesca, essendo il grano piantato in filari, in intervalli distanti sei piedi, il pezzo medesimo di terreno verrà a produrre cadaun' anno una nuova raccolta di grano negl' intervalli medesimi, senza alcun altro lavoro, o briga villesca unicamente col solo mezzo di rompere alcun poco la superficie coll' aratolo leggero, e coi vanghetti.

Ella si è una regola generale, che tutte le biade, e qualsivoglia sorte di grani fanno più felice, e miglior riuscita ove vengano seminati in un tempo, che i terreni trovansi bene asciutti, e che la terra medesima, allorchè vien arata, o lavorata, va in polvere. Il solo grano da pane, o strumento si è l' eccezione però di questa regola; e la ragione di quello si è, che siccome il grano dee far testa, e sopportare le severità di un' inverno Invernata, dopo che è stato seminato, per conseguente riesce meglio coll' esser seminato in stagione più umida, allorchè la terra non viene a stritolarsi in parti così minute, e che viene ad esser pigiata, ed a gravitare sopra i semi, e perciò a meglio ricuoprirgli. Se il grano fosse di pari doro, che le legale, e che le sue radici fossero egualmente dure, forti, e facenti testa al freddo, potrebbe benissimo seminarsi in una stagione asciutissima, non altamente, che faciasi della legale medesima, e così, a vero dire, verrebbe a ricavare dal grano medesimo un profitto considerabilmente maggiore, ma il grano ricerca per lo contrario, e vuole una sì buona difesa, e coperta, che alcuni pratici, e giudiziosi Assittuali fanno una specie di leggerissimo strato di pecorino sopra la superficie dei loro campi di grano; e coloro, che non mettono in uso cautela somigliante, con loro danno non lieve hanno a sperimentare, come il freddo uccide per lo più una buona parte del grano, colla agevole strada, che trova per penetrare fino alle sue radici. E siccome il grano ricerca, che la terra, sotto cui stassi, divenga più dura, e consistente non meno sopra l' esso, che intorno a sé nell' Invernata, così ricerca similgiante più concimatura, od alcuna altra cosa somigliante, la quale vaglia a sciogliere il terreno medesimo intorno alle sue radici, dopo, che sia già passata la fredda stagione, di quello ricerchi ciò la legale, le radici della quale non sono così confinate dalla pressione della terra intorno ad esse.

Ella si è altra regola generale, che tutti i vegetabili fanno migliore riuscita, allorchè sono seminati in un terreno lavorato di fresco, vale a dire, immediatamente, che sarà stato arato: ma il grano fa similgiante un' eccezione di questa regola; e conciossiachè il metodo per esso il migliore si è quello di rompere, e d' arare il terreno appunto al-

lor-

lorechè è più asciutto, e tosto gittarvelo sopra, ancorchè dopo essere stato gittato in terra scorrano più settimane, senza che cada dal cielo pioggia ad inumidirlo, e bagnarlo; e che allora si debba soltanto rincalzare, e governare. L'ericicare, ed il rincalzare in questo caso in altro non dovrà consistere, salvo che nel muovere una porzione sufficiente di terreno, il quale vegga a fissarsi insieme, e venga a servire di bastevole difesa alle picciolissime, e sommamente tenere radici nel decorso dell'Invernata, ed il resto della terra, che rimane aperta, e da ogni parte separata, e divisa fino alla Primavera, affine che allora possa somministrare l'umido alle radici medesime, e per conseguente il loro necessario adeguato nutrimento.

Avvi una specie di sabbione legante, il quale non solo vuole, e richiede d'essere arato bene asciutto, ma eziandio d'essere seminato, allorchè è alciutissimo; eppure con tutto questo nella primavera verrà a dar' dietro, ed a decadere, ed a mancare di somministrare una buona raccolta. Ciò, che noi intendiamo però per arata asciutta, non è già, che il terreno sia per modo secco, e duro, che la polvere del medesimo se ne abbia a volar via e ad esser dislungata dal vento in rompendola, come seguirebbe, allorchè l'aridore della medesima fosse estremo; ma basterà, e questo è ciò, che intendere vogliamo, che la terra non sia umida a segno, che rompendosi si vada fissando insieme in masse, e zolle, ma che agevolmente si stritolì; e che la terra medesima non si debba mai nè ericicare nè lavorare, allorchè è in uno stato d'una pappia, od intriso di farinata: servirà adunque, che ella sia d'una pasta alquanto molle, e soltanto i terreni più leggeri dovrebbero essere, allorchè si lavorano, più umidi dei terreni forti.

I terreni forti arati, e lavorati umidi nel Novembre, verranno ed essere, ed a riescire più duri nella Primavera, di quello, che se stati fossero arati, e lavorati asciutti nel mese d'Agosto, tuttochè verrebbero allora ad avere lo spazio di tre interi mesi di più per far lega. Veggasi *Tull*, della Coltivazione del pascicavallo ec.

GRANO di Miglio. E' questa una pianta in estremo vantaggiosa agl'Imprelari od Appaltatori Inglese, i quali sono in possesso di terreni sterili infruttuosi. Il grano del

miglio dee esse re seminato nel Mese di Maggio. Uno stajo di questa semenza basterà a seminare un'jugero di terreno, e verrà bene questa femina in qualsivoglia specie di suolo. Maturasi questo assai tardi, vale a dire, nel piegare dell'Autunno; ed, allorchè vien segato, o micuto, fa di mestieri, che diaccia, o sia corcato sopra il terreno, affinchè i suoi gambi, i quali sono naturalmente duri, vengano per tal modo ad ammorbidirsi: non reca pregiudizio al miglio, se si semini in qualsivoglia tempo, sia asciutto sia umido, avvegnachè nè alcun danno ricever possa questo dagli aridori, nè tampoco dalla pioggia. Somministra nella raccolta una erelcita sommamente considerabile, e se il terreno, in cui è stato seminato sia tollerabile, non darà meno talvolta di cinquanta, ed anche sessanta staja per jugero.

E' questo un cibo eccellente, ed egregio per i majali, pel pollame, e per altri parecchi animali. La farina, o fiore di questo minuto è bianchissimo, e mescolato col fior di farina di grano viene usato come cibo ottimo da molto contrado in alcuni luoghi: La sua paglia o strame è ottima per pascolo dei bestiami, ed i granelli son buoni altresì per darli a mangiare ai cavalli insieme colla vena; ma è guoco forza infragorlo con una macina da acciaccare, altrimenti questi animali lo restituiranno intero, s'è farà granelletto, come si è naturalmente.

Fanno i migli un'ottima concimatura pel grano, e per la segale, massimamente, le non faranno micuti, ma lasciati sul suolo, e se vi verranno arati sul suolo medesimo; ma il metodo migliore di far ciò si è appunto innanzi che il miglio medesimo fiorisca per darlo a pascolare al bestiame, e massimamente alle vacche lattanti; avvegnachè una sì fatta pastura farà sì, che le vacche faranno una quantità di latte grandissima, oltre di che un latte tale somministrerà poscia un cacio, ed un burro d'ottima, e sommamente egregia qualità. E' questo cibo egregio pel bestiame nelle stagioni sommamente alciute, e nei più severi freddi, allorchè le altre erbe tutte nelle pasture trovansi abbruciate, ed arse, erisce eziandio di un miglioramento grandissimo per i terreni, ingrassandogli, ed impinguandogli in grado considerabilissimo. A questo fine appunto sogliono i giudiziosi Contadini seminarlo più fitto, che qualsivoglia

glia altera femente, ed allora ne gettano in terra tre ed anche quattro staja per ogni jugero. Veggasi *Motimer*, della Coltivazione, p. 137.

GRANO bianco di figura conica. E' questa un' espressione usata dai nostri Agricoltori per significare, e dinotare una specie di grano particolare, il quale è fortissimo, ed ha una spiga assai grossa.

E' questa la specie migliore di grano per seminarli nei campi, i quali sono soggetti alle nebbie, conciossiachè i gambi di quello grano, essendo per la maggior parte solidi o pieni di midollo, non altramente, che il giunco, e non simili ai gambi del grano comune, che son vuoti dentro come le canne, quegli inferi, che cagionano, che la nebbia s'attachi ai gambi dell'altro grano, non fanno il menomo danno a questo grano, quantunque vi si scermino sopra, e lo investano; i gambi di questa specie di grano vengono bene spesso trovati pieni di tache, o macchie nere, e queste son sempre mai i segni, che avevano formato sopra gli inferi, e mal grado eò, le spighe son piene e granite d'ottimi, e fanissimi granelli.

Questo grano fa un' ottimo pane, qualora però il mugugno non lo macini soverchio forte, oppure il fornajo non lo impasti soverchio duro, o che lo cuoca troppo, avvegnachè la farina di questo grano richiegga pailoni alquanto più grossi, o pagnotte più faticose dell'altro fior di farina, e voglia altresì esser cotto un poco meno, e rimaner più morbido, e più mollosso, e perciò fort'è, che il fornajo lo impasti un poe più tenero dell'ordinario. Uno stajo di grano bianco conico verrà a dare una quantità maggiore considerabilmente di pane, d'uno stajo di grano di Lamsalo, ma questo pane butta alquanto poco giallognolo. Veggasi *Tull* della Coltivazione a passacavallo ec.

GRANO di Smirne. E' questo una specie di grano particolare produttore grossissime spighe, con parecchie altre spighe più picciole laterali nel fusto, o gambo medesimo, veggenti tutte fu dalla base, o fondo della spiga maestra.

Siccome questo è il più grosso di tutte le altre specie di grano, richiede una buona, e grassa terra, o terriccio da orto, senza trasmodare nel suo pascolo, e vuole un nutrimento il più abbondevole, che somministrar

possa mai alle piante la più abbondevole maniera di concimarle, e governarle. E di vero feminandolo nella guisa comune, colla quale si semina, e si coltiva tutt'altra semente, questo grano dà la spiga misera, e poverissima, vale a dire, niente più grossa di quella del grano ordinario.

Sembra, che questa specie di grano sia la più adeguata, e la più propria, per la nuova invenzione delle femine a passacavallo, vale a dire con ampie porche, aventi nelle loro ben capaci distanze la lor soffetta disopra descritta più fiata, avvegnachè questo nuovo metodo sia valevole a somministrare quel nutrimento, che un terreno dar mai possa maggiore, a piacimento dell'Agricoltore, e questo otterrassi a maraviglia bene, se verravi più fiata ripetero il lavoro del passacavallo. Dopo di questa specie di grano, il più acconio per questo nuovo metodo d'arare i terreni, si è il sopra descritto grano bianco conico; e finalmente il grano conico bigio.

GRANO-GRANELLO *Struttura del grano, o granello.* In cadaun granello hannovi tre cose particolari osservabili, siasi questo di grano, d'orzo, di vena, o di qualsivoglia altra specie eziandio. Queste adunque sono, 1. L'incamiciatura esteriore, o buccia, o pellicina, la quale contiene in sé tutto il rimanente del granello. Questa nelle medesime specie di granello, vien trovato essere sommamente differente rispetto alla sua grossezza, e spezzenza in annate differenti, e secondo, che sia venuto su, e cresciuto in diversi terreni. 2. Il germoglio, o tallo. Trovasi questo sempre mai nascosto entro il seme, o granello, ed altro non è se non se la pianta in picciolo, che d'esso deve alzarsi, e formarsi; e 3. La midollosa sostanza, o sia quella materia farinacea, che trovasi nascosta o racchiusa entro la pellicina, e che faccia, veite, e circonda il tallo o germoglio, e che serve per dare al medesimo il primo necessario nutrimento nella terra, prima, che esso germoglio sia valevole a procurarselo dalla terra medesima per se stesso. Veggasi il *Dottor Grew*, nella sua Anatomia delle Pianta, il quale ha trattato da valentuomo, che egli era di questa cosa ampiamente. Veggasi altresì l'Articolo VEGETAZIONE ec.

La struttura tutta della pianta, la quale questi semi produce, è di pari sommamente ammirabile.

ammirabile. Il guscio paglioso, o sia loppa è in guisa veramente maravigliosa adattato a riparare, ed a difendere il seme per tutto il lungo tratto di tempo, che è necessario, e poi allorchè esso seme non ha più bisogno d'esser difeso, e tenuto serrato, allargasi, e lascialo cadere; ed il gambo, che è formato concavo, e tondeggiato a foggia di cannello, è necessariamente a un tempo leggero, sottile, ed insieme forte a bastanza, valevolissimo a sostenere la spiga senza assorbire porzione soverchia di quei sughi, che necessari sono, e destinati dalla natura al nutrimento della spiga medesima, e le barbe di varie, e parecchie specie, o sieno filetti aguzzi, e pungenti sono uoa validissima difesa contro gli uccelli, i quali senza tal intoppo, che trovano, verrebbero a distruggere, e divorarsi i semi, o granelli delle spighe medesime, innaozi che giunger potessero alla loro piena e perfetta maturezza. La coperta poi, od incamiciatura di questi semi è formata di due membrane, le quali venendosi ad incontrare in una linea in una parte del seme, vngono a formare insieme quel solco, o fossetta, che in esso veggiamo. Questa appunto è la parte, in cui dee aprirsi il seme, allorchè viene inumidito. Non ha la Natura provveduto similgiante mezzo per l'uscita fuori del germoglio, cioè la durezza necessaria per l'incamiciatura, o vestito del seme, non altrimenti che una difesa dalle ingiurie; avvegnachè altramente la materia farinosa, ed il germoglio farebbono marciti insieme, dentro cisa incamiciatura, prima che avesse dato al granello l'adito di venir fuori, e di germogliare, e di far la sua crescita.

Nè è già questo il solo uso della descritta apertura piantata in questa particolar parte del granello. Il sommo Creatore delle cose tutte ha provveduto questi semi, non solamente come un supplimento della specie medesima di pianta, ma altresì per nostro ottimo cibo, e per quello eziandio degli uccelli, e d'altre creature similgianti. Noi abbiamo un'arte sufficientissima d'altar delle macchine per ridurre la farina in polvere, e per ispogliarla eziandio delle sue membrane, ond' è coperta, e

Suppl. Tom. III.

vestita, ma gli uccelli si cibano del grano intero, tale quale si è, e questo passa per entro essi intiero, e senza far loro alcun bene, se non se quello, che i sughi dello stomaco loro gonfiandolo, vien questo ad aprirsi, e spaccarsi appunto nel suo solco, o fossetta, e così ne sgorga fuori entro lo stomaco loro tutta la sostanza nutritiva del seme medesimo. Veggasi *Deslandes*, Trattato Filico p. 62.

Questa materia farinosa è composta d'un numero infinito di corpiccioli bianchi, e trasparenti, d'una figura globulare: questi corpiccioli per ogni e qualunque verso, circondano, vestono, e racchiudono la giovanetta pianterella, ed a motivo di loro figura, venendo agevolissimamente posti in moto, subito che il calore, e l'umidità della terra agiscono sopra essi, questi vanno per gradi, spingendo le stelli per entro i vasi della pianta, e le vanno dando di tempo in tempo accrescimento, fino a tanto che vengon ad assorbirsi totalmente nella medesima; e questi stelli hanno allora così bene dato alla medesima tanta robustezza, che viene a trovarsi in uno stato di cibarsi dei sughi della terra. Il procedimento medesimo della natura è osservabile massimamente nel caso, ove i granelli del grano vengon fuori innanzi tempo, allorchè veogao con soverchia trascuratezza gittati insieme in luogo umido.

Allorchè il grano vien macinato in polvere, questi globuletti farinosi quelli appunto sono che noi addimandiamo fiore di farina. I germogli son sempremai meno bianchi, e meno trasparenti di questi globuletti, ma sono però d'uso grandissimo, conciossiachè ad essi principalmente noi dobbiamo il gustevolissimo sapore del pane; oltredichè la fermentazione della pasta ad essi è quasi per intiero, e totalmente dovuta. Le loro picciole parti, di tutte le altre parti del granello quelle sono, che più agevolmente vengono poste in movimento. A questi similgiamente esser dee attribuito il corrompimento del grano che venga conservato io umidi granaj, avvegnachè abbiano essi una tendenza naturale al moto, ed alla corruzione, qualora questo moto medesimo venga dato loro senza i necessari concomitanti accidenti. Che l'osservazione del fermentare del-

L

la

la pasta, come anche della leggerezza del pane sieno dovute a questi germogli, non possa sembrare avanzata a taleuto, od a calo, sarà somamente dicevol cosa il sfaocheggiarla, ed il confermarla, colle osservazioni medesime di quelle persone, che vengono impiegate nel fare il pane per le Armate. Sperimentano coloro costantemente, che il finissimo fiore di farina se sia ben bene asciutto, e posto in afeiutissimi barili, si conserverà ottimo per lungo tratto di tempo; ma che dopo essere stato lungamente così conservato, quantunque buono per farne biscotto, e per servire per molti altri usi necessarii, non sarà però buono per farne del buon pane leggiero per la tavola, e questo attribuiscono ad esser già svanita la vita del fiore, che è quanto dire, a quei germogli, che sono rimasti insieme colla facoltà loro vegetante distrutti, per essere stati soverchio lungo tempo così infranti.

GRANULAZIONE dei Metalli. Per quella voce granulazione intendesi nell'arte del Saggiare il ridurre i metalli in particelle minutissime, affinché in tale stato possano i metalli medesimi più perfettamente, ed interamente squagliarsi, ed insieme perchè possano mescolarsi più egualmente con gli altri corpi in certe date più diligenti, e più esatte particolari operazioni.

Questo viene più rozamente effettuato per mezzo del metodo umido col fare scorrere questi metalli entro l'acqua facendogli passare per una scopa nuova di ginestra, oppure col ruotolarli per entro un cilindro concavo fabbricato apposta per sì fatto lavoro: ma il metodo più esatto, più fino, e più dicevole si è l'asciutto, vale a dire, senza l'ajuto dell'acqua, per mezzo d'una cassetta di legno tutta ne' suoi lati interni sogliata. In sì fatta maniera il piombo viene a granellarsi egregiamente bene, e questa faccenda dovrà effettuarsi nell'appresso guisa.

Portai una data quantità di piombo io una padella, o romajolo di ferro, ed andrai lentamente squagliandolo sopra un fuoco soave e mezzanamente attivo. Tollo che questo piombo sarà perfettamente liquido, lo verserai in una cassetta di legno rotonda, avente un coperchio fatto ap-

posta per essa, che combagi colla medesima a capello, e tanto quello coperchio, quanto la cavità della cassetta medesima procurerai, che sieno ben bene incrostati, ed intonacati di gesso: tolto che avrai versato nella cassetta il metallo liquefatto, la ferrerai, e l'andrai rivoltando, e dimenando colla maggior violenza, che potrai, e per modo, che il metallo trovandosi entro la scatola venga a sbattersi qua, e là con empito di contro ai lati tutti della scatola stessa. Andrai continuando questo dimcolo, fino a tanto che il metallo sia sì intieramente raffreddato; e nell'aprir, che farai la cassetta, verrai a trovare la maggior parte del metallo finissimamente granellato, o diminuito, ed impieciolitosi in grani porosi d'una picciolezza estrema. Il gesso, che sarà attaccato a questi granellini, procurerai, che a forza d'acqua venga a staccarsi dai medesimi: quindi vaglierai questi granelli ben bene, affioc di rendegli tutti d'una grossezza medesima, ed uguale.

Il piombo, lo stagno, ed il bronzo sono i metalli più acconci per diviso lavoro; e conciossiachè, allora quando questi metalli sono intieramente stati squagliati, riescono sempre estremamente fragili, e sono in alcun grado fomigianti all'arena bagnata. Il gesso, col quale è intonacata la parte interna della deferita cassetta, somministra alla superficie una forza di resistenza grandissima, e difendela dal rimanere abbronzata; mentre il metallo spinto contro a' suoi lati essendo estremamente fragile, appunto allorchè divien solido, viene a spezzarsi in una minuta polvere, la quale per nessun altro metodo è ottenibile salvo che per la pur' ora descritta operazione.

Dee però osservarsi, come sono onninamente necessarie alcune precauzioni nel maneggio d'essa operazione. Fa di mestieri, che il piombo non venga squagliato per mezzo d'un fuoco soverchio gagliardo, ed attivo; conciossiachè quello venga a produrre nella superficie una spezie di pellicina; la quale però tuttochè assai spesso venga levata via, vien tuttavia immediatamente rimpiazzata da un'altra; e la materia di queste pelliciole mescolandosi col metallo viene ad indurire, ed inorridire il dimenamento, e facendo il tutto più tena-

ce tronca in gran parte l'operazione. Quantunque il fuoco non debba esser energico, e sommamente attivo, è però giuoco forza, che tutto il piombo venga a rimaner tutto perfettamente fluido; altramente si rappiglierà tolto che sarà versato entro la cassetta, e per conseguente pochissima sarà la polvere, che vorremo ad ottenere.

Si fatta specie di granulazione esser non può procurata da certi tali metalli, i quali sieno più tenaci, più prossimi che sono allo squagliamento, come l'oro l'argento e somiglianti, che perciò questi esser possono granellati nel metodo più rozzo da noi sopra descritto, vale a dire coll'ajuto dell'acqua. Veggasi *Cramer*, Arte del Saggiare, p. 70.

GRASSO. Noi abbiamo un'osservazione fatta da Monsieur Schulze della cera passante per le tuniche delle Arterie, e delle vene, allorchè questi vasi venivano sezionati, o facevi le iniezioni: della qual cera, quella colorita di rosso, perdeva il suo colore, dove la cera verde per lo contrario conservavalo. Quindi questo galantuomo s'affaccia d'argomentare per la secrezione del grasso, e pel producimento di un' Edema. Veggasi *Com. Lib. Norimb. 1731. Semell.*

1. Ipccimen 5.

Da Monsieur Hunauld vengono somministrate le appresso osservazioni riguardanti il grasso del corpo umano, vale a dire 1. Che quantunque i Feti, ed i piccioli bambolini abbiano molto grasso sotto la cute, nulladimeno ne hanno essi soltanto una picciolissima porzione, ovvero due (*pelous*) nella base del cuore; dove per lo contrario i magri, ed i corpi degli adulti, hanno del grasso tutt'all'intorno della base nei vasi, che vengon fuori del cuore, e che accompagna i più grossi coronari, come anche nella punta d'esso cuore. 2. Che l'Omento ed i tenerissimi figliuoli non ha grasso, e che il loro mesenterio ne ha pochissima porzione. 3. Che in parecchie persone il grasso sotto la pelle trovasi clauso, mentre gl'intestini ne sono anche soverchio carichi. 4. La parte esteriore della tunica cellulare è la prima che viene a riempirsi di grasso, ed è insieme l'ultima a vuotarsene. Da ciò, e dal vedere le aponeurosi, e le membrane sparse sopra cotanti muscoli, ci fa sia

a conchiudere, che l'opinione comune, vale a dire, che i muscoli vengano renduti lubrici dal grasso, sia mal fondata. Veggansi *Memoirs Acad. Roy. Par. Scienc.* ann. 1732.

Gli antichi per esprimere questa sostanza cui noi grasso addimandiamo, servivansi indifferentemente, e promiscuamente delle voci *adeps*, *pinguedo*, e *sebum*; ma gli Anatomici Moderni hanno creduto cosa assai dicevole, e propria lo stabilire una distinzione, conciossiachè secondo loro la voce *pinguedo* è un termine adattato a qualsivoglia sorte di grasso: sotto le voci *adeps*, & *sebum* intendono i rami, o dir le vogliamo specie della sostanza medesima: la voce *adeps* comprende la sorte più sottile, più soffice, e più umida, la quale agevolmente si squaglia, ed a stento grandissimo si unisce insieme; ed il *sebum* dinota la specie più consistente, più arsiccia, e più tigliosa. (a)

Secondo un'antico Glossatore per la voce *adeps* viene a significarsi propriamente la parte interna del grasso, o per meglio e primierci il grasso interno, oppure quello, che fascia, o sia attaccato agli intestini. (b).

Quelle virtù specifiche, che da certuni, che non son pochi, vengono attribuite a certi dati grassi particolari, non sembrano gran fatto accertate: anzichè alcuni fannosi per fino a dubitare, che posseggano delle proprietà differenti dalle altre sostanze della specie medesima; quando non vogliasi eccettuare ciò, che vien fuori dalle varie loro consistenze, e gradi di volatilità. Per sì fatto rapporto sembra che il grasso della vipera abbia il dritto di pretendere non so che di straordinario (c).

Il metodo di preparare il grasso per le intenzioni medicinali si è di levarlo dalle pelli, dalle vene, dalle fibre, e somiglianti: di lavarlo ben bene, fino a che venga ad essere affatto sceuro d'ogni menoma parte di sangue, poscia di squagliarlo, colarlo, e tenerlo ben custodito dall'aria. (d)

Alcuni Chimici descrivono l'*adeps* per una pinguedine coagulata, o condensata fino alla durezza per mezzo della mescolanza d'alcuna sostanza salina; conciossiachè nella distillazione la parte fulfurata dell'*adeps* ascendendo, lascia soltanto una materia sa-

lina nel fondo del vaso, ed essendo distrutto il coagulamento, la sostanza cessa d'esser altramente *adept*, ma viene caratterizzata colla speciale denominazione d' *Oleum adipis*. (e)

(a) *Veggasi Blas. Comm. ad Vesling. cap. 1. p. 10. Gal. de usu Partium, l. 16. Corr. Def. Med. pag. 37. & seg. in voce Πικρά.*

(b) *Veggasi Glossar. Du Cange. Tom. 1. p. 56. (c) Quincy, Pharmac. P. II. §. XII. p. 27.*

(d) *Pharmac. Edinburg.* (e) *Vegg. Johns. Chymis. in Addit. p. 7.*

GRAVIDANZA. Per la voce *gravidanza*, esprimersi lo stato della donna portante nell' utero il feto. E' questo un tempo, in cui soffrono le povere donne moltissimi incomodi, e malori, i quali tuttochè non possansi da esse dilungare radicalmente, ed assolutamente fino a tanto che non sonosi della prole sgravate, tuttavia esser possono dalla Medicina grandemente mitigati, e renduti assai più sopportabili. Prima però, che uno s'azzardi a fare alcuna cosa in questi, od in casi somiglianti, egli si è necessarissimo, ch'è sia perfettamente, ed interamente accertato, se la paziente trovisi, o non trovisi realmente *pregnante*; e questo vien conosciuto dai seguenti sintomi, nei casi ove non havvi occasione per dissimulare, o che non abbiavi altro malanno con questo congiunto: ma allorchè la donna ama di celarlo, e che vi ha una complicazione di mali, le prove per presumerlo con grado grande di certezza, sono.

Il troncamento dei corsi, o scariche mestruali, si è il primo segno della *gravidanza*, qualora però non abbia questo altra apparente cagione. Ma tuttochè sia questo un sintoma comunissimo, e sommarmente ovvio; nulladimeno egli non si è per modo alcuno un sintoma certo, e sicuro; avvegnachè una soppressione di specie somigliante può benissimo dipendere da occulte cagioni.

Il secondo sintoma si è una particolar nanca nel vedere quelle date vivande, od eziandio nello stesso sentirne l'odore, mentre per altro la persona trovasi perfettamente sana, e può con tutto il gusto mangiare qualsivoglia altro cibo.

Un terzo segno si è la tumescenza del

ventre; la quale suol d'ordinario esser tondeggiata, o globulare regolarmente, e non già gonfiarsi irregolarmente, come avviene negli sconcerti, e malattie del fegato, e delle altre viscere. Si fatto gonfiamento va altresì avanzandosi e crescendo placidamente, e senza che gonfiino le gambe, o che venga accompagnato da qualsivoglia altro sintoma, qualora però la persona trovisi per gli altri rispetti in istato sano.

Dopo di questo nella ventesima settimana della *gravidanza* abbiamo il più certo, ed univoco degli altri segni tutti, vale a dire, il movimento del Feto. Questo però dee essere diligentemente distinto da quei movimenti degl' intestini cagionati da flatuosità, i quali bene spesso assomigliansi tanto al movimento del feto, che può benissimo ingannarsi quella persona, la quale non facciavi seria attenzione.

In evento che, la madre abbia in cuore d' occultare i sintomi, nel divuito periodo, malgrado questa sua procedura, la cosa può rendersi accertatamente palese, quantunque non sempre, e costantemente, tuttavia il più delle volte: conciossiachè, se allora quando ella abbia il ventre caldo altri le ponga sopra esso una mano fredda, o viceversa, s'ella lo abbia freddo, altri la tocchi colla mano calda, per lo più il feto incontanente si muove; e la stessa figura, ed apparenza del ventre alle persone, che sono assai use, e pratiche a somiglianti ispezioni, somministrerà certezze grandemente probabili della *gravidanza*. Nei casi d' un concepimento accertato, un feto vivente dee esser soltanto distinto da una mola, o dir lo vogliamo falso concepimento, per mezzo de' suoi movimenti. Adunque allora quando una persona va avvicinandosi al tempo della maturità del feto, o dir lo vogliamo fine della gestazione, senza accorgersi tampoco, che il feto si muova, con gran ragione può altri farsi a sospettare, che ella abbia in corpo una mola; la qual cosa rendesi anche più probabile, se a volte, ed in tratti di tempo irregolari, ella abbia veduto delle scariche mestruali durante lo stato di sua gestazione; e se il gonfiamento del ventre sia irregolare, e che la donna sia soggetta a violenti

lenti flatusofti, e massimamente, qualora ella oltrepassi l'usato periodo naturale dei nove mesi.

Ma non è già che i divisi sintomi tutti dobbiamo promettercelgli in qualsivoglia femmina pregnant; conciossiachè moltissime donne del minuto popolo, che vivono delle fatiche delle loro braccia passano tutto l'intrico tratto di loro gestazione in mezzo a travagli, e fatiche gravissime, e fastidiose, senza il menomo dei divisi sintomi; di modo che quelli esser debbono in grandissima parte attribuiti al corso della vita, non già al corso della Natura, nelle femmine di condizione, e stato migliore. Sono grandemente ad essi sintomi soggette quelle femmine, le quali sono d'una complessione tenera, e delicata: come anche quelle, che sono di un'abito pletorico, che menano una vita otiosa, e riposata, o che sono intemperanti, e trasmodate, o finalmente, che sono da passioni di vario genere predominante, come, a cagion d'esempio, da timore, da collera, da afflizioni d'animo, e somiglianti.

Sono quelli i sintomi più naturali, e meno imperversanti della gravidanza; ma questo dato tempo viene assai sovente accompagnato da sintomi più affittivi, più complicati, e più dannosi eziandio, i quali dall'Arte possono benissimo in gran parte esser mitigati, minorati, e renduti meno veementi e penosi. Certune sono assai soggette a violentissime emorragie dal naso, e queste debbon esser trattate dal Medico col metodo comune, e verranno ad esserne liberate con uguale facilità, non altrimenti, che gli altri-conceretti tutti di sì fatta spezie. In altre durante il tempo della gestazione accadono delle pienissime scariche di sangue per le vene morroidali. Queste però dovranno esser ammansire, e minorare con somministrare alla pregnant le polveri di nitro, di cinabro, e d'occhi di granchio, od una, o due volte il giorno. Alcune poi sono soggette ad un'emorragia dello stesso utero, sebbene il caso suol esser rarissimo; e quando egli avviene, può esser dovuto a due cagioni, e perciò comparisce in due maniere. Nel primo caso il sangue sgorga fuori nella guisa medesima, che suole sgorgare nelle usate sca-

riche mestruali, durante i primi mesi della gravidanza; e perciò viene a confondere, ed a disturbare grandemente il regular calcolo del tempo d'essa gestazione. Nel secondo caso il corso sanguigno tronca si nei primi mesi; ma torna poscia a farsi vedere di bel nuovo verso la metà del tempo della gravidanza, od anche passata la metà della medesima ed in quello secondo caso suol d'ordinario continuare fino al tempo dello sgravamento del feto: ma sì l'uno, che l'altro di questi due casi porta seco mai sempre pericolo grandissimo nelle pregnant d'abortire. In casi somiglianti i nitri, il cinabro, ed i medicamenti d'indole affoibente dovranno prescrivere alle pazienti; a quelli per assai acconcio, e dicevol modo dovranno aggiungere le medicine corroboranti, nè dovranno per verun conto traslasciare la cavata del sangue dal braccio.

Soventi volte sogliono le donne pregnant esser molestate da dolori di testa e da capogiri, e questi sono massimamente dovuti a cagioni occasionali; quali appunto esser possono, a cagion d'esempio, movimenti, o commozioni violente di corpo non meno, che di spirito, un disacconcio refrigeramento delle parti inferiori del corpo, oppure il darsi a bere trasmodatamente dei liquori soverchio spiritosi. Il metodo di liberarle da sì molesti sintomi si è quello di somministrar loro dei medicamenti temperanti, e nitrosi, con i lassativi della spezie la meno attiva, e più mite, nè dovrà si a un tempo stesso traslasciare di stropicciare esternamente la testa medesima con del buono spirito di vino canforato, qualora però la paziente pregnant ne possa senza suo disturbo soffrire l'odore, conciossiachè bene spesso in simili casi l'incinte femmine realmente non possono.

Altro accidente in grado estremo penoso, e molesto, e ad un tempo stesso sommarmente comune nelle donne gravid, si è una debolezza, e languidezza grande della membra: e questo non dee altrimenti ripararsi, che colle adeguate e dicevoli cavate di sangue non meno, che col moderato, e savio esercizio; ed in evento, che questo ci manchi fra mano, nè produca l'effetto bramato, potranno ag-

giun-

giungere le poc' anzi accennate polveri nitrofe per ammansare le commozioni del sangue, ed a vero dire, sì fatto metodo fuole comunemente aver buona riuscita.

Oltre ai malori finor divisi non di rado suol' unirsi allo stato pregnante certa tosse secca, ed anche una non lieve difficoltà di respiro. Per sì fatti incomodi richieggonsi i merodi medesimi divisi: ma allora quando la difficoltà grave del respiro assalisce la donna incinta dopo il cibo; potranno se preferire con somma debolezza picciolissime dosarelle di polveri saline, e digestive, quali appunto esser potrebbero il tartaro vetriolato, colle polveri nitrofe, ed assorienti; ed allorchè fasti sentire questo non lieve incomodo negli ultimi mesi della gestazione, soltanto, e che ha origine non da altra cagione, che da una mera pressione dell' utero allungato, e disteso, è giuoco forza alla povera pregnante il portarsi in pace, e con una santa pazienza sì fatto incomodo fino al tempo del parto; conciossiachè questo sintoma si dilegui per se medesimo sempremai nel calar che fa la matrice. Veggasi *Junker, Concept. Medic. p. 701.*

Dalle Memorie Franzesi ci vien somministrata l'istoria d'uno stato sommamente infelice e compassionevole di gravidanza in una giovanissima donna di anni diciassette, funestata da tali sintomi nicote a questo lato comuni. La creaturina giacevasi nel lato dritto; e crebbe a tal segno, che non poteva punto agitarsi; subito dopo ella morì, e fu levata, ed estratta fuori dell'utero dell'infelice madre morta, ed in braoi separati. Negli ultimi mesi di sua gravidanza venne questa povera giovane tormentata da una terribile oppressione di petto, e da veementissima difficoltà di respiro, accompagnate da una violentissima palpitazione di cuore. Il parto di questa sventurata anzichè ammansare i dolorosi sintomi, da quali veniva martirizzata, continuo glieli accrebbe, e fu sempre con maggior violenza battuta dai medesimi pel tratto di cinque interi anni. In questo aratro di tempo come colei, che era assai giovineta, crebbe in altezza di sua persona, ed ebbe due figliuoli, i quali nella maniera stessa del primo giacevasi nel suo lato dritto, e di quelli le era venuto fat-

to di sgravarsi, senza alcun reo sintoma particolare. Dopo questi cinque anni i rei sintomi di questa sua malattia divennero stabili, nè l'abbandonavono giammai fino al trentanovesimo anno di sua vita, nel quale ella si morì.

Dopo la costei morte essendo stato aperto il suo corpo, i due ligamenti dell'utero, vale a dire il rotondo, ed il dilatato, furono trovati di pari più corti nel lato destro, che nel lato sinistro, ed in questo lato corto erano assai più compatti, e più fitti. L'utero era assai maggiore di quello sì è comunemente, e trovavasi alcun poco inclinato verso il lato destro, ed il maggior lobo del fegato, che avrebbe dovuto esser concavo di dietro, era convesso all'innanzi, e stretto, e stirato nel fondo grosso, e fitto nella sua sommità, e totalmente ed interamente rinchiuso nella cavità del ventre: in questa persona era d'una figura conica, lungo nove buone dita, e quattro dita largo nella base, che era la sua parte più bassa, e due dita nella sua punta, o vertice: mezza la sua quantità trovavasi depositata nella cavità del petto, e le parti tutte nel lato medesimo. Gli artoni, il diaframma, ed i polmoni comparivano, non solo in rapporto degli uni agli altri, ma eziandio in rapporto alle parti circonvicine, ed adjacenti, non altramente, che se fossero state spinte, e sforzate all'insù in guisa assai considerabile dalla matrice. La forza soverchio grande dei ligamenti dell'utero nel lato destro, aveva tirato e violentato l'utero medesimo a questo stesso lato, ed aveva determinato il feto in quella parte; e per mala ventura dell'infelice giovane il feto medesimo era stato di un' eccedente grossezza, ed aveva ellesa, e comunicata l'influenza di sua pressione nelle viscere trovantisi sopr'esso, e per fino ai polmoni. La duragione dei rei divisi sintomi a questo era dovuta, cioè, che essendo le parti state tolte del luogo loro, e della naturale lor diacitura per lungo tratto di tempo continuato, vale a dire, durante gli ultimi mesi della sua prima gravidanza per sì fatto modo, che non potettero ricovrarsi, e restituirsi di bel nuovo ai luoghi loro naturali, e propri, eziandio dopo che l'ostacolo venne allontanato, di modo

modo che i rei sintomi ebbero a continuare tuttochè rimossa ne fosse la loro prima cagione; e la crescita della giovane altro non fece, che fargli crescere vie maggiormente. Veggansi *Memoires Acad. Paril.* ann. 1769.

Lo sconcertarsi, od abortire delle donne pregnant riconosce più che da ogni altra cosa l'origin sua massimamente da una plethora, ed avviene con frequenza grandissima nelle giovani donne d'abito plethorico nei primi mesi di loro prima gravidanza. Hannovi però parecchie altre cagioni, che concorrono a questo sconcerto; e queste sono una violenta passione d'animo, come a cagion d'esempio un subitaneo dolore, timore, o somigliante; una trasmodatamente copiosa scarica abituale dei corsi mestruali: una dieta soverchio nutriente, e caricatamente condita, unita all'uso d'abbondevoli bevute di vini generosi, e d'altri liquori assai gagliardi, ed attivi: il prendere de' forti catartici, od emetici violenti; e le diarree, massimamente allor che sono per lungo tratto di tempo continuate, come quelle, che involano al feto il suo dievole nutrimento: un tenefmo, oppure un violento moto nello scaricarsi delle fecce, e quindi è appunto, che i elisteri soverchio stimolanti possono bene spesso esser cagioni reali, e veraci di un' effettivo aborto: come altresì qualunque trasmodato, e violento movimento, come a cagion d'esempio un camminare affrettato, od una corsa, un salto, il portare, o l'alzare dei pesi assai considerabili, una caduta, una percossa data sulla regione dell'addome: può niente meno esser cagione funesta di un' aborto l'uso soverchio venereo; e similgiatamente potranno cagionarlo i gagliardi medicamenti emmenagoghi, le euporose cavate di sangue dai piedi; l'odore d'olio ardente, o di qualsivoglia altra fetente sostanza; le malattie d'indole nefritica, le cachessie; un fluor bianco, od altro disordine, o sconvolgimento della matrice: l'uso delle oppiate, e la morie o la grande debolezza del feto, mentre stanza nell'utero.

I metodi migliori d'impedire l'aborto sono, l'uso de' medicamenti d'indole attemperante, e specialmente i nitrosi, do-

po qualsivoglia trasmodata commozione del sangue: il cavar sangue nei tempi propri, e dievoli, le medicine corroboranti, ed i più miti, e benigni carminativi. A questi poi dovrasì aggiungere una savia temperanza nella quotidiana dieta, ed un placidissimo moto del corpo. Da certuni sono grandemente raccomandati i gusci d'uova, e da altri gli acini d'uva, le quali sostanze sono a vero dire, manifestamente d'indole astringente.

La costringazione del ventre nel tempo della gravidanza è comunissima; ed è comunemente dovuta alla mancanza d'adeguato bevere, e del dovuto esercizio. Alcune volte, a vero dire, ella è unicamente dovuta ad una immediata pressione della matrice sopra l'intestino retto; ma questo caso viene a distinguersi agevolissimamente dagli altri, avvegnachè sia sempre mai accompagnato da un tenefmo. Simigliante disordine dee essere riparato, od alleviato da una dieta umettante, dal fatto delle bevute di liquidi più frequenti, e più abbondanti di quello la paziente far soltesse per innanzi, ed insieme di tenere il corpo esercitato in un placido moto, ed in un soave, e mezzano esercizio. In caso similgiante viene sperimentata sovrannamente benefica la gomma ammoniacca; e talvolta rendonsi di pari necessarie le gentili infusioni di fena: ma queste dovranno sì unicamente somministrare alla paziente pregnant in doserelle piccolissime. Certuni fanno mettere in pratica delle supposte, le quali non sieno d'indole acre, nè pungente, ed altri d'elisteri d'acqua di farina d'orzo, &c.

Altro sconcerto, che suol' essere unito allo stato delle donne pregnant si sogliono essere le flatuosità: queste dovranno essere dilungate da esse per mezzo dei medicamenti carminativi d'indole più miti, quali appunto sono la scorza d'arancia, la radice di pimpinella, ed i semi d'anaci, il finocchio dolce, e similgianti, presi od in polveri, od in decocti.

Le diarree nelle donne pregnant riconoscono per lo più l'origin loro dalle cagioni medesime, che nelle altre persone; ma in questo caso esse richieggiono un riguardo sommamente particolare; e consi-

ciofiacchè, allora quando queste continuano per lunghissimo tratto di tempo, e che sono accompagnate con un tefesimo, elle vengano a terminare in un' aborto.

Debbono queste pertanto essere raffrenate, e finalmente troncate affatto nella seguente maniera: dovrannoosi prescrivere alla paziente i medicamenti corroboranti, carminativi, e stomachici, quali esser possono la scorza d'arancia condita, il zenzero preservato, il calamo aromatico, quella spezie di giunco angolare appellato Cipero, e la Zedoaria, e la confettura, o conserva di mele cotogne; e nel tempo, che le divisate sostanze verranno prese internamente, produrranno altresì ottimo beneficio, ed effetto le esterne applicazioni allo stomaco di balsami, ed impiastri stomacali.

Il fluor bianco, fluor albus. E' questo un' inconveniente, e disordine, che assai di rado inquietar suole le femmine pregnanti, massimamente se i mariti loro sieno persone oneste, e dabbene; ma allorchè trovansi queste da sì fatto incomodo inquietate, ella è cosa pressochè impossibile il liberarcele; avvegnachè le medicine catartiche, che dovrebbero per ottenere l'effetto prescrivere, non possono in verun conto permettersi alle Donne trovantisi in tale stato, vale a dire nel tempo, che trovansi col feto nel loro utero. In simigliante caso adunque potressi il fluor bianco ammansare, rettenere, e minorare coll' uso dei correttivi, dei depuranti, e dei carminativi. D' indole, e spezie sì fatta, ed acconcissima sono pertanto le infusioni delle erbe amare colla radice di pimpinella, colla balsamina, coll' abrotino, e co' fiori bianchi d'ortica secca: oppure tutti i divisati ingredienti potranno per acconcio modo ridurre in polvere, che potranno prendere dalla pregnante infusata dal fluor bianco in adeguata porzione di vino rosso asciutto.

Oltre ai malori, e sconcerti finora divisati sono le donne pregnanti sottoposte ad altri parecchi, i quali riconoscono meramente l'origine loro dal peso, e dalla compressione dell' utero. Di spezie, ed indole simigliante sono gli appresso:

Dolori nella region lombare, e nella schiena. Provano le povere donne incinte sì

fatti dolori massimamente negli ultimi mesi, allorchè il ventre loro è grandemente gonfiato, e proleso all' innanzi: in altre, nel periodo medesimo il ventre stesso trovasi addolorato, e mirasi in varie parti macchiato di rosso, non altramente, che fosse stato scottato. Simiglianti disordini vengono renduti peggiori da qualsivoglia sorta di moto, nè danno luogo ad alcuna spezie di cura, se non se seguito, che sia il parto, il quale dilegua incontinentemente, e per intiero tutto il dolore.

Tumori varicosi nelle gambe. Questi tumori sono simigliantemente nelle donne gravidie comunissimi, e sommamente molesti; e nelle donne d' abito flemmatico assai sovente trovansi di pari congiunti con dei tumori edematosi: nelle altre donne poi di diverso abito sopra essi varicosi tumori sogliono comparire delle macchie, e segni lividi, quali appunto esser sogliono quelle lividure, che veggionsi comparire sopra quei membri d' uno, che siasi ammaccato. Disordini somiglianti delle gambe accompagnano le donne pregnanti in tutti i tempi dal secondo mese, cioè, fino al tempo del Parto, e riconoscono l'origin loro unicamente dalla compressione, che fa l' utero sopra i vasi iliaco, o crurale. Questi se ne vanno sempremai, e dileguansi seguito che sia il Parto; ma in parecchie donne sannosi costantemente rivedere in cadauna loro gravidanza. In alcuni casi sono questi tumori così leggieri, che non debbonsi gran fatto avere in considerazione; ma in altri sono assai violenti, e sommamente penosi, ed affittivi; e questi secondi dovrannoosi dal savio Medico trattare nella guisa seguente.

Dovrannoosi far prendere all' incinta paziente una, od anche due fiate il giorno internamente le polveri comuni antispasmodiche; ed esternamente dovrannoosi loro prescrivere delle moderate fasciature usandovi i topici canforati, e le fregagioni adeguate. Qualora poi un sì fatto metodo non produca buono effetto, sperimenterassi immaneabilmente assai proficua, e giovevole un' unzione fatta d' acqua di calceina, d' olio di sambuco, e di Zuccherò di piombo; ed allorchè la donna da sì fatto malore infestata avrà partorito-

rorito, e che trovarsi fuori del suo puerperio, dovessi far uso di un' allacciatura soave tutt' all' intorno alle gambe, facendosi dalla nocca fino al ginocchio. Affine poi di frapportare un' impedimento ai divisi tumori per l'avvenire, sarebbe devotissimo nel principio della gravidanza il cavar sangue alla puerante, e dovrebbe aver l'occhio, che il suo ventre venisse costantemente mantenuto obbediente in una misura dievole, ed adeguata: ed è sempre cosa di malinna conseguenza, e momento, che la persona pregnant si ausi a starli a sedere sopra una seggiola alta; conciossiachè quelle basse seggiole, nelle quali amano d'ordinario le donne gravidie di starli adagiate, faccian sì, che il ventre venga molto più a gravitare, ed a premere sopra i vasi crurali, di quello altrimenti farebbe. Dovranno esse pregnant sfuggire parimente il molto esercizio.

Voglia di frequentemente urinare. La voglia d'urinare ad ogni momento inquieta bene spesso le donne pregnant; ma questo massimamente avviene con più frequenza verso la fine di lor gestazione, e singolarmente nelle ultime settimane: Se ciò avvenga assai per tempo, vale a dire, nei primi mesi della gravidanza, come non di rado suole accadere, è ciò dovuto al trovarsi la matrice sospesa troppo all'ingù, e ciò a motivo di una rilasatezza dei legamenti. Quello disordine non è di rea conseguenza, e perciò, quantunque sia fastidioso anzichè no, tuttavia dovrascelo la buona donna portare in pace, e con una santa pazienza, essendo sicura, che liberassene col suo sgravarsi.

Sogliono similmente non di rado accadere alle donne pregnant una stranguria, e delle temporarie soppressioni d'urina. In casi somiglianti dovrannole preferire le polveri di nitrò, e di cinabro da prendersi internamente, ed esternamente le le appicheranno ben calde dei cataplasmi di natura emolliente, fino a che cessi il disordine divisato.

Moroidi. Sogliono le moroidi nelle donne gravidie gonfiarsi bene spinto a segno, che assomiglianti ad una specie di verruche; e quello, che è assai più affittivo li è, che vengono accompagnate da un' acuto ardente dolore, ed alcune fiato da un' erosione ulcerosa, e nelle persone di un' abito ple-

torico sono un malanno, che dà sommo fastidio, inquietudine, e pena. Dovrassi pertanto curare questo non lieve male con preferire alle pazienti delle medicine nitrofe, ed altri attemperanti da prendersi per bocca; ed estremamente con appiccate l'*Unguentum linaria*, fatto appunto dell' erba appellata linaria, tagliata, e fatta ben ben bollire nel lardo. Sarà similmente un' ottimo medicamento topico un decotto, oppure un' estratto dell' erba detta Millefoglie.

Fra gl' incomodi, e disordini, che inquietar sogliono le donne pregnant non picciolo si è similmente quello del gonfiarsi loro i piedi. Si fatte gonfiezze, allorchè trovansi confinate nei piedi, oppure che son tali, che non s'estendono sopra il gionocchio, non danno gran fatto da pensare; ma queste salgono talvolta fino alla regione dell' addome, e lascianvi i sintomi di un' ascite; ma etandio in questo caso farà sempre miglior consiglio il non istuzzicare il tumore, e lasciarvelo stare fino al tempo del Parto; oppure al più al più tentare soltanto di mitigarlo, e d'ammansirlo, alleviandone i suoi sintomi, conciossiachè per curarlo vogliavvi de' medicamenti di un' indole sì fatta, che non posson per modo alcuno preferire alla pregnant con sicurezza. Forz'è, che la paziente schivi più, che le sia possibile lo starli in piedi, e poichè farassi lgravata, la cura si dovrà incamminare con i metodi comuni. Allorchè le donne nella loro gravidanza smagriscono grandemente, e divengono estremamente, ed assai dilegini, vien comunemente toccato con mano, la creatura, che hanno nel ventre, esser più nutrita, più vegeta, e più robusta. In questo caso la donna dovrebbe cibarsi di gelatine, e d'altre vivande grandemente nutrienti, e far picciolissimo moto, ed esercizio, schivando qualsivoglia fatica non meno corporale, che di spirito. Altre femmine gravidie per lo contrario soglion nel tempo di lor gestazione considerabilmente impinguare; e quelle partoris sogliono d'ordinario de' fanciulli più piccioli, di' legini, e magri. Quelle donne, che in questo tempo ingrassano a segno, che la loro carne le incomoda, e le è piuttosto di briga, dovrebbero farsi cavar sangue e mantenersi in un moderato esercizio, usare una dieta sottile,

M

tile,

vile, e di quando in quando dovrebbero prendere una leggerissima, e gentilissima dose della d'alcun medicamento rilassante.

Moltissime poi sono quelle femmine, le quali nelle loro gravidanze trovansi in estremo deboli, e sono grandemente soggette a deliqui, ed isfinimenti. Queste prender dovrebbero di tratto in tratto una leggiera soave dose d'alcuna medicina rilassante, e nei giorni di mezzo, dovrebbero far' uso de' medicamenti corroboranti, e stomachici, uniti ai carminativi d'indole più mite, e più benigna.

Uno sgravarsi delle acque troppo per tempo sempreminaccia un'aborto, od un parto immaturo, e fuor di tempo, ai quali sconcerti ci dovremo opporre colle medicine corroboranti di qualsivoglia specie. Parecchie donne nel tempo di loro gravidanza vengono inquietate da grosse macchie scure, o segatole nel collo non meno, che nella faccia. Queste sogliono massimamente infestare quelle donne, che sono di un'abito bilioso, e sono in alcune accompagnate queste macchie con una perpetua pallidezza, ed in altre con assai frequenti accessi di calore, e di rossori. Le buone donne sogliono a quelle tali applicare diversi rimedi; ma sarebbero assai meglio a lasciarle senza inquietarle, perchè e possono far del male, e la pregnant, che non ne riceve per allora che leggerissimo incomodo, è sicura di liberarsene tosto, che avrà partorito.

Il moto soverchio grande del Feto è un' inquietudine e disturbo non raro ad accadere nelle donne pregnant; ma questo è singolarmente dovuto ad esse stesse, ed è d'ordinario cagionato dalle violente passioni della Madre, e massimamente dalla collera: questo fenomeno potrà benissimo seguire eziandio dal tenerli l'addome soverchio riscaldato; e talora verrà di pari originato da alcuna indisposizione del feto medesimo. Se in caso similgiante debbono prescrivere medicamenti, è guoco forza, che questi sieno dell'indole attemperante, e tali, che vagliano ad atterare, ed a correggere l'acrimonia dei fuggi biliosi: potranno di pari applicare esternamente delle pittime nervine, e la madre più, che sia mai possibile, dovrà mantenere in uno stato placido, e tranquillo, non meno rispetto ai moti ed esercizi corporali, che per rapporto alle passioni dell'animo.

Il calcitrare della creaturina stanziente nell'utero è un incomodo sommamente frequente nei mesi ultimi della gravidanza, e nelle donne di complessione diligine, tenera, e delicata, ciò viene a cagionare dei lagrimenti, e soventi volte dei deliqui d'animo, e degli svenimenti. Certuni famosi a supporre, che ciò minacci un'aborto; ma ella si è quella opposizione affatto erronea, conciossiachè il feto non ha facilità, nè forza di contribuire al suo proprio parto. E' questo un sintoma, che altra medicina non ammette, salvo una rassegnata pazienza; ma diliguasi, e cessa totalmente prima del parto medesimo.

La debolezza del feto vien chiaramente conosciuta dal suo lento, e languido muoversi entro la matrice, ed assai volte dipende unicamente da una rea, e prava costituzione della Madre; e dal suo essere stata soventi volte soggetta a grandi paure, e violenti timori, od a sventure di momento rilevante. In questo caso faranno gran bene le medicine corroboranti prese internamente, ed esternamente con somma dicevolezza potranno applicare degl'impiastrici balsamici, ed aromatici.

Alcuna fiata le secondine si uniscono, e erefcono all'utero fuori del loro adeguato, e proprio ordine, e situazione. E' questo uno sconcerto, rispetto al quale noi non abbiamo che leggerissime opportunità di congetturare; ed è occasionato dal soverchio starsi la Madre adagiata durante l'ultima parte di sua gravidanza. Allorchè vi ha probabile, e giusto sospetto, questa esserne la cagione, i medicamenti interni non vi hanno alcun luogo, ed i topici esterni dovranno unicamente ristingersi al grasso d'animali bruti tenerissimi, oppure allo spirito divino impregnato d'oli d'anaei, o di carvi, co' quali topici dovrà bene spesso stropicciare il ventre dell' affetta donna pregnant.

Il cinto della corda ombilicale, o belliconchio intorno al collo dell'infante stanziente nel materno utero, è bene spesso un' accidente sommamente funesto, e sfortunato, e riesce in prova fatale al medesimo. Fannosi a credere le buone, e semplici donne, esser tale inconveniente dovuto allo stendersi, che fa la madre all'insù, ed allo stirare ed allungare, che fa talora le sue braccia sopra la propria testa vicino al tem-

po del suo parto; ma questa è un'opinione veramente ridicola, e propria delle ignoranti domnicciuole; e quella sventura non riconosce già la sua origine da un accidente subitaneo, ma è peravventura una malavventurata, e sinistra volata dello stesso belliconchio formatasi fin dal bel principio della gravidanza. Veggasi *Junker*, *Concept. Medic.* pag. 708. Veggasi l'Articolo PARTORIRE.

GRAVITA'. Il determinare con accuratezza la gravità specifica dei corpi è cosa, che richiede una cura veramente estrema, e la faccenda è soggetta a numero così grande di difficoltà, che non dobbiamo per conto alcuno rimanerci maravigliati, allora quando noi troviamo, che gli Autori, per grandi, ed eccellenti, che sieno, grandemente differiscono gli uni dagli altri. L'Autore più recente, e ad un tempo stesso il migliore, che noi abbiamo rispetto ad un tal particolare, si è il Dottore Riccardo Davies, la cui opera leggesi nelle *Trasfazioni nostre Filosofiche* sotto il num. 988. Ha questo valent'uomo con brigue, e stenti grandissimi, ed insieme con sommo giudizio, e durezza di mente raccolto le esperienze tutte di specie somigliante, le quali sono state fatte da i più elatti, diligenti, ed accurati Autori, facendo vedere quanto enormemente discordino infra loro, ed additandoci le ragioni, ed i motivi di loro così ampie differenze: e ci ha il medesimo somigliantemente somministrato le specifiche gravità di moltissime sostanze, tratte dalle sue proprie osservazioni, alle quali noi rimettiamo quelle persone, che vaghe sono di materie sì fatte. Veggansi le *Trasf. Filosof.* num. 988.

GRISOCOLLA. Grisocola, *Chrysocola* nella materia medica dei buoni Antichi è il nome d'una finissima polvere arenosa di color verde, massimamente una della saburra, che si rinviene in questi nostri tempi in moltissime parti del noto Mondo.

Ella si è d'un colore sommamente vago e grazioso, eccita una violentissima fermentazione coll'acqua forte, e da essa rimane intieramente disciolta, e la tinge d'un colore verde inclinato al pavonazzo; ma essendo calcinata, viene a perdere tutto il suo color verde nato.

Di presente trovasi nei lidi del Mar rosso, in quelli d'alcune parti dell'America,

e nella Russia; e quella, che s' nostri giorni si trova, possiede a capello tutte, e le medesime proprietà, delle quali fanno menzione, e che ad essa attribuiscono gli Antichi. Ella serve per seldar l'oro, e gli altri metalli, e presa per bocca è un Emetico violentissimo, e sommamente pericoloso. Veggasi *Hill*, *Istoria de' Fossili*, pag. 580.

La voce *Chrysocola*, Grisocola, era similgiamente un nome dato dagli Arabi antichi alla Gomma Ammoniacica dei Greci. L'interpretazione piana e naturale della voce *Chrysocola* si è colla d'oro; ed in un tal senso ella veniva usata per quella sostanza impiegata nelle saldature dell'oro, o per unire, e combangere insieme stabilmente dei pezzi, o lavori d'oro; ma ella vieni soltanto usata per esprimere un color d'oro, che possedeva le proprietà attaccaticce non altramente che la colla rispetto alla carta, sopra la quale veniva distesa. Ci dice Avicenna, che somigliante gomma veniva messa in opera per macchiare i libri e le carte, e che il colore ch'ella dava, era appunto un giallo dorato, che non ismariva giammai, e che per quanto altri facesse, non potevasi mai più rimuovere dalla carta con essa gomma inzavadata. Questa pertanto non è in verun conto la cosa medesima, che la nostra gomma ammoniacica. Ci parla Plinio di due specie d'Ammoniaco usata dai Greci antichi, una delle quali specie era fragile e pura, e l'altra faticcia, e piena di mondiglia. Egli è sommamente possibile, che la seconda specie di questo Ammoniaco, che è appunto quella specie, che chiamasi *phyrma*, sia la medesima cosa che l'Ammoniaco, ch'è di presente in uso; ma l'altra specie appellata *thrauston*, oppure *thrauston*, che era d'una color bruno rossiccio, e sommamente fragile, non sia tale. Si ingegna, ed arrabattasi il Neofiti per conciliare ambedue le diverse defezioni, e per farci credere, che ambedue esse fossero la sola nostra gomma ammoniacica in due stati differenti ad essa connaturali; ma il buon uomo non s'avvisa, che appunto mentre fa ciò, non si ricorda più, o pone in dimenticanza, che i caratteri distintivi del *thrauston* sono per modo diversi, che non possono per modo alcuno fare una cosa medesima co' nostri, ancorchè ambedue le specie, delle quali fanno menzione i Greci antichi, fossero le medesime; la qual cosa non

ha l'ombra menoma di probabilità.

GRISOLITO. E' questo il nome, col quale individuano i Moderni una gemma, cui gli Antichi addimandavano Topazio. I moderni gioiellieri tutti, e quelli di molte etadi innanzi ad essi eziandio, sonosi accordati nel denominar questa gemma Grisolito; ed il vero Grisolito degli Antichi, il quale guadagnossi la sua denominazione dal suo finissimo color giallo dorato, essi di presente addimandano universalmente l'Opazio.

Il Grisolito de' nostri tempi, vale a dire, il Topazio degli Antichi, è eziandio nello stato suo il più puro, ed il più perfetto, una gemma d'una mezzanissima bellezza, e d'un valore non gran fatto prezabile. Trovasi in varie grossezze, ed alcuni de' pezzi più grezzi di essa gemma sono grandemente più grossi di quelli di qualsivoglia altra gemma, che possa trovarsi. La grossezza però più frequente, e solita comunemente a trovarsi, allorchè i Grisoliti son perfetti, e senza pecca, non eccede il volume d'una noce moscada. Quella gemma trovasi di figure sommamente varie, ma non mai della forma di colonna, nè delle solite figure del cristallo. In alcuni luoghi trovasi picciola, od in picciole tondeggianti masse similanti alle pietruzze dei greti de' fiumi: in altri luoghi poi vengono universalmente trovate bislunghe e piatte, e sono sempre mai d'una superficie ruvida, e molto meno brillante di qualsivoglia altra delle gemme native. Il suo colore è un verde languido, e smorto, con una dilavata mescolanza di giallo pallido: queste differenti ombre, o tinte in diverse mostre di Grisoliti sono in vario grado, vale a dire più o meno piene, più o meno languide; ma il colore assai comune di questa gemma è quello d'oliva acerba, o non matura, con un'ombra di color di rama framschiantesi per entro il color pieno; e talvolta è quell'ombra framschianta d'un verde pallido cupo, oscurato da una mescolanza di scuro, e con una leggerissima tinta del medesimo color giallo di rame. Questa gemma è grandemente più tenera di qualsivoglia altra delle gemme pellucide; conciossiachè i pezzi di Grisolito i più perfetti, ed i più fini non sieno niente più duri del cristallo; ed i pezzi più rozzi, e più ordinari sono assai più morbidi del cristallo medesimo: prende però questa gemma un ottimo pulimento, ed in alcune mostre del-

la specie più perfetta, e più fina fanno anche i grisoliti una non dispregevole comparfa, tuttochè sieno sempre grandemente inferiori a tutte le altre gemme. Veggasi *Hist.* Istoria de' Fossili, pag. 398.

I nostri gioiellieri non curano gran fatto d'aver appurata certezza di questa gemma; ed in vece d'avere due, o tre distinti nomi per esprimerne le sue diversità, siccome gli hanno per le altre gemme tutte, assaiissime siate si contentano di chiamare il Grisolito *Pragio*, e fra essi gioiellieri, i meno diligenti bene spesso addimandano il grisolito un *Grifoprasio*.

Trovasi il Grisolito nella Nuova Spagna, ed in parecchie parti dell'Europa altresi, come nella Slesia, nella Boemia ec. I Grisoliti Americani però sono assai superiori agli Europei, ma d'ordinario son piccioli. Quei di Boemia sono assai grossi; ma radi fra essi son quelli, che abbiano buon colore, e che non vengano bruciati da qualche macchia, od altro difetto.

GROTTA. La tanto famosa, e celebrata grotta de' nostri propri paesi conosciuta nel mondo sotto il nome di *Oakey Hole*, Tana d'Oakey, giace nel fianco risguardante mezzodì delle Colline di Mendip dentro un tratto di miglio fra Wells. L'imboccatura di questa grotta trovasi nell'anelinare delle divise colline, che è tutto fasciato, e circondato di rupi, ed in vicinanza di sé ha una dirupatissima, e sommamente precipitosa calata di un'altezza di presso a settantadue piedi, nella cui sommità forgonvi perpetuamente delle polle d'acqua, che vengono a produrre una corrente, o sgorgo d'aque sommamente considerabile. Gli scogli, o rupi nude intorno intorno alla divinata imboccatura s'innalzano sopra essa pel tratto di circa ecoto ottanta piedi; e tutta la falata, od erta del colle al di sopra stendesi un miglio in circa, ed è sommamente dirupata, e scoscesa. Come altri va passando entro questa volta, alla bella prima cammina sopra un suolo livellato, ma via via, che vassi inoltrando, trova il sentiero tutto dirupato, scosceso, e disuguale, di modo che alcuna fiata gli convien salire, alcun'altra calare. La volta di questa terribile caverna nella sua parte più elevata alzasi oltre quaranta otto piedi dal pian terreno, ma in parecchi luoghi particolari è bassa a segno, che

che è giuoco forza a colui, che vi si è intanato, il esaminarvi" carpone. L'ampiezza della grotta medesima non è meno varia di quel' o sialo la sua altezza; avvegnachè in alcuni siti ella sia larga trenta, o trentalei piedi, ed in altri niente più di sei, o di dodici piedi. La sua lunghezza, o sia tutto il suo cavernoso tratto si stende altre dugento pertiche Inglesi. La gente, che va a vederla, prende quivi entro moltissime pietre ivi trovantisi, le quali rappresentano in qualche forma figura d'uomini, di donne, e d'altre cose varie; ma in queste pietre non vi ha cosa da essere gran fatto considerata, avvegnachè altro non sieno, che confuse masse di spalto comune. Nella più dilungata o più remota parte della caverna havvi una corrente d'acqua. che stendesi poi per un miglio, scorrendo lungo un lato della caverna medesima, e che alla perfine esca, e precipita giù oltre la scesa di quaranta piedi, rompendosi infra i dirupi, ed ora montando, ora calando fra le disuguaglianze, e per gli andirivieri dei dirupi medesimi viene alla perfine a metter foce, ed a scaricarsi in un' ampia vallata.

Il fiume, che scorre entro la caverna è abitato da copia grande d'anguille, e stanziarvi eziandio, sebbene in minor numero astai, delle ottime Trote; e quelli pesci non possono u'cire, e portarsi coll'acqua fuori del letto del divisato fiume cavernoso, avvegnachè presso l'imboccatura abbiavi una così grande, ed enorme discesa. Nelle Estati, che corrono assai asciutte, veggionsi in prodigioso numero per tutto il tratto della caverna, e per fino nella parte di essa più dilungata, delle torme di granocchi; e nella volta della grotta medesima infinito numero di pipistrelli attaccati, non altramente che in tutte le altre caverne, l'imboccature delle quali, o trovansi a livello, o ben poco ascendenti, o discendenti; ed eziandio in quelle, che sono più perpendicolari, trovansene alcuna fiata, purchè non sieno soverchio anguste, e che sieno sufficientemente alte. Quel bestiame, che va a pascolarsi per quelle pasture, per le quali il divisato fiume cavernoso passa, è stato osservato, come si muore immediatamente dopo essersi pasciato; e somigliante sventura è sommamente probabile, che venga cagionata dalle acque, le quali, o per acci-

dente, o di loro natura vengano ad essere impregnate di miniera di piombo. Veggansi le Osservazioni Filosof. n.º. 2. pag. 2.

Nelle nostre Filosofiche Trasfrazioni, (a) noi abbiamo un' Istoria di una Grotta sotterranea trovantisi in vicinanza di Werodale a venti miglia in circa del Mezzodì occidentale di Newcastle, Castelnauovo. L'entrata di quella grotta si è un picciolo, ed angustissimo nel fianco di un' assai vasta montagna: quindi altri trovasi, intanato, che vi si sia, entro un' assai spaziosa cavità tutta concamrata di mura, e di colonne d'acque discendenti petrificate. La cavità inoltrasi, e si stende assai più di quello alcuno abbia tentato di scoprire; avvegnachè la tenebrosissima oscurità di queste caverne voglia l'aiuto delle torce, e queste assai fiato vengono spente dall'acqua, che gronda giù dalla volta. (a) Vegg. le *Transf. Filosof.* n. 480. pag. 223.

GROTTA. Un cemento per le grotte artificiali può procurarsi nella seguente maniera: Prenderai due porzioni di raggia, o resina bianca, la l'uglierai ben bene ripurgandola; e ad essa aggiungerai quattro porzioni di cera vergine d'alveare: quando quelle due sostanze saranno l'ugliate insieme, v'aggiungerai due, o tre porzioni della polvere di quella, pietra, che avrai destinato pel cemento, oppure quella porzione d'essa polvere, che venga a dare al cemento diviatato il colore della pietra medesima: a tutta quella massa andrai aggiungendo una porzione di fiori di Zolfo; procurerai, che tutte queste sostanze per mezzo d'un fuoco mezzanamente attivo s'incorporino ben bene insieme, e poscia le andrai intridendo colle tue mani, ed impastando con dell'acqua calda. Col descritto cemento, le pietre, le conchiglie, e qualsivoglia altra sostanza somigliante, dopo che saranno state prima ben bene asciutte al fuoco, potranno essere attaccate, o cementate. Veggasi *Smith, Laboratorio*, pag. 169.

I rami di corallo rosso artificiale per decorarne, ed abbellirne le grotte, potranno procurare nell'appresso gu' fa: Prenderai della raggia, o resina ben purgata, la liquefarai in una padella, o romajolo di rame: a cadauna oncia di questa raggia v'andrà aggiungendo due dramme di vermiglio, o color rosso acceso finissimo: quando avrai ben ben dimenato insieme queste due sostanze, e che

che avrai preparate le sue mazze, e rami ben bene scorzati, e seccati, prenderai un pennello, ed inzavarderai per ogni lato i rami medesimi in guisa adeguata, ed uguale fino a che la descritta composizione è ben calda; e dopo darai a questi rami la forma, e configurazione del corallo naturale, sicchè perfettamente lo imitino. Fatto questo, terrai sospesi i rami preparati nella divisata guisa sopra un gentilissimo fuoco di carboni, o bragie accese, fino a tanto che vengano la lor superficie ad appianarsi, ed a divenir lisce e lucenti non altramente che fossero stati ridotti a polimento.

Nella maniera medesima può similgiamente prepararsi il corallo bianco, col piombo bianco, ed il corallo nero per mezzo della raga nera.

Può altri con leggiera spesa fabbricarsi una grotta di vetri, di ceneri, di pietruzze, di grossi pezzi di pietre focaje, di nicchi, di muschio, di sassi, di coralli contraffatti, di pezzi di gesso, e somiglianti, tutto ammassando, e lasciando insieme per mezzo del pur'or descritto cemento.

GUANCIA. Le ferite delle guance, se sieno piccole, e leggere, possono curarsi per mezzo della cucitura secca; ma in evento, che elle sieno molto grandi, e dilatate, richiederanno una cucitura sanguigna a fine di poter riunire insieme le labbra della ferita medesima; ed allora con somma agevolezza, e felicità verranno a rammarginarsi con gli usati balsami da ferite. Ma s'egli avvenga, che sia rimasto ferito uno de' condotti salivari dello Stenone nel suo passaggio, che s'incrocia nella guancia dalla glandula parotide, verrà impedita in tal caso, e trasformata la cura dal costante sporgo della saliva nella ferita, fino a tanto che il condotto diviso non venga forato nella parte interna della guancia medesima, affine di dare un passaggio alla saliva entro la bocca. Simigliante metodo ci vien proposto dal Cheselden nella sua Anatomia. Veggasi l'*Esistere*, Chirurgia, pag. 81.

GUERRA. Cavallo da Guerra. Le proprie, ed acconce regole per isteglierne un Cavallo per servizio della guerra sono le appresso: Per primieramente di mestieri, che l'animale sia alto di statura; che abbia una testa gentile, e il fronte rigonfiante, o sporgente all'infuori. I suoi occhi dovranno essere vivacissimi, e sfavillanti, e la parte bianca de' medesimi tutta coperta dalle ciglia.

Le sue orecchie dovranno esser picciole, fottili, corte, e aguzzate; eppure, se quelle sieno lunghe, dovranno esser tali, che il cavallo le muova con somma agevolezza, e che sieno ben portate. Il suo collo dovrà essere affondato, ed il suo petto ampio, e rigonfiato. Le costole inclinate, la spina del groppone dilatata, e ben tirata, e le chiappe piene, e tondeggiate. La coda sarà ampia, ed alta, e non lo verchio satteicea e spessa, nè troppo lottile, e rada, la colcia rigonfiante, la gamba larga, e piatta, ed il garreto assai corto. Allorchè avrai scelto un cavallo avente tutte le prerogative divise, ti converrà mantenerlo e conservarlo molto ben pasciuto durante tutto il tempo, che lo andrai ammassando, affinchè possa essere pieno di vigore. Il suo cibo forz'è che sia sieno ottimo odorosissimo, ed ottima vena ben purgata dalle mondiglie, oppure due porzioni di vena, ed una porzione di fave, o di piselli, che sieno ben bene asciutti, ed interamente induriti. La quantità di questa biada vorrebbe' essere un quartiere per la mattina, e la quantità medesima non meno a colazione, o desinare, che a cena la sera. Ne' suoi giorni di riposo dovrà essere inellato, ed imbrigliato fra le cinque, e le sei ore della mattina, ed adeguato verso le sette, o le otto. La sera dovrà essere imbrigliato, ed inellato alle quattre ore, ed abbeverato verso le cinque; e sia ordinamente di mestieri, che dopo l'abbeveramento sia fatto costantemente pascolare; converrà poi che sia messo alla mangiatoja, ed al suo stallo col suo pagliariccio lott'esso accomodato verso le otto della sera, ed allora fàj' mestieri il preparargli il cibo per tutta l'intera notte. Quella notte innanzi, che dovrai poi la mattina cavalcare, intorno alle nove ore dovrai flegli levar dinanzi tutto il fieno, che ha nella mangiatoja; e farà di mestieri il dargli una manciata, o due di vena verso le quattre ore della mattina; e quando avrà mangiato queste manciate di biada, dovrai flegli porre il morio, e dovrai ben bene stropicciare con un drappo asciutto; e ciò fatto dovrà inellarsi, e porsi in assetto pel suo esercizio. Allorchè avrà fatto questo, se gli dovrà levar di dosso la sella, e dovrai ben bene asciugare, e stropicciare con pezzo di panno ben asciutto; e ciò fatto, dovrai flegli porre indosso il copertone, e dovrai far camminare attor-

no gentilmente fino a che venga bel bello a rinfrescarsi. Dopo che sarà rinfrescato, converrà lasciarlo stare in piedi senza alcuna sorta di cibo pel tratto di due o tre ore, passate le quali bisognerà abbiadarlo; e nel dì seguente bisognerà ripulirlo, stropicciarlo, e governarlo nella maniera stessa del dì innanzi, ed abbeverarlo alla foggia comune.

GUIDALESCO. Per quella voce intendesi quella parte d'un cavallo, ove termina l'affilatura dei crini del collo, ch'è congiunta ad esso, e che termina nella punta della paletta della spalla.

Queste divise parti dovebbon'essere ben rialzate, e fortissime, avvegnachè sia questo un segno univoco di forza, e di bontà, e vigore in un cavallo. Queste parti impediscono, che la sella s'abbrucioli all'innanzi sopra le spalle, e verso il collo del cavallo, lo che viene immediatamente a spellarlo, ed a scorticarlo; che perciò i Fiorentini queste particolari scorticature per acconcio modo addimandano guidaleschi. Un male o danneggiamento fatto in questa data parte del cavallo, riesce sommamente disfacile, e malagevolissimo a risanarsi, e per per questa ragione appunto sarebbe sempre desiderabile, che nella divisa parte il cavallo fosse piuttosto magro, che carnofo; avvegnachè essendo magre son sempre meno soggette le parti medesime ad essere intaccate e danneggiate dalla sella.

Allorchè nel guidaleseo sentesi il cavallo addolorato, fa di mestieri l'esaminar bene, ed attentamente la cagione del male, affine di determinarne la cura appropriata, e per impedirne la recidiva. Se il male venga cagionato dalle soverchie grosse bande della sella, purchè il male non sia eccedentemente grande, la cura dovrà farsi nella seguente maniera, e coll'appresso agevolissimo, e pianissimo rimedio: = Prenderai le chiare di sei uova: le andrai sbattendo insieme con un pezzo di allume per un buon quarto d'ora, oppure fino a tanto che quella materia sia tutta divenuta una ben fissa schiuma: ciò fatto, andrai ben bene stropicciando la parte gonfiata, ed indolentata colla divisa mistura; e dopo la stropicciatura, andrai cuoprendo la parte con buona porzione della schiuma, o chiarata medesima. Questa la lascerai sopra la parte fino a che vi si seccati; e si fatta applicazione topica l'andrai rinnovando sopra la parte, e ripetendo ogni

dodici ore: tuttochè la gonfiezza, e l'incallimento della parte rimanga, nulladimeno a poco a poco, e gradatamente andrà cedendo, tuttochè sembri alla bella prima, che non diminuisca.

Se il male poi sia grandemente considerabile, sarà giuoco forza il ricorrere alla cavata del sangue, la quale converrà anche ripetere indi a due giorni, qualora seguiti a far testa la gonfiezza, e l'infiammazione.

In evento, che uno scorticamento fatto dalla sella venga seguito da un tumore non distinto da una grande infiammazione, dovrassi lavare, e stropicciare la parte inferma con dell'acqua di calceina, e poscia converrà coprire con una pelle d'agnello tutta la parte fino al collo dal lato lanoso della pelle medesima. Dopo la divisa lavanda, dovrassi applicare alla parte stessa quell'unguento ben conosciuto da i Manescali sotto il nome d'unguento del Duca; ed in evento, che il tumore tenda alla suppurazione, farà di mestieri il lavar via l'unguento diviso con una mescolanza d'aceto, e d'acqua calda, ad ogni quartuccio d'ella mescolanza aggiungendo un pugno di sal comune: ciò eseguito, dovrassi procurare un altro unguento composto d'una mezza libbra di populeon, e d'un quarto di libbra di sapone nero, e d'altrrettanta quantità di miele. Questa mescolanza dovrassi affortigiare dentro un ben capace vaso di vetro con dello spirito di vino, e la parte affetta dovrassi bagnare e stropicciare con una adeguata porzione di quella mistura tre o quattro volte il giorno, e coprirla dopo sempramai con una pelle d'agnello dalla parte lanosa. Certuni, in vece del diviso unguento, sogliono mettere in opera certa farinata fatta di polvere di semi di comino, d'olio di semi di lino, e di sterco di piccione, che, a vero dire, riesce a maraviglia bene.

GUSCIO. I gusci, o dir gli vogliam custodie, a calici dei fiori delle piante, non sono riguardati, e considerati per rapporto alle facilità, e virtù loro medicinali, come si meriterebbono. Monsieur Petiver nelle nostre Filosofiche Transazioni, in ragionando delle virtù della Classe verticata delle Pianta, entro la quale racchiudonsi la salvia, il ramerino, e simiglianti piante, falli ad osservare, essere un'opinione falsa, ed erronea, tuttochè generalissima, che i fiori delle additate piante contengano le prin-

principali virtù delle medesime, e che i gulci d'essi fiori sono quella parte speciale nella quale stanziano le virtù divise. A cagion d'esempio nel ramerino, il finissimo odore dell'acqua della Regina d'Ungheria non stanza nei fiori di questa pianta, ma bensì nei gulci, o coperta, o calice d'essi fiori; ed i soli fiori allorchè sono staccati, e nettati del loro guscio, somministrano alla prova pochissimo, e languidissimo odore. Il calore in questa non meno, che nelle altre piante della Classe medesima, è la sola parte, in cui stanziano le loro qualità viscosa, e sulfurea, e che alcuna porzione di materie di specie fomi-gliante venga realmente depositata in quella parte particolare, puoli distintissimamente conoscere col toccarla, e coll'odorarla; avvegnachè queste dalle parti appariscono umide, e sentonsi attaccatice, e viscoso; e si fatta viscosa materia, allorchè vien a riceverli fra le dita è di un'acutissimo, ma insieme gravissimo odore, e ciò in un grado sommamente superiore a qualsivoglia altra parte della medesima pianta.

GUSTO. *Sapore.* E' questo uno dei caratteri infinitamente ovvi dei corpi, e dalla qualità del quale debbi far giudizio, e giudizio prestochè accertato dell'indole, e della natura di moltissime sostanze. Il valentissimo Dottore Abercromby in un Trattato in parte disteso intorno a questo soggetto, è colle sue dotte, e giudiciose Osservazioni andato tanto innanzi, che ha potuto fissare una serie di Regole per formar giudizio sano di qualsivoglia Pianta, o di qualunque altro corpo, senza conoscere ciò, che esso siasi, unicamente dal suo gusto, o sapore, per rapporto alle sue virtù, e facoltà medicinali.

Per giudicare di ciò, che egli s'intende espressamente per i nomi di parecchi gusti, e sapori, sarà sommamente dicevole l'aggiugner qui la lista de' nomi medesimi con alcune di quelle cose, alle quali vengono applicati.

Le Pianta, i frutti, &c. o sono agri, come l'acetosa comune, od aspri, e luzzi, come la nespola, austeri, o ruvidi, come a mela corogna, dolci come il fugo fresco dell'uve mature, grassi, od oleosi, come il sisamo altramente appellato guggiulena, amari, come la genziana, od il cocomero salivatico, salsi, come il sal comune,

bruschi, come l'aglio, o finalmente insipidi, come la Zucca, oppure d'un miscuglio di sapori risultanti da due, od anche da più dei divisi finora.

Le sostanze aspre, od acerbe son fredde, repellenti, e leganti, e dure a concuocersi, e tutt'esse posson benissimo conoscersi col porle sulla lingua, dal contrarre, od inaridir che fanno la medesima. Le cose austere, o ruvide, differiscono dalle aspre, od acerbe soltanto rispetto al grado, come quelle, che sono alcun poco più miti nel gusto, e più deboli, e più languide in rapporto alle loro virtù.

Le sostanze agre, od acide sono sempre, e costantemente refrigeranti; ma quella loro facoltà non è soverchio eccedente, a motivo delle loro parti penetranti. Questo sapore vien conosciuto da un'azione mordace, che produce sopra la lingua, ma senza eccitare il menomo calore. Le sostanze dolci sono tutte nutritive; e se noi prenderemo la voce nel suo proprio, ed adeguato senso, noi vedremo, che significano soltanto questo. La loro dolcezza nasce unicamente dal loro non riuscire alla lingua nè soverchio calde, nè soverchio fredde.

Le sostanze grasse sono mezzanamente calorose, e per tal ragione, tutt'esse in alcun grado umettano, e rilassano; ma ei pari intasano, ed ostruiscono. Elleno son distinte dalle cose dolci pel loro ingombrare, e, come avviene, pel loro ugnere la lingua, senza produrre nel nostro organo quella sensazione piacevole, e gustosa, che le altre producono.

Le sostanze salate sono astringenti, ed insieme detergenti, qualità, cui esse riconoscono dalla loro parte ferrea, e l'altra dalla loro parte acquosa.

Le cose amare esser possono di vantaggio, e di beneficio sommo allo stomaco; ma somministrate disaccociamente e nei casi incoerenti possono di pari far male grandissimo. Gli amari pungenti, quale appunto si è l'Elaticeo, o cocomero salivatico, riescono, e sono tutti pregiudiziali, e dannosi, qualora non vengano rettificati, e renduti sicuri per altri mezzi.

Le sostanze brucche, od agre son calde, e bene spesso pregiudiziali alla testa; ma son sempre ottime nei temperamenti pesanti, e stematici, e quelle conosconsi dal calore, che producono nella bocca.

Uti-

Ultimamente, le sostanze insipide in generale non hanno qualità alcuna particolare, ma sono fredde, ed acquose. Queste sostanze sono d'ordinario dannose allo stomaco, qualora esse non vengano mescolate con sostanze calorose, ed aromatiche. Veggasi *Abercromb. Nov. Medic. Clavis.*

Viene osservato dal dottissimo Signor Giovanni Floyer, come il gusto, o sapore è per noi un così buon giudice, che per mezzo d'esso solo possiamo distinguere egregiamente bene, e rintracciare nelle Pianta tutti i loro principi, ed elementi chimici prima della distillazione d'esse Pianta. Tutte le piante acquose mostrano e fanno conoscere la loro flemma, non meno coll'assaporarle, che col distillarle; ed in tutti i legni asciutti il gusto viene a svelarci la terra, che in essi contesi in quella guisa medesima, che per mezzo d'una Chimica analisi. Dal sapore mucilaginoso, e gommoso, e per via d'una oleosità manifesta in alcune Pianta, noi venghiamo a distinguere a meraviglia l'oleosa parte in esse predominante, non altramente, che far si possa per via d'una storia chimica. L'odorato ci aiuta di pari assai per fare un giudizio esemplare, ed istantaneo delle Pianta; e noi siamo valevolissimi a dichiarare col semplicemente intaccarle, che tutte le Pianta aromatiche, e tutte le Pianta fetenti eziandio, contengono porzione abbondevolissima di un olio volatile, e d'un sale. Dall'acrimonia, e dalla qualità pungente noi venghiamo ad essere con certezza assicurati, nelle Pianta avervi un sale volatile: e dal sapore abbruggiante d'altre Pianta, noi tocchiamo con mano, che in esse Pianta vi ha un sale d'indole corrosiva, e caustica. Da una cruda, e ruvida acidità, venghiamo a distinguere il tartaro, o dire lo vogliamo sale essenziale delle Pianta medesime in esse contenuto in copia grande, e predominante; ma in evento, che la divisa acidità sia di un odore vinoso, noi osserviamo, ch'ella si è d'un mezzano stato di digestione, e puossi a buona equità appellare un tartaro vinoso, e distinto, e tutt'altro dal primo; ma se il tartaro abbia un odore pungente, in tal caso egli si è evidentemente un tartaro volatile, oppure un tartaro acido acre.

I gusti, e sapori dolci nelle Pianta sono in numero assai più copioso, e fra essi di

Suppl. Tom. III.

verificano anche assai più di quelli d'qualsivoglia altra specie. Mostrano questi in generale, e fanno conoscere il loro olio per mezzo di loro limacciola morbidezza, ed il tartaro loro farsi evidente nel loro Estratti, come egli si è evidentissimo, e pianissimo nel fugo comune di liquiritia.

Le erbe dolci, quale appunto si è la gramigna, e fomigianti, posseggono porzione grande di sale essenziale, ed una mezzana parte d'olio; ed i giunchi, le canne, la coda di cavallo, e la coda di gatto, sono di pari tutte dolci, ed insieme ruvide. Alcune di quest'erbe posseggono maggior copia d'olio, ed altre più copiosa quantità d'acido; è quell'erbe, che fra esse sono molto erude posseggono più olio, che tartaro. I grani dolci, come l'orzo, il tifo, il frumento, la vena, il miglio, la segale posseggono buona porzione di sale essenziale, e picciolissima parte di sal volatile; quindi è, che il pane preparato di qualsivoglia dei divisi grani, somministra nell'analisi olio, sale essenziale, e sal volatile.

Dee in questo luogo osservarsi, come la fermentazione, ed il fuoco produce parecchie fiato un sal volatile, il quale non avevavi prima, e ciò per via di fertilizzare, e di volatizzare il sale essenziale; e la melmosa masticatoria nel grano ci somministra l'olio. Il caprifoglio, e la specie della scorzonera posseggono gli elementi, e principi medesimi, che le erbe, vale a dire, buona porzione d'olio, e di sale essenziale. I subacri dolci, come i saperonzoli, le campanule, la stachela, e fomigianti, contengono gran porzione d'olio, e di sale essenziale, ma in queste particolari Pianta fa toccar con mano l'acrimonia loro, come esse posseggono similmente un sale volatile, e questo non in picciola quantità, tuttochè nè il Lemery, nè gli altri Scrittori delle cose Chimiche non abbiano ciò osservato. La sece, il polipodio, e tutta quella classe di Pianta, contengono copiosa quantità d'olio, e di sale essenziale; ma i Chimici in generale hanno trascurato di far parola d'un principio, od elemento acre in queste Pianta particolari stanziate, che ci dà certo avviso d'un sale volatile in esse contenuto: come altresì quella fragranza, che viene osservata in alcune specie di scolopendria, ci somministra di pari una accertata prova di un sale volatile, e di un

N olio

olio similmente volatile, quantunque finora ciò non sia stato dagli Autori avvertito.

Tutti i legumi limacciosi dolci posseggono maggior porzione d'olio, che di tartaro, ma tutt'essi contengono copia abbondantissima d'entrambi questi elementi. Le fave, i piselli, e le lenti, hanno similmente un sale volatile, siccome lo possiede di pari quello strao frutto, che vien mangiato dalla gente nella Russia, ed in alcuni altri luoghi, che da certuni viene denominato *Lenticula aquatica*, ma dai dotti Scrittori Botanici addimadasi *Tribulus aquaticus*; avvegnachè l'altra denominazione appartenga a quell'erba detta volgarmente *Anitrina* comune. I legumi aroma-

tici, quale si è, a cagion d'esempio, il melioto, posseggono un'olio esaltato, ed un sale volatile. Il Succamele viene asserito dal Lemery non meco, che da altri Chimici, che possiede soltato un sale essenziale, ed un'olio; ma siccome vi si scorge un sapore in grado eminente aromatico, ed insieme una grande acrimonia, forz'è che oltre ai divisati elementi, chechè pretendasi il Lemery, e gli altri Chimici, possiega eziandio un sale volatile.

Vi sono alcuni pochi esempi, fuori di un'ampissimo numero dall'Autore recitato, pel quale noi rimettiamo il nostro leggitor alla stampa medesima esistente sotto il Numero 280. delle nostre Traduzioni. Vegg. *Tranf. Filosof. N. 299. pag. 1160.*



H

HEC

HECTICA febris. La febbre ettica. I sintomi di quella rea infermità a distinzione di quelli della febbre lenta, la quale bene spesso viene pravamante con quella confusa, sono i seguenti:

Un perpetuo aridore abbrugiato, o scottante nelle carni, il quale si fa grandemente sensibile nelle mani dopo, che il paziente ha mangiato: un polso debole, basso, e vivace: un'orina di color d'arancia carico, coo una posatura rosso-pallida, avente nella sua superficie una pellicola sottile, untuosa, e tramandante un'odore acuto, e gagliardo: un'abito di corpo languido, ed un'appetenza particolare a qualsivoglia vivanda fredda: un'aridità delle fauci, con una perpetua sete, ed uno sputo spumoso, e coloso, ed un dormire disagiato, e scomposto, che non arreca il menomissimo sollievo, e rinfrancamento al paziente: una successiva emacrazione continuata di tutto il corpo, una perdita di forze, un languor di spirito, un peso, ed insieme dolore in uno degl'ipocondri: una sensibilità considerabile in tutti i cambiamenti della stagione i più leggieri, e presto che insensibili; ed un continuo peggioramento nei cambiamenti maggiori, che avvengono negli Equinozi: un vertiginoso capogiro, e sonnacchiolo nella testa, allorchè il paziente s'alza sul letto a sedere, od in altra guisa; e negli ultimi periodi della fatale infermità dei sudori colliquativi; ed ultimamente, la trista scena viene ad esser chiusa, e condotta a termine da una diarrea, e da una faccia ipocratica, la quale io niun'altra malattia scorgessi tanto manifestamente, quanto in quella, ed un totale consumamento. La tosse, com'altri peravventura si farebbe a credere, non è una conseguenza necessaria della febbre Ettica, ma d'ordinario suole accompagnarla, ed ha sua origine da alcuna cagione congiunta. Veggasi Junter, Conspect. Medic. pag. 388.

Perseone soggette alla febbre Ettica. Gli

HEC

uomini sono grandemente più soggetti alla febbre Ettica, che le femmine; e fra questi massimamente coloro, i quali sono d'una costituzione tenera, e di un abito asciutto, e che sono violentemente portati alle passioni, che trattansi con soverchia levità, che si cibano di vivande soverchio condite, che bevono in copia vini generosi, od altri gagliardi, e potenti liquori; come altresì quei tali, che hanno spoliato, e consumato le forze loro, e gli sfiniti a forza di violenti, e trasmodati esercizi, colle eccedenti veglie, coll'eccessiva continuata applicazione agli studj, od in un perpetuo profondo pensare, o per mancanza d'adeguato nutrimento, per trasmodato travaglio venereo, o finalmente pel soverchio continuato uso di avvallare potenti catartiche medicioe. Precipitano similmente in sì brutta infermità bene spesso le persone a cagione di trasfasciare le abituali cavate di sangue, od altre evacuazioni, ed a motivo di farsi troncare le abituali scariche di sangue dalle vene moroidali, o da altra strada con prendere delle medicine astringenti: ma più che in qualunque altra maniera cader sogliono in sì fatto fatalissimo male quelle persone, che sono ilate per disaccordo, ed improprio modo trattate nelle febbri; ed è certo, che similmente prava, ed impropria medicatura è più valevole a far divenire una persona ettica, di quello lo sieno tutte le altre divise cagioni unite insieme; e massimamente per la prava medicatura delle febbri intermittenti.

Prognostici in questo male. Allorchè uno è Ettico confermato, e che ha indosso tal brutta malattia da qualche tempo, ella è cosa affatto inutile, e vana il tentarne la guarigione, avvegnachè qualora sia efulcerata una delle viscere, la Natura tenderà sempre mai, ed incamminerassi verso quella febbre per procurare di detergere la viscera medesima intaccata; e siccome non puossi per modo alcuno dilungare la cagione, co-

è impossibile, che il sintoma pieghi la testa, e ceda. Veggasi *Junker*, *Conspect. Medic.* pag. 387.

Tutto quello, che altri può promettergli in simiglianti casi dalla Medicina, si è il mitigare, ed il rendere meno tristi i sintomi, e di tirare il fatal periodo più in lungo di quello farebbe esito, e prolungato naturalmente. Le persone assai fresche d'età, e negli anni loro più verdi vengono con maggiore speditezza, ed in tratto di tempo più corto distrutti dalle febbri Etiche, e sono a il fatto malore assai più sottoposte di quello sienovi le persone già avanzate in età. Quindi le età dai diciotto, ai trentacinque anni, possono essere a buona equità stabilite pel periodo dell'umana vita grandemente soggetta al pericolo di questa fatalissima infermità; e d'ordinario entro questi periodi il male giunge presto a terminare il suo corpo, ed a distrugger l'uomo; ed in quelle persone, che dopo questo tempo vengono a cadervi, il male diventa cronico, e portando addosso per lungo tratto di tempo. I cambiamenti delle stagioni sono punti di tempo sommamente pericolosi per le persone ettiche, ma più di tutto nell'equinozio Autunnale, e negli anni climaterici. Quei giovani, che vengono dall'Eritrìa assaliti nell'apparire di Primavera, si muojono per lo più nel seguente Autunno; e quelli, che vengono dalla medesima soprapresi nel solstizio estivo, soglion vivere d'ordinario fino alla nuova stagione medesima dell'anno seguente. Se negli ultimi periodi di questo male s'allesi vedere una scarica di sangue dalle vene moroidali, la persona morirà aliai prima di quello avrebbe fatto: ma per lo contrario se un fenomeno somigliante comparisse nel principio della malattia, sarebbe fortuna somma del paziente; conciossiachè quella sola scarica di sangue per quei vasi più e più volte ha fortunatamente prodotto la total guarigione.

Metodo del Trattamento. Gli umori viscidii, e collosi raccolti nelle prime vie debbono essere assottigiti per mezzo del tartaro vetriolato, e dei sali neutri, ed il ventre dovrà esser mantenuto soavemente obbediente, ed aperto con dei clisteri, e con delle dolerelle di manna, o d'altri catartici d'indole la più mite, e benigna. Quindi dovrassi rintuzzare, ed imprigionare l'acrimonia della materia ulcerosa per via d'absorbenti

fatollati con gli acidi d'vegetabili, come, a cagion d'esempio, colla polvere d'occhi di granchio fatollata col lugo di limone, col corallo, colla madreperla, e con simiglianti sostanze testacee fatollate nella maniera medesima. Gran servizio faranno similmente dei decotti di pimpinella, e di corneo di cervo con i fiori detti di Primavera; una misura di Squirio di corneo di cervo, e di tintura d'antimonio, e le polveri di corallo, e d'antimonio disforctico, dovranno far prendere al paziente due, ed anche più volte il giorno. Le picciole dosi di pillole di storace misigheranno molto bene la tosse; e le emulsioni di mandorle dolci con una picciola misura di lugo di limone abasteranno, ed attuteranno grandemente il calore febbrile. Fa onninamente di mestieri, che la dieta durante tutto quello doloroso tempo sia nutritiva; e le gelatine, le pilule corroboranti, ed i cibi lattiginosi faranno indubitatamente i più dicevoli, ed i migliori. Veggasi *Junker*, *Conspect. Medic.* pag. 390.

Forzè però osservare, come i medicamenti divisi non debbon già continuarsi per un corso non interrotto: dovrassi alcuna fiata sollevar la Natura da un fissato peso; e finalmente vie più, che la malattia andrà incalzandosi, e crescendo dovranno minorare sempre più i medicamenti, avvegnachè vi sia sempre minore speranza, che sieno per produrre alcun buono effetto, altro in simigliante stato non facendo le medicine, salvo l'accrefcere al paziente l'incomodo, e rendere a quel miserabile più grave, e più affannosa la vita sua infermicissima.

In evento, che accompagni l'Eritrìa una tosse, vien trovato comunemente grandissimo sollievo col far lambire al paziente dell'olio di mandorle dolci mescolato con dello sciroppo di papaveri; oppure potrássi prescrivergli, sebbene in picciolissime doselle, del laudano liquido da prendersi a tempo, e luogo. Quei sudori colliquativi, che sogliono accompagnare d'ordinario si fatta malattia, non dovranno per modo alcuno sopprimere con violenza; ma il paziente dovrassi conservare moderatamente fresco, e se gli dovranno far prendere delle polveri di corallo, della terra Lemnia, o di Lenno, ed altri assorbenti d'indole simigliante, ed alla quantità di tre, o di quattro dosi

doli potralfi dicevolmente aggiungere un grano femplice d'oppio. Produiranno fimigliantemente benefizio grande le camifioni refrigeranti.

La gomma arabica aggiunta in porzioni mezzane, e moderate, alle divifate emulfiioni è d'ufò grande di pari nell'attutare la diarrea, che bene fpefo fuole infeitare gli Ettici; e la conferva di rofe roffe unita ai benigni, e miti calibefati debbon effere prefi conflantemente, a fine di temperare, e di mitigare quello fintoma; ed allorchè quello alza con maggior empito la tefta, viene fperimentato un medicamento in grado fommo efficace una dofe di diafcordio feiolta nell'acqua di cannella; e qualunque volta la violenza dell'evacuazione fia ftata attutata, e fermata da un tal rimedio, farà pofcia tenuta anche a dovere dagli altri metodi più comuni. Veggafi l'*Hiftero*, Compend. Medic. pag. 115.

La perdita, talvolta totale, dell'appetito, che non fuol eflere da sì fatti cali difgiunta, dee eflere ricovrata a forza di fofianze amare, quali appunto effere pollono le tinfure di fcorza d'arance, e la corteccia eleuterica, alla quale può aggiungerfi altresì una picciola porzione di corteccia de' Geloni; e per rivegliare l'appetito con maggiore fpeditezza, e preffo che in un fubito, alle divifate fofianze potralfi aggiungere una picciola doferella di fpirito di zolfo, oppure di vetriolo.

HEPAR, *Hepar fulphuris*, per quella efpreffione intendefi lo Zolfo fquagliato colla metà della fua quantità di un'aleali filfato. Una fofianza fomigliante può di pari effere prodotta dal tartaro vetriolato, dai fondiglioli di vetro, o da qualivoglia altro dei falì neutri, che contengano un'acido vetriolico, e allora quando fono roffi roventi entro il fuoco, venga ad effi aggiunta della polvere di carbone, o qualivoglia altro Flogiftico più filfato; ma l'*hepar-fulphuris* non è così gagliardo, e forte, come altre volte, allorchè è procurato col nitro filfato col carbone, oppure coll'aleali compofito di tartaro, e di nitro; oppure con i falì neutri con un'aggiunta di Zolfo già contenente l'acido vetriolico. L'*Hepar fulphuris* fa scorrere, e fquagliare le terre, e le pietre fopra il fuoco; ed allorchè viene ad eflere liquefatto con i metalli, gli rende agevoliffimamente fquagliabili,

ma gl'indebolice, e gli rende fragili, friabili, ed ericiando in alcun grado folubili nell'acqua. Veggafi l'*Oftmanno*, Obfervat. Physic. Chem.

HERMODATTILO. Sono ftati gli hermodattili troppo generalmente fupposti un frutto; ma non havvi ombra menoma di dubbio, null'altro eflere quelli, che fono radice, e fembra veramente, che fieno le radici di quella fpezie di zafferano pratenfe appellato dagli Autori delle cofe Naturali, *Colebicum Chinenfe floribus fritillaria ininflar variegatis, foliis undulatis*; oppure zafferano pratenfe Chinefe dalle foglie ondeggiante con fiori variamente lifati a norma di quelli della fritillaria. Gli Hermodattili avevano un cortò grande preffo i buoni Antichi, e che fervivane come una purga: ma, a vero dire, la loro operazione è fomamente lenta, tediofiffima, e grandemente affaticante. Vengono corretti, e renduti migliori, fe fono congiunti con gli aromatici; e di prefente vengono talvolta melfi in opera mefcolati colla gialappa nelle affezioni reumatiche. Le donne mangiano quefte radici fresche abbruffolate per ingraffare. Veggafi *Pomes*, Iftoria delle Droghe.

HOBBY. E' quello nella Zoologia il nome Inglefe d'una fpezie di falcone della fpezie dei falconi dalle lunghe ale, efpreffo da parecchi Autori colla voce *Subbuteo*, che è la voce, colla quale altri efprimono quell'animale appellato fottivento, o gheppio.

Ha l'Hobby un becco prominente, ed archeggiato, tutto coperto nella fua bafe con una pelle gialla, e vicino a quella membrana; tutto il reftante poi è paonazzo. La fua lingua è alcun poco forcuta; e l'iride de' fuoi occhi è di color di nocciola. Egli ha una linea rofficea fcura, mefcolata di bianco fopra gli occhi: le penne del fuo collo fono di un color bruno biancaffro: il fuo dorfo, e le fue ale fono d'un color grigio nericeio: il fuo mento, e la parte fuperiore della fua gola fono d'un color bianco giallognolo con una macchia, o taccia nera da ambi i lati: la pancia di quello uccello è fcura: affai lunga la fua coda e punteggiata, e divertifcata di fcufo, e di bianco. Le zampe, ed i piedi fon gialli. Abita preffo di noi negli alberi più alti, ma nell'Invernata floggia dalle noftre contrade. Il fuo

gar-

particolar cibo si è l'allodola, al quale uccello di carne assai saporita dà questo uccello di rapina continuamente la caccia. Veggasi la Favola degli Uccelli sotto il numero 3. Veggasi eziandio Ray, Ornithologia, pag. 49.

HUNDRED *Dorimastie hundred*. Questa Inglese espressione, che noi diremmo per avventura Centinajo, Centuria ecc., nella Metallurgia, e nell'arte del Saggiare è presso gl'Inglese particolarmente (che perciò si è giudicato esprimere la cosa col la voce preta Inglese) un pelo divisibile, prima in un Centinajo, e quindi in un numero maggiore d'altre porzioni più piccole; ma quantunque la voce sia la medesima, non solo presso gli Artefici metallici, che presso i Saggiatori nostri, nulladimeno ella dee esser intesa come significante, ed esprimere una quantità sommamente diversa, e tutt'altra nell'accettazione che fanno di essa queste due differenti Macellanze. I pesi degli Artefici de' metalli vengono agevolmente compresi, come quelli, che sono della proporzione comune; ma quelli dei Saggiatori per lo contrario sono mille volte più piccioli di quelli, avvegnachè le porzioni dei metalli, o delle miniere dai Saggiatori esaminate sieno d'ordinario sommamente picciole.

Gli Artefici metallici, i quali estraggono i metalli dalle loro rispettive miniere, servono d'un peso diviso in cento parti uguali, ciascuna delle quali è una libbra: ed il tutto appellano *an hundred*, un Centinajo, o sia un peso di cento libbre. La libbra loro è divisa in trentadue parti, o senza mezza oncia, e la mezza oncia in due quarti d'oncia, e cadauno di questi quarti d'oncia in due dramme.

Simiglianti divisioni, e denominazioni degli Artifici metallici comprendonsi con somma agevolezza; ma queste voci, denominazioni, ed espressioni medesime, tuttechè vengano usate anche dai Saggiatori nella stessa guisa, nulladimeno presso di questi vengono ad esprimere, e significare quantità totalmente differenti; cionciòsiachè siccome un Centinajo dei Metallici Artefici contiene cento libbre, così il Centinajo dei Saggiatori non è realmente punto maggiore d'una sola libbra, alla quale corrispondono in proporzione le altre parti tutte.

Siccome i pesi dei Saggiatori sono di-

visi in un tale estremo grado di minutezza, e siccome perciò sono in estremo diversi da tutti i pesi comuni, e correnti, così i Saggiatori se gli accomodano comunemente nell'appreso maniera, fuori del picciolo argento, o di finissime piastrine saldate d'una grossezza al fuso, che venga a dinotare il loro peso, secondo la divisione della dramma, che è appunto l'Inglese *dorimastie*, od il Centinajo de' Saggiatori, vale a dire, quello che esser può loro accordato. Prendon' essi prima per una base un peso, che è circa due terzi d'una dramma comune. Questo peso essi lo contrassegnano (64. lib.) Quindi, avendo in mano alquanto piombo granellato, ben ben lavato, polcia ben'alcugato, e sfacciato finissimamente, ne pongono tanta quantità in un tondo d'una picciolissima bilancia, che venga ad equilibrarsi col peso (64. lib.) com'essi dicono, testè mentovato. Polcia dividono questi granellini di piombo in due elasticissime metà in due bilancie: ciò fatto versan fuori una metà dei divisi granellini da un tondo delle bilance medesime, ed in vece d'essi granellini di piombo, pongono un'altro peso d'argento, cui essi fanno, che equilibrisi a capello col piombo trovantesi nell'altro tondo delle bilance, e lo contrassegnano così (32. lib.). Se questo secondo peso, allorchè vien per la prima volta posto entro il tondo delle bilancette trascenda, od ecceda di molto il peso de' granellini di piombo ne cavan fuori una picciolissima porzioncella con una finissima lima; ma quando avvicina assai al divisato contrappeso, sogliono essi allora servirsi d'una pietra affilata per levarne via tutt'una volta una porzione estremamente picciola. Allorchè questa argento è ridotto equilibrante a capello, e del peso perfettissimamente uguale ai divisi granellini di piombo, essi mutano allora le bilancette, per vedere, od esservare, che non siavi accaduto errore; e per simigliante guisa procedono fino a tanta che non hanno preparato, e disposto tutte le divisioni, e tutti i loro picciolissimi pesi.

Ciò fatto per avere un'intero, e compiuto Centinajo loro proprio, quale po' anzi abbiamo esattamente descritto, essi aggiungono al (64. lib.) com'essi lo chiamano un (32. lib.) ed un (4. lib.) e pesan-

pestando questi di nuovo con un picciol pelo, vengono a fargli uguali ad esso, e lo contrafegnano (100. 1. b.). Questo è il *Docimastreo Inglese*, o dir vogliamo il Centidajo de' Saggiatori, che altro realmente non è, che una dramma. Veggasi *Cramer*, Arte del Saggiare, pag. 108.

HYPOPYON. La cura di simigliante malattia degli occhi viene alcuna fista condotta a fortunato termine da una violenta scossa data alla testa. Usavano i buoni Antichi pratica simigliante non altramente che un rimedio accertato, e sperimentato; ed il solo accidente ci ha fatto toccar con mano, che anche a' di nostri contina a riuscire. Le scosse, o succussioni di un calesso, o di una carrozza, o simigliante in un lungo viaggio è stato manifestamente osservato dilungare questa malattia col far sì, che la materia purulenta venga a cadere dietro all'uvea. Adunque dovebbesi prima di qualsivoglia altro tentativo, sperimentare questo sconotimento, o succussione, per dar del sollievo in questo caso, disponendo la testa del paziente in una postura supina, e comprimendo gli occhi colla mano, o colle dita per rimuovere, o per lo meno per isciogliere la materia. Veggasi l' *Eislero*, Chirurgia, pag. 425.

In evento però, che il divisato tenta-

tivo riesca senza il desiderato effetto, sarà giuoco forza il venire alla necessaria operazione. Fa di mestieri, che il paziente venga adagiato di contro la luce colla sua testa, e colle sue mani bene, e stabilmente assicurate, o tenute ferme da un tagliando chirurgico ajutante. Allora il Cerusico dovrà abbassare la palpebra inferiore, mentre un' altro suor ajutante innalzerà a un tempo stesso la palpebra superiore; e poscia il Cerusico medesimo con infinita cautela dovrà fare un taglio per la cornea appunto sotto la pupilla, facendone un foro, che balti per dar lo scarico alla materia coll' umore acqueo; ma dovrà aver cura grande, e guardarsi con ogni più intensa attenzione di non venir a ferire l'uvea dietro alla materia. Tre o quattro ore in circa dopo l'operazione, fa di mestieri, che l'occhio venga vestito con un piumacciolo ben inzuppato in un colirio composto d'acqua rosa, di chiara d'uovo, di mucilagine di semi di mele cotogne, e d'una picciola presa di canfora; e per simigliante medicatura verrà a rammarginarsi la ferita fatta nella cornea, l'umore acqueo verrà ricoverato, e se non sarà intraccata alcuna delle parti interne, il paziente riacquisterà con ogni sicurezza la vista.



IDA

IDA

IDATIDI NELLA MEDICINA. Questa specie di tumori trova talvolta il suo spurgo per la strada della vagina. Il valentissimo Monsieur Watson ci ha somministrato un'assai considerabile, e strepitoso esempio di eìd in una Gentildonna dell'età di circa quarant'otto anni, madre di parecchi figliuoli, e che dopo aver respirato per intieri sei anni dall'ingravidarsi, mostrò di bel nuovo i segni tutti d'un novello concepimento pel tratto di tre mesi, spirato il qual termine, i segni divisiati svanirono, e fin da quel punto ella cominciò a scaricarsi immancabilmente ogni notte per un mese intiero continuato d'abbondevolissima copia di sangue per la vagina, senza accorgersi nè essa, nè gli altri della menoma erecita nella sua pancia, nè nella mole delle sue poppe; sicchè ella ebbe a conchiudere, che le evacuazioni mestruali l'avrebbero lasciata oel loro periodo usuale. Ma alcune settimane dopo questo fatto ella venne assalita da dolori somigliantissimi alle deglie del parto, ed ebbe a scaricarsi di un'ampissimo numero d'Idatidi, di qualsivoglia grossezza, cominciando dalla mole d'una noce moscata, fino a quella di un capo di spillo; alcune delle quali erano piene di acqua chiarissima, alcune altre di una linfa sanguigna; e tutti esse erano cresciute alla foglia di un grappolo di uva, da una sostanza spongiosa, che veniva a far come le veci di una placenta. La Gentildonna medesima, dopo essersi alleggerita di queste idatidi, in pochissimi giorni ebbe a ricuperare la sua perfetta sanità.

Nel porre a bollire queste idatidi, elle comparirono somigliantissime ad un'ovata di una gallina lessata, con questa sola differenza, che siccome l'ovata dell'ovaja della gallina nel cuocerli si fassano, e si indurano, queste continuaron a conservare la loro materia fluida. Erano meno trasparenti, e comparivano così cotte di un

color giallognolo dilavato. Veggansi le *Trasfazioni Filosof.* N. 461. pag. 770.

IDEA. Il termine *idea* dal nostro Monsieur Locke è stato esteso a cadauna cosa, che noi conosciamo, o di cui abbiamo alcuna nozione, ed a qualsivoglia cosa, intorno alla quale viene ad impiegarsi la mente in pensando. Ma quest'uso cotanto esteso del termine *idea* vien giudicato incoerente, ed improprio da un'ingegnosissimo, e sommamente acuto Scrittore (a) il quale s'assi ad osservare fra le altre cose, come può benissimo dirsi, aver noi alcuna contezza, o nozione della nostra propria mente, degli spiriti, e degli enti attivi, dei quali, stando ad un senlo rigoroso, noi non ne abbiamo le idee. Nella maniera medesima noi conosciamo, ed abbiamo una nozione delle relazioni, che passano fra le cose, o le idee, le quali relazioni sono distinte dalle idee, o cose relate, di maniera tale che quest'ultime posson'esser da noi concepite, senza che noi concepiamo le prime. L'Autore medesimo somigliantemente osserva, (b) che per *mente*, *spirito*, *anima*, non viene a dinotarli oia cillo la menoma di sue idee, ma una cosa totalmente, ed interamente da esse distinta; in cui esse esistono, o che è la cosa medesima, per cui esso sono percepite, avvegnachè, siccome egli asserisce, l'esistenza dell'idea consista nell'essere percepita. Osserva di pari questo Valentissimo, (c) che la voce, *cosa od essere*, si è nome generalissimo di tutte, e che comprende sotto di sè, ed abbraccia due specie totalmente, ed interamente distinte, ed eterogenee; null'altro avendo di comune, salvo il solo nome, cioè, spiriti, ed idee. Nell'altra parte poi del dotto suo Trattato, egli afferma espresamente, (d) che non puossi per modo alcuno formare l'idea dell'anima, o dello spirito.

(a) Veggasi Berkeley, *Principi della Conoscenza Umana*, seconda Edizione, sezione

me 89. pag. 112. (b) *Ibid.* sez. 2. pag. 36. (c) *Ibid.* sez. 89. pag. 111. (d) *Ibid.* sez. 27. pag. 57. *Veggasi altresì la sezione 142. pag. 160.*

Da altro Autore è stato similantemente attaccato Monsieur Locke, avendolo accagionato di confondere le idee colle nozioni. Osserva questi, come per idea, secondo il comunissimo, ed utilissimo significato della voce, viene intesa l'immagine, la pittura, o la rappresentazione nella mente umana di un'apparenza sensibile, oppure di un'oggetto, che è stato prima percepito dal senso. Pertanto a questa sensibile apparenza riferisce necessariamente l'idea, perchè qualunque siasi in essa, o per qualsivoglia modo ella trovivisi, può essere alla medesima riferita: E vi serve e farvi uso di essa in suo luogo; avvegnachè la mente nel contemplare, od in impiegandovisi intorno in pensando, in quel dato tempo, in che l'oggetto la rappresenta, non viene immediatamente percepita, come lo è nell'atto del senso. Veggasi pag. 105. e 106. di un libro intitolato: Due Differenzioni riguardanti il senso, e l'immaginazione, con un saggio intorno la Conoscenza interiore, che abbiamo d'una cosa. Londra 1728. in 8.

Afferisce di vantaggio questo Autore contro Monsieur Locke, che la percezione di un'idea non è un'atto dell'intendimento, o sapere. Insiste inoltre, che un'idea nel piano proprio che ne dà il medesimo Monsieur Locke, è un'oggetto, od alcuna cosa percepita, ed intorno alla quale viene impiegata la mente in pensando. Laonde se la percezione, [in supposizione] che è un'operazione, o dir lo vogliamo nell'atto della mente venisse ad esser considerata come un'idea, [e sotto questo unico, e micro titolo Monsieur Locke tratta della percezione] in tal caso un'idea verrebbe ad essere l'oggetto di un'altra idea, e così farebbevi un'idea di un'idea, oppure un'oggetto di un'oggetto; ed un'idea percepirebbe un'altra idea, lo che non ammette il menomo senso tollerabile. Ed, a vero dire, nell'appianare, o nello spiegare, e dichiarare l'operazione di qualsivoglia facoltà, per darle il nome, ed appellazione medesima, che dassi all'oggetto stesso, intorno al quale ella è impiegata, e cui vi ha una necessità indispensabile.

Suppl. Tom. III.

le di considerare, per esporre, e rappresentare la qualità, e la natura particolare dell'operazione, e la maniera precisa del suo appartenere, ed aver che fare coll'oggetto sembra incoerentissima, e sommamente inconsistente con una sì fatta intrapresa, o disegno.

Questo Autore è stato in estremo accurato, ed esatto nel provare, e nel fiancheggiare la distinzione fra le nozioni, e le idee. In un'altro Trattato egli s'assai ad osservare, come Monsieur Locke nel suo Saggio sopra l'Umano Intendimento, non dà contezza delle nozioni razionali, e perciò non solamente egli ci ha somministrato un piano parziale, manco, ed imperfetto del suo Soggetto, ma ce ne ha fatto altresì un'ingiusta, ed un'incoerente rappresentazione. Veggasi un Saggio riguardante le Nozioni Razionali, stampato in Londra nel 1723.

Che possa essere infortuna alcuna confusione dall'aver assegnato un medesimo nome a quelle cose eterogenee, non vi ha ombra menoma di dubbio. Monsieur Locke però non è in tal riguardo niente più colpevole, e difettoso, di quello lo sieno il Malebranche, ed il Cartesio, o per meglio esprimerci, i Cartesiani tutti, i quali servonsi della voce idea nel medesimo senso stesso, siccome fa egli, e dai quali se vogliamo dir la cosa, com'è in fatto, sembra, che egli l'abbia preso. Sembra però che i Cartesiani sieno stati assai più solleciti nel porre della distinzione fra le idee dell'Immaginazione, e quelle dell'Intelletto, dell'Intendimento, o dello Spirito puro, *de l'Esprit pur*, siccome talvolta essi soglionsi esprimere, e perciò si sono garantiti contro gl'inconvenienti, e le incoerenze originanti dal soverchio generale significato del termine idea. Veggasi l'Articolo Nozione.

L'origine delle nostre Idee, e delle nostre Nozioni, è una questione grandemente perplessa, nè con tutte le fatiche, sudori, ed intense applicazioni dei Metafisici ella non è stata finora in verun conto appianata, ma rimanuta nel suo buio primiero.

Rispetto alle idee di senso hanno alcuni Filosofi preteso, che i corpi operando o premendo sopra i nostri nervi, e ponendo in movimento gli spiriti animali, ven-

O

gono

gono a produrre le sensazioni. Ma siccome il moto ai nervi, od agli spiriti comunica non ha cosa menoma comune, nè colla sostanza, o corpo movente, nè coll'idea nella mente eccitata; e perchè noi non concepiamo la menomissima relazione fra il moto del nervo, o degli spiriti, ed il prodimento di un'idea, il dire, che il moto, o l'impressione sopra i nervi, o sopra gli spiriti animali, è la cagione delle idee, è un dir nulla affatto, o per meglio esprimerci, un nulla spiegare.

Le specie vibrare, scagliare, od emanare dagli oggetti, e la formazione delle idee dall'anima stessa, di cui fanno parola nella *Ciclopedia*, non sono niente più chiare. Quanto alle Idee Innate egli è vero certamente, che gli argomenti di coloro, che le sostengono, sono stati giusti a terra, e distrutti dal Locke; ma non è niente meno vero, che quando Locke va innanzi, e viene a negare le Idee Innate medesime, i suoi argomenti nulla affatto concludono. Un'opinione, tuttochè malamente sia difesa, può esser vera, malgrado ciò.

In somma la questione intorno alle Idee Innate trovasi a' di nostri indecisa, come lo era per innanzi, e come lo è stata sempre. Nè vi ha una sola difficoltà od oscurità delle tante, che trovansi unite a sì fatto soggetto, la quale sia stata finora schiarita, od appianata.

L'opinione del Leibnizio riguardante l'origine delle Idee, pare, che abbia alcuna affinità coll' Idee Innate. Egli asserisce, l'anima esser semplice, e senza parti, o dir la vogliamo composizione; quindi farsi a concludere, che niuna cosa creata può agire sopra essa internamente, ma che tutti i cambiamenti, ai quali ella soccombe, discendono da alcun interno principio.

Il grande Iddio ha formato ciascuna anima in guisa, che ella ha percezioni diverse infra sé; alcune distinte moltissime confuse; ed un numero grande oscuro a segno che vengono a, randissimo stato ad essere comprese. Queste Idee tutte insieme rappresentano l'Universo: Intendeli per questo termine qualsivoglia cosa, che è stata, che è, o che sarà. secondo i differenti rapporti, che ciascuna anima particolare ha coll'Universo, alcune delle sue Idee vengono ad esser distinte, ed a distintamente rappresen-

tare una certa data parte dell'Universo medesimo. Il fondamento di questa opinione si è, che siccome ciascuna parte dell'Universo distintamente rappresentata, ha una relazione, o rapporto necessario con ciascuna cosa, che esiste, con ciascheduna cosa, che è stata, o che sarà, le cose tutte essendo connesse, di modo che una è la conseguenza dell'altra; così nella maniera medesima la rappresentazione d'una certa data parte dell'Universo, ha un rapporto, o relazione necessaria, ed inseparabile alla rappresentazione del Tutto.

Quindi ne seguita, che tutte le distinte percezioni dell'anima essendo connesse, e congiunte colle idee di tutte le altre cose, forz'è similmente, che queste trovinsi nell'anima, sebbene oscuramente. In questo senso asserì il Leibnizio, che l'anima è lo specchio, o sfera dell'Universo. Ora tutte le cose, che nell'Universo accadono succedono l'una all'altra secondo Leggi certe: In guisa somigliante nell'anima, le idee fanno, e divengono successivamente distinte secondo altre Leggi, le quali tuttochè abbiano una relazione alle prime, nulladimeno sono consistenti colla Natura della Intelligenza.

Tutte le anime umane hanno le idee medesime, prendendo le idee di ciascuno individuo collettivamente. Ma in ciascuna di esse, le idee distinte non sono le medesime; avvegnachè quelle dipendano dalla relazione, o rapporto, che ciascuna anima ha all'Universo; e questo rapporto è differente, secondo quella stazione, cui è piaciuto al sommo Dio di assegnare a ciascheduna. Sembra, che questa sia una novità, e genuina esposizione del sistema del Leibnizio riguardante l'origine delle Idee: intorno al qual sistema noi possiamo osservare, che il fondamento di questo sistema medesimo si è, che tutte le parti dell'Universo hanno una connessione necessaria. Ma per tirare da sì fatta proposizione delle giuste conclusioni, forz'è, che la connessione sia tale, ch'essendo le cose considerate in se stesse, una cosa non possa esser supposta, senza che le altre tutte sieno una conseguenza così necessaria di essa, che l'idea di un'altro Universo, in cui si trovasse alcuna cosa al nostro attuale Universo appartenente, fosse di necessità contraddittoria.

Qualora venisse ammessa, ed avesse luogo

go una sì fatta connessione, cioè, che vien supposto in rapporto alle idee oscure, in un certo senso verrebbe ad esser vero; cioè, che direbbesi, che un uomo, il quale ha un'idea distinta d'un triangolo, ha però delle idee oscure di tutte le proprietà di questa figura, a motivo della necessaria connessione, che trovasi fra quelle ultime idee, e le prime.

Ma, a vero dire, non è percepibile una sì fatta connessione fra le idee succedentesi l'una l'altra nell'anima. Conciossiachè se passando da un luogo oscuro ad altro, che è luminoso, io perciò vengo in un subito ad acquistare le idee di parecchi oggetti, non più innanzi veduti, non apparisce, che la previa percezione della oscurità, mi guidi necessariamente a quelle nuove idee.

Queste, ed altre somiglianti difficoltà possono essere opposte al sistema del Leibnizio: nè quello del Padre Malebranche è gran fatto più fortunato. Suppone questo Filosofo, non potervi esser cagione di un'idea, se non quella idea stessa in altro essere intelligente; e quindi ei faasi a concludere, che noi acquistiamo le nostre idee mentre l'anima nostra le percepisce in Dio.

Per provare la sua opinione, faasi egli a novare tutte le strade, e le maniere, in cui è spiegabile l'origine delle idee; e dopo d'aver combattuto, e confutato tutti gli altri Metafisici, conclude, che la vera opinione è la sua sola. Ma il suo raziocinio pecca di due sommi difetti. Prima chi può mai pretendere in un soggetto coranto oscuro, di novare tutte le vie, e le maniere, onde l'anima acquistar possa le sue idee? Ei non conosce, che l'opinione del Leibnizio è sommamente differente da quella dei Cartesiani, e le altre soluzioni, che potrebbero per avventura rinvenirsi. In secondo luogo non è già per esso dimostrata tanto che basti la falsità delle altrui opinioni. In somma egli non ci dice cosa menoma, che ci rischiari nemmeno d'una scintilla l'origine delle Idee.

Non accrete poi tanto poco le difficoltà riguardanti le nostre idee, la considerazione della Memoria. Possono essere ripetute alla mente moltissime idee non presenti. Queste idee sono certissimamente con non lieve differenza riferite all'anima più di quelle, ch'ella non percepisce, o di quelle, ch'ella non può riunire insieme. Ma e che cosa è mai nell'anima un'idea, cui l'anima

stessa non può percepire? Eppure tali idee vi sono. Se per spiegar quello, noi ricorriamo alla costituzione del cervello, ne insorge tosto una folla di nuove difficoltà. Che ha che far la memoria con gli spiriti separati e disgiunti dai corpi? Se ella non è memoria, che è adunque l'intelligenza? Veggasi *Gravesand*, *Introducit. ad philosophiam*, pag. 134.

Rispetto poi alla Nozione del Malebranche, veggasi *Locke*, *Opere Postume*, ove vien posta a disamina egregiamente bene questa opinione, e veggasi di pari *Burkley*, *Dialoghi*, Edizione seconda, pagg. 257. 258. & seq.

IDILIO. Secondo l'opinione del dotto Letterato Francezse Monsieur Fraguier, l'incerto, ed indeterminato significato non meno dell'Idilio, che dell'Egloga, è dovuto a questo, che nè l'una, nè l'altra di queste due voci, originalmente, e per le stesse non vengono ad esprimere, ed a significare quella cosa, per la quale vengono usate. La voce *Idyllion*, Idilio, quantunque venga generalmente usata per un poema pastorale, ciò non ostante ella si è meno appropriata ad un componimento di tal natura di quello fuo la voce *Egloga*; conciossiachè siccome osservava il medesimo dotto Autore, le Ode di Pindaro hanno il Titolo di *Εἰς ἄνθος*, della qual voce *Εἰς ἄνθος* altro non è, che il diminutivo, *Idyllion*, *Idilio*, e significa, ed importa propriamente un'Opera di un'estensione mezzana, senza considerare il soggetto. Tuttavia i Poemi pastorali di Teocrito, ai quali egli diede originalmente il Titolo di Buccolici, essendo dopoi stati raccolti, ed uniti in un Corpo insieme con gli altri suoi poetici componimenti, i quali furono denominati *Εἰς ἄνθος*, *Idyllia*, *Idilj*, i Grammatici antichi, i quali vengono accagionati per aver fatto dei sostanzialissimi cambiamenti nei Titoli dei Libri, dierono i Titoli comuni d'*Idilj* a tutta la Raccolta. E siccome i Buccolici, o sieno pastorali poemi erano quei Componimenti, che di grandissima lunga soverchiavano gli altri tutti in finezza, in bontà, ed in perfezione; e siccome i Componimenti tutti di questo insigne Greco Poeta sono di presente conosciuti soltanto sotto la denominazione d'*Idilj*; così pare, che l'uso comune abbia appropriato questa voce ai Buccolici, o Componimenti Poetici pastorali, quantunque in un grado mino-

re dell'Egloga, la quale è più strettamente coerente a sì fatto significato. Così i soli dieci Buccolici di Teocrito possionfi a buona equità appellare Egloghe; tuttochè il termine Idilj con altrettanta proprietà, dicevolezza e coerenza possa essere appropriato a gli altri suoi poetici Componimenti. Veggansi *Memoires Acad. Inscript.* Tom. 2. pag. 159. & seq. Veggasi di pari l'Articolo Egloga, *Ciclopedia*.

Gli Idilj dei moderni differiscono da quelli degli Antichi; conciossiachè i primi altro non introducano in questi loro Componimenti, che Pastori Allegorici, od uomini urbani travestiti e mascherati, dove per lo contrario nell'Idilj de' buoni Antichi non vengono introdotti, e rappresentati, se non se veri Pastori. Osserva Monsieur Hardion, come il gusto della nostra presente età è così grandemente diverso io sì fatto riguardo da quello de' buoni Antichi, che egli è d'opinione, che non dovrebbe mai dar fuori, o pubblicare una versione letterale degl'Idilj di Teocrito, non già perchè egli intenda, che questi sieno difettosi io se stessi, e cattivi, od ch'ei facciasi a condannare le Regole nella loro composizione seguitate; ma perchè le Regole, le quali erano ottime in quei tempi, nei quali scritti furono questi poemi, ne i tempi presenti verrebbero da pochissima gente gustate, e pregiate.

Havvi noa varietà grandissima di caratteri osservabile infra i Pastori ne'gli Idilj degli Antichi, la ragione della quale si è, che aveavvi quattro specie di Pastori, l'una dall'altra differenti sì nelle maniere, che nelle opinioni, e nel linguaggio. I primi, e principali di questi eranfi *Bucoli* *Boucolici*, Buccolici, guardiani delle gregge; l'incombenza de quali consisteva nel condurre al pascolo, e nel custodire il bestiame. Forz'è che noi non ci facciamo a supporre, che costoro fossero già gente stupida, o zotichi villanzoni, scervi affatto d'umosità, e di cognizione. Conciossiachè fossero per lo contrario coloro persone tutte facoltose, e bene allevate, ed educate, ed erano i principali di quei borghi, terre, e villaggi, ove essi vivevano. La seconda specie di Pastori, che accollavansi d'affai alle qualità dei primi, addimandavansi *Poimenes* *Poimeni* Pastori così propriamente appellati, o coloro, che badavano a far pascolare gli armenti, &c. Da

Teocrito non sono questi per modo alcuno distinti dai *Boucolici*, Buccolici, rispetto alla civiltà, ed umanità; ma sì quelli, che questi vengono introdotti a divertirsi insieme con delle cantilene, e con de' suoni pastorali sul gusto, e sapore medesimo. Componevano la terza specie gli *Agricolici*, e questi erano propriamente destinati al pascolo, e custodia delle Capre, Capraj; e questi per ogni riguardo erano inferiori d'affai ai Pastori delle due prime specie divistate. La quarta, ed ultima specie facevanla i pastori mercenari, che noi diremmo garzoni, i quali non avevano od pecore, nè altro bestiame, che fosse loro proprio, ma erano accontati, e stavano al servizio d'altri Pastori padroni di bestiame. Gli Attori da Teocrito introdotti nel suo quarto Idilio, sono di quest'ultima specie. E conviene, che venga osservato per onore dell'egregio Poeta, come egli non manca giammai d'informare in cadaun Idilio i suoi leggitori della qualità, e della condizione dei Pastori, cui egli introduce in scena. E' questa uoa Regola, l'importanza somma della quale niuno può ignorare, senza gravissimo peccato nella Drammatica Poesia. Veggansi *Memoires Acad. Inscript.* Tom. 6. pag. 251. & seq. Veggansi di pari gli Articoli *BUCOLICI*, *POIMENI*, &c.

Il Soggetto degl'Idilj, come quello, che è di per sé umile, e basso, ricerca per essere sostenuto, e rilevato una somma eleganza nella dizione, e nella poetica elocuzione. Monsieur Hardion è di sentimento, che in simigliante rapporto Virgilio stassi sotto a Teocrito, osservando sempremai, e costantemente la speziale, e particolare fabbrica propria dei poemi pastorali, la quale struttura viene a costituire una delle sue principali bellezze. S'è fatta struttura ricerca, che il quarto piede di cadaun verso esser vorrebbe un dattilo, ed alcuna volta anche il primo piede, qualora ciò possa farsi senza evidente affettazione. Oltre a ciò sarebbe di pari oecessario, che questi dattili fossero slaccati, vale a dire senza alcuna cesura dopo di essi, od essi attaccata, e se fosse mai possibile dopo cadaun dattilo, dovrebbero essere nel sceso una fermata, la qual cosa verrebbe ad aggiungere assaiissimo alla regolarità, ed alla perfezione del verso medesimo. Tali sono i seguenti versi di Teocrito, e di Virgilio.

Έντο μοι, ὦ Κριδιάρ, τινος αἰθέρι;
ἦ κα Φιλάρδα; Teo-

„Dimmi un po', Coridone; queste vacche
„Di cui sono? forte di Filonda?

Salvini, *Teocrito Volgarizzato*.

*Dic mihi, Damoeta cujum pecus? an
Meliboei? Virgil. Eclog. 3. v. 1.*

Struttura somigliante a nei Poemi pastorali una vivacità, la quale viene a riuscire nella bocca d'un pastorello mirabilmente graziosa. Cotale Regole vengono da Teocrito osservate costantemente con tutta la possibile accuratezza; ma assai di rado dal suo imitatore Virgilio; lo che però dee piuttosto essere ascritto al genio della Lingua Latina, che a difetto dell'abilità, e valentia di quel sovrano latino Poeta; avvegnachè il latino idioma sia assai meno abbondevole, meno arido, e meno pieghevole del Greco. Veggansi *Memoires Acad. Inscript.* Tom. 6. pagg. 255. 256.

L'invenzione dell'Idillio viene attribuita Dafni, il quale pel suo genio straordinario, dice Diodoro Siculo, che "rinvenne il poema, ed il canto Buccolico in quella forma, medesima [parla del tempo suo] che, vedesi di presente continuare nella Sicilia." (a) 2° si fatto passo grandemente osservabile, come quello, che parla accertatamente dell'origine dell'Idillio, quale appunto apparisce in Teocrito non meno, che in tutti quei Poeti, che dati sonosi ad imitarlo. Destino, al quale pretender non può la Poesia Pastorale, parlando generalmente; conciossiachè, quantunque grandissime brighe s'ensi presi i Critici, per rintracciarne la sua origine, e parecchie Nazioni contrastino quest'onore a vicenda l'una all'altra; nulladimeno tutto il risultato ad altro non serve, salvo che a convincerci, che i Pastori pel tratto lunghissimo di molte età sonosi divertiti nelle loro ore oziose in cantando, senza che noi possiamo esser valevoli ad esattamente fissare, e determinare, nè il quando, nè in qual Regione si cominciasse la fatta costumanza.

Dopo Dafni divenne famoso, ed acquistossi gran nome un altro Pastore Siciliano appellato Diomo, per le sue pastorali cantilene. Dopo di questo ne venne Stefisico, il quale, secondo Eliano, fu il primo, che prendesse per soggetto de' canti suoi le disavventure di Dafni. Visse costui, come pretendonsi alcuni Cronologi nel tempo di Faride 550. anni in circa prima dell'Era volgare.

Ultimamente alcune età dopo di costui, comparve in scena Teocrito, il quale fendosi formato sopra i divinati modelli, soprapponendo gli esemplari suoi a segno, e condusse la Pastorale Poesia a sì alto grado d'eccelesenza, e di perfezione, che non è sperabile il preferirla di vantaggio; ridotta avendola a quel colmo di perfezione, di cui ella esser possa suscettibile. (b).

(a) *Lit. 4. cap. 16.* (b) *Memoires Acad. Inscript. Tom. 9. pag. 101. & seq.*

IDROCEFALO. E' il mondo debitore al dotto Membro dell'Accademia Reale di Parigi Monsieur Hunauld d'alcune sommarie singolari, e preziosissime osservazioni intorno a questo assai rilevante soggetto. Facendosi questo Valentuomo ad esaminare da suo pari la testa d'un fanciullo, il quale in età di soli sette mesi era morto d'Idrocefalo, in tutte le parti, a riserva del suo dinanzi, trovolla più grossa di quella di un'adulto, verso la faccia il cranio non era maggiore di quello esser foglia in quella età naturalmente; ma dai lati, e dalla parte dretana erasi gonfiato, e dilatato alla divisa mostruosa grossezza. L'acqua trovavasi racchiusa nei ventricoli, ed ascendeva alla quantità d'una pinta.

Nel considerare qual fosse il tempo, in cui avesse il suo principio sì fatta infelicitissima indisposizione, sembrò a questo Valentuomo, che questa non cominciaste, se non se dopo che le ossa del cranio cominciarono ad esser congiunte l'una all'altra per mezzo delle suture; avvegnachè, se fosse avvenuto diversamente, sarebbe bisognato, che la testa si fosse trovata nello stato medesimo in cui trovansi quelli, nei quali l'Idrocefalo sia cominciato molto prima; nel qual caso le ossa del cranio separansi, e disgiungonsi l'uno dall'altro ad una gran distanza, e la membrana che gli unisce, trovassi estremamente dilatata, ed estesa. Il principio di sì singolare Idrocefalo forè che sia stato in quel tempo in cui le ossa del cranio, unite per via delle loro suture avessero già avuto tutto l'aggio, e tutto il tempo di dilatarsi e di stendersi considerabilmente; e l'azione dell'acqua sopra i lati dei ventricoli, e sopra il cervello, avessero forzato le ossa del cranio a prendere quella grossezza nonnaturale, ed a fare sì trasformante crescita. E dal tutto ella è cosa agevole il conchiudere, che quei bambolini, nei

nei quali comincia un'Idrocefalo prima, che le ossa del cranio trovinsi validamente unite, possono vivere per un tratto di tempo considerabile. Veggansi Memoires Acad. Scienc. Roy. Paris. ann. 1740.

L'effetto, che l'acqua nella testa contenuta produce nel cervello nel caso di presente considerato, merita veramente d'esser considerato. I lati dei ventricoli in uno stato naturale, trovansi applicati feratamente, e strettissimamente l'uno all'altro, e lasciano a mala pena la menoma sensibile cavità; dove per lo contrario in questa testa i divisi lati trovavansi a segno disgiunti, e separati l'uno dall'altro, che venivano a contenere una buona pinta d'acqua. Forz'è pertanto, che accadesse che la sostanza del cervello, la quale compone questi lati, fosse stata in guisa assai considerabile dilatata, ed allungata; e che venisse di necessità rimasta di pari grandemente, effusa la sostanza corticale, oltre le sue naturali dimensioni; e per rendersi capace di sì fatta dilatazione, ed estensione, ella venne trovata senza alcuna circonvoluzione, e fattasi soltanto una superficie piana, ed uguale regolarmente, e il capello di quella estensione, e grossezza, che verrebbe a risultare dall'espansione, ed appiannamento di tutte le sue circonvoluzioni. La sostanza midollare veniva a formare una seconda superficie piana, ed uguale somigliantissima alla prima. Era questa sommarmente sottile, e giacevasi sotto la prima. La ragione di sì fatta disposizione delle parti del cervello in questo caso, è patente, ed ovvia: conciossiachè non avendo la pia Madre in questo caso da seguitare i ravvolgimenti circolari del cervello, come nello stato naturale, veniva a formare di se stessa una piana superficie sopra la parte corticale.

Egli è evidente da somiglianti osservazioni, e da altre di pari fatte dal Vesalio, e da altri Autori, come può benissimo il cervello per cagioni accidentali divenire d'una cresciuta, e d'una figura sommarmente diversa, e tutt'altra da quella, che avrebbe avuta naturalmente; e che le stessissime ossa del cranio sono in guisa somigliante capaci d'assumere una figura, ed una cresciuta differente, e che anzi dopo d'aver acquilato una gran parte di loro naturale fermezza, grossezza, e durezza,

za, e che sono valevoli a resistere con una forza considerabile agli accidenti, i quali tendono a determinare in esse questa cresciuta nonnaturale. Ed applicando tutto questo al caso d'un tenerissimo feto, in cui le parti posseggono appena grado alcuno di solidità, o di durezza, noi verremo a ravvisare un piano agevolissimo per tutte quelle nonnaturali configurazioni nelle quali alcuna fiata incontransi gli Anatomici in osservando le teste degli adulti. Veggansi Memoires Acad. Scienc. Roy. Paris. ann. 1740.

Nell'Idrocefalo interno, allorchè l'acqua trovavasi radunata nel lato interno del cranio, vi ha pochissima speranza di ricoveramento; conciossiachè, se venga fatta una paracentesi a fine di scaricarne la lina, l'infante si muore tosto che l'operazione è compiuta; ma nell'Idrocefalo esterno, ove l'acqua viene ad essere ritenuta fra i comuni integumenti, ed il cranio, havvi alcuna speranza di riparo, e di cura, massimamente se il male non sia di vecchia data. Fa onninamente di mestieri il somministrare delle interne medicine. Quelle forz'è che sieno catartiche, diuretiche, e diaforetiche; e mentre questi medicamenti si amministrano per bocca, conviene, che si applichino esternamente dei grossi piumaccioli e compresse, che cuoprano, e facciano tutta la testa, e questi piumaccioli dovranno essere ben bene inzuppati di acqua di calcina, e di spirito di spigo, o di acqua della Regina di Ungheria. Bagnerannosi di pari nei liquori medesimi, ed applicherannosi dei sacchetti d'erbe secche, di spigo, cioè di majorana, di puleggio, e di altre erbe di indole somigliante; e l'uso frequente di un medicamento errino fatto di majorana, di gigli delle valli, di maro, e di somiglianti vegetabili, dovrebbe essere coerentemente raccomandato, come anche l'uso del macerare il tabacco, a fine di portar fuori, e promuovere la scarica delle serosità in forma di saliva. In evento, che i divisi mezzi vadano tutti falliti, sarà giuoco forza il far prova di un cerotto da applicarsi dietro alle orecchie, nell'occipite, e nel collo, e l'applicare eziandio nelle divise parti le coperte a taglio. Di gran beneficio riuscireanno similmente le fontanelle, e i latti scorsaj di seta nelle parti medesime. Nell'applicar poi le divise

visate coppette, o coppettone solo a taglio, può dicevolmente farli la scarificazione affai sffondata, e poscia medicarla, e vestirla con degli unguenti digestivi, e con del precipitato, affine di mantener viva la necessaria scarica. Veggasi l'*Eislero*, Chirurgia, pag. 355.

IDROPE. Idrope, od idropisia dei polmoni, *Hydrops pulmonum*. Ella si è questa una malattia, la quale non è punto comune; ma ella è stata alcune volte bravamente osservata dai prodi e dotti medici della nostra nazione. Ma la più elatata, e la più perfetta istoria, che siasi stata somministrata finora di simigliante raro malore, si è quella del valentissimo Monsieur Maleot membro dell'Accademia Reale di Parigi, nel caso di un povero soldato Gregorio ridotto invalido, cui egli attentissimamente medicò, ed osservò in tutti i periodi, ed in tutto il corso di questa strana sua malattia. Questo pover'uomo era afflitto da una forma difficoltà di respiro accompagnata da una febbre lenta. Allorchè costui giacevasi in letto, non vi era caso, che potesse starsi nè sull'uno nè sull'altro fianco, nè tampoco sulla schiena, ma veniva obbligato a giacersi supino sulla pancia, per conseguente, siccome questa era una scomodissima, e travagliosissima positura, così egli era costretto a starsi il più del tempo adagiato sopra una seggiola. Le sue mani, e le sue braccia erano grandemente gonfiate, non altrimenti, che le sue gambe, ed i suoi piedi; e la sua orina era appunto del matton cotto.

Da tutte le diversate circostanze il valentissimo Monsieur Maleot diedi a sospettare, che l'acqua stanziasse nel petto; ma non gli venne fatto, per quanto ci tentasse d'arrivare a comprendervi alcuna fluttuazione, in qualunque positura ci si facesse collocare l'infelice paziente; nè potette ottenere, che l'uomo stesso arrivasse a comprendere alcuna sensazione di ciò dentro di sè medesimo. Quest'infelice creatura adunque si morì dopo aver tollerato la brutta infermità pel tratto d'interi due anni; ed essendone aperto il corpo, non fuvi trovata acqua sciolta, ondeggiante nella cavità del petto. Ma in cadaun lato dei polmoni fuvi osservato un tumore di figura ovale della lunghezza

di sei dita, e della larghezza di quattro buone dita: questi due tumori erano di una medesima figura, e grossezza, e nel maneggiarli venivavi sensibilmente conosciuta una verace fluttuazione. In aprendo i tumori divisi, l'acqua ne sgorgò fuori in copia abbondevole, ed in esaminando la loro struttura, venne trovato esser tumori incamiciati, o vestiti, composti di assai faticce, e grosse membrane, formate di varj letti, o conserve di materia, ma non aveavi distinguibile il menomo vaso sanguigno. In esaminando il fegato fuvi scoperto un altro tumore simigliantemente incamiciato, o vestito, la materia contenuta nel quale era linfatica tinta di un verde giallo di galla. Veggansi *Memoires Acad. Roy. Paris. ann. 1732.*

IDROPICO. L'*Idropico Inglese*. E' questa una denominazione data nel tempo del nostro Re Carlo Secondo, ad una certa particolare Chimica preparazione, riputata di sovrana efficacia; e virtù contro i vapori non meno, che contro le affezioni letargiche, e che è fama, che venisse comprata da colui, che ne era l'inventore, a carissimo, e trasmodante prezzo da quel Monarca. Quella medicina comparve null'altro essere di più, che uno spirito estratto a forza di una sorta chimica dalla seta cruda, e poscia rettificato coll'olio di cannella, oppure con alcun altro olio essenziale; ed in sostanza ella non era niente affatto cosa migliore del comune sal volatile oleoso, o di qualsivoglia altro degli spiriti volatili, come sono quelli di corno di cervo, il sale ammoniaco, o gli altri molti, impregnati con un'olio essenziale, a riserva soltanto, che questa medicina era meno disgustosa e disagiata al palato di qualsivoglia altera delle diversate, a percid assai acconcia, ed appropriata a quelle persone, che hanno soverchio delicato il palato. Veggansi *Memoires Acad. Roy. Paris. ann. 1700: Rupertio Idropico*. Veggasi l'Articolo **RUPERTIO**.

IDROPISIA. Pensano certuni, che l'Anasarca, la Leucostemazia, gli Asciti idropici, la Timpanitide, l'Idrocelo, e somiglianti differiscano così poco dall'Idropisia, che altro non sia il ritenere questi speciosi nomi Greci, che una inutile pomposa medica vanità, o burbanza. Veggansi i saggi di medicina d'Edimburgo, Vol. I. pag. 226.

L'olio

L'olio di ginepro, oppure una semplice infusione di coccole di ginepro abbrustolite, e fatte bollire macinate in un liquore alla foggia medesima del caffè, viene asserito, essere un'ottimo medicamento per l'Idropisia.

Viene similgiatamente assai raccomandato alle persone idropiche, immediatamente innanzi di farsi punger, l'esercizio, affinché le particelle più faticce, e più grossolane stanzianti nell'acqua del ventre loro, possano mescolarsi colle particelle più sottili, e più minute, e per tal modo sgorgar fuori con esse. Ed in evento, che abbavi prudente ragione di sospettare, che alcune delle parti grossolane divise si rimane nel corpo dopo l'operazione della puntura, sono taluni di avviso, che varrà grandemente a farle venir fuori un'iniezione, che vengavi fatta d'acqua d'orzo, come quella, che le dilaverà, e le condurrà fuori seco.

Ultimamente sonosi state somministrate delle istorie nelle nostre Trasfazioni Filosofiche di Idropisie curate mirabilmente bene per mezzo dell'operazione della puntura, e dopo colle iniezioni opportune di vino di Cahor mescolato con dell'acqua di Bristol.

Vi ha similgiatamente un' Istoria di una non comune idropisia nelle Trasfazioni Filosofiche medesime, originata per la mancanza di un'arnione. Il soggetto, in cui avvenne era una giovanissima donna. L'acqua, che sgorgò fuori dall'addome nella sezione del suo corpo, giugneva alla quantità, che starebbe in una mezza delle nostre botti comuni, e questa stanzava entro un grossissimo sacco, il quale occupava pressochè tutta la cavità dell'addome eccedente l'ampiezza di sei piedi nella sua circonferenza, ed all'insù stendevasi, e dilatavasi oltre il tratto di quattro piedi, dalla cartilagine Xifoide, all'osso della pube. La figura non meno, che la descrizione di questo smisurato sacco, che delle sue parti adiacenti, puossi vedere, e leggere nelle nostre Filosofiche Trasfazioni sotto il numero 482. alla lezione 2.

Noi leggiamo d'un Idropico, il quale era divenuto a segno maligno, ed infestante, che il Cerusico, il quale ne aperse il cadavere, ebbe a cadere e morire di

un morbo pestilenziale. Veggansi di pari le Transf. Filosof. n. 454. Sez. 4.

IGROSCOPIO. Il seguente Igroscopio viene grandemente commendato nelle Trasfazioni Filosofiche sotto il numero 479. ove l'espone etziandio una figura del medesimo.

Consiste questo in un sottilissimo pezzo di spugna, tagliata in guisa, ch'ella venga a contenere una superficie della maggior ampiezza, che sia mai possibile. Questa spugna s'appender per mezzo di un filo di seta sopra lo stilo di una bilancia, e sarà esattamente, ed a capello equilibrato dall'altro lato della bilancia medesima da un'altro filo di seta, infilzato una picciolissima pallottolina di piombo, ad uguali distanze, e per modo accomodata, ed agguistata, che venga a cagionare un'indice al punto di mezzo di un arco con i suoi gradi, allorchè l'aria trovasi in uno stato di mezzo fra la massima umidità, e la massima siccità. Sotto questo filo di seta nella divisa guisa infilzato col piombo, vienvi collocata una picciola tavoletta per quella parte della seta, e della pallottolina di piombo, che non è sospesa, per posarsi sopra. Quando l'umidità dalla spugna imbevuta accresce il peso di quella, ella verrà ad alzare l'indice diviso, e similgiatamente anche la parte della pallottolina, dalla descritta tavoletta; e viceversa, allorchè l'aria è asciutta. Veggasi numero citato, pag. 76.

Nelle Trasfazioni Filosofiche sotto il numero 480. noi abbiamo la descrizione esattissima di un' Igroscopio, ovvero di un' Igrometro, fatto di bacchette d'Abete, che viene affermato, riuscire di grandissimo uso, e servizio.

ILIO Oso. Oso Illo, *Ilum os*. Venne quell'osso da' buoni Antichi così denominato, a motivo del sostentare, ch'ei fa quelle parti, cui essi addimandarono *Ilia*. E' questo il pid grosso di tutt'e tre le ossa del Pelvi. Egli è piatto, o compresso, sommamente largo, o dilatato, disugualmente convesso, e concavo; in parte tondeggiato, ed in parte di una figura quadrata irregolare. Vien diviso tanto commodamente, che basta, in cresta, in base, ed in contorno, od orlatura anteriore, e posteriore; ed in due lati, uno esterno,

L'altro interno. La cresta è la sua parte superiore, ed è un orlo, o margine arcuato assai faticcio, la cui circonferenza è alcun poco di più di un quadrante di un circolo: la parte anteriore, e la parte di mezzo sono connesse all'infuori, e la parte posteriore è alquanto convessa all'indentro. Gli Anatomici per amore della regolarità, che salvar vogliono nelle loro descrizioni, distinguono due labbra, ed uno spazio, od intervallo di mezzo infra esse. E' questa originalmente un'epifisi, di cui noi veggiamo talvolta segni piani, ed evidentissimi nelle avanzate età. La porzione posteriore della cresta, la quale è convessa all'indentro, è molto più grossolana, e più faticcia della sua porzione anteriore; ed appunto per sì fatto motivo puossi dicevolmente appellare il tubercolo della cresta. Tutta la cresta apparisce esser coperta al di sopra con una cartilagine; ma questa altro non è realmente, che una seccata espansione tendinosa dei muscoli. L'orlatura, anteriore di quell'osso ha due protuberanze o tubercoli, appellate le spine anteriori, una di esse superiore, l'altra inferiore; e similantemente due tacche, od intaccature, una, cioè fra le spine, l'altra sotto la spina inferiore. L'orlatura, o contorno posteriore è più corto, e più faticcio dell'anteriore, e termina similantemente in due protuberanze, o tubercoli, di spine, fra le quali vi ha un' assai considerabile intaccatura. La base, o dir la vogliamo parte inferiore dell'osso, è la più fissa, o faticcia, e la più stretta di tutte le altre; e viene a formare anteriormente una porzione dell'acetabolo, e posteriormente, presso che tutto il seno sciatico. Il lato esteriore è convesso nella sua parte dinanzi, ed è concavo nella sua parte dretana: in esso noi osserviamo gli strascichi d'una lunga linea semicircolare, che arriva dalla superiore spina anteriore al seno grande sciatico, essendo una marca muscolare; e tanto sopra, che di dietro a sì fatta impressione sonovi parecchie altre marche muscolari. Alcuu poco sopra l'orlatura, o contorno dell'acetabolo, noi scorriamo similantemente parecchie disuguaglianze, le quali vanno fasciando, e contornando la parte dell'assilatura in una forma semicircolare, essendo un' unione, o zaccolla di marche muscolari, e ligamen-

Suppl. Tom. III.

tofe. La parte, o lato interno di quell'osso è disugualmente concavo, ed ha molte disuguaglianze verso la sua parte dretana. La principale di queste si è appunto quella grossa superfiocie cartilaginosa, la quale rappresenta la forma d'un S majuscola, o di una testa di uccello; e questa corrisponde alla superficie laterale dell'osso fagro, colla quale ella viene ad esser congiunta da una finissi cartilaginosa. Le altre disuguaglianze sono pressochè a capello le stesse, o della medesima specie di quelle della parte laterale dell'osso fagro, colla quale esse vengono a formare parecchie cavitadi aspre, ed irregolari. Dalla parte superiore della superficie cartilaginosa, o sia finissi, per ogni verso alla prominenza obliqua, scorre una linea rilevata, la quale lascia la concavità delle parti interne di quell'osso, e che viene a distinguere il margine, od orlo del l'elvi dal fondo. Veggasi Winslow, Anatomia, pag. 69.

IMB. LSAMARE. La maniera, onde gli Egiziani imballamavano i corpi morti, era come segue: Allorquando un uomo moriva, il suo corpo veniva condotto a quelli Artefici, il cui mestiero si era il fabbricare le bare, o cataletti. Prendevano allora la misura del corpo, e fabbricavano un cataletto per esso, proporzionato alla sua statura, alla qualità delle persone defunte, ed al prezzo, che la gente voleva sborsare, avvegnachè presso gli Egiziani rispetto a ciò aveano delle diversità parecchie di prezzi. La parte superiore della bara divisata rappresentava la persona, che dovevasi essere adagiata, si fosse quella uomo, si fosse donna. In evento, che quella fosse un uomo di condizione, veniva distinta dalla figura, che era rappresentata nel coperchio del cataletto, o cassa mortuale: quivi venivano di ordinario aggiunte delle pitture, ed altri abbellimenti, ed ornamenti, dicevoli, e proporzionati alla qualità della persona medesima. Veggasi Cassian. Colat. 15. cap. 3. E Cicerone Tusculan. Quest. lib. 1. Veggasi di pari Herodot. Lib. 2. cap. 86. e Diodor. Lib. 2. cap. 5.

Allorchè il corpo veniva di bel nuovo condotto a casa, accountavansi i suoi con gli Imballamatori, o particolarmente a qual grado essi volessero, che quel tale fosse imballamato; conciossiachè vi fosse-

P ro

ro delle imbalsamazioni di prezzo vario. La massima, e più nobile imbalsamatura veniva a costare un talento, venti mine spendevansi per un imbalsamamento mezzano, ed il più basso prezzo era cosa di assai lieve momento. Viene supposto, che il Ta'ento Egiziano montasse al valore di trecento lire sterline. Alla bella prima, accontato che altri si fosse con gli Imbalsamatori, andavano sul fatto a chiamare un disegnatore, il quale delineasse il corpo in quella guisa appunto, che questo trovavasi disteso nel luogo, ove esser doveva aperto, nel sinistro lato, e per la lunghezza dell' incisione. Un Disettore con un' acutissima pietra Etiopica faceva l' incisione, lo che egli faceva colla maggior prestezza, che fosse stata possibile, e fuggivasi tosto a celarsi; avvegnachè i Congiunti della persona trapassata, che trovavansi presenti, davano di piglio a dei sassi, e facevansi a perseguitare colui, non altrimenti che uno sciaurato malfattore, per lapidarlo.

Sendo condotta a termine simigliante operazione gl' Imbalsamatori, i quali venivano considerati come Persone Sagre, davansi ad effettuare l' ufficio loro. Estravano costoro per le narici della defunta persona per mezzo di un' istrumento di ferro uncinato tutto il cervello di quella, il qual ferro era apposta fabbricato, e provveduto per questo particolare lavoro; e ripiempivano tutto il cranio di droghe astringenti. Ne estravano poscia simigliantemente tutti gl' intestini, a riserva del cuore, e degli arnioni per mezzo di un' apertura, che essi avevano già fatta nel fianco. Questi intestini venivano lavati ben bene nel vino di palma, ed in altre droghe gagliardissime, e eleganti. Tutto il corpo veniva unto con olio di cedro, colla mirra, col cinnamomo, o cannella, e con altri aromati per lo spazio d' intorno a trenta giorni, di modochè veniva a conservarsi intero, non solamente senza putrefarsi, ma cielava un' ottimo, e soave odore: *Αἰὶς τῶν δὲ μὲν ἰσχυρὸν ἔσθιοιτο, καὶ κινῆται ἀπὸ τοῦ*. Ed i Persiani, siccome l' Autore medesimo, vale a dire, Sello Empirico, osservava usavano *εἰς τὴν μύτην*. Veggasi *Sex. Emp. Pyrrhon. Hypoth. Lib. 2. cap. 24.*

I corpi nella divisa guisa conservati adimandavansi *Mummies*, e quello dall' Ara-

bico termine *Mum*, che importa cera, che era un ingrediente, che faceva parte della preparazione per l' imbalsamamento.

Cid fatto il corpo medesimo così preparato, veniva posto nel sale, ove tenevavolo per tratto di quaranta giorni in circa. Che perciò allorchè Mosè dice, che furono impiegati quaranta giorni nell' imbalsamamento del Profeta Giacobbe, noi dobbiamo onninamente intendere per simigliante espressione quella quarantina di giorni continuati, per quali quel santissimo corpo venne tenuto entro il sale di nitro, senza includervi per verun conto le trenta giornate, che furono consumate nell' effettuare le altre ceremonie tutte poc' anzi accennate; di modo che in tutto, il pianto durò nell' Egitto, siccome simigliantemente osservò lo stesso Mosè, intieri settanta giorni.

Dopo questo tratto di tempo il corpo cavavasi fuori del sale, lavavasi, falcivasi tutto all' intorno con bende di tela di lino inzuppate di mirra, e tutte stropicciate, ed inzavardate di una certa particular gomma, che dagli Egiziani veniva usata in vece di colla.

Cid eseguito il corpo medesimo in tale stato veniva restituito ai suoi Congiunti, e questi ponevano in una cassa, e conservavano nelle proprie loro case, oppure in certi particolari depositi, o tombe fabbricate per tale effetto. Alcuni dei divilati corpi sono stati fino ai dì nostri ritrovati nell' Egitto sotto camere, o volte sotterranee, e questi scuoprimenti ci hanno avvertito dimostrativamente tutto ciò, che detto abbiamo finora.

Coloro poi presso gli Egiziani, i quali non erano facoltosi a segno, che supplir potessero a sì rilevante spesa, si contentavano di infondere nel corpo del defunto per l' ano con una canna da serviziale un certo particular liquore estratto dal cedro, ed ivi lasciavano, rit. Vando poscia il cadavero medesimo nel sale di nitro. Quell' olio divoravasi la parte umida di tutti gl' intestini, di modo che, allora quando volevano di nuovo cavar fuori, gl' intestini se ne uscivano insieme coll' olio medesimo inariditi affatto, senza esservi nemmeno per ombra putrefatti. Il cadavero poi essendo racchiuso nel nitro, seccavasi totalmente, ed a segno che del medesimo

desimo altro non rimaneva salvo la sola pelle attaccata all' ossa, od incollata sull' ossa. Quelli finalmente, che eran così poveri, che soccomber non potevano nemmeno a questa spesa, altro non facevano, che nectar ben bene il corpo morto nelle sue parti interne, coll' infondere per via di siringhe certo liquore entro il corpo medesimo; e ciò fatto collocavano il corpo della defunta persona, senza alcun' altra cerimonia, entro il nitro, ove lasciavano per intieri settanta giorni, affinchè si seccasse. Veggasi *Calmet*, *Dictionarium Bibl.*

Ella non è maraviglia, che noi troviamo dei corpi umani conservatisi, e mantenuti senza corrompersi pel tratto lunghissimo di molte, e molte età: a forza di sostanze aromatiche, ed altri ingredienti valevoli a far tetta alla putrefazione, applicati ai cadaveri con elastissima cura, e maestria; ma ella è bensì una cosa assai strana, e pressochè prodigiosa, che in alcuni dati luoghi particolari abbiasi una specie di imbalsamamento effettuato dalla medesima natura; avvegnachè in certi dati luoghi i corpi morti vengano conservati illesi, ed intatti dalle sole virtù, facoltà, e qualità del suolo, in cui trovansi disposti: ma, malgrado sì fatta maraviglia, noi abbiamo non radi esempi di questo evidentissimo fatto. Nelle nostre Filosofiche Transazioni leggiamo un' istoria di un' uomo, e di una donna, i quali rimasero miseramente perduti fra le gran nevi nelle paludi di Speranza nelle vicinanze delle boscaiglie della Provincia di Derby, il dì quattordicesimo di Gennaio dell' anno 1674. Queste persone non furono trovate, se non se il dì tre del Maggio seguente, nel qual tempo gittavan fuori un così potente ed acuto fetore, che l' Ufiziale destinato dal Magistrato alla disamina dei corpi trovati morti, con somma prudenza, ed avvedutezza ebbe a comandare, che fossero incontanente sotterrati in quel luogo medesimo. Questi corpi si giacquero sotterrati in quel paludoso terreno pel tratto di intieri vent' otto anni prima, che venissero scoperti di bel nuovo, alloraquando alcune persone, le quali udito avevano favellare delle maravigliose virtù del suolo di tutti

quei contorni di conservare illesi i corpi morti, ruppero il terreno, e trovarono le due divise persone belle, ed intiere, non alterate nei corpi loro in un menomo che, avventi per fino il color della pelle bellissimo, ed affatto naturale, e le carni morbide, fresche, e maneggevoli, non altrimenti che abbianle i corpi morti di poche ore. Veggansi le *Trans. Filosof.* n. 434. pag. 415.

Dopo di ciò venne contrassegnato il luogo, ove queste due persone stavansi sotterrate; e quivi furono veduti da chicchessia, che vago ne fosse, pel tratto di vent' anni, quantunque vennero a cambiarsi di assai a motivo delle soverchie frequentate volte, che in tal tratto di tempo furono scoperti; e l' anno 1716. vennero trovati nello stato e condizione, qui appresso descritta: Il corpo dell' uomo era perfetto: la sua barba era consistente, ed era lunga intorno alla quarta parte di un dito: i capelli del suo capo erano corti. La pelle di tutte le sue membra era dura, e sissa, e del colore di penna abbronzata, o pure della terra umida, in cui giacevasi. Aveva in dosso un' assai larga casacca, la quale era lana, illesa, e niente patita, siccome lo era, allorchè vestiva da vivo. Il corpo della donna era stato levato fuori del terreno, e trovavasi assai pregiudicato, e patito: una gamba le era caduta, e tutta la sua carne era in pessimo stato; ma le ossa conservavansi sanissime, e la carne di una mano era calcata, ma tutte le ossa di quella erano di pari intatte: nella sua faccia il labbro superiore, e la punta del naso erano caduti, ma in tutto il rimanente era sanissima: i capelli della sua testa erano lunghi, e sommamente arrendevoli, non altrimenti che quelli di una persona vivente. Sendole in quel tempo fatto cavato un dente dalla sua bocca, questo era di pari elastico, che un pezzo di acciaio, e giungeva benissimo, ed attorniavasi intorno alle dita, ma incontanente ritiravasi, e ripigliava di nuovo non altrimenti, che una molla, la sua forma primiera: il dente medesimo però venne a perdere la divisa qualità subito, che fu levato da quella terra. Dopo il diviso tempo questi corpi furono sepolti

nella Chiesa di Speranza, ove indi a pochi anni furono trovati totalmente disfatti, e consumati.

Nel luogo, ove questi due cadaveri furono la prima volta sotterrati, erano stati posti sotterra l'altezza di un braccio Inglese, ed il suolo era umido, ma non avcavi nel luogo attuale acqua stagnante. Allorché al cadavero dell'uomo furono tratte via le calze, le sue gambe, che non erano rimaste per innanzi scoperte, comparvero bellissime: la carne, allorché veniva premuta colle dita, cedeva alcun poco, e le sue giunture erano mobili, e pieghevoli, senza la menomissima tenacità, ed intirizzamento; ma le altre parti avevano assai patito. La gente per capriccio, o per curiosità aveva di tratto in tratto tagliato, e portato via buona parte dei loro vestiti; ma quei brani, che rimanevano loro indosso, erano ottimi, e benissimo conservati.

IMBIANCAMENTO. Nella faccenda degli Ortolani è questa un'operazione, che viene da essi effettuata intorno a certi dati particolari erbaggi, e radici, e somiglianti, come sedani, indivie, cc. a fine di rendere questi erbaggi medesimi più appariscenti, più teneri, e più acconci per le tavole.

Il tempo per l'imbiancamento, o per porre in bianco il sedano è verso la metà del mese di Giugno, allorché buona parte dei sedani per tempo seminati, faranno giunti ad una propria grossezza, ed altri per esser trapiantati, ed aggiustati nelle usate fosse, ed arginetti per tal lavoro. Questa specie di trincee debbon esser tagliate da una linea larga quelle otto, o dieci dita, e a un di presso altrettanto profonda, entro la quale l'ortolano dovrà per acconcio modo aggiustare le sue piante, dopo che ne avrà mozzate le vette, e le radici. Via via, che i sedani andranno ingrossando, ed allargandosi, l'ortolano andrà dando loro della nuova terra lasciandone sempre quelle quattro, in cinque dita soltanto fuor delle loro sommità, e così continuerà a fare il medesimo lavoro fino a tanto che i sedani sieno a segno imbiancati, che sieno bastantemente buoni per l'uso della mensa: lo che di ordinario non l'ottiene

se non dopo sei settimane, che stati sieno nella divisa foggia interrati. (a) Rispetto poi all'invidia, tolto che è ingrossata, l'Ortolano spiantala, e sotterrala, facendosi prima dalle piante più faticce, e così seguitando; ed in una quindicina di giorni troverà la bella, e bianca, sicché per buon tratto di tempo avrà le sue buche differenti di indivia imbiancata per l'uso ec. (b)

(a) Veggasi Bradl. nuovo miglioramento per gli orti, parte 3. pag. 162. (b) Bradl. loc. cit. pag. 163.

IMPIASTRO. Per impiastro intendosi nella farmacia un'applicazione esterna di faticcia, e più consistente di un unguento. Si fatto topico medicamento dovrà essere disteso, e sparato, secondo le varie circostanze di una ferita, del luogo, o del paziente, o sopra delle pezze di tela di lino, o sopra della pelle conciatà. In evento, che la parte, sopra la quale dovranno stendersi gl'impiastri, sia naturalmente pelosa, sia onninamente di mestieri, che venga prima per acconcio modo rasa; ma affinché l'impiastro possa fare presa migliore fa di mestieri esaminar la parte, alla quale dovrà essere applicata, e dovrassi stenderci esso impiastro, ed accomodare, o rotondo, o quadrato, o triangolare, od ellittico, ed in forma di mezza luna, o della figura della lettera T, secondo la naturale configurazione della parte ec. Alcuni similmente di questi impiastri sono ad ambe le loro estremità divisi, ed altri sono forati nel mezzo. Questi secondi son di uso assai frequente nelle fratture accompagnate da una ferita; conciossiachè per mezzo di similgiantre forma di impiastro la ferita possa essere comodamente nettata, rimodata, e medicata senza il bisogno, e la briga di levar via per questo l'impiastro. Questi Impiastri sono di forme differenti, secondo la parte, sopra la quale debbon esser distesi; ma soglion'essere d'ordinario quadrati, oppure rotondi; ed, a vero dire, non havvi parte nel corpo umano, alla quale non possa essere adattabile acconciamente una delle due divise figure, qualora vengano ne' loro contorni intaccate coa un paio di cesoje.

Vari sono gli usi degl'Impiastri. Rifaccono

scono questi di gran fervigio per assicurare le medicature: accelerano il maturamento dei tumori, riuniscono, e cicatrizzano le ferite: combaggiano, e rassodano le ossa rotte, rammarginano le feccature: ammansano i dolori, e corroborano le parti indebolite. Veggasi *Eistero*, Chirurg. pag. 18.

IMPOTENZA. Noi abbiamo degli esempi parecchi d'inasabilità alla generazione negli uomini, o sia impotenza generante, originata da un impedimento allo scagliamento del seme nel coito, prodotto da una prava direzione, o meccanismo vizioso, che trovassi orisiz del Verumontano, o capogallinaceo pel quale il seme viene ad essere spinto nella vescica. Venne fatto al valentissimo Chirurgo Francese Monsieur Petit di curare un uomo, che soccombeva al divisato vizio di scagliamento femminile, eol fargli soltanto un'ineisione somigliante a quella, che fassi comunemente nell. grande operazione per l'ellirazione della pietra. Veggansi *Memoirs de l'Acad. de Chirurg.* Tom. I.

Può l'impotenza essere cagionata da varj accidenti, ma assai lovente riconosce la sua origine dall'uso incominciato troppo per tempo, ed anche trasmodato, dell'atto venereo; ed anche bene spesso da venerei malori. Veggasi l'Articolo *VENEREA infermità*.

IMPRESTITO marinarefco. Questa faccenda, che dagl' Inglesi viene espressa colle voci *bossmory*, e *bossmorge*, e dagli Olandesi col termine *badmery*, i Francesi dinotarla in tre maniere, vale a dire, appellandola *bomerie* (a), *bodinerie*, (b) ed anche *grosse aventure*. Noi altri Italiani la diremmo per acconcio modo *Imprestito* marinarefco; tanto più, che non mancano Autori di conto, che voglionla una cosa medesima, che il *foenus nauticum* degli Antichi. (c) Altri però, non senza ragione, fanno quelle due cose differenti infra loro. (d)

(a) Veggasi *Savary*. *Diâ. Commer.* Tom. 1. pag. 401. (b) *Ejusdem supplement.* pag. 74. in voce *Bodinerie*. (c) *Molly de Jur. Maritim.* l. 2. cap. 11. §. 9. pag. 293. & seg. (d) *Trattato dei Dominj, e delle Leggi del Mare*, nella Prefaz. pag. 3.

La ragione, o dir lo vogliamo rate, ed

interesse del danaro preso sopra l'Imprestito marittimo, seguita, e va a norma di quella della assicurazione, che fassi di mercanzie, di vascelli, e fomiglianti da qualsivoglia perdita, o danno. Nella guerra della Regina Anna, allorchè l'assicurazione per l'Indie Orientali, e pel ritorno era d'un sedeci per cento, l'Imprestito marinarefco montava ad un quarantacique per cento.

Nella guerra del Re Guglielmo, allorchè l'assicurazione pe' paesi medesimi dell' Indie Orientali era d'un ventidue per cento, l'Imprestito divisato ascendeva ad un cinquantacique. Veggasi *Trattato dei Dominj, e leggi del Mare*, Append. p. 10. & seg.

Se l'Imprestito marittimo venga soltanto considerato non altramente, che un danaro d'affitto, in tal caso, non farebbe Legale, e verrebbe manifestamente a cadere sotto il carico dell'usura; per rapporto del trasmodante, e veramente eccessivo interesse; ma questo non è già un mero e semplice dar del danaro a multiplico, eonciolsiache colui, che impresta, stia di pari agli avvenimenti, e pericoli del viaggio. Il danaro ivi imprestato, o messo nelle mani di quel tal mercadante, viene appellato *Pecunia trajectitia*, come quello, che vien condotto via a pericolo di colui, che la sborfa, od impresta, di là dai Muri; di maniera tale che, in evento, che il bastimento si perda, l'Imprestatore perde tutto: dove per lo contrario, allora quando il danaro vien mandato, o consegnato ad interesse, viene sborfato a pericolo di colui, che lo prende, non già di colui, che lo dà. Ed ivi il profitto è meramente il prezzo dell'imprezzanza: ma il profitto dell'altro è una ricompensa, o guiderdone dei pericoli, ed avventure marittime, le quali colui, che impresta, prende sopra sè, ed a suo carico, e quindi è, che la faccenda divenga legittima, e legale. Veggasi *Idem*, *ibid.* pag. 206. & seg. *Lex Merc.* cap. 1. pag. 37. *Biglietto*, o *Cedula d'Imprestito marinarefco*.

E' questo un Contratto fra due persone, una che prende ad imprezzanza, l'altra, che somministra una somma di contante, per cui colui, che lo prende, palesa, ed espone la sua intenzione per fare un viag-

gio in certo dato Balimento nella cedola, o biglietto nominatamente espresso, confiscando la ricevuta d'una certa somma di danaro dall'imprestante sotto questa condizione, e patto, che in evento, che il balimento termini prosperamente il suo viaggio, senza patire alcun disastro dai suoi nemici, od in altra qualunque siasi guisa, in tal caso sia tenuto a restituire all'imprestante la sua somma, con altra somma ad essa aggiunta nella cedola d'accordo espresso, per l'interesse, dentro un certo dato prefisso tempo dopo il suo ritorno: ma che in evento, che il balimento perisca, o sia preso dai Nemici, od ai Corsari, la persona di colui, che riceve l'imprestato non debba aver il carico di rimborsare l'imprestante di un menomo che, e la perdita debba andar tutta a conto di esso imprestante. Veggasi Trattato del Domin. e delle Leggi del mare, pag. 617. Item, pag. 580. & seq.

INFIAMMAZIONE. Un'affai moderato Autore porta opinione, che l'Oftalmia, l'angina, la frenitide, la peripneumonia, la pleurite, l'epatite, la nefritide, ed il reumatismo, abbiano tutte la caratteristica medesima, e che in nulla altro differiscano, salvo nella non sola parte affetta; di modo che se uno possiede una diritta, e giusta cognizione di un'infiammazione sopra una parte esterna, del suo procedimento, e dei rimedj acconci, ed adeguati, e che a un tempo stesso sia bene informato dell'anatomia, e dell'animale economia, non possa essere a meno, ch'ei distingua perfettamente, e ebe per conseguenti tratti, e curi da prode qualsivoglia delle malattie a questa Classe appartenenti. Veggansi Saggi di Medicina d'Edimburgo, Vol. 1. pag. 265. *Disperzione delle Infiammazioni.* Veggasi l'Art. **DISPERZIONE.**

INFRASPINATUS. Così addimandasi un muscolo triangolare, carnoso, e totalmente dilatato, in qualche parte penniforme, riempiente tutta la cavità infraspinale, o sia la fossella della Scapula. Trovasi fissato nella metà posteriore della cavità infraspinale, o fossella, ed alla parte corrispondente della base della scapula. Quindi prende sua origine numero grande di corte fibre caruose, le quali scorrono giù più, o meno obliquamente, e vengono a

terminare in un piano di mezzo tendinoso, che finisce alcun poco sotto la parte più dilatata, e più ampia della spina della scapula, sotto la radice dell'Acromio. Allora le fibre caruose lasciando l'osso, s'uniscono in una massa carnosa, la quale passando sotto l'acromio, sopra l'articolazione della testa, od intestatura dell'osso dell'omero, ed aderendo al ligamento capsulare, vengono ivi a terminare in un dilatato tendine piatto, il quale rimanendo similmente attaccato alla capsula, viene dopoi inserito nella maggior superficie di mezzo della grande protuberanza dell'intestatura dell'osso dell'omero. In quel luogo, in cui le fibre lasciano la fossella infraspinale sotto l'Acromio, havvi copia grande di grasso, o sieno cellule adipose fra le ossa, e la porzione sciolta della massa carnosa. Questo muscolo un poco sotto la spina apparisce doppio, e verso la base della scapula a motivo del piano tendinoso di mezzo già mentovato. Sembra similmente, che venga a rimaner confuso col Terete minore, al quale stassi strettissimamente congiunto; ed il suo tendine in un lato è unito con quello del Terete maggiore, e dall'altro lato con quello del soprastinato, e vienvi coperto dalla porzione posteriore del Deltoid. Vegg. *Vinslow*, Anatomia, p. 183.

INARGENTARE. E' questa una specie d'indoramento, e può esser fatto nell'appresso guisa.

Prenderai quella porzione adeguata d'Acqua forte, che ti potrai immaginare, che t'abbisogni per l'intento: la porterai in un vaso di vetro accomodato sopra delle ceneri calde: quindi vi porrai la sua porzione d'argento, dopo d'averlo ben battuto, e ridotto sottilissimo, e che l'avrai tagliato in picciolissime fettucce, o ritagli. Allorché l'argento sarà sciolto, leverai via le accennate ceneri calde, e mescolando questa sostanza liquida con tanta porzione di tartaro bianco, che sia bastevole a formarne con esso una specie di pasta: andrai inzavardando con questa divisa mistura il metallo, che avrai in animo d'inargentare. Il bronzo, il rame, o qualsivoglia altro metallo in similante guisa puoi far comparire verace argento; e di vero, allorché la faccenda venga dicte-

vol-

volmente , e macisevolmente effettuate , stenterassi a distinguere per altro , che per vero argento .

Il bronzo , il rame , l'acciajo , ed anche il ferro possono essere inargentati nella seguente maniera così forte , che l'inargentatura non vada via dai metalli medesimi , se non vengano prima a forza di fuoco fatti rossi roventi .

Prenderai dell'orina , che sia stata evacuata la mattina , la porrai in un vaso , e la cuoprirai , lasciandola così quieta , e coperta pel tratto di un mese intero , ove ella fermenterà : dopo questo tempo la porrai in un vaso di terra cotra , e la farai ben bollire : mentre bolle l'andrai schiumando : ed allorchè ne farà svaporata la terza parte , prenderai due pinte d'orina , un'oncia di tartaro ed un'oncia di pietra *galiz* , mescolerai tutto insieme , e lo farai sul fuoco alzare il primo bollo . Allorchè vnrrai inargentare alcun metallo andrai stropicciando ben bene con della polvere di matton cotto attaccata ad uno straccio di panno lano inumidito , fino a tanto che il metallo medesimo resti sommamente pulito , e lustro : ciò fatto lo porrai in infusione nell'orina preparata pel tratto di venti quattr'ore : dopoi lo asciugherai , ed in quelle parti , ove vorrai , che sia inargentato , lo andrai inzavardando , e stropicciando con dell'argento vivo , il quale fa di mestieri , che venga disteso sottilmente con una spatola di ferro , la quale sia stata similmente per buone due ore entro l'orina medesima . L'argento vivo così steso ed affottigliato fa di mestieri , che vengavi allora stropicciato sopra con un pezzo di panno lano morbidissimo , e questo produrrà una finissima , e bellissima inargentatura .

Puossi inargentare il bronzo col farlo bollire con limature d'ottimo , e purgatissimo stagno , e con del tartaro bianco , vale a dire , con porzioni uguali di queste due sostanze .

Hanno altre maniere , e metodi diversi d'inargentare , per i quali rimettiamo chi sia vago di ciò al Laboratorio del Sig. Smith , che gli espone tutti alle pagine 37. 38. & seg.

INCHIOSTRO . L'inchiostro da scrivere è comunemente composto di vetrio-

lo , e di galle , ma per questa faccenda medesima possono di pari servire mirabilmente bene altre piante allringenti altresì , quali appunto son la scorza di querciuolo , le rose rosse , il legno indico , od il sommacco . Sembra che Monsieur Boyle facesi a dubitare , se tutti i vegetabili d'indole allringente sien valevoli a produrre l'effetto medesimo . Veggasi *Boyle Oper. compend.* Vol. 5. pag. 37.

Le limature di ferro poste in parecchi fughi di vegetabili comuni , in un batter d'occhio gli rendono neri come l'inchiostro ; e quindi sembrerebbe , che il vetriuolo nel far l'inchiostro agisse soltanto come una sostanza , che contiene in sé parti di ferro : il quale dà sempremai un color nero ad un'infusione di galle , o di similgianti sostanze vegetabili , e questo vien tanto più profondo , più cario , e più cupo , quanto vien ad essere più diviso nelle sue particelle dagli acidi . Secondo siffatta regola tutti quei vetrioli , che hanno per base loro il ferro , e tutte le soluzioni del ferro negli acidi vetriolici , sulfurei , od alluninosi , for' è che insieme colle galle facciano l'inchiostro , come anche con altre similgianti infusioni : ed il vetriolo azzurro di Cipro , come anche tutti altri vetrioli , che per loro base hanno il rame , for' è che nelle divise infusioni non producano questo effetto : e sì la prima , che la seconda di queste due iluzioni viene in realtà dall'esperienza confermata .

In esaminando disgiuntamente i due principi , ai quali sono composti i vetrioli atramentali , vale a dire , il loro acido vermiforme , e la loro base della materia del ferro , egli apparisce , come essendo mescolato con un'infusione di galle il solo acido , questo non produce in conto veruno l'inchiostro ; dove per lo contrario la sola base , vale a dire , le particelle del ferro , produrranno collantissimamente , ed in brevissimi momenti l'inchiostro medesimo . Quindi egli apparisce , che l'acido non ha parte , o luogo alcuno nel divisato effetto , e che il tutto è dovuto ad una materia ferruginola stanziante nel vetriolo , ricovrantesi di nuovo in ferro . La maniera , in cui questo ravvivamento , o ricovramento del ferro viene ad essere così in un subito effettuata nel mescolar , che altri fa

il vetriolo coll'infusione di galle, sembra essere, che questa infusione agisca non altrimenti che un'assorbente sopra l'acido il quale aveva prima ridotto il ferro in vetriolo, e le particelle ferruginose essendo così libere e scure dell'acido dal quale vennero trasformate in vetriolo, appaiono di bel nuovo nella loro formatura, e producono l'effetto medesimo sopra l'infusione, che farebbe il puro, e semplice ferro. Veggansi *Memoires Acad. Roy. Paris. ann. 1707*.

Una prova, che gli acidi del vetriolo lasciano le particelle del ferro nei pori delle molecole delle galle sospese nell'infusione, e che a questo solo ravvivamento, o ricovramento del ferro è dovuto il color nero del liquore, è quella; che se dopo che l'inchiostrò è così fatto, vengavi aggiunta una piccolissima porzioncella d'acido, o di spirito di vetriolo recente, e fresco, le particelle del ferro immediatamente ricevono, la qual cosa non avverrebbe, se l'acido, cui esse prima possedevano, non fosse stato estratto fuori delle medesime. La conseguenza del ricevere, che esse fanno questo nuovo acido, si è il loro esser di nuovo disciolte, e ridotte alla forma di vetriolo, di modo che viene ad esser distrutto il loro ravvivamento; e siccome questo solo nell'inchiostrò produceva il color nero, quello similmente se ne va, e diseguali, ed il liquore resta limpido, e chiaro; conciossiachè il vetriolo nello stato di vetriolo non sia valevole a far nera una soluzione di galle, nè che questa soluzione torni di bel nuovo, o riduca un'altra volta il vetriolo in ferro, allora quando abbia già assorbito quella data porzione d'acido che valse a ridurlo a quello stato, che richiedevasi.

Da questo solo principio, e non altrimenti, avviene appunto, che dipende, che l'agresto, il sugo di limone ed altri acidi de' vegetabili portin via, e facciano smarrir dai panni lini le macchie dell'inchiostrò: riconoscendo queste macchie unicamente l'origin loro dal ferro, e questi acidi convertendo di bel nuovo quello ferro medesimo in vetriolo.

Egli è chiaro, ed evidente da ciò, che detto abbiamo finora, che le galle agiscono non altrimenti che assorbenti nel fo-

mare l'inchiostrò col vetriolo: nè è questo già il solo esempio, che esse senza valevoli ad agire nella maniera medesima: avvegnachè esse suppiungano in luogo degli Assorbenti comuni, quali appunto sono il sal di Tartaro, l'acqua di calceina, di sale ammoniac, e sostanze similanti nel precipitare le soluzioni metalliche. Così sono similantemente tutte le altre infusioni vegetabili, le quali produrranno l'inchiostrò col vetriolo; ma siccome le galle producono un'inchiostrò, migliore di quello di qualsivoglia altra vegetabile infusione, così esse vengono ad agire con assai maggiore energia di qualsivoglia altra sostanza vegetabile nel precipitare i metalli dalle loro soluzioni.

Dovrebbe altri prometterci, che siccome le galle agiscono sopra le metalliche soluzioni non altrimenti, che il sal di Tartaro, l'acqua di calceina, e similanti, così il sal di Tartaro, e queste altre sostanze agissero di pari in una soluzione di vetriolo, e lo convertissero in inchiostrò: ma la differenza si è, che mentre queste agiscono come meri assorbenti, e tirano soltanto le particelle degli acidi nel vetriolo, le galle agiscono come assorbenti, insieme, e ad un tempo stesso ancora come corpi sulfurei, prendendosi, e levando via le particelle acide, e dilungandole dalle particelle ferruginee, e per similante guisa scomponendo il vetriolo, e lasciando il ferro di esso ravvivato, e nello stato di ferro. Veggansi *Mem. Acad. Roy. Paris. ann. 1707*.

Qualsivoglia Assorbente, od Alcalico, caricato di particelle sulfuree, produrrà l'inchiostrò con una soluzione di vetriolo nella maniera medesima della infusione delle galle, quantunque far non possa un semplice assorbente. Così le scorie del regolo d'antimonio, senza ferro, disciolte in una quantità abbondevole d'acqua, somministrano un liquore a un tempo stesso con un'acidi, e collo zolfo d'antimonio; e questo liquore produce l'inchiostrò con una soluzione di vetriolo, di pari che colle galle.

Nella maniera medesima l'acqua calda versata sopra la calceina viva, e l'orpiamento, dopo esservi rimasta pel tratto di cinque in sei ore diviene un'acqua di calceina

eina in grado sommo impregnata dello zolfo dell'orpimento, e questa effeodo somigliantissima all'altra, vale a dire, a un tempo stesso uo corpo assorbente, e sulfureo, agisce oon altramente, che la prima nella foggia delle galle, e fa divenire inchiostro una soluzione di vetriolo. Si fatte opinioni vengono somigliantemente confermate dalla natura, ed indole medesima del ferro: noi sappiamo già esser questo uo metallo sommanente sulfureo, e quindi acconcissimo ad imbeverfi coo estrema facilità degli acidi; ed è cosa agevole a concepirsi, che uoa volta che gli abbia imbevuti, e che si è convertito in vetriolo, non vi ha cosa, che possa spogliarlo perfettamente de medesimi, e ricavarlo di bel nuovo allo stato suo di ferro, ma ad un liquore ugualmote sulfureo, ed atto di pari a ricevergli.

Tuttochè parecchie sostanze vegetabili sieno valevoli a supplire io luogo delle galle nel produrre l' inchiostro con una soluzione di vetriolo, oulladimeno tutte noo producono l' effetto così bene; e la ragione, onde le galle producono in forma migliore delle altre sostanze tutte, che posseggono tal qualità, si è, perchè elleno sono appunto il massimo, ed il più efficace, ed energico di qualsivoglia altro vegetabile d' indole assorbente. Posseggono somigliantemente le galle una proprietà glutinosa, la quale rende un' infusione d' esse valevole a sostentare le particelle ravvivate del ferro. Questa proprietà manca a moltissimi, od a tutti gli altri vegetabili messi in opera in si fatta occasione; e questi tali, quantunque producano l' inchiostro immediatamente, che vengano mescolati con una soluzione di vetriolo per mezzo di ravvivare le particelle del ferro, nulladimeno, non essendo queste valevoli al sostentarle, o tenerle sospese, allorchè sono ravvivate, avviene che queste particelle medesime precipitino al fondo, e che per conseguente il liquore divenga opresse chiaro, e limpido. Uoa preia di gomma arabica, o qualunque altra sostanza di somigliante natura che aggiungasi alla misura, ripara egregiamente bene il difetto divisato, con somministrarle la qualità glutinosa delle galle; ed io fatti copo di ciò le particelle del ferro non

Suppl. Tomo III.

precipitano più, e l' inchiostro rimane buono, e perfetto.

Tutti i vegetabili sono più, e meno accoci per far l' inchiostro coo una soluzione di vetriolo, come quelli, che più, o meno s' approssimano all' indole, e natura delle galle, e sono assorbenti, ed agglutinanti. Di tutte le sostanze vegetabili niuna apparisce così buona per far l' inchiostro, quanto questa classe degli astringenti, la quale agisce per via d' inspessire gli umori, di consolidare le parti, e di distruggere gli acidi, che le irritano. Di questa specie sono le bucce delle mele granate, le balaustine, il sommacco, le rose rosse, le ghiaode, e le foglie, ed il legno della quercia, e finalmente le galle. Le virtù di tutte queste sostanze nella Medicina, dipendono intieramente, ed unicamente dal loro essere corpi assorbenti, e sulfurei, siccome è stato dimostrativamente provato, essere le galle. I rimedj purganti dall' altra parte, non producono effetto simile, od analogo. Le infusioni di fena, d' agarico, di gialappa, di colocintide, di tabacco, d' eleboro bianco, e nero, sono state moltissime volte ipermentate in una mescolanza con una soluzione di vetriolo; e niuna affatto di esse dà al liquore la menomissima negrezza, nè sembra tampoco, che posseggano la menoma tendenza verso un tale effetto. Questo viene a coconfirmare ciò, che è stato di già osservato, conciossiachè si fatti medicamenti catartici non posseggano qualità assorbente; ma per lo contrario contegono tutt' essi dei sali sommanente attivi, e pungenti, dai quali unicamente dipende la facilità, e virtù loro purgativa. Veggansi *Memoires Acad. Roy. Paris.* ann. 1707.

Per l' altra parte poi il Rabarbaro, ed i Mirobolani, elle posseggono una virtù e facilità medicinale astringente, la quale essi metton fuori, ed esercitano, dopo aver operato colla facilità loro purgativa; per conseguente forz' è, che contengano di necessità alcune particelle astringenti, ed agglutinanti; e coequentemente le infusioni di somiglianti sostanze forz' è, che convertano in inchiostro le soluzioni del vetriolo.

Somiglianti esperienze non sono già nell' uso loro limitate a farne unicamente dell'

Q

in-

inchiostro; ma possono benissimo stendersi ad ulteriori usi parecchi, conciossiachè, siccome egli apparisce indubitato, e certissimo, che il vetriolo non può produrre l'inchiostro, se non è quel tal particolare vetriolo, che contenga parti di ferro; e che non vegetabile può produrre l'inchiostro medesimo con nium' altro vetriolo, se non se con quel solo che possenga una facoltà, e virtù astringente; queste due sostanze divengono cementi, o prove l'una dell'altra, e servir possono egregiamente bene a far riattaccare le facoltà, e virtù di tali sostanze, che non sono conosciute. A cagion d' esempio, qualsivoglia non conosciuto vegetabile può esser posto a cemento, e sperimentato per mezzo della sua infusione in mescolanza con una soluzione di vetriolo: se questo vegetabile renderà la soluzione medesima nera, si conoscerà essere una sostanza astringente, in cunto ch'ei non produce questo effetto, non sarà tale. Ed in qualsivoglia vetriolo il cemento, o prova può agevolissimamente esser fatta, per vedere, e per assicurarsi, se contenga sostanza ferruginosa, ond, conciossiachè se contrattalla, renderà istantaneamente nera la soluzione colle galle, nè ha renderà tale, s' e' sarà scervo, e spogliato di ferro. Tutti i vetrioli di rame o la comune spezie di vetriolo paonazzo, e gli altri di spezie somigliante, non hanno facoltà o forza di convertire in inchiostro una soluzione, qualunque ella siasi, eziandio di galle. Le mescolanze di vetriolo paonazzo, e verde, producono un inchiostro rossiccio; e con somma probabilità tutti quei vetrioli, i quali producono un inchiostro del medesimo colore rossiccio, contengono considerabile porzione di rame, che è la base del vetriolo azzurro, mescolata col loro ferro.

INCHIOSTRI Simpatetici, o simpatetici. Cadauna sorte di liquore, col quale una persona possa scrivere in modo, che le lettere non compariscano fino a tanto che vi venga usato alcun mezzo particolare per darle alle medesime un colore differente da quello della carta, sono appellati inchiostri simpatetici. Di questi trovansi descritti in numero prodigioso, e di spezie moltissime nelle opere del famoso Napolitano Giambattista Porta, in quelle del Lemery, e d'altri Autori eziandio.

Tutti questi inchiostri esser possono regolarmente distribuiti in classi diverse secondo i differenti mezzi, che usar dovranno per fargli risalire, e comparire sulla carta: e queste Classi sono in generale, e così all'ingrosso le quattro seguenti.

1. Per via di dare un nuovo liquore, od il vapore d'un nuovo liquore ad una parte della carta sopra la quale sieno scritte già le lettere con inchiostro naturalmente invisibile. 2. Per mezzo d' esporre la carta all'aria, pel qual mezzo le lettere alla bella prima invisibili, salteranno fuori, e compariranno. 3. Col far passare gentil modo sopra le lettere una materia d'alcun' osservabile colore ridotto prima in polvere pressochè impalpabile. E 4. Coll' esporre la carta sopra il fuoco.

Quest'ultimo metodo è di gran lunga il migliore, ed è così generale, che può essere prudentemente usato per tutte quelle carte, che venga sospettato, che possano nella loro scrittura contenere alcun segreto, e questo metodo radissime volte falla di scoprirlo. Le comuni spezie tutte però di sì fatti inchiostri, qualora sieno stati fatti saltar fuori, e comparire, o per mezzo del fuoco, e per qualsivoglia altro metodo, non può esser fatti scomparire, od occultarsi mai più di nuovo: vi ha però una spezie di tale inchiostro descritta da Monsieur Heliot nelle memorie dell'Accademia Reale delle Scienze di Parigi, e poichè è stato sperimentato più, e più volte presso di noi non meno, che altrove, si è toccato con mano, riuscire mirabilmente. In questo metodo, tutte che le lettere, che dà quest' inchiostro, sieno per se stesse invisibili, ed appariscano non altrimenti che quelle d'alcuni altri inchiostri di spezie somigliante, nell'esser tenuti sospesi sul fuoco, tuttavia questo inchiostro dopo si farà scomparire, ed occultarsi di bel nuovo sopra la carta, e di bel nuovo più, e più siate coll'esperienza medesima farassi risalir fuori, e ricomparire sulla medesima carta. Questo pertanto è l'inchiostro per la prima volta conosciuto, d'una quinta Classe generale, della quale ulteriori ricerche, che vengano da altri fatte potranno essere per avventura far rinvenire degli altri somiglianti.

Del

Della prima Classe degl'inchiostrî simpatetici, o sieno quelli, che non saltan fuori, nè compariscono sulla carta che con essi è stata scritta, fino a tanto che non venga questa fatta imbevver un'altro liquore, oppure il vapore di un'altro liquore, sono le appresso spezie.

1. La Spezie d'Orpimento di Monsieur Lemery; E' questa composta di liquori differenti: le lettere debbon'essere scritte con una soluzione di piombo, o di litargirio fatta nell' aceto distillato. Questa essendo fatta seccare all' aria, non già al fuoco, non comparisce nemmeno per ombra sopra la carta; se questa venga stropicciata sopra con un pennellino intinto in una soluzione d'orpimento fatto nell'acqua di calceina, o se la carta venga fatta semplicemente imbevver il vapore di questa acqua, le lettere occultate immediatamente salteranno fuori alla bella prima d'un color giallo, ed indi a non molto diverranno nere. Queste possono esser fatte scomparire di bel nuovo, se la carta venga inumidita o stropicciata sopra con un liquore acido, quale appunto si è l'acqua forte, oppure lo spirito di vitro, e possono novellamente far comparir fuori, se prima che la carta medesima si sia asciugata, venga stropicciata di nuovo con una soluzione d'orpimento. Ella si è cosa agevole a concepirsi, che tutti gli effetti divisati vengono ad esser prodotti dalle successeve soluzioni, e precipitazioni.

2. L'INCHIOSTRO *simpatetico aurato*. Questo vien procurato per mezzo di disciogliere nell'acqua regia quella adeguata porzione d'oro, che può prendere quello menstruo, e poscia coll'aggiungere a questo liquore tanta quantità d'acqua, che soverchi il liquore medesimo di cinque, o sei doppi. Forz'è poi, che abbavi in altro vasetto alcuna porzione di stagno sciolto similmente nell'acqua regia, e poichè al fatto menstruo si farà di pari presso quella quantità di questo metallo, eh'ci può prenderli, dovrasse aggiungere al liquore una porzione uguale d'acqua comune. Fà di mestieri, che le lettere sieno scritte sopra una carta bianca colla soluzione d'oro, e la scrittura essendo fatta asciugare all'ombra, le lettere non com-

pariranno niente affatto, se non se pel tratto di sette in otto ore dopo: intiguerassi allora un pennellino nella soluzione, pur'or descritta, dello stagno, e stropiccerassi con essa sopra la soluzione d'oro, colla quale furono scritte le lettere, ed esse salteranno incontanente fuori d'un color vaghissimo porporino.

Potrebbe esser luppusto, che qualsivoglia altro metallo, il quale fosse solubile nel medesimo menstruo acido, venisse di pari a produrre simigliante effetto; ma fa l'esperienza toccar con mano, che ciò non avviene in conto veruno; e l'argento non meno, che il rame, tutto che si l'uno, che l'altro sieno solubili nell'acqua forte, nulladimeno non producono cambiamento di colore, per mezzo di sì fatte precipitazioni, procurate per via delle soluzioni de' medesimi, sopra la carta; e simigliante esempio della soluzioni dell'oro, e dello stagno, è veramente una genuina eccezione alle regole generali delle soluzioni dei metalli, e degli effetti rispettivi degli uni sopra gli altri.

Il color porporino di queste lettere può esser di bel nuovo occultato, e fatto sparire col bagnare o stropicciar la carta con un poco d'acqua regia semplice, e può esser fatto ricomparire, e saltar fuori di bel nuovo collo stropicciarvi sopra la descritta soluzione di stagno. Il Kunkel, il Cassius, e l'Orichal, ed alcuni altri Autori fecero i primi passi verso simigliante scoperta, per mezzo dei loro cimenti, e tentativi di dare al cristallo, a forza d'oro, il colore del rubino orientale. Hanno, oltre le divisate preparazioni minerali, alcune preparazioni vegetabili, le quali somministrano i fenomeni medesimi; ma queste sono le più certe.

Della seconda spezie degl'inchiostrî simpatetici, o sieno quelli, che compariscono nell'essere esposti soltanto all'aria, si è l'inchiostro aurato procurato per mezzo d'aggiungere alla soluzione dell'oro fatta nell'acqua regia, tanta acqua, che il liquore non arrivi a macchiare la carta bianca. Le lettere scritte con questo inchiostro non salteranno fuori fino a tanto che la carta scritta non sarà stata per parecchie ore esposta all'aria aperta; e quelle cominceranno allora ad acquistare un colore per

gradi fino a che diverranno alla per fine d'un color violetto eulpo e carico, inclinate al nero.

In evento, che in vece d'esporre la carta all'aria aperta, ella venga ferrata bene entro una cassetta, oppure ferratamente rivoltata entro un'altra carta, la scrittura rimarravvi affatto invisibile pel tratto di dur, ed anche di tre mesi; ma passato questo termine, la scrittura comincerà a saltar fuori, e comparir sulla carta, ed in guisa fomigliante andrà tratto tratto acquistando il color violetto carico divisato. Per tutto quel tratto di tempo, che l'oro continua a starsi unito al suo dissolvente, la scrittura seguita a mantenersi gialla; ma l'acido, che lo discioglie, essendo di un indole, e d'una natura volatile, la parte massima del medesimo svapora, e più non lascia di quello sia soltanto necessario a colorire la calcina dell'oro la quale rimansi sopra la carta.

Il secondo inchiotto di questa classe è l'argento, procurato per via d'una soluzione del medesimo argento nell'acqua forte, iodebolita dall'acqua distillata per modo, che ella non venga a macchiare la carta. Le lettere scritte con sì fatto inchiotto si conserveranno affatto invisibili pel lungo tratto di tre, o di quattro mesi, qualora la carta scritta con questo inchiotto tengasi ben chiusa entro una scatola; ma se questa venga esposta al sole, ella diventa leggibile nel breve spazio di un' ora in circa, conciossiachè per questo mezzo viene accelerato lo svaporamento dell'acido le lettere imprigionante. Le lettere scritte con questo inchiotto parricolare faranno d'un colore di pianella, cioè di quella pietra così appellata; e ciò dipende dalla natura fulfurea dell'acqua forte; avvegnachè qualsivoglia sostanza fulfurea annerisca di sua natura l'argento. Questo color neruccio però non è permanente; avvegnachè a poco a poco svaporando la parte fulfurea, le lettere vengono lasciate nella loro naturale apparenza, e sono d'un vero, e genuino color d'argento, qualora l'argento, che venne messo in opera, fosse finissimo, e fatta l'operazione in luogo aperto.

In questa Classe possono fomigliantemente collocare, e muovere a buona e-

quità parecchie metalliche soluzioni; come, a cagion d'esempio, quella del piombo nell'aceto, e del rame nell'acqua forte, la quale viene a dare alla perfine un color bruniccio alla carta; come altresì la soluzione dello stagno nell'acqua regia, del mercurio nell'acqua forte, del ferro nell'aceto, dello smeriglio, e di parecchie altre spezie della pietra pirite nello spirito di saie. Ma tutte le diversitate particolari soluzioni, quantunque somministrino delle lettere le quali sieno indi ad alcun tempo leggibili, coll'essere esposte all'aria aperta, vengono fomigliantemente fatte comparire istantaneamente sulla carta, in tenendola sospesa sul fuoco. Cadauna di simiglianti soluzioni dà il suo rispettivo colore particolare; ma tutt'esse hanno questo vantaggio, che coll'andar del tempo si vanno mangiando, e divorando la carta, e sopra essa le lettere ravvisansi non altramente, che per tanti fori.

Della terza Classe di sì fatte spezie d'inchiotto, o siano di quelli, che saltan fuori, e compariscono in istropicciando sopra la carta una polvere scura, o nera, sono pressochè tutti fughi glutinosi, o colorati spremuti dalle piante, i quali fughi sono per se stessi di un colore oon gran fatto risaltante, e di pari il latte d'animali, o finalmente qualsivoglia altro fluido fisso, e viscoso. Per far uso di questi, abbisogna, che le lettere sieno scritte sopra una carta bianca, ed allorchè saranno queste lettere asciutte dovravvisi gittar sopra la polvere stesso che impalpabile di qualsivoglia terra colorata, o d'altra simigliante sostanza; e la scrittura comparirà dappoi colorita, avvegnachè la sua qualità viscosa rimangasi sufficientemente in essa per l'agglutinamento, e l'imprigionamento, che fa questa polvere, quantunque ella venga a cader giù da qualsivoglia non scritta parte della carta medesima. Veggansi *Memoires Acad. Roy. Scienc. Paris. Ann. 1737.*

Della quarta Classe o sieno quelli inchiestri, che s'annosi visibili, e leggibili nel tenergli sospesi sul fuoco, haveco uno smisurato numero, ed, a vero dire, tutte le infusioni, la materia delle quali è interamente abbrugiata per mezzo d'un lentissimo fuoco, fino ad esser divenuta carbone effettivo, e corrispondranno egregia-

mente bene a tale intrapresa. La più delicata, e la più fina di tutte queste spezie, si è l'inchioffro di sale ammoniaco, procurato per mezzo di sciogliere uno scrupolo del sale ammoniaco stesso in due once di limpidissima acqua. Le lettere scritte con questa particolare soluzione rimangono invisibili sulla carta fino a che questa non venga tenuta sospesa sopra il fuoco, o che non vengasi fatto passar sopra un ferro alquanto riscaldato. La ragione di sì fatto fenomeno si è, che la parte infiammabile del sale ammoniaco, viene abbruciata fino a divenir carbone da un calore, che non è sufficiente ad abbronzare la carta; e quello stesso fenomeno succede con gli altri inchioffri tutti di questa quarta classe. Le lettere però, che sono state scritte con questa soluzione, non sono di lunga durata; e conciossiachè essendo il sale attissimo ad imbeverfi dell'umido dell'aria, quindi è che le lettere vanno allargandosi, e scorron giù per la carta in una maniera affatto confusa, ed ammassata.

La quinta Classe dell'inchioffro simpatico contiene una sola spezie, per quanto però sia alla umana cognizione finora. Questo inchioffro, tuttochè per se stesso invisibile, fatti però d'un color verde inclinate all'azzurro, allorchè venga esposto innanzi al fuoco; e questo colore svanisce di bel nuovo, e dileguasi tosto che la carta va raffreddandosi; ma puossi far saltar fuori, e comparire novellamente con accostarlo similmente al fuoco; e questo fenomeno continuerà a seguire per lunghissimo tempo, e per una serie di ripetuti cimenti. Puossi di più, secondo la maniera differente di trattarlo, e di manipolarlo, farlo comparire azzurro, verde, giallo, rosso, e d'alcuni altri colori, eziando.

Un certo Chimico Tedesco fece vedere alla Reale Accademia di Parigi un sale d'acqua rosata, il quale nell'esser tenuto esposto al fuoco diveniva azzurro, e nel tempo medesimo venne a mostrare la miniera, della quale aveva egli procurato questo sale cui egli chiamava spezie di mine a di Marchesira, appellazione assegnata da parecchi scrittori. Chimici alla miniera del Bismuth. A ciò aggiungeva costui, come questo era il Minerale, da cui scenne già

preparato il finissimo smalto azzurro di Sneeberg, e come s'inn'altra miniera somministra ciò, e finalmente, com'ei procurò la tintura da quello minerale per mezzo dell'acqua forte, cui egli ebbe a fissare col sale marino.

Questa fu la sostanza, che venne manifestata dal Chimico Tedesco all'Accademia, e dalla quale ebbe a prender lume Monsieur Heliot per la sua scoperta, o rintracciamento di sì considerabile inchioffro. Dopo molte esperienze, venne alla per fine trovato, che il sale era prodotto da una miniera arsenicale, e fu toccato con mano, come tutti i cobalti, e le miniere tutte del Bismuth, somministrano una tintura valevole a produrre per mezzo del fuoco i divisati cambiamenti.

Il metodo di preparare questo assai particolare inchioffro è il seguente:

Sopra due once di miniera d'arsenico grossolanamente polverizzato verserai una misura di cinque once d'acqua forte, e di cinque once d'acqua comune: poichè la prima ebullizione sarà giunta a capo, collocerai il vaso sopra un gentil fuoco d'arena, e ve lo lascerai fino a tanto che non vedrai ascender più pel liquore alcuna veltichetta aerea: in questo punto andrai aumentando il fuoco a segno, che il liquore venga a bollire pel tratto di circa un quatticello d'ora: dopo di tal bollitura il liquore prenderà un colore rossiccio; e poichè sarassi raffreddato, andrai per bel modo versando in altro vaso il liquor chiaro depurato da tutta la sua posatura; e poichè questo liquore sarà rimasto in quello nuovo vaso, o boccia per alcuno spazio di tempo, si converrà versarlo di nuovo per inclinazione in ampolla, a fine di purificarlo novellamente dall'altra posatura che sarà andato di nuovo depositando; e questa faccenda l'andrai per quattro, o cinque volte ripetendo, fino a tanto che divenga perfettissima mente chiaro, e non faccia più la menomissima posatura. Si fatto lavoro è onninamente necessario; conciossiachè, se per ischifar questa briga, lo andassi filtrando, alla bella prima, la parte acida andrebbe prendendo alcuna cosa, o qualità dalla carta, per cui passasse, e questo renderebbe affatto vani gli effetti del liquore medesimo. Al-

lorchè il divisato liquore sarà perfettissima-
mente chiaro, ti converrà aggiungere al
medesimo due once di sal marino bianco.
Questa misura la dovrai fare svaporare
per via di collocarla sopra un gentil fuoco,
o calore di fabbione, fino a tanto che
null'altro rimangavi, che una massa salina
asciutissima. Allorchè il liquore è divenuto
ben caldo, muta il suo primiero colore a-
ranciato, in un lucidissimo rosso; e poi-
chè ne è svaporata tutta l'acqua umidi-
tà, prende la massa un vaghissimo, e vi-
vacissimo colore di smeraldo; e da questo,
via via, che va perfettamente asciugando-
si, va grado per grado mutandosi, ed assume
un lordo color verde fomigliantissimo a
quello del verdere infocaciato. Via
via, che va avvicinandosi allo stato per-
fettamente asciutto, ti converrà andarlo
diminando, ed agitando con una bacchetta,
o pellettello di vetro, per impedire,
che s'unisca in una massa: e ti fa onni-
namente di mestieri il non tenerlo sul
fuoco fino a che sia perfettamente asciutto;
avvegnachè se ve lo terrai, vedrai
ooo tuo dispiacere, che per cotai mezzo
il colore si dileguerà bene spesso, e sva-
nirà, ed il sale di verde, ch'egli era,
assumerà un giallo scuro; ma se lo leve-
rai via dal fuoco, mentre conservasi an-
cor verde, via via, che andrà raffreddan-
dosi prenderà un colore rossiccio, ed alla
perfine acquisterà un bellissimo color di
rosa.

E' questo il sale del soprammentovato
Chimico Tedesco, presentato all' Accade-
mia Reale delle Scienze di Parigi, come
divisammo. Questo sale dee esser posto en-
tro un altro vaso con un' adeguata porzio-
ne d'acqua semplice distillata, e questo dee
simigliantemente esser collocato a fare una
digestione calda, fino a tanto che di tutta
la divisata sostanza, null' altro vi riman-
ga, salvochè una bianchissima polvere pre-
cipitata al fondo del vaso, ch' è appunto
la parte pietrosa della Miniera messa in ope-
ra nella descritta Preparazione, avvegn-
chè il sale sia stato tutto assorbito dall'ac-
qua. In evento, che la prima quantità
dell'acqua non sia stata valevole ad assor-
bire tutto il sale, ma, che abbia lasciato
il precipitato co' orio, bisogna che la versi,
e ne ponga entro il vaso dell'altra, fino a

tanto che vedrai, che il sale siasi tutto di-
sciolto. Otto, o nove once d'acqua al più
suol' essere la porzione comunemente, pro-
porzionata al sale procurato da un'oncia
della divisata Tintura; e se la miniera, di
cui ti sarai servito, sarà stata veramente
delle buone, questa quantità di liquore riu-
scirà a capello del colore de' fiori del gi-
glio. In evento, ch' entro la miniera vi
stantiasse alcuna porzione di rame, sicco-
me appunto avviene in grandissima parte
delle miniere del Bismuth, il liquore con-
tinuerà a produrre i suoi effetti non altra-
mente che un' inchiostro simpatico; ma
sarà sempremai d'un cattivo e tristo colo-
re; e se ti sarai a riguardarlo entro l'am-
polla, ti comparirà di colori differenti, se-
condochè lo andrai facendo prendere varj
aspetti di luce, in quella guisa appunto,
che far suole un' infusione del legno nes-
retico. Questo liquore non conserva sopra la
carta la sua virtù ed efficacia per lungo tem-
po, con e mantienla quello, che sia stato
procurato da una miniera più pura, e più
perfetta, e che entro l'ampolla compari-
sce costantemente lo stesso a qualunque ri-
verber, od aspetto di luce tu lo vada es-
ponendo.

La maniera, onde far uso di sì fatto par-
ticolare inchiostro simpatico, si è l'appres-
sio: =

Scriverei col medesimo sopra una finis-
sima, e liscissima carta, oppure disegnerei
con un pennellino di piombo nero sopra la
carta la figura d'una pianta, o di un albe-
ro, poscia tirerei sopra le linee medesime
con questo liquore, vale a dire; andrai se-
guendo, e ritoccando le linee fatte col piom-
bo nero, con questo liquore; lascerai, che
s'asciughino all'aria aperta; e poscia andrai
stropicciando, e levando via le linee ntre
con una midolla di pane, e la carta per ogni
parte comparirà bella e nitida, tutto che
le linee fatte dall'inchiostro sieno realmen-
te introdotte, e penetrare per entro la car-
ta medesima. Se esporrai o o terrai in vicin-
anza del fuoco questa carta medesima, ve-
drai tosto saltar fuori, e risorir di nuovo
sulla carta le linee a capello le medesime
di prima, e la figura dell'albero, o della
pianta, oppure le lettere, compariranno
di dipinte e risaltanti in un vaghissimo co-
lor verde inclinate all'azzurro, e questo

fenomeno continuerà per tutto quel tratto di tempo, in cui la carta seguita a mantenersi calda; ma quando quella si sarà raffreddata, tutta la figura delgueraffi, e sparirà affatto di bel nuovo. Le divise linee, e lettere però scompaiono, ed intananti di nuovo entro la carta più prestamente in tempo d'inverno, che nell'Estate; e nelle stagioni sommamente calde rendesi per fino necessario lo stendere la carta divisa sopra un marmo, oppure sopra alcun altro freddissimo corpo affine d'ottenere l'ultimamente additato effetto. In qualivoglia tempo se la carta sia rimasa nell'esperienza abbronzata, il colore delle linee non scomparirà di nuovo, ancorchè vi sia posto sopra del ghiaccio. In evento, che la scrittura venga tenuta per tre, o quattro giornate all'aria umida, le linee, o le lettere vi si faranno vedere d'un finissimo colore rosso dilavato. Se l'impregnamento della Miniera del Bismuth, in vece del sal marino, abbia avuto l'aggiunta sopra mentovata d'allume, e che tutta la serie dell'operazione sia stata continuata nella guisa da noi poc'anzi descritta; e se le lettere sieno state scritte col liquor rosso, subito, che fu tratto fuori del vajo, le lettere non salteranno in verun conto fuori, nè compariranno, ancorchè in ponga quanto vuoi la carta in vicinanza del fuoco: ma se andrai inumidendo la carta medesima con una soluzione di sal marino chiarissima, e poscia la lascerai a suo bell'agio asciugare, e quindi la terrai in vicinanza del fuoco, le lettere vi compariranno azzurre. Seguirà similgiatamente l'effetto medesimo, se la scrittura verrà tenuta sospesa sopra i vapori dello spirito di sale riscaldato. Allora quando si fatta preparazione viene per similgiante guisa procurata coll' allume, in vece di lervij del sale comune, il liquore non diventerà giammai verde, ma si conserverà rosso, nè cangerà colore in asciugandosi, nè dopo essersi asciugato. Sembra, che il color verde sia unicamente l'effetto del solo sal marino; conciossiachè non solamente il diviso impregnamento alluminoso, ma gli altri eziandio, nei quali sono stati messi in opera altri sali, vien sempre mai toccato con mano, essere d'un colore differente.

Il sale del Glaubero messo in opera in

vece del sal comune marino, lascia la massa rossa in quella guisa medesima medesimissima, che lascia l'allume. Il nitro aggiunto nel sal marino, somministra al precipitato, o sia sale asciutto, un vaghissimo colore porporino, il quale divien bianco in quel medesimo instante, che vienvi sopra versata l'acqua; e da esso viene ottenuta una Tintura di bellissimo color di rosa, la quale tali fa le linee, o le lettere sopra la carta, e quelle continuano a rimanersi invisibili fino a tanto che la carta medesima mantienfi fredda; ma assumono poscia un rosso vaghissimo e nitidissimo in approssimando la carta medesima al fuoco: e quello colore non vien dalle lettere ritenuto più lungamente di quanto vogliavi al raffreddarsi della carta; scoprendo poscia nella maniera medesima con i colori verdi prodotti dal sal marino; e se una semplice soluzione del sal marino medesimo venga stropicciata sopra la stessa carta, e che si aspetti, che asciughi, e che, ciò seguito, la carta venga riscaldata di bel nuovo, allora le lettere, o le linee compariranno, e fioriranno azzurre. Il Borace in sì fatta preparazione produce l'effetto medesimo, che dal nitro vien prodotto. Le divise esperienze tutte furono fatte con i sali neutri: ma affine di sperimentare, quali mai stati farebbono gli effetti, che prodotti avrebbero nella mislura gli Alcalici, il valentissimo Monsieur Heliot a tre once dell' impregnamento della miniera dell'acqua forte si pensò d'aggiungere il puro sale di Tarrato cessata che fu l'ebullizione; ma la conseguenza di questo cimento non fu una grande precipitazione, ma meramente, ed unicamente una leggerissima posatura, o deposizione di scassissima materia bianca. Questa mistura essendo stata fatta svaporare fino presso a seccarsi, la massa rimanente per tutto quel tratto di tempo, che si mantiene calda, comparve d'un vaghissimo color di porpora; ma via via, che la massa medesima andava seccandosi, andava divenendo più dilavato e più pallido, e nell'istante medesimo, che fuvi versata sopra l'acqua, divenne bianco. Questa massa sendo stata disciolta nell'acqua, non altramente, che le altre masse sopradescritte, diè sopra la carta le linee, e le lettere d'un color di
rosa

rosa languido, e queste lettere, o linee comparivano e scomparivano appunto come quelle tirate o scritte colle altre soluzioni, a norma che la carta scritta o veniva riscaldata, od era lasciata raffreddarsi; e l'umidità la carta colla semplice soluzione del sal marino, produce in questa soluzione gli effetti a capello i medesimi, che nelle altre, comparir facendo, e fiorire le lettere, o le linee azzurre in accollando la carta al fuoco. Veggansi Mem. Acad. Royal. Paris. ann. 1737.

INCROSTRO Indiano. Hanno i Chinesi tentato più e più fiate di servirsi di questo incrostro nelle loro porcellane, per dare il color nero a quelle figure, ch'erano delineate sopra i loro vasi di quella finissima terra bianca: ma questo loro tentativo è sempre andato loro fallito: conciossiachè quantunque le figure vi comparissero bellissime e fortissime non meno tosto che erano delineate su i vasi, che eziandio allor che i vasi medesimi eranli asciugati, e seccati, nulladimeno queste figure medesime, allorchè i vasi erano messi nelle fornaci a cuocerli, scomparivano, e dileguavansi a legno, che i vasi venivano sfornati totalmente bianchi, e non altrimenti, che non fossero stati prima dipinti di nero. 'I colori per similante lavoro foras' è, che sieno di tale natura, che penetrar possano la vernice, ed indurirsi, e far testa al fuoco. Vien pertanto sperimentato, che i soli colori procurati da i minerali posseggano sì fatte proprietà, che perciò questi soli debbon'essere per tale effetto messi in opera; conciossiachè quei tali colori legghieri, quale si è appunto questo nero, appellato inchiostro Indiano, nel lenire il caldo dileguansi tosto dalla superficie, nella qual sola si fermano, e scompaiono intieramente, e dileguansi. Veggansi Observez. sur les Coutumes de l'Asie, pag. 319.

INCOMBUSTIBILE, tela incombustibile. E' questa una specie di tela, o panno fatto dall' Asbesto, e che perciò non viene ad essere dal fuoco distrutta, o consumata.

In Europa abbiamo perduta affatto la maestria, od arte di fabbricare questa tela; ma in alcune parti della Tartaria hanno quei popoli una lunghissima, e som-

maamente fina specie d' Asbesto, e posseggono a un tempo stesso la maniera, e l' arte di lavorarlo, di modo che ne formano di presente dei fazzoletti, ed altri pezzi di tela più grandi, da poterne formare altre cose eziandio. Ci dicono le persone di quei paesi, che questa tela vien ivi fatta di radici d' un certo particolare albero; ma, a vero dire, quell' altro nome, è, che una favola da coloro inventata col fine unico di tenere all' oscuro di sì fatta manifattura i Popoli della China, avvegnachè in alcuni paesi sia quella gente per sì fatto modo vaga, e veramente appassionata di sì fatta specie di tela che compranla da quei pochi Tartari che la posseggono, a prezzo eccedentemente caro. Veggasi l' articolo ASBESTO.

Gli Autori antichi tutti favellano di questa tela; ma fra i moderni vi sono moltissimi, i quali non si a dubitare, se questa tela sia stata mai realmente fabbricata. Sembra, che il Dilecampio facesse la cosa impossibile, a motivo della coerenza delle fibre dell' Asbesto medesimo. Lo Schildio poi nel suo Comento sopra Suetonio, nega il fatto assolutamente. Il Bozornio pare, che porti opinione, che gl' Indiani possedessero una tal tela nel tempo dei Romani, avvegnachè presso de medesimi trovati fossero allora i materiali per fabbricarla; ma siasi a credere, che una tal tela non fosse giammai da i Romani medesimi fabbricata. Del sentimento medesimo si è il Calaubono; ed a vero dire, ciò sembra grandemente probabile, avvegnachè anche ai di nostri noi tocchiamo con mano, come i materiali migliori sono un prodotto di quella parte del Mondo, ed il segreto non meno di filare, che di lavorare in tela l' Asbesto, venga anche di presente da' soli Indiani posseduto. Veggansi le Transaz. Filosofiche sotto il num. 172. pag. 1050.

Coloro, i quali si fanno a supporre, che una tela similante non sia stata fabbricata giammai, e che non sia stata mai al Mondo, fondano unicamente la loro opinione, come appunto fa il Dilecampio, nella brevità, o coerenza delle fibre dell' Asbesto; ma chechè coloro ne abbiano per avventura veduto soltanto di quello dalle coesissime fibre, la verità si è, che

che havvene di quello, che le ha lunghe tanto che basta per lavorarlo in tele, e quello si è singolarmente finissimo, e nato fatto per lavorarlo, e manipolarlo non meno presso gl' Indiani, che in Europa eziandio. Il fatto si è, che il poc' anzi defunto Monsieur de Montesquieu avendo raccolto alcuna porzione d'Asbesto dalle rupi, che trovansi in vicinanza di Baraga, lo spedì in Inghilterra, e quivi venne lavorato da qualsivoglia più dotto artefice, e comune in bellissima tela.

Sembra, che le Indie Orientali sieno sempre state la sede principale della manifattura di questa tela d'Asbesto. Asserisce Celio Rudigino, che ivi soltanto questa tela si fabbrica, e che i materiali migliori per fabbricarla non si trovano altrove. Paolo Veneto poi dice, che la Tartaria si fu la Regione, ove fabbricossi per moltissime Eradi, e che non fabbricavasi in alcun'altra parte del Mondo. Fa quello Autore singolarmente parola d'un pezzo assai singolare di tela d'Asbesto spedita a Papa Alessandro dall'Imperadore de' Tartari, che regnava in quel tempo. Ci parla di pari Agricola d'un mantello di questa tela medesima trovantesi in Vereburgo nella Sassonia. E Simone Maggiori ci asserisce d'averne veduto un pezzo in Lovanio esposto sopra il fuoco: e Monsieur Ray vide una borsa fatta di tela d'asbesto in Heidelberg, la quale divenne tutta rossa sovente per essere stata in un vivacissimo fuoco, senz'essere rimasta d'un menomo che danneggiata. Da tutti questi racconti egli è chiaro, che in tutte le Età, ed in parecchi luoghi, questa particolarissima tela è stata conservata; e tutte le esperienze, che sono state fatte anche ai dì nostri, fanno roccar con mano, e convincono realmente della verità del fatto, vale a dire, che questa tela soffre il fuoco senza rimanerne nemmeno per ombra danneggiata. Con maggior facilità fabbricasi di questo asbesto la carta, di quello si fabbrichi la tela; e quella carta medesima possiede la virtù e qualità stessa d'esser nel fuoco incombustibile.

INCOMBUSTIBILE fideltà. E questa un' appellazione data dagli autori ad una particolare specie d'asbesto, o sia lino terrigno, il quale non è forma-

Suppl. Tom. III.

to in masse compatte, siccome lo sono le altre specie d'asbesto, ma vien collantamente trovato in certe date fila sciolte, e slegare, e queste di una natura sommamente pieghevole, e flessibile, ed estremamente acconce per essere lavorate.

E questa una specie di asbesto totalmente diversa, e tutt'altra da quelle conosciute dai buoni Antichi, e dacchè è stata rinvenuta, trovasi soltanto nella Contea di Aberdeen nella Scozia nelle vicinanze d'Achintore presso quelle Montagne. In quello dato luogo trovansi tuttora dei sommamente vaghi, ed appariscenti pezzi di legno fossile petrificato in una bellissima foggia. Nel fianco di una collina presso a questo divilato luogo, in un terreno pieno di scopeti, ed alquanto melmolo, e nelle orature di un ruscelletto, che vi scorre all'inghiù, havvi uno spazio dell'ampiezza di dieci in dodici pertiche Inglese quadrate, in cui trovansi i divilati pezzi di legno fossile petrificato assai spessi. In vicinanza di questo dato luogo, se il terreno venga scavato anche con un semplice coltello, vienvi trovata una specie di materia fibrosa giacentesi presso alla superficie fra le radici dell'erba; e questa non è il coltello valevole a tagliare; ed in eliminandola, vien toccato con mano, esser questa una sostanza della divilata specie dell'asbesto, tutto che non trovisi in masse. Questa materia, o filamenti, sono sommamente morbidi, e flessibili, nè vengono di un menomo che dal fuoco danneggiati.

Quantunque sì fatta materia giaccia universalmente in queste fila sciolte, nulladimeno ella viene ad essere alcuna fiata raccolta in porzioncelle, e sembra formare un sol corpo tollerabilmente compatto. Ma se venga questo dato corpo medesimo con più attenzione, ed accuratezza eliminato, vien trovato, non essere realmente una massa, ma una congerie di fila grandemente assomigliantesi ad una di quelle faldelle di fila di tela di lino, delle quali in medicando le ferite, e somiglianti, si servono i Cerusici, e se queste apparenti masse vengano poste nell'acqua, incontanente si dilgiungono nelle loro naturali fila sciolte, lo che non segue già di qualsivoglia altra specie d'a-

R sbe-

sabetto. Tutto l'asabetto di questa particolarissima specie giace in un dito solo sotto la superficie del terreno, parallelo alla superficie medesima, e così viene ad essere come intessuto fra le radici dell'erba, e le picciole piantucelle in guisa, che non è così agevole il disgiugnerlo, e separarlo dalle medesime.

Il legno soffile petrificato, che trovasi nel luogo medesimo, assomigliasi nella sua tessitura grandemente a questo asabetto; nè è improbabile punto, che questo non sia alirante in realtà legno petrificato, ma soltanto un'asabetto coll'apparenza delle vene di albero, o se usi un legno soffile in alcuni luoghi che dia l'origine all'asabetto; il fatto sta, che queste masse, e quelle sciolte faldelle sono grandemente l'una all'altra congiunte. Le pietre, ed i pezzi di legno petrificati sono di spezie differenti: alcuni son bianchi del colore delle faldelle divise, e di una sostanza così soffice, e morbida, che un coltello arriva a tagliargli, e fendergli per mezzo, senza rimanere intaccato; altri sono mescolati con una spezie di talco verdastro, e questi sono sommamente duri, e consistenti.

Le faldelle sciolte alle loro estremità sono sempre malmenate, e non aliramentate, che fossero state alla rinfusa intaccate, o tagliate con un coltello; ed il terreno, ove si giacciono, è un suolo grigio della profondità di due dita incirca, e che serve come di coperta ad uno strato di terra vegetabile dell'altezza di due buoni piedi. In alcuni luoghi di quelle vicinanze vengonvi trovate delle abbondantissime porzioni di un sabbone di una spezie di talco lucidissimo; e vicino a quello sabbone trovansi ove in maggiore, ove in minor quantità, costantemente le divise faldelle; similmente in questi luoghi medesimi vengonvi talvolta trovati dei pezzi di legno petrificato, i quali degenerano, e si dilungano assai più degli altri della natura del legno, e questi compariscono candidissimi, lucidissimi, e talcosi. Quindi apparisce, come il talco può benissimo avere alcuna parte nella sua origine, e questo si rende anche più probabile dalla natura stessa del talco, il quale di pari, che l'asabetto, non

rimane danneggiato dal fuoco. I Romani antichi facevano filare, e lavorare in tele i pezzi del loro asabetto, e servivano nelle cerimonie funebri delle persone defunte, conservando disgiunte le ceneri della morta persona, dalle ceneri del legno, col ravvolgere, prima di metterlo sulla pira, il cadavero di quella, in un lenzuolo fatto di questa tela.

Quelli, che i Romani avevano per simigliante faccenda, dal pino, e dalle deslerizioni, che ce ne fanno Plinio, ed altri autori, sembra, che fossero tutti sommamente corti; ma questo asabetto, di cui ora parliamo, sarebbe molto più acconcio per un simigliante lavoro, come quello, che in alcuni pezzi è lungo quelle feste, ed anche otto dita. Il fabbricare una tela di sì fatta sostanza, non è stato per anche tentato; ma il prode Monsieur Wilson, che fu primo ad iscoprirlo, ne fece filare buona porzione, non altrimenti che lo stame, lo che fa argomento, che il lavoro è affatto praticabile. *Tranfaz. Filosof. n. 276. pag. 1005.*

INCUBUS. Nella medicina così addimandasi un' infermità, la quale consiste in una contrazione spasmodica dei muscoli del petto, che assale di ordinario la gente di notte tempo, e che è sempremai accompagnata da una penosissima difficoltà di respiro, e da una grandissima ansietà.

Segni di questa indisposizione. Il sintoma assai ovvio di questa malattia, si è una sensazione simigliantissima a quella di un gravissimo peso, e che preme sulla regione del petto: E' questo poi accompagnato da un troncamento così violento di respiro, che la persona divien totalmente impossibilitata a muoversi in qualsivoglia parte del suo corpo, od a precipitare alcuna distinta, ed articolata voce. Tutto questo gravissimo male va assente incontante, e diseguali al primo muoversi di qualsivoglia membro; ma dopo di ciò ne suol venire a' colui, che ne è stato assalito, una languidezza ben confidabile di tutto il corpo, la quale dura ad incomodare la persona assalita per alcun tratto di tempo. Questo male assalisce di ordinario la gente di notte tempo, in una forte di stato di mezzo, fra il sonno, e la vigilia.

Per-

Perfone soggette a sì fatto inconveniente. Le perfone di abito pletorico sono grandemente soggette a cadere in sì fatta indisposizione, e fra queste, quelle tali massimamente, le quali hanno il sangue assai grosso. Le perfone, che sono sottoposte a sconcerti ipocondriaci, e ad indisposizioni, e pechie della milza, vengono di pari assai sovente da sì fatto male molestate; e questo per lo più suole assalirle con maggior empirio, allorchè hanno abbondantemente cenato, e che ciò fatto addormentansi sulla schiena.

Cagioni di tale infermità. Sono queste, un ristagno del sangue nelle perfone d'abito pletorico, che è assai ingrossato, ed inspessito intorno alla vena porta, e donde la natura si sforza di dilungarlo per mezzo di questi movimenti spasmodici, i quali costituiscono appunto sì fatta infermità; ed assai frequentemente producono altresì delle crudelle stanzianti nelle prime vie, le quali divengono perciò cagioni addizionali, che rendono più grave il male, e più imperversante.

Prognostici in questo male. Questo male viene riputato comunemente cosa da scherzo, anzichè no, e che al più al più, qualora non se ne vada per se stesso, da esser curato con una semplice cavata di sangue. I medici la reputano una malattia di non pericolo, e da non curarsi gran fatto; ma noi ci facciamo a sospettare, e non senza gran fondamento, che parecchie di quelle perfone, che vengono trovate morte nel letto, sieno state uccise da questo male.

Metodo della Cura. Allorchè questa infermità torna ad assalir la persona così spesso, che viene obbligata a chiamare il medico, ed a porsi nelle sue mani, il metodo si è di farle prendere tre, o quattro medicine purganti, ma soavissime, congiunte ai medicamenti digestivi, quali appunto esser possono, la gomma ammoniaca, od il tartaro vetriolato da farseglì prendere, cioè, nei giorni di mezzo, fra i blandi catartici. Ciò fatto non sarà disfacconcia col farle cavar sangue dal piede, e dopo di ciò chiuderassi, e terminerassi la cura, lo che comunemente suole accadere, col far prendere al paziente le polveri di nitro, e di cinabro.

In evento, che l'accennato metodo manchi fra mano, dovressi ricorrere al metodo, col quale sogliono trattarsi i casi ipocondriaci. Allorchè stanziano delle crudelle nelle prime vie, le quali elasperano sempremai sì fatto male, in tal caso dopo le divise purghe, dovranno prescrivere gentili amari, ed altre tali medicine che ricovrino il tono dello stomaco. L'infusione di genziana, e di scorze d'arancia è veramente ottima per tale effetto. Allorchè l'incomodo dipenda pressochè intieramente da un'infarcimento, od ammasso di materia nello stomaco, condurrà a felice termine la cura un semplice gentilissimo emetico. Ma è onninamente necessario in questo caso avere somma cura ed attenzione per non prendere un granchio rispetto all'indole, ed alla natura della malattia, e che il medico non prenda una cosa per un'altra, avvegnachè molti, e molti casi ipocondriaci assomigliansi grandemente a questo; ed in tutti i casi ipocondriaci medesimi gran male fanno, e faranno sempremai, i vomitivi. A fine d'impedire la recidiva di questo male, importa molto, che i pazienti s'assino a dormirsi corcati sopra, o l'uno, o l'altro de' fianchi, e non mai sulla schiena. Vegasi *Junker, Conspectus medic. pag. 631.*

INCUDINE. L'incudine racchiusa, o contenuta nella canna, o barile dell'orecchio, assomiglia in qualche forma ad uno dei denti macellari anteriori colle sue radici piantate in una considerabilissima distanza l'una dall'altra; o per lo meno ella s'approssima a questa più che alla forma di un'incudine. Gli Anatomici dividono in corpo, ed in rami. Il corpo è una sostanza alquanto fatticcia: i rami, o gambe son due, una lunga, l'altra corta. Il corpo è rivolto perinnanzi, la gamba corta sporge all'indietro, e la gamba lunga si porta all'ingù. Il corpo dell'incudine è più largo, o dilatato, che grosso: ha egli due prominenze, ed infra queste due cavità, che grandemente assomigliansi a quelle, che noi ravvisiamo nella corona dei primi denti macellari. La gamba corta è fatticcia e grossa nella sua origine, e quindi va via via gradatamente assottigliandosi, finchè viene a terminare in una punta. E questa situata

orizzontalmente, essendo la sua punta rivolta all'indietro, e congiunta all'orlatura del mastoide, apertura del timpano. La gamba lunga, se venga osservata pel passaggio esterno uditório, comparisce esser situata verticalmente; ma se noi la riguardiamo sopra esso, o dal lato dretano, noi la osserviamo inclinata, essendo la sua estremità rivolta molto più all'indietro, di quello sia la sua radice, od origine. La punta dell'estremità è alcun poco piatta, e piegata all'indietro non altrimenti che un'uncino, ed alcuna fiate è alquanto concava ed assomigliata in ciò ad una spezie di sluzzicorecchi. Da ciò appunto l'incudine di un'orecchia può esser distinta da quella di un'altra, allorchè trovansi fuori del luogo loro; conciossiachè volgendosi, o piegando la gamba corta all'indietro, e la gamba lunga portandosi all'ingiu, se la curvatura della gamba lunga medesima sia verso la mano manca, l'osso apparterrà all'orecchia destra, se poi s' incurvi verso la mano destra, egli si apparterrà all'orecchia sinistra. Veggasi Winslow, Anatom. pag. 48.

INDURIRE. *Indurire il legname.* Sono i Veneziani famosi per la saldezza, e durezza di loro bastimenti, i quali non infracidano, nè marciscono, come quelli delle altre nazioni, ma continuano ad esser buoni, e resistenti al mare oltre il corso del periodo comune. Ci dice il Tachenio, che tutto il segreto, onde i Veneziani ottengono effetto sì buono, consiste nella maniera, colla quale quella brava gente indurisce il suo legname, che destina alla fabbrica de' bastimenti; e che questo s'ottiene col metter sotto acqua il legname, mentre è ancor verde, e col lasciarvelo per anni parecchi. Questo impedisce l'alcali, o quel sale, che vien fornito dall'alcali, nell'abbrugiarsi, dall'alcare dopo; e per simigliante mezzo il legname viene ad indurirsi quasi come una pietra, ed a farsi presto che incorrumpibile. Ella è cosa evidente che l'efalamento di questo sale, e l'infracidarsi, o corrompersi del legname hanno alcuna somma connessione l'uno coll'altro, conciossiachè il pezzo di legno più sano, e consistente si è anche quello, che proporzionatamente somministra più sale. Nel

legname marcito fa toccar con meno l'esperienza chimica, non trovarsi stilla menoma di sale. Veggasi Tachen. Hippocr. Chem. Veggasi l'Articolo LEGNAME.

INIEZIONE. Per questa voce intendesi nella Chirurgia quello schizzettamento d'algun liquore, o medicina fatto entro una vena per via di un'incisione. Pratica somigliante, come anche quella del trasfondimento, o sia quell'operazione che consiste nel far passare il sangue arterioso di un'uomo, oppure d'altro animale, in un'altro, erano un tempo assai in uso; ma di presente non veggionli praticare altrimenti, e sono state poste da un lato.

Il modo, onde far sì suole l'iniezione è l'appresso: dovrasì aprire una vena nel braccio con una lancetta in quella guisa appunto, che suol farsi per cavar sangue, e nel foro, od orifizio fatto venendo introdotto il cannellino d'una siringa, o schizzetto, quel liquore, che avrasì intenzione, che venga a mescolarsi col sangue, e che per tale effetto vien contenuto nel corpo della siringa medesima, dovrasì con forza, e vivacità schizzare, o spingere entro la vena od all'insù, o verso il cuore: il che fatto che sia, dovrasì ben bene assicurar l'orifizio, o ferita fatta con de' piomaccioli, e con delle falce in quella guisa appunto, che fassi, allorchè si cava sangue. Veggasi l'Eislero, Chirurgia, pag. 304.

Se questa pratica d'introdurre per via d'iniezione dei diecevoli, ed opportuni medicamenti nel sangue, potesse essere sperimentata d'uso nelle Apopleisie, nelle Ispumanzie, nell'Idrofobia, ed in casi somiglianti, ella si meriterebbe grandemente d'esser continuo messa alla prova con varie ripetute esperienze, e cimenti. Effettualmente il sommo Purmanno sopra la persona sua propria con grandissima riuscita per ben due fiate, avveggachè una volta ci si riland colla divisa iniezione, da un'ostinata crudelissima scabbia, ed altra da una febbre; e dall'Elsholtz è stato ess professo composto un serio Trattato intorno a sì fatto soggetto.

Il metodo d'introdurre per mezzo dell'iniezione i liquori entro il sangue d'animali viventi, viene asserito, essere un trovato del liquor Cristofano Wren.

Il suo metodo per tanto era di far delle legature sopra le vene, e d'aprirle nel lato della legatura alla volta del cuore: quindi introducendo, od adattando alle incise ferite delle piccole siringhetta attaccate a delle vesciche fatte a foggia di canne da serviziali, contenenti il liquore o la materia, che dovea essere per forza introdotta. Monsieur Boyle ne fece incontanente le esperienze sopra varj mastini con delle infusioni d'oppio, e di croco di metalli. Tutto ciò, che quel valentuomo ne descrisse, leggesi nel suo Trattato intitolato *Utilità della Filosofia Sperimentale*, Par. 2. Saggio 2. Veggansi le *Trans. Philos.* n. 7. pag. 128. 129.

Parecchie iniezioni, e sconcerti di alcune parti particolari non sono peralora via tanabili, se non se per quella di far l'iniezioni in esse parti intaccate, ed offese di un dicevole appropriato liquore con una siringa, o con un tubo adeguato. Il metodo per esseruar ciò con dicevolezza è così patente, agevole, ed ovvio, che non abbisogna d'alcuna ulteriore istituzione, o direzione; ma sono bensì rispetto a similgiant operazione onninamente necessarie queste cautele, cioè, che la siringa, o tubo venga applicato, ed adattato alle parti con estrema delicatezza, e diligenza, massimamente a quelle date parti particolari, che come quelle, che son piene di nervi, sono altresì in estremo sensibili, e ciò per ischifare di produrre nel paziente alcun dolore; ed in secondo luogo, che il liquore, che dovrà essere introdotto, non sia nè soverchio caldo, nè soverchio freddo.

Nelle esculcerazioni, e nelle infiammazioni dell'ugola, delle tonsille, e delle fauci, l'iniezioni sono d'ordinario proficue; ma importa onninamente, che in facendo queste sia tenuta giù la lingua con una spatola, o col manico piatto d'un cucchiajo, ed avendo il Professore introdotta la siringa, o schizzettino per lo spazio di due, od anche di tre dita della larghezza della bocca, l'iniezione dovrassi per gentil modo, e con somma diligenza schizzettare in più, e più volte. Nelle gonorrree rendonsi somigliantemente bene spesso necessarie le iniezioni, per alleviare, ed ammansare il bruciore, ed il male dell'uretra non meno, che per dilavar via la ma-

teria peccante. In sì fatta occasione le schizzettature migliori, e più dicevoli, come altresì le più innocenti, e sicure, sono quelle di latte tepido, e d'acqua d'orzo raddolcita con dello Zuechero, o con del miele, oppure con dello sciroppo di malva; e vero il fine vi si potrà aggiungere una preferella di Zuechero di Satumio sciolto in acqua di pianaggine. Veggasi *Eisler*, Chirurg. pag. 317.

INJEZTIONI Anatomiche. Queste iniezioni son preparate di liquori coloriti, e ciò col solo fine di render le parti più visibili, e più appariscenti. Il celebratissimo Professore Edimburgese Monsieur Monro servess massimamente delle iniezioni rossa, e verde. Per la rossa fa di mestieri servirsi del vermiglio finissimamente levigato, che è la sostanza più acconcia per tal soggetto. Rispetto poi alla verde il veridame distillato di è il miglior materiale degli altri tutti; avvegnachè il suo verde è assai più lucido di quello della forte comune, e non iscorre in tacche e difcioglied di pari nei liquori oleosi.

Per preparare l'iniezione veramente fissa, verserai una pinta d'olio di trementina in tre once di perfettissimo vermiglio, o di veridame: poscia andrai dimenando, ed agitando ben bene questa mistura con una spatola di legno, finchè queste sostanze sieno intieramente, e perfettamente incorporate, e mescolate insieme, e poscia farai passare il tutto per una pezza di tela di lino finissima.

L'iniezione poi più grossolana vien preparata nell'appresso guisa: prenderai di sego lib. 1. di cera bianca onz. 5. di olio d'ulive onz. 3. squaglierai queste sostanze sopra un gentilissimo fuoco, quindi agungerai alla soluzione, di trementina Veneziana onz. 2. Quando quella sarà squagliata v'andrai spruzzando dentro di vermiglio, o di veridame, onz. 3. ciò fatto, farai passare tutta la divisa mistura per un pezzo di tela di lino ben riscaldata. Allorchè vorrai, che questa iniezione scorra vivacemente, e speditamente entro i vasi del corpo, basterà, che tu v'aggiunga immediatamente prima di servirne una porzioncella d'olio di trementina recente.

Rispetto poi alla pratica delle iniezioni noi

noi ci riportiamo d' buon grado ai saggi Medici Edimburgesi, Vol. 1. Art. 9.

INNESTARE. Parecchi sono quelli scrittori, i quali hanno ragionato del cambiare le specie, oppure del produrre delle fruttamecolate per via d'innestare un'albero in un'altra della Classe medesima: ma siccome l'innesto conduce, o carreggia i sughi dal tronco alla polpa del frutto, così havvi leggiera speranza di riuscire in una sì fatta aspettativa eziandio a forza di ripetuti innestamenti: ma, se dopo aver cangiato l'innesto, ed il tronco parecchie volte successe l'una all'altra, voi vi farete a collocare il seme del frutto prodotto sopra l'innesto in una buona terza ortense, egli farà possibilissimo, che ne possa risultare un cambiamento, e che ne possa esser prodotta una nuova Piantamecolata. Così il mandorlo, ed il pesco, possono pervia di parecchi cambiamenti nell'innestargli, e per mezzo degli incerti dei noccioli delle pesche, e delle mandorle col guscio, e per mezzo altresì di foracchiamenti delle radici sì dell'una, che dell'altra piantarella, alterare la loro natura a segno, che l'incamicatura, oppure la polpa stessa della mandorla possa approssimarsi alla natura della pesca, e che la pesca possa aver il pinocchio del suo nocciolo dilatato, ed allargato in una specie di mandorla: e sul principio medesimo il prode, e curioso Giardiniere può produrre parecchie, e parecchie cose di sì fatta specie mecolata. Vegg. le *Tranlaz. Filosof.* o. 46.

Il valentissimo Monsieur Du Hamel membro della Reale Accademia delle Scienze di Parigi ha osservato, come nell'innestare gli alberi vienvi sempre, e costantemente trovato nell'inferzione dell'innesto un cambiamento nelle direzioni delle fibre, od una specie di matassa, o di avvolgimento all'intorno dei vasi, che imita grandemente quello, che scorgesi nella formazione di certe particolari glandule nei corpi degli animali; e questo Valentinuomo con somma dritture di mente inferisce da ciò, che essendosi formato per cotai mezzo una specie di un nuovo rischio, il frutto può benissimo, e con tutta la naturalezza ricevere da questo il suo influxo, rispetto al rimaner migliorato nelle ramificazioni novelle; ma che per un

cotal mezzo esser non possono in conto veruno prodotti cotai instantanei cambiamenti essenziali, siccome sonosi fatti a pretendere tanti, e tanti Scrittori d'agricoltura. Osserva però questo dottissimo Autore, che quella sola anatomica osservazione non avrebbe convinto della falsità di numero così grande di deferzioni, e di asserzioni, qualora non glielo avesse confermata l'esperienza medesima unita alla divilata osservazione. Fece egli pertanto prova di moltissimi innesti io varj alberi, e per timor di ingannarsi si fece a ripetere più, e più fiate caduna esperienza di momento; ma tutte queste esperienze ad altro non servirono, che a convincerlo della verità di ciò, che erasi egli fatto alla bella prima a sospettare. Innestò egli alla foggia comune il pesco sopra il mandorlo, il susino sopra l'albicocco, il pero sopra il melo, la prugna, e la spinaiba, o pruno bianco, vale a dire una specie di susino, in un'altra di specie totalmente differente, e sopra il pesco, l'albicocco, ed il mandorlo. Tutti questi riuscirono similantissimi; le specie del frutto non rimasero alterate, ed in quelli, che non portaron frutto, le foglie, il legno, ed i fiori, tutti furono della medesima medesimissima indole, e natura di quelli dell'albero, dal quale era stato preso l'innesto.

Quelli autori, che trattato hanno dell'Agricoltura, hanno similantemente fatto parola di una differentissima specie di innesto, vale a dire di infestare gl'innesti di un'albero nei pedali di alberi di un genere diverso: come a cagion di esempio di porre un'innesto di pero nella quercia, nell'olmo, nell'acero, o sopra il susino: similantemente di innestare il morogello sopra l'olmo, sopra il melo cotogno, e sopra il fico: il ciliegio sopra l'alloro, il pesco sopra il lazzaruolo: la vite sopra il ciliegio, e sopra il lazzaruolo, e altre parecchie simiglianti non naturali congiunzioni, od innesti. Il valentissimo Monsieur Du Hamel diedi a sperimentare tutti i sopradescritti non naturali innestamenti di giungimento, e con una diligenza veramente estrema, e l'evento ebbe a provare ad evidenza, come tutti coloro, i quali avevano di tali

in-

incoerenti innelli parlato, non avevagli per modo alcuno nè sperimentati per se stessi, nè veduti; e la conclusione naturalissima, ch'ei tirò da questo, si fu, che vi è onninamente necessaria una allanza naturale fra l'innello, ed il tronco, che lo riceve, e che altramente, o non farà mai la menoma presa, o l'albero piuttosto agevolmente perirà. Veggansi *Memoires Acad. Roy. Paris.* ann. 1727.

La facilità, colla quale gl'innelli fanno presa, e crescono, e vegetano sopra i propri coerenti soggetti, è molto ben conosciuta: Hannovi però parecchi accidenti, ed incertezze, le quali accompagnano gl'innelli medesimi nei loro differenti periodi. Alcuni si seccano, e periscono incontante, altri dopo esser compariti sani, e vegeti per alquanti mesi, altri muojono per fino dopo essere stati stecchi, e rigogliosi per qualche anno. Di questi ultimi alcuni muojono, senza che il pedale patisca il menomo pregiudizio, altri periscono di conserva col pedale, o tronco medesimo, sopra il quale furono innestati. Ella è cosa incubiata, che la maggior parte degli alberi innestati non vive così lungamente, come vissuto avrebbe, se questi alberi fossero stati lasciati nello stato loro naturale: tuttavia ella non è questa una regola, che non patisca la sua eccezione; avvegnachè ve ne abbiano alcuni, i quali coll'essere innestati hanno una vita più lunga di quella avuta avrebbero, se non lo fossero stati: e di vero noi abbiamo degli esempi di innelli, i quali essendo stati fatti sopra pedali di alberi, che erano di lor natura di cortissima durata, hanno vissuto, e vivono più lungamente di quello si facevano allorchè sono inseriti in quelli di rempra più robusta, e che vivono più lunga serie di anni. Sono queste certe tali irregolarità, le quali sono state pochissimo osservate finora, tutto che elleno avvengano tuttodì in pratica: eppure grandissimi sono i vantaggi delle medesime. Un requisito grandissimo perchè riesca qualsivoglia innello si è, che sia nella sua propria natura capace di una sì serrata, ed intima unione colla sostanza del tronco, o pedale, ch'è venga a diventare, comericarsi, e come dee essere, un verace ramo di quel-

lo. Se gli alberi tutti si assomigliassero l'uno l'altro nella loro struttura, e nei luoghi; se le loro parti solide fossero tutte di una figura medesima; ed il loro succhio fosse in tutti dell'indole, e della consistenza medesima; i loro vasi tutti del medesimo diametro; e che la loro elasticità, ed il numero delle trachee fosse in tutti uguale, e lo stesso; ed in tutti fossero ripiene le trachee stesse delle medesime porzioni d'aria: se gli alberi, io dico, fossero simiglianti, ed analoghi in tutti i divisati particolari, con assai probabilità gli innelli tutti degli alberi medesimi, riuscirebbero l'uno sopra l'altro: ma la cosa va tutt'al contrario.

Ella si è cosa oggimai conosciuta, gli alberi esser composti di serie numerosissime di fibre concave, e queste in qualsivoglia specie di alberi essere totalmente diverse, e disuguali. Affinchè un'innello venga a buona riuscita, egli è evidente, che fa onninamente di mestieri, che abbiavi una conformità vicendevole nell'assi, e nei luoghi eziandio dell'innello, con i vasi ed i luoghi del tronco, in cui viene incastato; e che quanto più l'innello, ed il tronco in ciò accordarannosi, l'innello riuscirà probabilissimamente sempre migliore, e che quanto più saranno infra loro l'innello, ed il tronco differenti per tal rispetto, peggiore riuscirà, e più imperfetto l'innello medesimo.

Se non abbiavi però alcuna differenza nelle parti solide degli alberi, ve ne ha evidentemente molto più nei luoghi di quelli. Il succhio in alcuni alberi è bianco, non altramente che il latte; in altri poi egli è rossiccio; ed in altri chiarissimo, e limpidissimo, come la pura acqua: in alcuni alberi questo succhio è fortissimo, e sommamente fluido; in altri per lo contrario fitto, e viscoso. Rispetto poi al sapore non meno, che all'odore di questi luoghi hannovi simigliamente delle differenze niente minori delle divise finora; conciossiachè alcuni di essi luoghi sono dolci, altri amari, alcuni inspidi, altri agri, ed alcuni fetenti. Le differenze in una, od in altra Classe vengono variate in guisa prestichè infinita; e la buona riuscita dell'innello può con somma ragionevolezza suppoti esser dovuta uni-

unicamente alla coerenza, ed accordo, che trovasi infra i fughi non meno, che fra la struttura dell' innesto, e del tronco, in cui questo viene incastrato. Così la qualità del fucchio produce una somma diversità nell' indole, e natura degli alberi; ma la sua quantità, e la penetrabilità di derivazione alle parti, è appena meno osservabile. In questo noi abbiamo degli esempi familiari nel falcio, e nel busso, il primo dei quali gitterà fuori rampolli, e talli più lunghi in un' anno di quello sia per gittargli l' altro in venti.

Altra differenza però, che fa maggior colpo, e che è, a vero dire, molto più essenziale in rapporto alla crescita degli innesti, di tutte le differenze divise finora, si è la stagione diversa dell' anno, in cui i differenti alberi gittan fuor le loro foglie, e i loro germogli, od in cui maturano i loro rispettivi fiori. Il mandorlo trovasi aver fatta di ordinario l' intera sua fiorita, prima, che gli altri alberi, generalmente parlando, abbiano per anche aperite le loro gemme, od i loro germogli novelli; ed allorchè gli altri alberi trovan si il fiore, il mandorlo è tutto vestito di foglie, ed ha il suo frutto allignato prima che il moro gelfo, a cagion di esempio, cominci a far vedere le sue gemme. Quando noi ci facciamo a considerare negli alberi tutte le divise differenze, noi non abbiamo se non luogo di maravigliarci grandemente, come esser possa, che un ramo di un' albero possa arrivare a mantenersi vivo sopra un' altro albero; e diventerà in oltre una questione assai più dubbia, se risisteremo, come qualsivoglia innesto possa aver buona riuscita, anzichè come esser possa, che al prodigioso numero di innesti non riesca, nè faccia presa. Un' innesto di on pero sopra il tronco di un altro di specie differente, vedrassi venir su, e crescere immediatamente, non altrimenti che si trovasse sopra il suo materno tronco, onde è stato staccato, ed in una quindicina di giornate arrivare a guadagnare sei buone dita di lunghezza, e così intendosi, come è in fatto, di alcuni altri. Forzè è che questo sia omninamente dovuto alla grandissima analogia, che passa in tutti i rispetti fra l' innesto, ed il tronco, in cui

questo viene incastrato; ed una gran contrarietà, o differenza nella struttura delle parti produrrà sempre, come osserviamo, una somma difficoltà, e malagevolezza nel far presa. Un esempio di ciò può averli manifestamente nel fusino, e nell' olmo, che l' arte non può in verun conto giugnere a far sì, che uno riesca sull' altro albero, siassi l' fusino innestato sull' olmo, siassi l' olmo innestato sul fusino. Sono questi esempi delle estremità di agevole crescita, e di assoluta perdita, o mala riuscita; ma hannovi parecchi congiungimenti di alberi, che mostrano di essere di una natura di mezzo fra queste due, vale a dire, e che non periscono sul fatto, ed immediatamente, e che non hanno totale riuscita. Di questi, quei tali, che furono innestati nell' Autunno, rimangono di ordinario verdi tutta l' Inverna, senza gittar fuori rampollo: quelli poi che vennero innestati di Primavera, stannosi verdi nel tratto di un mese, od anche di vantaggio, ma però senza gittar fuori alcun germoglio. Alcuni alberi particolari è stato similantemente toccato con mano, che gittan fuori alla bella prima alcun germoglio, od eziandio rinnovano il germoglio nella seconda stagione dell' operazione; tutti però al terminare dei periodi divisi periscono, e si seccano totalmente. Di questa specie sono appunto gl' innesti del pero sull' olmo, dell' acero sopra l' orno, e del moro gelfo sopra l' olmo, e sopra il fico, con altri moltissimi.

Allorchè noi c' inoltriamo ad investigare la cagione di questo fatto, noi troviamo, come questi innesti, tuttocchè non naturali, hanno avuto però una comunicazione col tronco, entro il quale stasi sono incastrati, per mezzo di alcuni pochi piccioli vasi, i quali sono stati valevoli a mantenerli verdi, od eziandio a fargli germogliare alquanto nel tempo appunto, che durava la salute maggiore, e più energica del fucchio. Ma il migliore, e maggior numero delle fibre, avvegnachè avuto non abbia la menoma comunicazione, così queste o sonosi rrovate putrefatte, o seccate, o tutte coperte di un putrido fugo. E' questo evidentemente accaduto a motivo lontano della

spiro-

sproporzione della configurazione fra i vasi del tronco, e quelli dell'innesto, e per la differenza grandissima altresì dei fughi naturali di quelli, i quali sono ostacoli bastantemente sufficienti per impedire od un congiungimento, od unione delle fibre, o l'introducimento del succhio novello.

Gli'innesti del mandorlo sopra il fusino, e del fusino sopra il mandorlo, per i primi anni vengon su, e crescono con sommo vigore, e danno tutti i segoi immaginabili di un'ottima, e totale riuscita; eppure, malgrado ciò, tutti, senza eccezzarne pur'uno nel second'anno, od al più al più del terzo, periscono. L'innesto del mandorlo sopra il tronco del fusino, alla bella prima gitta fuori con estremo rigoglio i suoi rampolli, ma quella parte del tronco, che rimane immediatamente sotto all'innesto, va intristendosi, diminuisce, e si secca; conciossiachè, venendo l'innesto ad assorbirvi parte soverchio grande dei fughi di quella, ella perisce, e per conseguente, viene a perir con essa di pari l'innesto medesimo. Il perire del tutto avviene d'ordinario sul principiare di Primavera; e questo evidentemente dipende dalla differente stagione, in cui germogliar sogliono quelli due alberi naturalmente, il mandorlo portandosi avanti con sommo vigore, e per conseguente tirandosi via seco, e divorandosi i fughi tutti del suo tronco, o sia del tronco, in cui è incastrato, in un tempo appunto, che, secondo la sua natura, i fughi trovansi in esso in picciola quantità, e che il succhio non ha quella forza, che è necessaria per fare la sua montata. Gli'innesti poi del fusino sul mandorlo per la ragione medesima vengono ad esser soverchiati da una sovrabbondante copia di succhio in quel tempo, che loro non l'addice, e che non ne abbisognano, e per conseguente coo ogni certezza quelli vengono a perire di ripenezza, siccome i primi periscono per sfinimento. Veggansi *Memoires Acad. Roy. Paris.* ann. 1730.

Il Pefco innestato sopra il fusino riesce a maraviglia bene, e vive più lunga serie di anni, di quello fatto avrebbe nel suo stato naturale di pefco. La ragione di questo fenomeno si è la seguente: Il pe-

Suppl. Tom. III.

fco è un'albero tenerissimo, getta fuori i suoi talli, o germogli con grandissima vivacità, e produce numero maggiore di rami, di quello le sue radici sieno capaci di sostenere, e questa è la ragione, onde i pefchi veggionsi di ordinario pieni quà, e là di rami morti, e bene spesso sogliono seccarsi, e perire i loro rami più grossi, e maestri, ed alcuna fiata ben' anche tutto il loro tronco: sopra similgiante occasione, vale a dire per motivo di tale innesto diviso, essendo per lo contrario il fusino un'albero, che gitta lentamente, ed a bell'agio i suoi germogli, così viene per conseguente a comunicare questa sua qualità all'innesto del pefco; e per conseguente il pefco medesimo manda fuori i suoi talli, ed i suoi germogli assai più forti, consistenti, e robusti, e quelli non più in quel tramondante numero, che portar non potevano le sue radici, vale a dire, ai quali non potessero le radici somministrare l'adeguato nutrimento; e per conseguente l'albero viene ad esser più forte, e di durata maggiore. Vegg. *Memoir. Acad. Roy. Paris.* ann. 1730.

Ordgni, od istrumenti necessari per innestare. Per la faccenda dell'innestare gli alberi fa onninamente di mestieri, che altri sia provveduto degli appresso ordgni, od istrumenti, cioè 1. Di una acutissima, e picciola fega da adoprarli con una sola mano, per troncar via le intestature dei grossi tronchi. 2. Di un gagliardo coltello avente una ben faticcia costola, per fare l'incisioni, o spaccature necessarie nel tronco. 3. Di un tagliatissimo, e finissimo temperino per tagliare gli innesti. 4. Uno scalpello, ed un picciolo maglio, o martellino. 5. Del filo di rame, od anche della lana, o stame filato per raccomandare, legare, e fasciar più tronco gli innesti; e finalmente una porzione di argilla, od altra terra cretosa, la quale converrà, che sia stata preparata, e manipolata un mese innanzi di metterla in opera, e che sia stata per tutto questo tratto di tempo dimenata, e rivoltata entro un mortajo. La materia migliore, e più acconcia per sì fatto terzuzzo, fa di mestieri, che sia un letame o tetta grascia, viscoso, gagliardo, e grasso,

fo, che farà la base di questa materia medesima, e dentr' essa converrà mescolarvi, e ben battervi, e dimenarvi insieme alcuna porzione di sterco secco di cavallo, alquanto strame sminuzzato, e tagliato cortissimo, e minutissimo. Ultimamente bisognerà mescolarvi dentro una dicevole porzione di sale comune, e questo fa di mestieri mescolarlo, rivoltarlo, e sbatterlo insieme riducendo a forza di acqua il tutto in una specie di pasta, ma convien guardarsi dal tenerla esposta alle brinate, ed ai geli. Il pure or descritto terriccio è ugualmente buono, ed appropriato per qualsivoglia sorta di innesto. Veggasi *Mil-ler*, Dizionario del Giardiniere, in voce. *Specie, o forte principali di innesti*. Sono queste: 1. Innestamento nella buccia, appellato anche l'innestare a spalliera, e da questo anche l'altra appellazione innestatura a corona, o coronale: Quest' ultima è soltanto adattabile, e propria degli alberi grossi, e di piena crescita, e gl' innesti, che in questi dati alberi sono aggiustati, e disposti appunto in foggia di corona, o di un circolo. Simiglianti innesti sarà sempre miglior consiglio il farli, o nella fine del mese di Marzo, oppure subito dopo l'aprire dell' Aprile.

2. Innestamento a screpolo, o spaccatura, che è altramente detto da certuni innestare per lo lungo, o per fisura. E' questo proprio per quei polloni, od alberi più piccoli, e di una minore grossezza di pedale, vale a dire il diametro del cui tronco non oltrepassa la grossezza di quelle due dita. Questa specie di innestatura dovrà farsi nei mesi di Febbrajo, e di Marzo, e così schivare il metodo dello Scudicciolo, o sia l'innestamento ad occhi che viene a farsi di ordinario nei mesi di Giugno, di Luglio, e di Agosto.

3. Innestamento a frusta, da taluno appellato anche innestamento a lingua, e questo è adattato, e proprio per i piantoncini della grossezza di un dito, o di un dito e mezzo al più di diametro, e da questo calando alle grossezze anche più piccole, e più minute. Viene sperimentato esser questa la maniera di innestare, che riesce meglio delle altre tutte, ed è quella appunto, che singolarmente ai di

nostri vien praticata quasi comunemente.

4. Innestatura per approssimazione, od *ablatazione*, ed è quella specie di innestare, che consiste in tagliare il rampollo a poco a poco, e gradatamente fino a che sia rimasto attaccato al tronco. Questa specie di innestatura, che a noi però non garba gran fatto, viene effettuata meglio che in altro tempo nel mese di Aprile, e da certuni viene anche appellata *inarcamento*; e queste viene massimamente usata per i Gelsomini, per le arance, e per gli alberi esotici più teneri, e più diletigini.

Tutti quegli alberi, i quali sono di una medesima Tribù, che è quanto dire, che vengono, ed accordarsi nei loro fiori, e nel loro frutto, faranno benissimo presa l'uno sopra l'altro. Così le specie tutte delle noci, come noci, nocciolo, e somiglianti possono egregiamente l'una sull'altra vicendevolmente innestare; come possono similantemente le specie tutte di prugne, e di susine, e tutti quegli alberi, che hanno naturale alleanza con esse, come il mandorlo, il pesco, la noce persica, e somiglianti: ma siccome queste perdono, nell'innestarle porzione abbondevole di gomma, così per queste è grandemente più acconcia quella foggia di innestatura, che con proprio vocabolo vien detta *Inoculazione*, od innestatura a oocchio.

Gli alberi tutti, che producono delle coccole, possono egregiamente bene innestarsi l'uno sopra l'altro, tuttochè alcuni di essi gettin via nell'inverna le loro foglie, ed altri le ritengano. Così il Cedro del Libano, e l'albero appellato Teda, o Larice, riescono a maraviglia bene innestati l'uno sull'altro: ma perchè questi abbondano grandemente di resina, è giusto forza, che vengano innestati per approssimamento; conciossiachè la resina dell'innesto perdendosi dal medesimo prima che esso trovisi congiunto al tronco, verrebbe altramente a fallire, e produrre un aborto.

La stagione rea, e contraria bene spesso fa fallire le speranze del più prode, e del più esercitato Innestatore: Per altro, salvo questo inconveniente a cui, che terrà a dovere le divise regole, e direzioni, tutti gl'innesti riuscirannogli a

maraviglia, ed egregiamente bene. E per similgiante maestria il prode Giardiniere non solamente verrà a propagare moltissime piante esotiche, siccome a tempo dei loro Sovrani della Casa Medici i bravi Fiorentini eleggirono, ma farà altresì, che nei nostri climi medesimi verranno ad allignare piante tenerissime, ed in estremo delicate, per via di innestarle in tronchi di alberi più consistenti, e più duri della specie medesima. Veggasi *Miller*, Dizionario del Giardiniere, in voce.

Gli antichi erano sovrannamente eccellenti nel lavoro dell'innestare; e se noi dobbiamo intendere le loro descrizioni in quella guisa, che di presente si leggono, ci è giuoco forza il confessare, che essi possedevano un'arte grandemente alle arti nostre superiore, avvegnachè ci dicono, ch'essi operavano in guisa, che alberi infra loro dissimilantissimi riuscivano benissimo innestati gli uni sopra gli altri. Così essi innestavano il moro gelso fulfico, il fusino sopra il castagno, e così del rimanente: ma sembrerebbe, o che gli autori, i quali scrissero queste tali cose, scrivessero soltanto ciò, che udito avevano, senza accertarsi di ciò, che affermavano con alcuna esperienza; oppure, che altre Pianta diverse da quelle che noi intendiamo, intendessero essi per quelli nomi. Contiossiachè facciaci oggimai abbondevolmente vedere, e toccar con mano la quotidiana nostra non tenebrosa, ma illuminatissima esperienza, come niun'albero, tuttochè simile, ed analogo ad un altro nella foglia, od in alcun altro rapporto particolare, non riesca innestato sopra un altro giammai, qualora si l'innestato, che l'albero, nel quale viene innestato, non abbiano una medesima fruttificazione. Veggasi *Miller*, *ibidem*.

INOCULAZIONE. L'inoculazione, od inoculamento nella faccenda degli Orti, e dei Giardini è un'operazione riguardante il propagamento degli Alberi, praticato comunemente: e per lo più in tutti gli alberi da frutto d'osso, ed universalmente conosciuta sotto le appellazioni di occhio, di gemma, cioè, di incastrar l'occhio, il germoglio, la gemma; &c. Le pesche, le pesche noci, le ciliege, le susine, e somiglianti, come altresì gli aranci, ed

i gelsomini, riescono a maraviglia bene per cotai metodo, e se vogliamo dire la verità, egli è preferibile per gli alberi da frutto a qualsivoglia altro, parlando generalmente.

La maniera onde condurre ad effetto l'inoculazione, è la seguente. Fa di mestieri, che il giardiniere, o colui, che opera sia provveduto di un'affai acuto temperino avente un manico piatto, e questo dee servirgli per sollevare la buccia, o corteccia del tronco, per introdurvi l'occhio, o la gemma, ed alquanti giunchi sani, e consistenti, i quali dovrà prima ammollare, o tener un poco in molle nell'acqua per accrescere la loro forza, ed insieme per rendergli più arrendevoli. Quindi avendo tagliato via dall'albero, che avrà in idea di propagare, le gemme, od occhi divisi, gli fa di mestieri scegliere una parte liscia del tronco della Pianta, sopra cui vuol fare l'operazione, la quale s'ei vuole, che rimanga sana, gli converrà, che la divisa parte del tronco, o pedale sia soltanto quelle cinque in sei dita in circa sopra il terreno; ma in evento, che lo destini per piena crescita, e per alberi di altezza, dovrà la parte dell'inoculazione esser alta da terra cinque in sei piedi. Allora dovrà fare un'incisione o taglio orizzontale incrociato sopra la buccia del tronco, e dal mezzo di questo gli converrà fare una spaccatura, o screpolo scorrente all'ingù per la lunghezza di due dita, dimodochè tutti i tagli presi insieme possano rappresentare la figura della lettera T, importa però assai, che le divise incisioni non sieno soverchio approfondate. Allora troncando la foglia del germoglio, o della gemma, ma lasciandovi il piede, o base del gambo, o picciolo di quella, che vi rimane, dovravvi fare un taglio incrociato un mezzo dito in circa sotto l'occhio, e la gemma dee essere spaccata con parte della buccia ad essa appartenente in forma di uno scendicciolo. Allora bisogna, che sia tagliato fuori il legno della spaccatura del germoglio, senza portar via però l'occhio della gemma, o germoglio medesimo insieme con esso legno; avvegnachè se ciò l'accadesse, dovresti gettar via il germoglio come incapace di ef-

ser messo altramente in opera. Preparato che avrai nella maniera divisa il tuo germoglio, dovrai per gentil modo alzarlo, o sollevare la buccia del tronco col piatto manico del tuo temperino, e lo scudicciolo del germoglio medesimo dovrai da te introdurre nella fessura per modo, che venga a rimanere incastrato ugualissimamente fra la buccia, ed il legno, troncando via qualsivoglia parte della buccia del germoglio medesimo, la quale possa impedire, che il germoglio stesso incastri a capello nello screpolo fatto sopra il tronco. Allora dee il tutto essere per gentil modo legato, cominciando dalla parte inferiore della spaccatura, ed osservando con ogni maggior cura, ed attenzione di non danneggiare colla legatura medesima l'occhio dell'incassato germoglio, il quale nello screpolo dee esser lasciato fuori.

Nel tratto di tre settimane, od al più al più in capo ad un mese, il germoglio farà conoscere, ch'egli è attaccato, e che ha fatto presa; ed allora ti converrà sciogliere l'allacciatura, che facessi intorno intorno al tronco dell'albero innestato. Nel seguente mese di Marzo poi tu dovrai troncargli via il tronco d'esso albero, o pianta intorno a tre dita sopra il germoglio, od innestatura; e questo troncamento lo dovrai fare a schimbescio, affinché l'umido, e la pioggia possa scorrer giù, e grondare senza offendere la pianta stessa. A questa parte del tronco il germoglio procedente dalla gomma innestata dovrà esser raccomandato, e legato, affinché i venti non lo possano far ufcir di luogo, e shancare; e poichè avrai lasciato per un anno intero il tuo albero in questo stato, dovrai di nuovo segare quelle tre dita di tronco, che lasciasti sopra il germoglio rasente all'innestatura medesima.

La stagione dicevole, ed appropriata per l'innoculazione, si è dalla metà del mese di Giugno, fino a mezzo Agosto, secondo la prontezza, colla quale gli alberi vengono rispettivamente innanzi. Allorchè gli occhi, o gemme sonosi formate nelle estremità dei rampolli dell'anno medesimo, ella si è una prova, che l'albero è acconciissimo per questa impresa. Il primo albero, che viene in istagione propria, ed a portata d'

essere innestato a occhio, od inoculato, si è l'albicocco, ed il più tardivo degli altri tutti l'arancio. Nel far poi sì fatta operazione bisognerebbe che tu sceglieffi una giornata nuvolosa, e ciò perchè il Sole non possa così in un subito, e con danno della gemma stessa, seccarla; ed in alcune delicatissime, e formamente tenere e dilegnate Pianta, dovrai sempre nello scudicciolo della gemma stessa lasciare una porzioncella di parte legnosa. Veggasi *Miller*, Dizionario del Giardinere, in voce *Inoculazione*.

Viene asserito, che quei tali alberi fruttiferi, che sono stati innestati a occhio nel mese di febbrajo, sono sì essi, che i frutti loro, a coperto dei vermi perpetuamente. Ma simigliante asserzione non viene in conto veruno dall'esperienza confermata. Un altro errore in cose di questo genere si è quella opinione, che un occhio o gomma presa da un tenerissimo, e giovanissimo albero, o piantone, che per anche non ha gettato fuori germogli, non giungerà mai a portar frutto: conciossiachè faccia l'esperienza per lo contrario toccar con mano, che gli porta benissimo, quanto qualunque altro albero; tuttocchè i nostri Giardinieri amino meglio il prender le loro gemme da inoculazione da quei dati alberi, che abbiano già fruttato. Veggansi le *Trasfazioni* di *Filosofo*, n. 2.

Nelle Inoculazioni fatte sopra gli alberi da frutto, ella si è cosa osservabile, che una picciolissima gemma vegetabile, bene spesso anche della grossezza d'un pisello, è valevole a trasmutare tutto il fucchio, che giunge ad essa, e che quantunque questo fucchio trovisi già nella radice, e nel suo passaggio all'insù, determinato dall'intenzione della natura, come vien detto, alla produzione del frutto connaturale al tronco, o pedale, nulladimeno, mediante una sì picciola e minuta sostanza vegetabile, venga per sì fatto modo cangiato, che giunga a costituire un frutto di tutt'altra, e diversissima qualità del prodotto genuino dell'albero, entro del quale stato sia incassato; la qual cosa in un tempo medesimo vien prodotta attualmente da quelle altre porzioni del fucchio simigliante, che concorre a nutrire, ed alimentare simiglianti gemme prolifiche, quali sono le genuine discendenti del tronco; di maniera tale che

che quel fucchio medesimo, il quale in una parte d'un ramo costituisce, e forma un mucchio di more di spinalba, a cagion d' esempio, in un'altra parte del ramo medesimo possa coltizzare, e formare una pera. E quello ch'è anche di vantaggio osservabile, non solamente i frutti fatti e prodotti del fucchio medesimo differiscono bene spesso l'uno dall'altro, rispetto alla conformazione, alla grossezza, al colore, all'odore, al sapore, e ad altre affai ovvie diverse qualità, ma eziandio, tuttochè lo stesso fucchio sia un liquore acquoso, e pressochè insipido, nulladimeno egli si è non solamente cangiabile dagli occhi, o gemme di parecchie indoli, e nature, in frutta differentissime, ma in uno, ed in un medesimo frutto, il fucchio trasmutato da tessiture differenti, verrà a somministrare sommentamente varie qualità, e talvolta anche contrarie. Come, a cagion d' esempio, allora quando una gemma, od occhio di pefco, non solamente trasmuta e cangia il fucchio, che arriva adesso, in un frutto differentissimo da quello, che naturalmente vien dal tronco prodotto, ma nel frutto medesimo eziandio in parti l'una dall'altra sommentamente differenti.

Dalle Inoculazioni pertanto noi venghiamo ad imparare, come un liquore apparentemente omogeneo, può per via d'essere variamente violentato, o fatto colare e filtrare in varie fogge, esser trasmutato in corpi dotati di nuovi odori, di nuovi colori, sapori, solidità, facoltà, e virtù medicinali, e di moltissime altre qualità, sì manifeste e patenti, che oscure ed occulte. Veggasi Boyle, *Oper. Comp.* vol. 1. pag. 250.

INOCULAZIONE nella Medicina. Sembra, che la Nazione Chinesa possedesse il metodo, od arte d'inoculare il vajuolo moltilissimo tempo prima, che questo venisse introdotto in questa parte d'Europa. Il loro metodo in somigliante operazione pertanto si è il seguente:

Fannosi i Chinesi a raccogliere le erette, che escan giù dal corpicciolo di un fanciullo sano, che abbia avuto di fresco il vajuolo detto della buona specie, e conservarle ben chiuse entro un vaso della loro porcellana, fino a che si porge loro l'opportunità di servirle. Questa venuta pren-

dono quattro di queste croste più picciole, e due delle più grosse, e ponendo infra esse un grano di muschio, le ravvolgono in una faldelletta di cotone, e cacciano quella faldelletta, o specie di tala entro il naso del fanciullo, ove lascianvela fino a tanto che comincino a farsi vedere i sintomi dell'infezione. Il fanciullo dee passar l'età di un anno. In evento, che le bolle comincino a fiorire nella prima giornata della febbre, ella si è cola presto che indubitata, che il fanciullino si muore; se poi queste bolle spunteranno soltanto il secondo dì della febbre, l'evento rimansi dubbioso; se finalmente le medesime si fanno soltanto vedere nella terza febbre, è cosa affai probabile, che il fanciullino la campi. Veggansi Lettere Edificanti, e Curiole, *Tomo 20.*

INSETTI. Formano gl' Insetti una delle Classi degli Animali, i cui caratteri sono, che il corpo loro in vece di pelle, o cuticola, vien coperto da una sorta di sostanza ossea, e che le loro teste sono armate d'antenne, appellate comunemente corna. Veggasi *Linnaei system. Nat.* p. 83.

occhi degli Insetti. La benignità della Madre Natura nel somministrar gli occhi a questi minutissimi animali, è veramente maravigliosa, e stragrande. Hanno questi bene spesso, oltre i grossi occhi retati, che vengono a formare una porzione affai considerabile della grossezza della testa, altri picciolissimi occhi piantati in forma triangolare, o sopra, o sotto essi occhi retati. Quelli occhi retati pertanto formano costantemente una porzione d'una sfera. E' questa in alcune specie d'insetti una porzione più grande, ed in altre una più picciola; e per conseguente alcuni sono più, ed altri meno rialzati, o rilevati in fuori, ed in ispecie differenti sono, o più grandi, o più piccioli in proporzione sempre della grossezza della testa. Le incamicature, o coperte esteriori di questi occhi, le quali dalla loro positura, o situazione non meno, che per gli usi loro possenti addimandare la corna, hanno sopra di sé una specie di cbiosa, o chiazza lucida, la quale mostra bene spesso tutto l'arco balea, od iride, secondochè viensi voltando ai varj aspetti della luce. Il colore poi, che fa la base di questi colori, e che com-

pa-

parisce nella luce comune il color generale dell'occhio, in alcune specie d'insetti è nero, in altre bruno, ed in altre finalmente bigio. Talvolta una congerie variabile di parecchi colori serve in vece d'un semplice colore, eziandio in questo comune aspetto di luce. Un'ispezione di quegli occhi fatta coll'occhio nudo, ci fa vedere, che la loro superficie non è nè uguale, nè liscia, ma nel suo di sopra tutta come sparsa di moccicume; ma allora quando gli sottoponghiamo al microscopio, noi ravvisiamo, che quella data struttura è veramente oltremodo maravigliosa. Allora tutta la superficie ci comparisce per ogni verso formata a foggia d'una rete, e tutte le intralciate maglie della rete medesima con estrema regolarità veggonsi della grossezza a capello la stessa. Il mezzo di ciascuna di queste maglie non è vuoto, ma vien riempito da un corpo globulare, la superficie del quale stassi sopra a livello del rimanente, di modo che tutta la cornea, od eterna sostanza dell'occhio, altro non comparisce, che una moltitudine di picciolissimi corpi globulari, incastrati per entro una sostanza propria, e nata fatta per ritenergli, nei loro proprj rispettivi luoghi; e la materia, in cui questi trovansi incastrati, viene a formare una figura rettilineare, che gli fascia per ogni lato, e questa in alcune specie di insetti è quadrata, in altre sfangolare. Tutta la cornea pertanto può essere assai dicevolmente paragonata ad uno specchio tagliato in un dato numero di faccette commesse; oppure per esprimerci con termini più adeguati, può dirsi, che la cornea sia composta di un numero prodigioso di cristallini, chiusi, e serrati, con bellissimo ordine, e simetria maravigliosa tutti insieme. Il numero dei cristallini, che concorrono alla formazione di uno di questi occhi, è a grandissimo stento concepibile; ma siccome parecchi Autori sonosi presi la rediosissima briga di numerargli in differenti insetti, e siccome anche le nostre proprie osservazioni ci possono in qualunque tempo convincere della verità innegabile di cadauno di questi calcoli, non vi ha ombra di dubbio rispetto alla realtà di questo fatto. Il valentissimo Signor Lewenhoeck arrivò a contarne fino in 3182.

in un solo occhio di uno scarafaggio, ed 8000. nell'occhio di una mosca. Monsieur Puget Autore oltre ogni credere accorato, giunse a contarne 17325. nell'occhio di una farfalla; ed il gran Malpighi dallo estremamente diligente Osservazioni, ed analogia colle parti di altri animali, asserisce, e dichiara esser cadauno di essi cristallini un'occhio distinto, e separato; dimodochè in vece della comune opinione volgare, che tiene, che le farfalle sieno senz'occhi, noi tocchiamo con mano, come esse non hanno realmente meno di 34650. occhi per ciascheduna. Le posteriori osservazioni poi dei curiosi investigatori della Natura col fiancheggiar de' microscopi, son giunte a far toccar con mano, come ciascheduna di queste prominenti, o risalti nella cornea degli insetti, possiede le parti tutte necessarie, e fa benissimo gli uffizj, e le funzioni tutte d'un'occhio.

La somma accuratezza del dritto, e curioso Mons. Abate Catalan, e dopo di lui di parecchi altri Valentuomini, si è grandemente inoltrata nell'osservazione di questi occhi degli insetti. Son questi Curiosi giunti a sbaricar fuori della da noi descritta rete un solo di questi occhietti, e nettandolo ben bene, sonosi fatti ad esaminarlo, e son giunti a toccare evidentemente con mano, come possedeva le proprietà di tutte di un vero occhio. Tutta la cornea può similmente essere separata, e tagliata fuori, e questa ben ben lavata nel suo lato interiore, per mezzo di un morbidissimo pennellino, e di acqua calda, allorchè è rimasta perfettamente netta nella divisa maniera, diviene vaghiissimamente trasparente, e se ella venga e'posta nell'adeguata preparazione di un microscopio, e puntata di contro alcun'oggetto, ella si moltiplica, e diminuisce in grossezza in una guisa, che non possi mai a bastanza, ed adeguatamente descrivere, e con una vaghezza, che non è così agevole a concepirsi. Un soldato solo riguardato per entro di questa cornea somministra alla veduta un' esercito di pimmei: e gli archi di un ponte vengono a moltiplicarsi in numero così grande, ed appariscono con tanto garbo, ed avvenenza a dispolli sopra, ed intorno l'

uno

uno all'altro, che vengono a rappresentare un oggetto di una bellezza così sorprendente, che è appena descrivibile. La fiammella di una candella riguardata per quella cornea, vedesi vaghissimamente moltiplicata in un'immenso numero di candel: ed a vero dire, niuno specchio moltiplicante, nè qualsivoglia altra cosa puossi lavorare per arte, che giugner possa da una sola candela a farcene vedere numero cotanto prodigioso. Veggasi *Reamur*, *Hist. Insect.* Vol. I. Pars 1. pag. 267.

Adunque l'esistenza di questi numerosissimi cristallini è un punto, del quale non può essere altrimenti per modo alcuno dubitato; e di vantaggio Autori di conto grande ce ne hanno dato eziandio non meno le loro serie osservazioni, che le loro dotte e giudiziose congetture il soggetto medesimo riguardanti. Il dottissimo *Levenoechio* rinvenne i mazzetti, e fardelletti dei nervi ottici, i quali servono per quelle picciolissime lenti; ed il non meno dotto, e sperimentatissimo *Monsieur Reamur* li fece a supporre, che questi nervi vengano a supplire le veci di tutto ciò, che manca dietro alle lenti medesime per l'organizzazione di un'occhio compiuto per la visione; ed egli immagina, che essendo la tunica Coroide in varj insetti di differenti colori, ella sia appunto la ragione, onde noi veggiamo gli occhi loro di colori diversi.

Noi medesimi veggiamo gli oggetti con due occhi in una volta, o ad un tempo stesso; e, malgrado ciò, questi oggetti ci appaiono semplici, non raddoppiati; e quel medesimo meccanismo, che c'egli fa vedere così, può fare di pari, che la Classe degl'insetti gli veggia nella guisa medesima, tuttochè essi riguardino gli oggetti con più migliaia d'occhi in una volta.

Gli uni di questo prodigiosissimo numero d'occhi a questi piccioli animalucci sono ovvj; e siccome questi trovansi in continuo bisogno di cibo, ed in continuo timore d'essere assaliti da mille nemici, ella è cosa in estremo dicevole, che essi trovansi ben disposti, preparati, ed a portata d'essere sollecitamente avvistati, del quando, o l'uno, o l'altro trovai loro dappresso. E' stato supposto da non pochi scrittori delle cose naturali, che

gli occhi in quelle cornee sieno sì piccioli, e convessi, che servir possano alla creatura soltanto per iscorger gli oggetti in grandissima vicinanza de' medesimi, e che sia onninamente necessario, che quelle cornee stesse gliegl'ingrandiscano in forma eccedente: ma l'osservazione ci fa toccar con mano, come un semplice, e solo occhio di questi animalucci tenuto sospeso nel microscopio, vale a dire, nel foco d'un microscopio, serve colla lente in questo apparato per vedere gli oggetti distanti diminuiti. Noi sappiamo similantemente, come due lenti convesse di forza grandissima, possono essere combinate per modo, che ci mostrino gli oggetti distanti con somma distinzione, e non ingranditi, rispetto alla lor mole, ma bensì diminuiti; di maniera tale che noi troviamo, come tali occhi possono esser fatti servire per similanti effetti, e noi non abbiamo ombra di ragione di dubitare, se ciò, che noi siamo capaci d'ottenere a forza d'arte, possalo in questi, in forma eziandio molto migliore, e più perfetta, ottenere la Natura.

Fra tutti quei Naturalisti, i quali sono sì compiaciuti di maneggiare nei loro studi il microscopio, neppur uno ha trascurato d'osservare, e d'ammirar grandemente altresì la prodigiosa, e stupenda struttura, ed organizzazione di quelle date particolari parti dei piccioli animalucci; tutti adunque sono stati ad osservarle; ma alcuni fra essi sono stati d'opinione, che questi non fossero realmente occhi. Non vi ha però ombra di dubbio, che parti con sì prodigiosa vaghezza, e con sì incredibile avvenenza, e maestria organizzate, di necessità servir debbano ad alcuna sensazione; e se è così, come lo è in fatti, a qual'altro senso servir dovranno, che a quello della visione, avvegochè tal compariscia sotto l'occhio anatomico la fabbrica d'esse parti, come testè divisammo? *Monsieur de la Hire* si fu uno dei primi, che pose in campo questo dubbio, vale a dire, se le da noi esattamente descritte parti retate fossero veramente occhi; conciossiachè osservando egli come le mosche, oltre questi occhi retati, hanno nella fronte delle loro testoline tre lucidissimi punti, secessi a conchiudere che questi stessi

tre punti erano gli occhi, siccome anche in fatto tali sono pur troppo: e prendendo per cosa da esser da chicchessia accordata, che questi tre occhi sieno quanto basti per i bisogni di quelle piccole creature, egli slessi a conchiudere, troppo precipitosamente, a dir vero, che questi occhi retati non erano altrimenti occhi, ma corpiccioli in quella tal data foggia formati; ma siccome è stato prudentemente osservato, che tutti gl'insetti non sono forniti ugualmente di quelli altri più piccioli occhi rinvenuti da Monsieur de la Hire, e che particolarmente ne sono senza la Classe tutta delle farfalle, e che perciò di necessità alcuna cosa dee in esse fare le loro veci, noi dimandiamo, qual'altra parte di esse può aver mai tale ufficio, fuori di questi occhi formati a foggia di rete?

E' una mosca, una zanzara, un moscherino, &c. fornita in modo sorprendentissimo dalla Natura degli organi della vista: ella ha quella due corpi grossi, e formati a foggia di rete, siccome divisammo, cadauno dei quali corpi retati contiene parecchie migliaia d'occhi; ed oltre di questo immenso numero, non ne ha meramente, e soltanto altri tre, ma bensì altri dodici, quindi, ed anche più di questi occhi lucidissimi, e brillanti piantati distintamente da se soli in diverse parti della sua testolina. Il ragnatelo ha similgiatamente numero grande di questi occhi lucidi, o brillanti piantati disgiuntamente l'uno dall'altro, e questi trovansi incaltrati in parti differenti della sua testa, e sono anche di diverse grossezze; di modo che sembrerebbe, come la Natura avesse somministrato a questo animaluccio occhi differenti con differenti fini, vale a dire, acconci, ed appropriati a differenti necessità, ed effetti; avvegnachè gli servano per vedere gli oggetti da vicino, ed altri per iscorgerli in una distanza maggiore; e che quelle creature in vece d'aver degli occhi destinati non altrimenti che i nostri per gli effetti, ed operazioni medesime, possiedono tanti microscopi, e telescopi, che tronvinsi perpetuamente in pronto per le loro parecchie occasioni alla conservazione del proprio loro individuo necessitatissime.

Nella Classe delle farfalle parecchie ve ne ha, che posseggono un numero grandissimo di peli crescenti sopra i corpi retati, piantati su i lati della testa; questi peli da quei caparbi scrittori, che ostinatamente hanno preteso, che questi corpi retati non sieno in verun conto occhi, ci sono stati proposti, o messi innanzi non altrimenti, che una grandissima obiezione all'opinione, che sieno occhi, come veracemente son tali. Ma la risposta è pianissima, e pronta, cioè, che quantunque ciascheduno di questi corpi retati fosse un solo, e semplice occhio, e che di necessità la visione venisse ad esser disturbata da un sì fatto numero di peli crescenti nel mezzo d'essi corpi; nulladimeno, siccome ci compariscono veramente, e realmente cadaun d'essi corpi composti di una vastissima moltitudine d'occhi, questi peli posson far soltanto l'ufficio di ciglia agli occhi medesimi; ed il frangere una porzione dei raggi di luce, non solo non può turbare, e sconcertare la visione, ma questo stesso rompimento di luce può eziandio rendersi necessario ad occhi d'una così tenera, e delicata struttura. Veggasi *Reaumur*, Hist. Insect. Vol. 1. Par. 1. pag. 273.

Uso Anatomico degli Insetti. Il Mondo, o regno degli insetti viene a somministrarci usi numerosissimi e fra questi tali parecchi d'essi sono, che altri alla bella prima non farebbero fatto mai ad immaginare, e tali altresì, che qualsivoglia altra operazione, od operatore non avrebbe così bene condotto a fine giammai. Nelle parti menomissime dell'Anatomia, ove non possono fisicamente aver parte i coltelli, il cacchione, e la formica posson essere impiegati con grandissima riuscita. Gli scheletri dei fetti sono stati preparati con esser sepolci cotro quei mucchietti, o monticcioli, che fanno per albergarvi le formiche, e questi in una maniera così accurata, esatta, e perfetta, che tutti coloro, dai quali questi scheletri sono stati veduti, sonosi fatte le meraviglie, in riflettendo come mai esser potessero ridotti a total estrema sinezza, e perfezione; ed il segreto del gran Ruicchio, per mezzo del quale ei nettava la sostanza parenchimatosa dalle sue preparazioni vasculari, era appunto di questa specie. Dopo l'operazione dell'iniezione del-

o qualsivoglia vaso, ed entro i qualsivoglia parte, tutto quello che rimaneva a farsi pel compimento di somiglianti preparazioni, si era il netto, e, e levar via la materia parenchimatosa, o carnosità di fra essi, e di sopr'essi vasi. Altri Anatomici del suo tempo facevano questo col coltello, oppure per mezzo di maceramento nell'acqua, od in altri liquori; ma a coloro sembrava una specie di magia quella, che il Ruischio venisse ad effettuare la medesima preparazione non solamente assai più prontamente di quello essi si facessero, ma con un' esattezza, accuratezza, e perfezione infinitamente maggiore, superando di grandissima lunga gli scheletri di quel grand'uomo quelli, nei quali gli altri Anatomici vi consumavano tempo, brigue, e diligenze infinite. Il suo metodo adunque consisteva nel porre certo dato numero di quei tali vermi, che mangiano la carne, e che propriamente s'addimandano cacchioni entro la sostanza del feto; e questi bravamente, e con accuratissima regola s'andavano mangiando tutta la parte carnosità, introducendo quelli animalucci le loro testoline per entro certe sì minute fisure, cui non hanno istrumento, che sia valevole a penetrare, e tutta la sostanza dell'iniezione rimanevasi intatta, e siccome i loro morbidissimi corpicciuoli potevano scivolare, e sdruciolare, e muoversi fra le sue parti più minute, e sottili e d'legni senza danneggiarle, od intaccarle d'un menomo che; e la cera non offendo cibo ad essi cacchioni appropriato, non correva il menomo pericolo di essere corrofa da essi, eziandio nei pezzolini suoi più minuti, e più delicati. Le parecchie grossezze dei vermi, o cacchioni prodotti dall'uova di mosche differenti, erano d'uso grandissimo nella perfezione veramente sorprendente delle anatomiche preparazioni; conciossiachè quei cacchioni della specie più grossa mangiavano le parti più carnosità, ove i vasi sono più grandi, e quelli in picciol numero, i cacchioni di mezzana grossezza intrudevansi per entro gl'interitizj delle parti più vascolose, ed i più piccioli di tutti gli altri cacchioncini, i quali sono anche d'ordinario in numero assai maggiore, trattenevasi in vicinanza della superficie,

Suppl. Tomo III.

ed andavan cibandosi, e così nettando per ogn'intorno dei vasi capillari. Veggasi *Habenstreit*, de Vermibus. Anatomicor. ad ministris.

I cacchioni prodotti dalle mosche non son già i soli animali acconci per somigliante faccenda. Hannovi delle specie parecchie di scarafaggi, vale a dire delle razze più minute, dalle cui uova sbucan fuori de' vermi aventi sei gambe, i quali collo stesso garbo, ed esattezza mangiansi le carni delle parti preparate per la Anatomia, che facciansi i sinor descritti cacchioni delle mosche; e tutti questi con ugual felicità riuscita possono essere dal prode Anatomico impiegati nelle preparazioni delle parti degli animali.

Questi esatissimi anatomici insetti non sono confinati soltanto alle sostanze animali; ma bene spesso mostrano in effetto la lor valentigia di pari sopra le sostanze vegetabili. Parecchi d'essi cibansi di foglie, e di frutti delle piante; ed alcune specie di essi fanno un lavoro così netto, fino, ed accurato, che mangiansi, e divoransi tutta la membrana esteriore, e l'interna sostanza parenchimatosa delle foglie, e ciò per sì accurata guisa, che vengono a lasciar soltanto stabile ed appariscente il complesso dei vasi rappresentante una rete. Questi vasi pertanto siccome non sono d'un menomo che danneggiati, nè intaccati, così vengono a mostrare la verace, e genuina figura della foglia, e null'altro sono, che una specie di scheletri vegetabili, i quali per lo contrario meschinissimamente, ed imperfettissimamente vengono dall'arte imitati per via di lunghissimi maceramenti nell'acqua, conciossiachè quello metodo distrugga d'ordinario, e lavi, e tolga via la massima parte dei vasi più minuti, i quali vengono lasciati per lo contrario intatti dalle tenerissime bocche de' nostri anatomici insettocci. Ma le in guisa così perfetta esercitano quelli la loro valentigia sopra le foglie delle piante, noi tocchiamo con mano, che fanno di pari lo stesso con egual felicità, e bravura, e fors'anche maggiore, sopra i frutti. Le foglie del rusco, o del pugnino trovan di pari così bene da questi animalucci anatomizzate; e di tutti i frutti niuno riesce così bene, come quello dello stramonio, o del melo

T spi-

spinoso. In qualunque luogo questa pianta alligna bene, e trovasene in copia; il frutto verso l'Autunno, mentre trovasi, è ancora pieno di sugo, rimasi attaccato per un picciolissimo verme, il quale divorasi costantemente tutta la sostanza parenchimatosa, e lascia bravamente intatto qualsivoglia vaso stabile nella sua propria rispettiva situazione, e questo non solamente nell'esteriore incamiciatura del frutto, ma per fino nelle più interne cellette del seme. Questi vasi ricengono intieramente, e perfettissimamente la genuina forma, e configurazione del frutto, e per via dell'aria divenendo bianchi, vengono a rappresentarci il più vago, esatto, ed appariscente scabietto d'esso frutto, che possa immaginarsi giammai, mentre il frutto medesimo trovasi peranche così anatomicizzato, sopra la sua pianta. L'animaluccio, il quale fa sumigliante lavoro, è un vermicciolo avente sei piedi prodotto dall'uova dello scarafaggio della specie più minuta; e differisce pochissimo da alcuni di quelli i quali con tanto garbo, e con sì sorprendente elasticità mangiansi la sola sostanza carnosa dalle preparazioni anatomiche agguistate colle iniezioni della cera. Sono questi animali gregari somigliantissimi ad alcune specie dei bruchi, o rughe della razza minuta, e buon numero d'essi trovansi costantemente a lavorare sopra una medesima foglia, o sopra un medesimo frutto, di modo che lo scheletro viene ad essere in brev'ora perfezionato. Fannosi questi animalucci dal foracchiare per ogni verso la sostanza della foglia, e quindi intanassano sotto l'integumento, finchè vengono ad incontrarsi l'uno coll'altro; e quello lavoro essendo terminato tutto sopra una foglia, lascianla elastamente inscheletrita, e passano a far la medesima faccenda sopra un'altra foglia.

Trasformazione degli Insetti. Veggasi l'Articolo TRASFORMAZIONE.

INSETTI nell'Ambra. Non vi ha peravventura cosa in tutta l'Istoria Naturale, la quale abbia tenuto tanto sospeso gli Scrittori in rapporto a quello soggetto, quanto l'aver'egli trovato degli Insetti incavernati, e sepolti nell'ambra. Furono i Naturalisti per lunghissimo tratto di tempo non bene a legno, e quasi dissi, pres-

so che all'oscuro, rispettosamente ed origine della sostanza medesima, a tanto che continuaron questi Scrittori a fare delle fallaci, ed erronee congetture intorno alla medesima, non avevi grande speranza, che venisse loro fatto di somministrarci dei veraci piani, del come quelle creature potessero entro l'ambra medesima incavernarsi. Ci parla Plinio d'una lucertola, e Marziale di un'intera vipera, che trovate furono sepolte nel corpo d'un pezzo d'ambra; ed il Mercati nella sua *Metalloteca Vaticana*, come anche alcuni altri Autori, ci hanno descritto, e somministrato altresì la figura d'alcuni pesciolini trovati entro l'ambra stessa. L'istoria di un'intera vipera for'è confessare, che stata sia di necessità una pura, e verace chimera; e che gli altri animali di qualche mole considerabile, che è stato preteso, essersi trovati sepolti entro l'ambra, for'è di pari, che sieno state bizzarre frodi. Alcune addettate persone avendo trovato modo di fender l'ambra, facendovi per entro un'incavo atto a ricever l'animale, chiudevano l'ambra, e combagiarono di bel nuovo insieme i divisi pezzi, e quello peravventura a forza di calore, e quindi per meglio celar la frode lustravano tutt'al di sopra la superficie, affinché il segno non comparisse dello scroppo.

Ma tuttochè altri non debbasi in conto veruno promettere, che possa trovarsi naturalmente racchiuso entro l'ambra alcun animale di qualche considerabile grossezza; nulladimeno noi abbiamo per altra parte quotidiane, ed innegabili prove, che trovansi intanati, e sepolti degli insetti, e questi di parecchie specie eziandio. Veggasi *Hartman*, *Histor. Succin.*

Noi abbiamo un agevolissimo modo, e questo altresì sommamente accertato, e sicuro di distinguere, se queste sieno reali, e naturali curiosità, o se abbavi avuta mano l'Arte; e questa si è l'esaminare in qual profondità della massa la creatura trovisi infognata. Gli insetti immedematissimi naturalmente nell'ambra vengono sempre, e collantemente trovati in vicinanza della sua superficie, od al più al più, se alcuni trovansi un poco più affondati, questi son rari, e pochissimi. Le creature poi introdotte nell'ambra artificiosamente,

tro-

trovanfi stanziare o nel centro, od in vicinanza del centro dell'ambra stessa. La ragione di questo si è evidente, e piana; conciossiachè conoscesi troppo bene l'artista, che quanto più profondamente sarà intanata nell'ambra la creatura, tanto meno verrà a rinvenirsi la sua frode, o tanto meglio si rimarrà celata l'arte sua; e conosce altresì, che s'egli avesse ascelto l'insetto in vicinanza della superficie, la naturale trasparenza della sottile lamella d'ambra che giacerebbe sovr'esso, avrebbe fatto veder la fallacia col portare in troppa vicinanza dell'occhio la cavità artificiale. Veggansi le *Filosof. Transaz. Num. 248. pag. 21.*

Le due grandi bellezze, vale adire, la solidità, e la perfezione del pezzo d'ambra, in cui stanfi incavernati gl'insetti, è similgiamente una fortissima ragione per sospettare, che abbiavi nel caso alcuna fallacia. Allorchè l'Artista trovasi nell'impegno d'introdurre una mosca in un pezzo d'ambra, è in grandissima briga, allorchè elegge per tal lavoro un pezzo d'ambra fino, solido e trasparente; avvegnachè ne avrebbe lode maggiore allorchè l'opera fusse compiuta, e sostenterebbe assai meglio il suo lavoro in questo dato pezzo, che in altro più rozzo, più difetto, e più scuro. Ma la Natura, la quale non ha avuto in animo di dar nel genio ai compositori, ha d'ordinario fatto stanziare questi animalucci, o parti d'essi, nei pezzi d'ambra meno solidi, ed in quei tali, che son pieni d'ombre, e di screpoli. Un pezzo perfettamente uniforme, levigato, e solido d'ambra, avvegnè nel suo seno un insetto, può quindi con sicurezza, e generalmente esser tenuto per cosa procurata a forza d'arte; avvegnachè l'ambra naturale, che ha sì fatte creature in essa incorporate, è d'ordinario composta d'un numero di strati, o d'incamicature, ma in guisa assai imperfetta l'una all'altra attaccate, ed aderenti, ed ha bene spesso degli screpoli, e spaccature entro di sè, che arrivano perfino alla sua superficie, e le gambe, le ale, od alcun'altra parte dell'insetto raschiuolovi, bene spesso rimangono pendente dalla superficie medesima. Allorchè un pezzo d'ambra rozza, od inferiore vien trovato con un'insetto nella

diversa guisa immedesimato in essa, tutta può esser tenuta per opera della sola Natura, ed una mostra d'una curiosità di valore considerabile. Trovanfene anche dei pezzi, o mostre tali più fine, che similgiamente sono naturali, ove queste sono estremamente rare. Gl'insetti sepolti realmente dalla Natura nell'ambra fanno una formidabile diversità mostra di sè in rapporto alla maniera del loro conservarsi; conciossiachè veggiansi alcuni stanziare in tutta la loro bellezza, e splendore naturale: altri nulla di ciò posseggono, ma hanno soltanto una fortissima intonatura d'ambra stesa sovr'essi, e tutta la massa, che gli cuopre, fa sì, che vengano a sembrare moiche d'ambra, incorporate entro altro pezzo d'ambra; ma la massima parte di questi sono lordi, ed imperfetti. Veggansi le *Trans. Filosof. N. 248. pag. 21.*

Le loro posture sono similgiamente varie, di pariche la loro apparenza. Alcuni compariscono non altramente che se fossero stati intirizziti, rattappiti, o morti, allorchè vennero abbracciati dall'ambra: altri mostrano di esservi stati introdotti vivi, veggendosi colle membroline loro stirate, stese ed allungate; e tutta la creatura facendosi come vedere in atto di volere sprigionarsi a viva forza del suo carcere. Alcuni pezzi d'ambra racchiudono in sè un solo, e perfettissimo insetto, alcuni ne contengono uno mozzo, o mutilato, od anche una parte soltanto di quello, ed il vedersivi, od una sola gambolina, od un'ala di mosca, è la cosa più ovvia e più comune di qualsivoglia altra: ma dall'altra parte sonofi trovati dei pezzi di ambra, cadauno de' quali conteneva numero grande di insetti, e quelli alcuna fiata tutti di una specie medesima, alcun'altra di specie differenti. Veggasi *Hurtman, Historia Soccini.*

Sono queste le apparenze generali delle curiosità sì reali, o naturali, che artefatte delle specie dell'ambra. La realtà di moltissimi di questi pezzi pregni di insetti è indubitabile; e parecchi Autori per descrivere, ed appianare il come quest'insetti sianovvi introdotti, hanno avuto ricorso alla supposizione, che questo prodotto altro non sia, che la refina d'alcuna

specie d'alberi. Fannosi questi tali ad immaginare, che mentre questa resina andava calando, e scorrendo giù pel tratto del tronco dell'albero, la mosca, ed altro simile insetto rimanesse impaniato, e ravalto in essa: ma questa non solamente è un'istoria manifestamente falsa dell'origine dell'ambra, ma dato anche, e non conceduto ch'ella fosse verace, non ischiarirebbe con tutto questo di un menomo che il punto. Conciosiachè di tutte quelle resine, le quali fino al dì d'oggi sono da noi conosciute, e che grondano continuo giù per tronchi degli alberi, nelle quali aleresti in copia grande troviamo degl' insetti, neppure uno di questi insetti medesimi vedevansi incorporato, e sepolto nella maniera, in cui trovansi entro la sostanza dell'ambra. Veggasi le Trans. Filosof. N. 248. pag. 20.

Altri Scrittori poi, i quali conoscevano l'estrema debolezza, ed insufficienza di sì fatto argomento, asserirono, che quelle date sostanze, che compariscono per entro l'ambra insetti, non sono realmente tali, ma che noi erriamo allorchè prendiamo nell'ambra le fibre, e gli serepoli per corpi reali. Ma similgiante supposizione coll'istessa facilità vien provato, essere di pari erronea, e questo con niente più, che col farci ad esaminare i corpiccioli medesimi nei pezzi rotti dell'ambra stessa. Coloro, che portano sì precipitata opinione, troveranno, in ciò esaminando, esser veracissimi animali ivi realmente, e veracemente rimasi imprigionati, e vederanno combaciare, e convenire a capello cadauna parte della medesima struttura interna con cadauna delle parti dell'animaluccio medesimo ivi entro non istanzante. La vera istoria, e piano della materia si è, che l'ambra stessa è una sostanza soffile, ed un bitume condensato in un corpo solido, e che questo condensamento vien ad esser lavorato nella terra.

Noi troviamo bene spisso, che le mosche, le api, le formiche, ed altri insetti eziandio correndo ree, e cattede stagioni, ricorrono alla difesa della terra, e vanno a seppellirvisi vivi, rimanendosi in uno stato torpido per avventura pel tratto intero dell'Invernata, e forse per un periodo di tempo più corto. Durante que-

sto tempo l'ambra viene ad esser formata dal condensarsi, che fa un bitume fluido in una sostanza solida; e se mentre il fluido viene a cadere in quei dati luoghi, ove giacciono degl' insetti, forzi di necessità, che questo fluido gl' incorpori, e gl' immedesimi in se stesso, e gli mostri nel suo stato indurito. La maggior parte degl' insetti rinchiusi naturalmente nell'ambra, sono appunto di quelle date specie particolari d' insetti, che nell' Invernata vanno appiattendosi, ed instanandosi nelle viscere della terra, lo che noi molto accertatamente sappiamo. E quindi è appunto che l'universalità degl' insetti nell' Ambra vengono costantemente trovati in una postitura, ed atteggiamento di costruzione, quali appunto rimangono nello stato loro di quiete nella divilata rigida stagione. Egli è vero, che alcuni pochi compariscono per sì fatta guisa, che sembra come abbiano fatto dei validi sforzi per porsi in libertà. Questi sono probabilissimamente questi insetti, che rimasero impaniati nel fisco, e faticcio bitume, o nel primo loro insinuarsi, che fecero nelle viscere della terra, o vicino al periodo di loro stanza in quel dato luogo, valea dire, quando non erano per ancora caduti nello stato torpido degli altri insetti, o che stavano per uicire. Alcuni pezzi di ambra veggionfi, a vero dire, nei gabinetti, e gallerie dei curiosi, che contengono entro di sé delle mosche, e somiglianti in posture assai naturali, ed uguali, vale a dire, nè in istato torpido, nè violento, ed in alcuni per fino scorgonvisi il maschio, e la femmina in atto di congiungersi. I primi pezzi ci debbon' essere grandemente sospetti di impostura; ed i secondi dobbiamo con ogni più accertata sicurezza riputarli tali. Conciosiachè il tempo, durante il quale queste creature trovansi sepolte sotto terra, e mezzate morte di freddo, non è, a dir vero, il tempo acconcio alla loro propagazione. Veggasi l'Articolo SUCCHINO.

INSETTI AQUAJOLT. Mavvi un'insetto di una specie anfibia sommarmente particolare, che dal doto Monsieur Reaumur ci è stato descritto con estrema accuratezza, e da suo pari nelle Memorie dell' Accademia Reale delle Scienze di Parigi.

Mol-

Moltissimi animali sono acquajoli per una porzione di loro vivere, e passano l'altra porzione sopra l'asciutto terreno. Ma questa tanto singolar creatura è dalla natura fabbricata in guisa, che tiene sempremai non meno la sua testa, che la sua coda tuffata per entro l'acqua, e la parte di mezzo di tutto il suo corpo fuori dell'acqua stessa. A fine di concepire la maniera, colla quale vien ciò effettuato, ci è giuoco forza di farci a considerarne la sua figura. Egli è questo animaluccio composto non altramente che altri parecchi piccioli animalletti, di varj anelli, o dir le vogliamo giunture; ei ne possiede undici di questi anelli fra il tratto, che stende dalla sua testa alla sua coda; sono siffatti anelli tutti tondeggianti smigliantissimi alla fila da corona. La prodigiosa bestiola stassi pressochè costantemente in una figura serrata rappresentante una specie di bífone: la sua testa, e la sua coda trovansi costantemente piantate l'una in vicinanza dell'altra, mentre il corpo rimansi sollevato, e vien sopra esse a formare un'arco; la testa, la coda, e l'anello unentati alla coda medesima sono quelle parti, che mantengonsi costantemente, o stanziano sempremai nell'acqua; e gli altri nove anelli, o per lo meno sette di essi, giacciono sul terreno asciutto. La perpetua abitazione di questo portentoso animaluccio è nelle orlature delle acque stagnanti. In evento che l'acqua vada allargandosi non falla mai di andarsi via via costantemente tirando in dietro, e d'andar rinculando, qualora il suo corpo venga a bagnarsi di più della descritta postura, e delle parti accennate, e viceversa va tirandosi innanzi, o tuffandosi più addentro, se rimanga alcuna porzioncella delle tre divise parti all'asciutto. Questo animaluccio non è più lungo di due terzi di un dito: ma viene a distinguersi in guisa assai migliore, allorchè trovasi in un valo di acqua, che quando stanzia in qualche pantano. Il disagio grande, che prova questa creatura allorchè o trovasi sovra l'acqua, o troppo poco immerso entro l'acqua, ravvisasi agevolissimamente; conciossiachè, in evento, che il vaso venga piegato obliquamente dimodochè l'acqua allontanasi da esso, questo animaluccio con

una prontezza, che ha del maraviglioso, va seguitandola all'ingù del lato del vaso; e s'è venga inclinato dalla banda opposta, di maniera tale, che l'acqua ascendendo venga a coprirlo più della maniera sopra descritta, con forma prontezza ci va ascendendo, e montando in su, finchè trova da sifarsi, e piantarsi di bel nuovo in parte, che l'acqua non possa più di quella data porzione ammollarlo. Particolarissima si è poi la sua foggia di muoversi; avvegnachè paja, che nè la testa, nè la coda v'abbiano in questo suo moto la parte menoma, ma soltanto la sua parte più innalzata, o sia il sesto anello, o giuntura del suo corpo, la quale nel suo stato arccheggiano viene a formare appunto la sommità del deferito arco, e la parte, che prima si muove, e questa tira seco le altre parti tutte, le quali la seguono, continuando la creatura, eziando allorchè è in moto, nel suo stato, o postura piegata a ciambella. Non muovesi egli già con una progressione vermicolare, siccome alcuni animali fanno; ma egli possiede i suoi piedi regolari. Questi, a vero dire, sono così piccioli, che non possono scorgere, senza l'aiuto di ottime lenti; ma veduti, che sieno, fanno una delle più prodigiose parti di questo prodigiosissimo animaluccio. Veggansi *Mémoires Acad. Roy. Scienc. Paris. ann. 1714.*

I piedi, al contrario di lor postura in tutti gli altri animali, trovansi in questa creatura piantati sopra il suo dorso; quindi è che questa creatura diacesi sopra il suo dorso, appunto come le altre creature giacciono naturalmente sopra il suo ventre, e quando ei si giace, la sua bocca di pari che il suo ano stanno rivolti all'insù. Ma questa faccenda non è già soltanto particolare di questo animale, avvegnachè abbianvi alcune mosche speciali, come anche altri insetti acquajoli, i quali notano costantemente posando sopra il loro dorso, ed hanno le loro bocche puntate all'insù, e questo affinché possano prendere il cibo loro, che trovasi comunemente collocato *supr'esse*; e la ragione stessa dee essere assegnata, rispetto a questo insetto medesimo. I suoi piedi son dieci di numero, piantati sopra anelli separati, vale a dire, due per anello.

Era

Fra il sesto anello, e la testa ve ne sono soltanto quattro, ma quelle quattro gambe son più grosse delle altre sei. Sono queste gambe cortissime, ed assomiglianti grandemente alle dilegini gamboline dei bacchi da feta, o ad altri vermi della specie de' bruchi, e le loro estremità sono alla foggia medesima piate, o compresse, ed armate di dato numero di picciolissimi uncini. Le quattro prime gambe sporgono verso la testa, e le altre sei piegansi in direzione a questa contraria, o sia alla volta della coda. In disposizione fissata ammirasi una provvidenza grandissima: conciossiachè siccome questa creatura trovasi presso che perpetuamente in una postura archeggiata, e muovesi altresì in questa figura medesima, le dieci zampe quantunque trovinsi piantate in direzioni contrarie per rapporto alla testa, nulladimeno elleno trovansi piantate nella direzione medesima in rapporto al sesto anello, il quale è non altrimenti che fissi la testa negli altri animali, ed è quella parte, da cui cominciano, ed hanno la loro origine tutti i movimenti dell'insetto. Per simigliante disposizione delle gambe ha l'animale una varietà maggiore di moto, di qualsivoglia altra creatura; avvegnachè in una postura distesa, ed allungata ei può scorrere, e portarsi con uguale sveltezza all'indietro, od innanzi, per mezzo di far' uso, o dell'una, o dell'altra postura delle sue gambe; e nella sua postura archeggiata, ei può, oltre il moto comune all'innanzi, muoversi eziandio per fianco, sì a man dritta, che a mano manca, con somma agiolezza, la qual cosa è all'animaluccio di servizio grandissimo, allorchè gli abbisogna il cangiar luogo, col muoversi soltanto alcun poco o qua, o là, od innanzi, od all'indietro, od in somma per qualsivoglia verso. Oltre tutti i divinati movimenti, ei possiede simigliantemente la facoltà di nuotare non altrimenti che gli altri vermi tutti, lo che egli viene ad effettuare per mezzo di rivoltolare, e d'aggomitolare attorno attorno il suo corpicciuolo, allorchè da alcuno accidente venga ad esser tutto tuffato entro l'acqua. Questa postura però sembra ad esso non naturale, e pare, che non trovisi giam-

mai in essa, se non se suo malgrado, e forzato, ed in tal caso tornasi di nuovo alla sua usata postura tosto, ed il più sollecitamente, ch'ei può, e quello fa per via di nuotare in fianco, e portarsi ove col suo dorso possa prender terra. Stassi egli sempremai impegnato in cibarsi, sebene i suoi bocconi sono estremamente piccioli, altro quelli non essendo, che quei tali infetucci microscopici, che stanziano entro l'acqua.

La pancia di questo insetto è di un color bruno più carico di quello del suo dorso, ed i sui anelli, o giunture in questa data parte hanno delle tacche, o macchiette vestute, e circondate inaroundo intorno di cortissimi peli in quella foggia appunto, che veggonsi le tacche di parecchi altri insetti; e quelle servono probabilmente all'animaluccio per la funzione medesima della respirazione. La sua schiena è bianca, e trasparente, e quivi i suoi anelli non sono distinti da alcuna delle divise tacche della pancia; ma per la sua lucidissima trasparenza vengono in vaghiissima foggia a mostrarci ciò, che segua nelle parti interne del corpo dell'animale. Puorvisi osservare in vicinanza dell'ano un cannellino, o sia canaletto circolare, simigliantissimo all'anima di una siringa, il quale va continuamente sporgendosi, ed avvicinandosi all'ano medesimo, o dilungandosi da quello. La specie medesima di moto di appressamento, e dilungamento viene a scorgersi di pari dentro il terzo anello del corpo, in una cannetta, o canaletto, e quello altro non sembra, che una continuazione del primo moto; e non è impossibile, che questo sia il moto del cuore del nostro prodigioso infetuccio; quivi situato. Veggasi *Memoires Acad. Roy. Scienc. Paris*, ann. 1714.

Insetto del Muschio. Veggasi l'Articolo MUSCHIO.

Insetti dei Cuori. Veggasi l'Articolo CUORE.

INTACCATO. *Linea intaccata.* Intendesi per quella espressione nella Fortificazione una linea fuori, e dentro scorrente alla foggia appunto delle dentature di una sega, formante parecchi angoli in guisa, che uno viene a servire di difesa all'altro. Vengono simiglianti linee den-

tate

tate, od intaccate messe in' opera sopra le rive dei fiumi, ove questi mettan foce, e penetrino entro la piazza: il parapetto della strada coperta è similmente intaccato, o dentato. Simigliante lavoro dai macchinisti, od Ingegneri Franzesi viene appellato *Redent*, Dente doppio. Le picciole piazze sono alcuna fiata fortificate con simiglianti linee intaccate. Ma il difetto, o pecca di sì fatte fortificazioni si è, che gli assediati con una batteria possono rovinare ambi i lati della tanaglia, o sia fronte d'una piazza, e per conseguente venire ad un' assalto, senza il menomo timore di essere investiti, avvegnachè sieno già andate a terra le difese, ed i ripari.

INTERCOSTALI. *Muscoli intercostali.* Sono questi muscoli altrettante sottili piastrine o lamelle carnee, due fra cadaun paio delle costole, uno esterno, e l'altro interno, congiunti, e serrati strettamente insieme con una sola fortissima tela, o tessuto cellulare diacente infra essi. Le fibre dei muscoli intercostali esterni in vicinanza delle vertebre, sono sommamente oblique; ma questo pendio va insensibilmente scemando, e diminuendosi, via via, che esse vanno approssimandosi alle estremità anteriori delle costole. Le loro inserzioni cominciano nei ligamenti, per i quali le costole vengono ad essere attaccate, e legate alle apofisi trasversali. Sono queste alcun poco tendinose, ed oltrepassano di un picciol tratto l'orlatura sul lato esteriore di cadauna costola. Le fibre dei muscoli intercostali interni, sono generalmente più corte, e meno oblique delle prime: vengon queste presso che intieramente a riempire gl'interstizj, che stanziano fra le porzioni cartilaginose, e rimangono coperte nel lato loro esteriore da una membrana ligamentosa, le fibre della quale procedendo, e scorrendo in una direzione opposta a quelle de' muscoli, sono state erroneamente prese per continuazioni dei muscoli intercostali esterni, sopra i quali viene similmente a spandersi questa membrana, diminuita alcun poco soltanto in grossezza.

Qualsivoglia porzione del petto di un animale può esser fatta bollire a segno, che la carne tutta, che la veste, agevol-

mente staccandosi dall'ossa, le costole possono esser tratte fuori, senza disordinare, e scomporre, od i muscoli, o le membrane; ma noi non dobbiamo già per questa ragione conchiudere, che tutti i muscoli intercostali sopra un lato del petto non facciano, che un muscolo solo; conciossiachè il raziocinio medesimo venga a provare, che tutti i muscoli i quali facciano, e circondano per ogni verso immediatamente l'osso del femore, sieno soltanto un muscolo; imperciocchè per una simigliante esperienza, questi di conserva col periostio possono esser intieramente disgiunti dall'osso, senza rompere, od intaccare le loro fibre. Veggasi *Winslow Anatomia*, pag. 231. Rispetto poi all'uso di questi muscoli intercostali nella respirazione, veggasi onninamente l'Articolo **RESPIRAZIONE**.

INTERPOLAZIONE. *L'interpolazione*, od interpolamento vien' usato nell'Algebra per trovare un termine intermedio d'una serie algebrica, essendo dato nella serie medesima il suo luogo. Questa faccenda addimandasi da alcuni anche *intercalazione*.

Il metodo di far questo, addimandasi dagli Algebraisti *Metodo d'interpolazioni*, o d'*intercalazioni*.

Allora quando è data l'Equazione algebrica della serie, se il termine ricercato sia un termine primario, od un termine intermedio, eid può esser trovato per mezzo della risoluzione delle equazioni affette; ma allorchè questa equazione non è data, siccome in fatti avviene assai sovente, il valore del termine ricercato forz'è che vengaci somministrato da una serie convergente, oppure da una quadratura di curve. Veggasi *Stirling*, Metodo Differenziale, pag. 86. & seq. *Mejer*, in *Act. Pretopolit.* Tom. II. pag. 180. & seq.

Quando la prima, la seconda, od altre differenze successive dei termini d'una serie vengono a diventare alla perfine uguali, l'interpolazione, od intercalazione di qualsivoglia termine d'una tal serie può trovarsi nel metodo Differenziale del Sig. Isaac Newton. Veggasi l'Articolo **METODO Differenziale**.

INTERVALLO. *Intervallo nella Musica.* Sono gl'intervalli fondati sopra certe Ra-

Ragioni, o dire le vogliamo Proporzioni esprimibili in numeri, i quali tutt'esser possono analizzati nei primi numeri 2. 3. e 5. E tutti gl'intervalli possion'esser trovati, dall'Ottava, dalla Quinta, e dalla Terza maggiore, le quali corrispondono rispettivamente a quelli Numeri. Sono questi i Musicali Elementi, dalle varie combinazioni dei quali risulta tutta l'accordabile varietà, o diversità armonica delle relazioni dei suoni.

E questo il moderno sistema, ed un'altra recente Autore (a) ci assicura, che questo può esser riguardato come un modello di verità; e che cadauno intervallo, che occorra, o s'incontri nella Musica si è, o buono, o cattivo, secondo che egli si accosta, o dilungasi da ciò, che esser dovrebbe sopra questi principi. Egli osserva, come la dottrina d'alcuni degli Antichi sembra differente. Tolomeo, a cagion d'esempio, introduce non solo i primi 2. 3. 4. e 5.; ma eziandio 7. e 11. ec. Certamente sembra, ch'ei tenesse per buone tutte le quarte, purchè i loro intervalli componenti potessero essere espressi da Ragioni, o Proporzioni soprapparticolari. Ma queste sono fantasie, e concetti totalmente scartati, e con tutta ragione; e non sembra improbabile, che le contraddizioni di differenti Ipotesi numeriche, eziandio nell'età stessa d'Aristosseno, e la loro incoerenza, ed insufficienza coll'esperienza, lo inducessero a rigettare per ogni verso, ed in tutto, e per tutto i numeri.

(a) Veggasi Doctor Pepusch, nelle *Trans. Philos.* sotto l'n. 481. pag. 267. 268.

(b) *Idem*, *ibidem*.

Da Monsieur Euler vien definito un'intervallo la Misura della differenza di un suono acuto, e di un grave. Veggasi *Tentamen Nov. Theor. Music.* pag. 72. e pag. 103.

Fatti a supporre tre tuoni a , b , c , de' quali c sia il più acuto, a il più grave, e b il tuono intermedio. Dalla precedente definizione egli apparisce, che l'intervallo fra i tuoni a , e c , sia l'aggregato degl'intervalli fra a , e b , e fra b , e c . Adunque se l'intervallo fra a , e b , sia uguale a quello, che è fra b , e c , lo che avviene, allora quando a : b : c : d , l'intervallo, che passa da a a c , sarà doppio

dell'intervallo da a a b , o da b a c . Essendo questo considerato, apparirà, che gli intervalli dovrebbero essere espressi dalle misure delle Ragioni, o Proporzioni costituenti i tuoni formanti questi intervalli. Ma le Ragioni vengono misurate dai Logaritmi delle Frazioni, i Numeratori delle quali dinotano i tuoni acuti, ed i Denominatori dinotano i tuoni gravi. Quindi gli intervalli fra i tuoni a , e b , verranno ad essere espressi dal Logaritmo della Frazione

$\frac{b}{a}$ — che viene comunemente dinotata da a

$\frac{b}{a}$ —, oppure che viene alla medesima $l\frac{b}{a}$

a — $l a$. L'intervallo adunque di tuoni eguali, a ad a farà nullo, come $l a - l a = 0$. L'intervallo appellato un' Ottava, ovvero Disapason, verrà ad essere espresso dal Logaritmo di 2; e l'intervallo della Quinta, o sia Diapente, farà $l \frac{3}{2} = l 3 - l 2$. Quindi apparisce, come questi intervalli sono incomensurabili, di modo che un'intervallo, picciolo però, non può essere una parte aliquota, come dicevi, sì dell'Ottava, che della Quinta. La cosa medesima può dirsi di pari degl'intervalli $l \frac{3}{4}$, ed $l \frac{5}{4}$, e degli altri similmente, i Logaritmi dei quali sono dissimiliari. Ma gli intervalli significati per via de' Logaritmi di numeri, che sono forze, o facoltà della radice medesima, possono essere paragonati — Così, l'intervallo dei tuoni 27: 8, sarà all'intervallo dei tuoni 9: 4, come 3. è a 2. Conciossiachè $l 3^2 = 3$, $l 2^2 = 2$. Vegg. Euler, *ibidem*, pag. 74.

Ma quantunque i Logaritmi di numeri, che non sono forze della radice medesima, sieno incomensurabili, nulladimeno una Ragione, o Proporzione approssimante di un tal numero può benissimo esser trovata. Così la misura dell'Ottava è $- l 2 = 0.3010300$, e la misura della Quinta è $- l 3 - l 2 = 0.1760913$. Quindi l'intervallo dell'Ottava sarà all'intervallo della Quinta a un di presso come 3010300 a 1760913, la qual Ragione essendo ridotta a termini più piccioli, secondo il Metodo da noi spiegato sotto l'Articolo Ratto, ci somministrerà que-

ste

Re espressioni più semplici per la Ragione, o Proporzione dell'Ottava, e della Quinta, 2: 1, 3: 2, 5: 3, 7: 4, 12: 7, 17: 10, 29: 17, 41: 24, 53: 31, il quale ultimo è vicinissimo alla verità. Veggasi Euler, ibidem, pag. 75.

In similgiante maniera possono gli intervalli esser divisi in qualsivoglia numero di parti uguali. Per questa faccenda ci sia di mestieri soltanto il dividere il Logaritmo dell'intervallo proposto nel numero medesimo di parti, ed allora trovare per mezzo delle Tavole il suo numero corrispondente. La Ragione, o Proporzione del numero così trovato, all'unità, ci somministrerà la ricercata Ragione dell'intervallo diviso alla sua parte proposta. Così poni che sia ricercata la terza parte di un'Ottava; il suo Logaritmo sarà, $= 0.1003433. = \frac{1}{3} \cdot 1.2$: La Ragione corrispondente a un di presso a quella sarà 63: 50, o con minore accuratezza, 29: 23, oppure 5: 4, la quale ultima viene ad esprimere la Terza maggiore; e questa da chi ha minor cognizione in queste materie vien presa per la terza parte di un'Ottava; e sembra, che sia tale sopra i nostri buonaccordi, e sopra i nostri Organi, ove da C. ad E, è una Terza, da E a G $\sharp$ un'altra, e da G, $\sharp$ oppure A a e, un'altra Terza. Ma conoscono egregiamente bene i più intendenti, che G $\sharp$, ed A $\flat$ non debbono riputarsi un tuono medesimo, avvegnachè differiscano di un Diesis enarmonico, che è uguale a un di presso a due Commas. Veggasi Euler, ibidem.

Monsieur Euler nel suo *Tensamen Nova Theoria Musica* ha iscritto una Tavola di intervalli. Ei suppone, che il Logaritmo, o sia misura dell'Ottava sia 1.000000; quindi il Logaritmo, o misura della Quinta sarà 0.584962; ed il Logaritmo della Terza maggiore sarà 0.321928. Da queste possono esser trovate le misure di tutti gli altri intervalli. Ma siccome è stato costume dei Musici il misurare i loro intervalli per via di Comma, noi porremo in questo luogo una Tavola di intervalli colle loro misure in Comma; ove noi supponghiamo, il Logaritmo, o misura del Comma $\frac{1}{12}$ essere a 1.00000. quindi il Logaritmo dell'Ottava

Suppl. Tom. III.

tava $\frac{1}{12}$ sarà 55.79763; quello della Quinta 32.63952, e finalmente quello della Terza maggiore 17.96282. Da questi possono esser trovati gli altri intervalli tutti nella maniera, che viene espressa nella Tavola; ove la prima colonna mostra i nomi dei varj intervalli; la seconda colonna mostra le proporzioni dei tuoni formati da quegli intervalli; la terza la composizione di quelle proporzioni dai primi 2, 3, e 5. Le figure più minute segnate sopra, ed alcun poco alla dritta delle più grosse, indicano la forza, alla quale viene ad essere alzato il numero espresso dal-


le figure maggiori. Così $\frac{2^{17}3}{58}$ mostra,

che la settima forza di 2, moltiplicata per 3, e divisa dall'Ottava forza di 5, verrà a produrre $\frac{2^{17}3}{58}$ nella seconda colonna, e che questa è la proporzione esprimente l'intervallo appellato *Eschaton* nella prima colonna. La quarta colonna della Tavola contiene certi semplici segni di alcuni degli intervalli, come *b* per *hyperocha*, *d* per *diesis*, e somiglianti; e la quinta colonna rappresenta, come gli intervalli nascono dagli altri. Così di contro, o dirimpetto al semitono maggiore io trovo nella quarta colonna S, che ivi fa soltanto la vece di un contrassegno arbitrario per quello semitono; e nella quinta colonna io trovo $f + d = IV.$ — III., che viene a significare, che il semitono maggiore è uguale alla somma del semitono minore, e del diesis, oppure alla differenza, che passa fra la quarta, e la terza maggiore. Osservisi, che il comma è contrassegnato così (.) ; allora quando quello è piantato sopra la lettera, od altro simbolo, vi viene a significare, che l'intervallo vien supposto, che sia rialzato dal comma; e per lo contrario, allorchè il punto è piantato sotto, vi significa, che l'intervallo forza è, che venga ad essere diminuito dal comma: Così $r = T$ significa, che il tono minore accresciuto da un comma, è uguale al tono maggiore, e viceversa, $T = r$ mostra, che il tono maggiore diminuito da un comma è uguale al tono minore. I segni +, —, = vengono ivi presi nel senso medesimo, che nell'Algebra, vale a di-

V re,

re, per significare aggiunta, sottrazione, ed uguaglianza. Così similmente la parentesi piantata infra due numeri, oppure fra un numero, ed il simbolo di un'intervallo, significa, che l'intervallo dee essere moltiplicato pel numero. Così 2. IV. mostra, che la Quarta è raddoppiata; e così $7^6 = VI + S = 2. IV = VIII$. — T, mostra, che il B molle minore settimo è uguale alla sesta maggiore, ed al semitono maggiore, od anche a due Quarte, oppure all'Ottava, allorchè il tono maggiore è stato preso da es-fa. Ultimamente la sesta colonna della Tavola mostra le misure, o sieno i Logaritmi delle Ragioni, o Proporzioni nella seconda colonna. Non sono questi i Logaritmi comuni delle Tavole, ove I. 000000. viene assunto come il Logaritmo di $\frac{1}{10}$; op-

pure del comma, siccome innanzi divisammo. Questi Logaritmi vengono agevolmente derivati dalla comune delle più ampie Tavole di Ulacq, o Briggs. Così il Logaritmo di 2., oppure l'Ottava = 0. 3010299957.; il Logaritmo di $\frac{1}{2}$, oppure della Quinta = 0. 1760912590: ed ultimamente il Logaritmo di $\frac{1}{4}$, oppure della Terza maggiore = 0. 0969100130. Ora questi Logaritmi essendo soventi volte divisi dal Logaritmo di $\frac{1}{10}$, oppure del comma = 0. 0053950319; il quoziente somministrerà il numero del comma in un'Ottava = 55. 79763., in una Quinta = 32. 63952; ed in una Terza Maggiore = 17. 96282. Quindi tutto il rimanente può benissimo esser trovato soltanto per aggiunta, e per sottrazione. Qui appresso segue la Tavola.



Tavo-

Tavola degl' Intervalli Musicali colle loro misure .

Nomi degl'intervalli .	Proporzioni esprimenti gl' intervalli .	Composizio- ne delle pro- porzioni da 2. 3. e 5.	Segni fem- plici .	Segni complessi per mostrare la composizione degl' in- tervalli .	Misure per i comma .
Eschaton .	$\frac{393216}{390625}$	$\frac{2^{11} 3}{5^8}$		$\text{C}-d=2d-S=3d-S$	0.53222
Diafchisma .	$\frac{2048}{2025}$	$\frac{2^{11} 5}{34 \cdot 5^2}$		d	0.90917
Comma .	$\frac{81}{80}$	$\frac{3^4}{2^4 \cdot 5}$		$\uparrow-r$	1.00000
Comma di Pittagora .	$\frac{531441}{524288}$	$\frac{3^{12}}{2^{19}}$		S.T-VIII.	1.09083
Hyperoche .	$\frac{3125}{3072}$	$\frac{5^5}{2^{10} \cdot 3}$	h	$S-r=d=r=2d$	1.37695
Diesis Enarmonico, o seconda diminuita .	$\frac{128}{125}$	$\frac{2^7}{5^3}$	d	S-e	1.90917
Semitono Minore, ed ultimo diesis Cro- matico .	$\frac{25}{24}$	$\frac{5^2}{2^{13} \cdot 3}$	s	$\uparrow-S=d+h=III-3^6$	3.28612
Limma della Scala Greca o semitono maggiore mancan- te .	$\frac{256}{243}$	$\frac{2^8}{3^5}$		$S=IV-LT$	4.19529
Limma Minore , o Semitono Min. ri- dondante .	$\frac{135}{128}$	$\frac{3^3 \cdot 5}{2^7}$		$s+r=S$	4.28612
Semitono Maggiore .	$\frac{16}{15}$	$\frac{2^4}{3 \cdot 5}$	S	$s+d=IV=III$	5.19529
Apotome della scala Greca .	$\frac{2187}{2048}$	$\frac{3^7}{2^{11}}$		T-S	5.28612
Limma maggiore , o semitono Maggio- re ridondante .	$\frac{24}{23}$	$\frac{3^3}{5^2}$		S=T-s	6.19529
Semitono Maggiore doppio .	$\frac{625}{576}$	$\frac{5^4}{2^6 \cdot 3^2}$		$2s=\uparrow-d$	6.57224
Limma massimo , o semitono minore doppio ridondante .	$\frac{1024}{1024}$	$\frac{2^{10}}{3^3 \cdot 5^3}$		$s+S=T-d$	7.57224
Tono minore .	$\frac{9}{8}$	$\frac{3^2}{2^3}$		$S+s=T=IV-3^6=III-\uparrow$	8.48141
Tono maggiore .	$\frac{9}{8}$	$\frac{3^2}{2^3}$		$r=V-IV$	9.48141
Terza diminuita .	$\frac{144}{144}$	$\frac{2^4 \cdot 3^2}{5^3}$	t	$r+d=2S$	10.39058
			T	$\uparrow+d=3^6-s$	11.39058
				$\uparrow+s$	11.76753
				$T+S=3^6-d$	12.76753

V 2

T₀

Tavola degl' Intervalli Musicali , colle loro misure .

Nomi degl'intervalli.	Proporzioni esprimenti gl' intervalli .	Composizio- ne delle pro- porzioni da 2. 3. e 5.	Segni sem- plici .	Segni complessi per mostrare la composizione degl' in- tervalli .	Misure per i comma .
	125	53		$3^6 = \uparrow + S = IV - \uparrow$	13 . 67670
Secondo superfluo .	108	$2^1 3^3$		$T + S = V - III$	14 . 67670
	75	$3^5 1$		$3^5 = \uparrow + S + d$	15 . 58587
Triemitono della sca- la Greca , o terza minore mancante .	64	26		$3^6 + d = IV - 2S$	16 . 58587
Terza minore .	32	25	3^6	$III = V - 3^6$	17 . 96282
	27	33		$II = 2T$	18 . 96282
Triemitono maggio- re .	6	$2^1 3$		$III + d = IV - S$	19 . 87199
Quarta estrema dimi- nuita .	5	5	III	$III + S$	21 . 24894
Terza maggiore .	4096	212		$II + S = VIII - V$	23 . 15811
	3375	$3^3 5^3$		$IV = 3^6 + \uparrow$	24 . 15811
Quarta diminuita .	768	283		$IV + S$	26 . 44423
	625	54		$IV + S$	27 . 35340
Terza maggiore .	5	5	IV	$IV + S = V - S$	27 . 44423
Ditono della scala Greca , o terza Maggiore ridon- dante .	4	2^1		$IV + S = V - S$	28 . 35340
	81	34		$3\uparrow = VS = IV + S$	28 . 44423
Quarta diminuita .	64	26		$V - S = 2^1 3^6$	29 . 35340
	32	25		$V = IV + \uparrow$	31 . 63952
Quarta superflua .	25	52		$IV + \uparrow = III + 3^6$	32 . 63952
Terza superflua .	125	53		$V + S = 2.III$	35 . 92564
	96	$2^5 3$		$V + S = VIII - III$	37 . 83482
Quarta .	4	22			
	3	3			
Quarta ridondante .	27	3^3			
	20	$2^1 5$			
Quarta superflua .	25	5^2			
	18	$2^1 3^2$			
Semidiapente della scala Greca .	1024	210			
	229	36			
Tritono o Quarta fal- sa .	45	$3^1 5$			
	32	25			
Semidiapente, o quin- ta falsa .	64	26			
	45	$3^1 5$			
Tritono della scala Greca .	723	36			
	512	29			
	36	$2^1 3^1$			
Quinta diminuita .	25	32			
	40	$2^1 5$			
Quinta mancante .	27	31			

Ta-

Tavola degl' Intervalli Musicali, colle loro misure.

Nome degl'intervalli.	Proporzioni esprimenti gl' intervalli.	Composizio- ne delle pro- porzioni da 2 3. e 5.	Segni sem- plici.	Segni complessi per mostrare la composizione degl' in- tervalli.	Misure per i comma.
Quinta.	$\frac{3}{2}$	$\frac{3}{2}$	V	$V+I=VIII-3^6$	41. 12093
Quinta superflua.	$\frac{25}{16}$	$\frac{52}{42}$		$VI=V+7=VIII-3^6$	42. 12093
Sesta minore.	$\frac{8}{5}$	$\frac{23}{15}$	6 ⁶	$6^6+5=2.IV-5=7^6-5$	43. 03010
Sesta maggiore.	$\frac{9}{5}$	$\frac{25}{15}$	VI	$6^6+5=7^6-5$	44. 03010
Elacordo della scala Greca, oppure se- sta maggiore ridon- dante.	$\frac{27}{16}$	$\frac{33}{24}$		$IV+5$	44. 40705
	$\frac{128}{75}$	$\frac{27}{35^1}$		$VI+5=VIII-25$	45. 40705
Minore. } Settima Maggiore. } dimin.	$\frac{216}{125}$	$\frac{2133}{53}$		$VI+5=2.IV=VIII-T$	46. 31622
	$\frac{125}{72}$	$\frac{33}{23^1 3^1}$		$VI+5=V+3^6=VIII-7$	47. 31622
Minore. } Sesta su- Maggiore. } perflua.	$\frac{225}{128}$	$\frac{3^1 5^1}{27}$		$VI+5=V+3^6=VIII-7$	47. 31622
	$\frac{16}{9}$	$\frac{24}{32}$	7 ^b	$VI+7=VIII-5$	50. 60234
Minore. } Settima Maggiore. } Minor.	$\frac{9}{5}$	$\frac{32}{5}$	7 ^b	$VII+d=VIII-5$	52. 51151
	$\frac{15}{8}$	$\frac{3^1 8}{23}$	VII.	$VII+5=VIII-d$	53. 88846
Settima Maggiore.	$\frac{8}{5}$	$\frac{23}{16}$		$VIII=V+IV$	55. 79463
Ottava diminuita.	$\frac{48}{25}$	$\frac{24 3}{52}$			
Settima superflua.	$\frac{125}{64}$	$\frac{53}{26}$	VIII		
Ottava.	$\frac{2}{1}$	$\frac{2}{1}$			

Il Limma, l'Apotome, il Ditono, il Semidiapente, ed il Tritono additati in questa Tavola sotto le appellazioni di Limma, di Apotome ec. ec. della Scala Greca sono quali appunto venivano denominati dagli Antichi, o per lo meno s'incontrano nella loro scala, ove le Quarte sono divise in due Toni, ed in un Limma, ed ove l'Ottava era composta di cinque Toni, e di due Limma.

Il termine ridondante nella Tavola viene applicato a quei tali intervalli che eccedano il vero per un comma; e quei, che s'allontanano dal vero per una simile quantità, vale a dire, che sieno più corti, addimandansi mancanti. Gli intervalli, i quali trascendono, o soverchiano i veri intervalli diatonici, per un Semitono Minore, addimandansi superflui, e quelli, che mancano di arrivarvi per una quantità medesima, addimandansi diminuiti. Ove un intervallo soverchi, o trascenda un vero intervallo diatonico per la quantità di due Semitoni Minori, noi lo abbiamo denominato un intervallo estremo superfluo; e se manca di arrivarvi per una medesima quantità, gli abbiamo assegnato l'appellazione di intervallo estremo diminuito. Così se da A a D ascendente sia una Quarta vera, e da D ad a una Quinta; quindi se D venga supposto alzato da un Comma da A a D sarà una Quarta ridondante, e da D ad a una Quinta mancante. Da A a D $\sharp$ sarà una Quarta superflua; e da D $\sharp$ ad a sarà una Quinta diminuita. In maniera simile da A a D $\sharp$ verrà ad a una Quinta superflua. Da A a D $\sharp\sharp$ (D doppio acuto) sarà una quarta superflua estrema, e da A a D $\sharp\sharp$ (D doppio piano) verrà ad essere una Quarta estrema diminuita. In guisa simile da D $\sharp$ ad a sarà un'estrema diminuita, e da D $\sharp$ ad a una Quinta estrema superflua. Intervalli di tal natura non incontreranno colla pratica nella Musica; ma se la divisione è l'Ottava in trentuna parti venga ad essere una volta stabilita, siccome per la perfezione della Musica far si dovrebbe, questi tali intervalli, quali appunto sono stati qui esposti, occorreranno di necessità nella Scala. Veggansi le Trasposizioni Filosofiche

sotto il num. 481. pag. 273. 274. veggansi altresì l'Artic. GENERE.

Questa Tavola fra gli altri suoi utilissimi usi, verrà estendendo ad agevolare l'esame di qualsivoglia proposta scala, od intervallo. Supponghasi, a esemplio, che ne vengano ricercate alcune divisioni della Quarta di Tolomeo, come il suo Diatonico molle, cui egli fa $\frac{2}{3} \times \frac{4}{5} \times \frac{3}{4} = \frac{2}{5}$. Prendasi il Logaritmo di $\frac{2}{5}$ dalle Tavole comuni, e divisi per mezzo del Logaritmo di $\frac{1}{16}$, il Quoziente sarà 10.75, che dà la misura, o sia numero dei Comma, ed insieme le sue parti contenute in un intervallo espresso da $\frac{2}{5}$. Riguardisi per l'esattissima misura d'intervalli a 10.75 nella Tavola, e troveravvisi essere 10.39058, che corrisponde all'intervallo di due semitoni maggiori, oppure, siccome addimandansi i Musici Pratici, della Terza diminuita. Ma quello di Tolomeo soverchia quello di 0.36, o circa $\frac{1}{2}$ d'un comma. Il prossimo, o seguente intervallo nella divisione di Tolomeo è $\frac{1}{2}$, ch'è un verace tono minore. La terza è $\frac{1}{4}$, che sarà trovato essere 3.93. Comma, che è appunto un semitono minore, e 0.64. d'un comma, oppure un semitono minore ridondante di presso a $\frac{1}{2}$ d'un comma. Ma questo trovasi grandemente fuori di tono. Nella comune, e nelle Temperature di Monsieur Huygens, il semitono minore viene ad essere accresciuto soltanto di circa $\frac{1}{2}$ di un comma. Veggasi Ptolemai Harmon. pag. 93. apud Wallis Oper. Tom. 3.

INTERVALLO diminuito, nella Musica. Veggasi l'Artic. DIMINUITO intervallo.

INTESTINI. Ferite degl' Intestini. Allorchè accaggia, che venga fatta un'ampia ferita nella cavità dell'Addome, la quale non solamente intacchi gl'intestini, ma giunga estendendo a dividere alcuna parte di essi, le parti ferite degl'intestini medesimi debbono essere sempremai cucite, prima che vengano riattate, e ricovrate al loro luogo, avvegnachè per similgiant mezzo queste ferite verranno a risorgergarsi più perfettamente; e verrà a un tempo medesimo ad essere impedita la scarica del chilo, e delle fecce entro la cavità dell'Addome, dalla quale scarica ne avrebbero altramente origine pessimi, e

ut-

tremendi sintomi. E quantunque le ferite degl'intestini, massimamente delle piccole budella, non dicono, che pochissima, ed anche niuna speranza di guarigione; nulladimeno, siccome le budella maggiori ammettono alcuna fiata le cuciture con vantaggio grandissimo, farà sempre meglio il mettere in pratica la cucitura medesima come un rimedio dubbioso, che il non apprestarne nessuno affatto. Le piccole ferite degl'intestini però, o quelle tali, che non eccedano il diametro di una penna di oca, non debbon'essere per modo alcune cucite, ma ne dee esser lasciato il pensiero alla natura, abbandonandole in mano di quella, avvegnachè così adoperando, vi ha sempre speranza infinitamente maggiore di buona riuscita, di quello vi si arrischiando colla cucitura; ma le ferite ampie, e dilatate degl'intestini, tuttocchè rade volte sieno capaci di guarigione, nulladimeno farà sempre ottimo consiglio il tentarla per mezzo della cucitura a guanto, prima che l'intestino venga ricoverato al suo luogo. Per effettuare questa faccenda, vi converrà esser provveduto di un picciolissimo, e sottilissimo ago infilato di seta; ed un'assistente terravvi sospeso da una parte l'intestino per mezzo d'un sottilissimo pezzo di tela di lino ben ben riscaldato, mentre voi, che operate da Cerusico, sosterrete l'altra parte dell'intestino medesimo colla vostra mano sinistra, e colla destra vi porrete a cucire alla foggia, che cuocionsi i guanti, tutta la ferita, lasciando de' picciolissimi spazi, vale a dire, niente maggiori di un dodicesimo d'un dito fra cadauno dei punti, o cuciture. L'ultimo punto in questa operazione fa di mestieri, che venga fermato con un nodo, ma l'altra estremità è necessario, che rimanga pendente fuori, vale a dire, il tratto d'un buon piede fuori dell'addome, affinchè per simigliante mezzo la seta possa esser tirata fuori, allorchè l'intestino sarà rammarginato. Poichè ciò sarà effettuato secondo le regole dell'arte, dovressi aver l'occhio a risanare la ferita dell'Addome, e dovressi questa ancora cucire, conservando la parte più bassa, o dipendente della ferita aperta per mezzo d'una tassa, e questo fino a tanto che tutti i fluidi preternaturali vengano ad essere scaricati fuori della cavità dell'Ad-

dome medesimo, e fino a tanto che l'unione della ferita dell'intestino darà luogo, e troverassi a portata, che possasene tirar via la seta, colla quale venne in esse fatta la cucitura sopradescritta.

Siccome però dai Cerusici moderni è stato osservato, pochissimi essere stati coloro, che abbiano campato la vita dopo aver ricevute delle grosse ferite negl'intestini, e che in questi pochi, che sonosi riavuti, le parti ferite, a motivo dell'estrema finezza della tunica, od incamiciatura dell'intestino medesimo, non sonosi propriamente unite, ma sonosi piuttosto attaccate alla parte inferiore del peritoneo, oppure all'omento, o finalmente ad alcun' altro de' medesimi intestini, sonosi determinati, ed hanno amato meglio di porre da un lato l'operazione della cucitura, e di sostituire in vece di quello un metodo di cura più benigno, e più dolce.

Passano essi pertanto un filo inerato per entro un sottilissimo ago, e con questo filo raccomandano e legano la parte ferita dell'intestino all'orizzio interno della ferita dell'addome. Il filo, che in questo caso riman sospeso fuori dell'Addome, dee essere così stabilmente fissato per mezzo d'impiastrici adesivi alla ferita, che l'intestino non possa per conto veruno scollarsi di un menomo che dalla parte, alla quale verrà attaccato, e raccomandato, nè possa similgiatamente mandar fuori parte menomissima di ciò, che contiene entro di se, nella cavità dell'Addome. Allora quando è fatta veramente a dovere una operazione fissata, l'intestino con somma facilità s'attacca, ed uniscesi alla parte interna dell'addome medesimo, ed il paziente (lo che è infinitamente valutabile) soffre minor dolore, e corre a un tempo stesso assai minor pericolo, di quello segua nella prima maniera, poc'anzi descritta, della comune cucitura. Il metodo a capello il medesimo di cura è di pari sommamente proprio, e dicevole per le ferite dello stomaco, qualora però trovinsi in dato luogo, che giugner vi possa la mano maestra operatrice, ed assai fiata è venuto condotto a fine con egregia, e sorprendente riuscita. Veggasi *Eslero*, *Chirurgia*, pag. 36.

Perdita di sostanza negl'Intestini. Ove sia accaduto, che ne sia stata portata via qual-

qualivoglia porzione degl' intestini, è inutile qualunque medicatura, avvegnachè il caso sia apertamente, e totalmente disperato; ed è, a vero dire, una maraviglia grandissima, che le persone in simigliante guisa ferite, non sieno tutte rimale morte sul colpo, o nell' operazione della cucitura fra le mani del Cerusico operante: ma alcuni modernissimi Cerusici di conto grandissimo osservarono da prodi, come le labbra degl' intestini in questa particolar maniera feriti accollerebbonfi, ed unirebbonfi alcuna fiata alla ferita dell' Addome in guisa non mai pensata, e prefero dalla Natura quei valentuomini questa traccia per rinvenire una cura in sì fatti casi disperati. Qualunque siasi pertanto quel Cerusico, che venga chiamato in casi di questo genere, dopo essersi fatto ad esaminare con estrema diligenza lo stato della parte superiore dell' intestino, che ha sofferto la perdita della sostanza, dovrà cucirla, ed attaccarla quella parte esterna mancante alla ferita esteriore dell' addome; avvegnachè per simigliante mezzo il paziente non solamente possa esser salvato da una morte istantanea, ma hannovi non iscarsi esempi, nei quali l' intestino ferito si è così bene, e perfettamente rammarginato, che le fecce, le quali erano solite vuotarsi, ed espellersi per l' ano, sono uscite per la ferita parte dell' Addome; e tuttochè un sì fatto incomodo originante dal portare un cannello di stagno, o d' argento, o di conservare un sacchetto, o drappo perpetuamente sopra la divisa parte per ricevere gli ecrementi, sia grande, e di briga estrema; nulladimeno egli è sempre miglior consiglio il conservarsi la vita con sì fatto incomodo, che morirli miseramente in corto tratto, od in un subito; tanto più, che gli ecrementi evacuati per questa parte, non sono di un fetore così ributtante, ed offensivo, come quelli lo sono, che scaricati vengono per l' ano.

Il metodo medefimmo di cura può simigliantemente con sommo dicvolezza, e vantaggio esser messo in pratica, ove qualivoglia parte dell' intestino sia rimale mortificata, per essere stata spinta fuori dell' Addome; cuniossiachè se in quello caso voi verrete a legare, o cucire le arterie mesenteriche, la parte cortotta, o

mortificata dell' intestino medefimo, può esser tagliata fuori, e la parte sana rimanente può esser fatta accollare ed unire alla ferita del medefimo addome. E sarà cosa certamente sempre migliore quella di sperimentare sì fatto metodo, e salvare alcuni pochi soltanto per mezzo di quello, che lasciar morir tutti infelicissimamente, senza il menomo ajuto. Veggasi *Eislero*, *Chirurg.* pag. 65.

Noi abbiamo degli esempi di pezzi d' intestini mortificati nell' Ernie tagliate via, ed una cura fatta per via di conservare le estremità del budello vicine l' una all' altra, e vicine agli anelli dei muscoli, con una cucitura pel mesenterio. L' estremità degl' intestini in quelli casi crebbero al peritoneo, la carne nuova si fece, ed allargossi lungo questa membrana, e venne a congiungere insieme le estremità divise. La parte calda del budello, è sempre assottigliata e stirata viemaggiamente, e perciò coloro, che sono stati in sì strano caso guariti, dovrebbero con ogni maggior cautela guardarsi dal cibarsi soverchio, e dalla indigestione. Veggansi *Memoires de l' Acad. de Chirurg.* Tomo I.

INVERNICIARE. *Inverniciare alla Giapponese.* La vernice fatta, e messa in opera nella China non meno, e nel Giappone, è composta di trementina, e di una curiosa specie d' olio, che posseggono quelle genti. Quelle due sostanze essi le mescolano insieme, e fanno bollire fino ad una dicevole consistenza, e questa vernice non produce alcun gonfiamento nè nelle mani, nè nella faccia di quelle persone, che se ne inzavardano. Le gonfiezze in quelle parti, che accadono bene spesso a coloro, i quali lavorano nelle robe inverniciate, ed alcuna fiata per fino a quella gente, che passa soltanto, o si ferma nelle botteghe di sì fatti artigiani, vien prodotto dalla lacca, della quale coloro si servono, e non già dalla vernice. E' questa lacca il luechio, o sugo di un albero, che gronda lentissimamente dalle incisioni, che vengono fatte nella parte inferiore del tronco dell' albero medefimo, e che viene ad esser ricevuto da certi vasi aggiustati, e raccomandati all' albero medefimo per tale effetto sotto le divise incisioni. Il sugo medefimo allorchè gocciola

la fuori dell'albero è del colore, e della consistenza del latte quagliantesi o sia crema, ma tosto che giugne in contatto coll'aria esterna, la sua superficie tutta diventa nera. Siccome quei popoli se ne servono soltanto quando è nero, così il loro metodo di prepararlo si è di porlo spalo all'aria viva, ed aperta entro grossi piatti di superficie assai piana, nei quali vedevansi tutta la superficie; ma affinché possa venir tutto d'un medesimo ed ugal colore, vanno coloro senza posa dimenandolo, e rivoltandolo pel tratto di ventiquattr'ore continuate con un'assai levigato, e piatto pezzo di ferro. Per simigliante lavoro questo sugo viene a farsi assai più fiso, e più spesso di quello fosse perinnanzi, e viene ad acquistare un finissimo color nero assai carico.

Quando questa sostanza trovansi in tale stato, polverizzano costoro alcuni ramuscelli abbrugiati d'alberi, e mescolano questa polvere ben bene insieme con essa sostanza, e ciò fatto vannola spandendo sopra quella tavola, o tavolino, cui essi hanno intenzione d'inverniciare, e pongonla incontanente ad asciugarsi, e seccarsi al Sole, ed allora questa vernice viene ad acquistare una durezza assolutamente maggiore di quella della stessa tavola, sopra la quale è stata distesa. Quando questa sostanza è per ogni verso perfettamente seccata, pongonla a ridurla a pulimento, ed a lisciarla, e ciò fanno con istropicciarvi sopra una pietra sommamente uguale, e levigata, gittandovi di tratto in tratto dell'acqua, fino a tanto che ella venga ad esser liscia niente meno, che un cristallo. Ridotta che sia in questo stato, asciuganla perfettissimamente sicché non rimanga d'un menomo che inumidita, e poscia vi stendon su una vernice composta d'olio, e di trementina, e fatta bollire fino alla poca anzi divisa consistenza appropriata a quella specie di lavori.

In evento, che il lavoro debba essere di alcun altro colore fuori che del nero, questo colore dovrassi mescolare colla vernice, e poscia il tutto dovrà stendersi estremamente sottile, ed uguale; conciossiachè in questo lavoro del perfettamente distendere, ed appianare sopra la divisa mate-

Suppl. Tom. III.

ria dipenda l'arte, e la maestria principale dell'inverniciare.

Allorchè debbonvi essere delle figure d'oro, o d'argento, fa di mestieri, che vengansi tracciate, e delineate fuori con un pennellino nella vernice sopra il restante del lavoro; e quando questa vernice è pressochè asciutta, dovravvisi stender su la foglia d'oro, o d'argento, e dopoi dovrassi stropicciare, ed uguagliare per mezzo d'alcuna assai liscia sostanza.

IPECACUANHA. Viene asserito, che la buccia, o scorza dell'Ipecacuanha sia grandemente preferibile alla sua stessa radice, rispetto alla sua virtù, o facilità emetica; come quella, che opera ugualmente bene, e con ugal sicurezza anche in dosi più piccole, senonchè queste prese in polvere, senonchè prese in infusione. Sei grani della corteccia dell'Ipecacuanha stata in infusione pel tratto d'una sola notte in un'omcia, e mezzo di vin vecchio del Reno riesca un egregio Emetico. Veggansi le Trans. Filosof. n. 476. sezione 10.

L'Ipecacuanha scura o bruna somministra, per via di distillazione, una porzione più piccola d'olio, di quella che somministrane la specie bigia; e l'ultima porzione dello spirito, che vien sopra coll'olio, nel dare al fuoco maggior violenza, ed azione, tuttochè riesca considerabilmente acido, assaporandolo, nulladimeno sembra che non contenga meno, ma piuttosto più particelle volatili di quello che contengano lo spirito estratto nella maniera medesima dall'Ipecacuanha bigia. In mescolando poi simigliantemente gli spiriti d'ambidue queste specie col sal di Tartaro, le parti volatili di quello estratto dall'Ipecacuanha scura o bruna, volanosene via con maggiore rapidità, di quelle dello spirito della bigia, e pungono il senso olfattorio con sensazione maggiore.

Elia si è cosa ragionevolissima il conchiudere da questo, che se l'Ipecacuanha scura contiene porzione minor d'olio, di quello contenga l'Ipecacuanha bigia, ella conterrà simigliantemente minor porzione di resina; e che siccome quest'ultima porzione di spirito conteneva più parti volatili, così faccia di mestieri, che ci promettiamo, che sia per essere di necessità

X

nel:

nel suo operare più violenta di quello sia per esserlo la bigia. Questa osservazione altresì, la quale vien di pari confermata e verificata dal fatto, può in certo dato grado favorire l'opinione di coloro, i quali affermano, che le virtù e facoltà purgative de' medicamenti vengono eccitate da un sal volatile, e che questi medicamenti sono o più o meno violenti, secondo che contengono o maggiore, o minor porzione di quello sale.

L'Ipecacuanha bruna, di pari che la bigia, somministrerà due specie d'Estratti, vale a dire, uno resinoso, ed uno salino: ma sì l'uno che l'altro di questi due estratti, vien somministrato in quantità minore dall'Ipecacuanha bruna, che dalla bigia; e per conseguente il residuo della bruna è sempre, e costantemente in maggior copia. Ott'onze d'Ipecacuanha bigia somministrano collo spirito di vino dieci dramme dell'estratto resinoso: la quantità medesima dell'Ipecacuanha bruna, maneggiata e lavorata nella maniera medesima, ne somministra soltanto sei dramme. Dal residuo di questa quantità della specie bigia, in simigliante guisa spogliata dallo spirito soltanto del suo resinoso, puovvi esser procurata la quantità di due onze dell'estratto salino, per mezzo d'un solvente acquoso; ma il residuo della quantità medesima dell'Ipecacuanha bruna non somministrerà più di cinque, ed al più sei dramme di quello medesimo Estratto, col manipolamento a capello il medesimo. Il residuo della bigia in simigliante guisa spogliata delle sue parti resinose e saline, peserà quattr'onze; ed il residuo della bruna, col trattamento, e manifattura medesima non verrà a pesare meno di sei onze. Quindi è cosa evidentissima, che i principj, od elementi attivi trovansi in copia maggiore nell'Ipecacuanha della specie bigia, che nella specie bruna.


In evento, che il metodo, o procedimento di sì fatta analisi venga cangiato, o varato, e che venga messo alla bella prima in opera il mestruo acquoso, la proporzione dell'Estratto salino verrà ad essere grandemente da esso mestruo accresciuta, e per lo contrario diminuita d'affai quella dell'Estratto resinoso. Ott'onze d'Ipecacuanha bigia trattata con questo secondo metodo viene a somministrare tre onze e

mezzo d'Estratto salino, e soltanto trenta-fai grani d'estratto resinoso dopo per mezzo dello spirito di vino; e la quantità medesima dell'Ipecacuanha bruna somministra un'oncia, e tre dramme dell'estratto salino, e soli ventiquattro grani dell'estratto resinoso usato dopo per mezzo dello spirito di vino. Da tutto il diviso finora, egli è agevole il concepire, che l'Ipecacuanha scura contiene molto minor porzione delle parti attive, e molto maggior porzione di parte terrigna, di quello segua nella bigia: eppure con tutto questo ella è cosa niente meno certa per l'esperienza, che l'Ipecacuanha scura nel suo operare è molto più violenta di quello sia la bigia stessa.

Questa faccenda sembra una specie di paradosso imbarazzante: ma per appianarlo ci è giuoco forza il ricordarci, che le facoltà e virtù dei medicamenti non debbono già misurarsi nè dalla loro massa, nè dal peso loro, avvegnachè i più potenti ed attivi degli altri tutti agiscono in piccolissime porzioncelle. Egli è stato osservato, che la menoma porzione di spirito cavato dall'Ipecacuanha bruna, è più pungente, più gagliarda ed energica di quella porzione maggiore cavata dall'Ipecacuanha bigia; e probabilmente questa parte della radice ha ugual facoltà e forza d'irritare le parti interne degl'intestini, che le parti resinose.

Le picciole doserelle d'Ipecacuanha vengono grandemente raccomandate nelle diarreie della specie la più semplice di pari, che nelle dissenterie: nel fuor bianco poi noi appena conosciamo un medicamento migliore dell'Ipecacuanha.

IPERBOLA. Le Iperbole di tutti i gradi possono essere espresse per mezzo della Equazione $x^m y^n = a^m + b^n$, ove a è una quantità data, x un'abscissa presa sopra l'asintote, ed y un'Ordinata all'asintote.



Se

Se da qualsivoglia punto B d'una tale Iperbola venga tirata una linea BC parallela ad un'asintote, e terminata dall'altra, e venga ad esser compiuto il Parallelogrammo BCAD: allora questo Parallelogrammo farà allo spazio iperbolico BCEO prodotto all'infinito, come $m - n$ ad n . Veggasi l'*Hospital* Sezion. Conic. artic. 240.


Quindi 1. Quando $m - n$ è positiva, ch'è quanto dire, quando m è maggiore di n , noi possiamo sempre trovare la Quadratura di simiglianti spazj iperbolici.

2. Quando $m = n$, allora $m - n = 0$, e la ragione, o proporzione del Parallelogrammo è all'area iperbolica, come 0 ad n ; nel qual caso quell'area diventa infinita.

3. Quando m è minore di n , $m - n$ è negativa; ed in questo caso il Parallelogrammo è allo spazio iperbolico come un numero negativo è ad un numero positivo; la qual cosa ebbe ad indurre il Dottor Wallis, ed altri ad asserire, che quell'aree iperboliche sono più che infinite. Veggasi l'*Hospital* Sez. Conic. artic. 242.

Ma la verità si è, che la ragione, o proporzione di un numero negativo ad un numero positivo, fa soltanto vedere, che lo spazio limitato, o terminato da DB (vale a dire l'altro lato del Parallelogrammo) dalla curva, e dall'asintote prodotte all'infinito, è a CBDA, come m ad $n - m$. Vegg. l'*Hospital*, ibid. Veggasi di pari Mac-Laurin, *Fluizioni*, artic. 294.

Tuttochè l'area compresa fra l'Iperbola d'Apollonio, e la sua asintote sia infinita, nulladimeno qualsivoglia segmento, o settore di questa curva può essere quadrato per mezzo dei Logaritmi. A cagion d'esempio:



Suppongasi, che vengane ricercato di trovar l'area del segmento iperbolico EBCF, compreso fra l'arco della Curva

ERF, le linee EB, FC parallele all'asintote AD, e BC, porzione dell'altra asintote interclusa fra esse. Allora se ABED, Parallelogrammo dell'Iperbola, venga preso come un'unità, lo spazio EBCF farà il Logaritmo del Napier della Ragione di AC ad AB, oppure di BE ad FC. Quindi se noi avessimo tavole di tali Logaritmi, noi troveremmo l'area di EBCF per mezzo di sottrarre il Logaritmo di FC da quello di BE, e la differenza verrebbe ad esprimere la Ragione del segmento al Parallelogrammo ABED, oppure 1. Ma siccome simiglianti Tavole non esistono, è giuoco forza il prenderli alcuna anterior brigia per convertire il Logaritmo comunque, o sia del Briggs, in Logaritmo del Napier. Prendasi pertanto dalle Tavole comuni il Logaritmo della Ragione di BE ad FC, vale a dire la differenza dei loro Logaritmi, e si moltiplichi questa differenza per 2.3025851; Logaritmo iperbolico di 10; il prodotto verrà a somministrarci la Ragione del segmento al Parallelogrammo ABED, oppure 1. Così supponendo $BE = 36$, e $CF = 5$, ed il Parallelogrammo $ABED = 1$.

Da 1.5563025 = Logaritmo di 36.

Sottrazione 0.6989700 = al Logarit. di 5.

Differenza 0.8573325 = al Logar. di $\frac{4}{3}$ allora 0.8573325 x 2.3025851 = 1.9740810 per l'area del segmento BEFC. Questa moltiplicazione può essere effettuata col metodo ristretto di M. Oughtred.

Monsieur Huygens per ischifare la moltiplicazione per 2.302. &c. trova il suo Logaritmo = 0.3622156887, ed aggiunge tempremai questo al Logaritmo della differenza trovato prima, e poscia trova il numero corrispondente a questa somma. Veggasi *Horologium Oscillatorium*, ed il P. A. Grandi, *Demonstrat. Theoriae Huygen.* in fine.


Se venisse proposto di trovar l'area del settore AERF, siccome questa è uguale al segmento EBCF, così può benissimo servire l'istesso metodo. Ma positi far ciò simigliantemente per altre parecchie analogie, per le quali veggasi *Cotes*, *Harm. Mensur.* pag. 12. 13. veggasi di pari pag. 25. 26. dello stesso Libro.

IPERBOLE *conjugate*. E' questa una denominazione data a quattro Iperbole, quan-

X 2 do

do il primo, ed il secondo asse di due opposte Iperbole sono il secondo, ed il primo asse di due altre opposte Iperbole.

Così, se due Iperbole opposte AM, am hanno la linea Aa per loro primo asse, e la linea Bb per loro secondo asse; e le due altre opposte Iperbole BS, bs hanno per lo contrario Bb per loro primo asse, ed Aa per loro secondo asse, queste due seconde Iperbole BS, bs appellansi *Conjugate* alle Iperbole AM, am , e le quattro insieme vengono denominate Iperbole *Conjugate*.



Le Asintoti HCb, GCg delle Iperbole AM, am , saranno similmente asintoti alle Iperbole BS, bs . Vegg. *Monfieur de l'Hospital*, Sezioni Coniche, Articolo 132.

IRIDE. Quando l'umore acqueo dell'occhio viene ad essere evacuato in una ferita, od ulcera della cornea, vi ha gran pericolo, che venga ad attaccarvisi l'iride. Per impedire, ed ovviare sì fatto inconveniente dovraffi, di tratto in tratto, esporre il paziente alla luce, fino a tanto che la cornea venga ad esser di bel nuovo sollevata dall'umore acqueo. Produce la luce un moto nell'iride medesimo, il qual moto può benissimo impedire la sua adesione. Veggasi *Demaurs appresso i Saggi Medici d'Edimburgo*, *Compend.* vol. 2. pag. 508.

IRIDE, il Fior di luce, nel sistema del Linneo di Botanica, è questo un genere distinto di piante sotto il quale questo egregio Autore comprende l'Iride, il Xyphion, il Sibirinchio, e l'Ermodattilo del Tournefort, come piante tutte di un genere medesimo, i caratteri delle quali sono, che il fiore non ha calice, ma soltanto alcuni semplici filamenti intarsiati, od in-

tralcianti, imbracati, dividenti i fiori l'uno dall'altro, e rimanenti nel luogo loro, dopo, che i fiori son caduti. Il fiore è diviso in sei parti, i puntali son lunghi ed ottusi; i tre posteriori piegati all'indietro; i tre anteriori son diritti ed acuti, e tutti vanno a congiungersi nelle loro inferiori estremità. Gli stami sono tre aguzzi, o puntati filamenti giacenti, o stesi sopra i puntali piegati, e le antere sono bislunghe, stirate, ed abbassate. Il germoglio del pistillo è bislungo, ed è piantato sotto il ricettacolo. Lo stilo è semplice, e cortissimo. Lo stigma grossissimo, e diviso in tre parti, i segmenti, che assomiglianti ad altrettanti puntali d'un fiore, sono dilatati, e rivoltati all'indietro, e premono sopra i pedali, e gli stami: le estremità di questi sono divise in due. Il frutto è una capsula bislunga angolare con tre cellette, e con tre tuniche, od incamiciature. I semi sono in buon numero, e grossissimi. Veggasi la Tavola prima di Botanica Classe 9.

In alcune delle Pianta di questo genere la capsula è Trigona, in altre Pianta poi ella è elongata. Veggasi *Linnaei Genera Plantar.* pag. 22.

I Caratteri dell'Iride, secondo il Tournefort, sono gli appresso.

Il fiore è lisaceo, composto d'una sola foglia, ed è nel suo fondo formato a foglia d'un tubo. Quindi viene a dilatarsi, stendersi, ed allungarsi, e così viene a formar sei parti, tre delle quali sono posate all'insù, e tre per lo contrario all'ingiù. Il pistillo sorge dal fondo del fiore, ed è guernito di tre puntali, i quali sono archeggiati, e piegati per sì fatto modo all'ingiù sopra le ripiegate foglie del fiore, che assomiglianti ad una specie di palato. Il calice, o base del fiore, finalmente diventa un frutto bislungo, che va ad aprirsi in tre parti nella sua estremità e mostra d'esser diviso in tre celle entro alle quali contengono de' semi tondeggianti, ed alcune frate anche compressi, o piatti. A tutto ciò dee esser aggiunto, che la radice è carnosa, bislunga, e d'una specie arrampicante, e non coperta da alcuna incamiciatura.

Le specie dell'Iride da Monfieur Tournefort noverrate sono le seguenti.

I Iri-

1. Iride silvestre comune, o sia Iride della Germania. 2. Iride comune Ortense dalle foglie dilatate, avente fiori azzurri porporini. 3. Iride ortense dai fiori azzurri dilatati. 4. Iride ortense dal fiore azzurro alquanto pallido, con una coperta bianca. 5. Iride Ortense Tedesco bianco. 6. Iride Fiorentino bianco. 7. Iride Illirico comune. 8. Iride nero, e bianco dal fiore grossissimo. 9. Iride dalle foglie alcun poco dilatate, dai fiori bianchi, e dai contorni azzurri. 10. Iride dalle foglie alcun poco dilatate, avente fiori bianchi, ed orlature porporine pallide. 11. Iride Asiatico azzurro dai molti fiori. 12. Iride Asiatico porporino. 13. Iride dal fiore rosiccio senza odore. 14. Iride avente odore d'Oxycantha. 15. Iride Romano azzurro dalle grandi foglie dilatate. 16. Iride grande Dalmatino, avente un fiore violetto pallido. 17. Iride Costantinopolitano porporino pendente all'azzurro. 18. Iride Damasceno azzurro dai molti fiori. 19. Iride Tedesco dall' ampie foglie spirante soave odore. 20. Iride Tedesco dall' ampie foglie con fiori spiranti odore di sambuco. 21. Iride Tedesco dalle foglie dilatate, avente fiori di color giallo carico. 22. Iride Tedesco dall' ampie foglie con fiori bianchi, e porporini. 23. Iride dalle larghe foglie spirante odore d' Oxycantha. 24. Iride della Pannonia dall' ampie foglie, di fior doppio. 25. Iride dalle dilatate foglie, avente fiori verdi, e bianchi. 26. Iride dalle foglie grandi con gambi nudi. 27. Iride di foglie dilatate, avente fiori bianchi strisciati di rosso. 28. Iride Olandese dall' ampie foglie spirante odore di sambuco. 29. Iride spirante odore di sambuco di foglia ampia variamente strisciata. 30. Iride dalle foglie dilatate avente fiori porporini di maggior grandezza, spirante odore di sambuco. 31. Iride dall' ampie foglie con fiori bianchi strisciati. 32. Iride porporino dalle foglie corte dilatate. 33. Iride dalle due fiorite, di fior piccolo, spirante odore simile al giglio delle valli. 34. Iride Illirico dal fiore di maggior grandezza. 35. Iride Dalmatino picciolo dai fiori porporini languidi. 36. Iride Ortense dal fior giallo. 37. Iride ortense dal fior giallo variamente strisciato. 38. Iride Tripolino dal fior giallo di foglia estremamente lunga. 39. Iride

de selvaggio palustre comune di fior giallo, appellato fior giallo a bandiera. 40. Iride silvestre giallo dal fiore a bandiera, di foglia più corta, e di un color verde pendente al paonazzo. 41. Iride giallo silvestre pallido. 42. Iride silvestre fetente, appellato anche *Xiride*, e *gladivino feido*. 43. Iride fetente pratense dalla stretta foglia, o gladvino. 44. Iride più alto non puzzolente dalle foglie strette. 45. Iride più basso pratense dalla foglia stretta. 46. Iride marino dalle strette foglie. 47. Iride marino minore dalle foglie anguste. 48. Iride Ortense dalle anguste foglie avente fiori di color cangiante. 49. Iride ortense dalle strette foglie, avente fiori bianchicci spruzzati di macchie rosse. 50. Iride dalla foglia angusta avente fiori di due colori. 51. Iride maggiore dalle foglie strette, spirante odore di sulsina. 52. Iride minore dalle anguste foglie spirante odore di sulsina. 53. Iride nano di fior di due specie avente fiori grossi di un color porporino carico. 54. Iride basso con fiori porporini inchinati al nero. 55. Iride basso con fiori diversamente strisciati. 56. Iride basso con fior porporino pendente al nero. 57. Iride basso dal fior porporino piano. 58. Iride basso dal fior candido, con strisce, ed orlature d'azzurro. 59. Iride basso dei Pirenei dalle foglie spale verdastre gialle. 60. Iride basso dei Pirenei di foglia verde spala, variamente strisciata d'azzurro. 61. Iride basso picciolo, di fior porporino inclinate all'azzurro. 62. Iride basso dai fiori rossi. 63. Iride basso nano, avente fiori variamente dipinti. 64. Iride basso dai fiori porporini, e gialli. 65. Iride basso dai fiori pallidi, e biancastri. 66. Iride nano minore dai fiori variamente strisciati. 67. Iride minore dai fiori bianchi. 68. Iride nano dai fiori gialli. 69. Iride nano dai fiori gialli scuri. 70. Iride basso avente fiori gialli pallidi. 71. Iride basso dai fiori bianchi strisciati di vene di diversi colori. 72. Iride nano pietra Francese. 73. Iride basso pietra dall' ampie foglie. 74. Iride più grosso basso, pietra di foglia minore. Veggansi *Tournefort Institut*. pag. 360.

L' Iride secco Fiorentino, o sia radice di giuggiolo, è un medicamento espettorante, ed attenuante. Vien prescritto con buo-

na riuscita nelle affezioni splanatiche, ed in parecchie altre indisposizioni del petto, e dei polmoni; la dose è dai dieci ai quindici grani in polvere. Il fugo della radice fresca del nostro Iride è un medicamento eccellentissimo nelle Idropisie; ed il modo migliore, e più dicevole di darlo si è quello di unirlo con vin bianco, un'oncia, o due per dose, questa dose in due, od in tre giorni fa di mestieri prenderla una sola volta. Questo medicamento opera come Emetico, e come Catarrico, e scarica costantemente quantità abbondevole di flemma.

Noi abbiamo numero copiosissimo di spezie di questa Pianta conservate nei nostri giardini, e parecchie d'esse sono eccellentemente belle. Le loro radici sono groppolose, o bernoccolute, e vengono affai faticce, e tutte le spezie vengono propagate con ispartire quelle radici. La stagione più acconcia per somigliante faccenda si è il mese d'Agosto, allorchè son cadute le foglie dei loro fiori, e che la Pianta tutta comincia a cangiar di colore; ma questo lavoro vorrebbe sempre esser fatto in tempo umido, di modo che in evento, che il Mese d'Agosto corresse tutto formalmente secco, la cosa dovrassi differire al mese di Settembre, tuttochè il farlo, se si possa, innanzi farà riuscire il lavoro sempre migliore, Amano tutte queste Pianta i luoghi umidi, ed ombrosi. Se la terza, in cui trovansi piantate, sia soverchio concimata, le loro radici marciscono; e se vengano tenute esposte al sole, i loro fiori hanno cortissima vita. Ogni due anni vogliono queste Pianta esser trapiantate, e ciò per impedire, che dilatino, ed essendano soverchio le radici loro, avvegnachè elleno sieno dispostissime a spanderli, e di farsi stanza a tutte le spezie di vermi, e lombrichi.

Possono i curiosi far venir su, e nascer tutte le spezie dai loro rispettivi semi, i quali se verranno scelti dai fiori più nutriti, e più perfetti, e se saranno con cura, ed attenzione coltivati, somministreranno una varietà di snissimi fiori delle Pianta, che essi producono. Voglion questi semi esser posti in terra subito, che son maturi, in un'orlatura di terreno esposto ad Oriente. Vedrammoli spuntar fuori nella

Primavera; e l'anno seguente fioriranno. Vegg. Miller, Dizionario del Giardiniere.

Iatix palustre di fior giallo. Iris lutea palustris. Il popolo Scozzese ha rinvenuto un'uso di questa Pianta, che non è stato mai osservato dagli Autori della materia Botanica i più accurati. In quei paesi l'inchiosfro, del quale servono comunemente, è fatto di questo Iride palustre di fior giallo. Tagliano essi alcune di queste radici in sottilissime fette, e fannole bollire, oppure tengonle in infusione nell'acqua fino a tanto che il liquore venga a rimanerne in grado massimo vinto. Quindi lo colano fuori del vaso assai chiaro; e poscia collocandovi dentro la lama di un coltello, od altro pezzo di ferro, ve lo vanno fortemente stropicciando con una ruvida pietruzza bianca, e così il liquore vienvi a grado a grado divenendo nero: Continuano coloro questo lavoro, fino a tanto che il color nero del liquore sia divenuto carico a quel segno, che si richiede, ed, in sostanza viene a riuscire un'inchiosfro tollerabilmente buono. Veggansi le Trans. Filosof. n. 117.

Il fugo di questa Pianta mescolato col fugo di spinamagna, o sia spina giudica, vien riconosciuto un assai efficace Idragogo. Veggansi Saggi medici d'Edimburgo, Vol. 5. Art. 8.

IRIDE. L'Iride è somigliantemente il nome dato da alcuni Autori ad una spezie particolare di cristallo ramificato, assai osservabile per rappresentarci ne' suoi colori riflettuti l'Arcobaleno. Ma siccome una sì fatta proprietà viene più, o meno a ravvisarsi in tutte le spezie di cristalli ramificati, e siccome questi grandemente assomigliansi l'un l'altro, così una somigliante denominazione diventa generalmente applicabile a qualsivoglia spezie di cristallo ramificato; e per conseguente la voce Iride, in vece d'essere il nome di una data spezie particolare, venne preso non altramente che un termine sinonimo del cristallo comune. Ha però il Dottor Hill dall'istorie, o piani di quelli Autori, che dapprima attribuirono un tal nome a questa sostanza, toccato con mano, esser questa propriamente la denominazione d'una particolare spezie di cristallo ramoso, avente una lunghissima piramide, che vien trovato in copia grandissima nella Germania, per

per l'Italia, ed in Inghilterra, aderente alle superficie delle spaccature nelle cave delle pietre. Veggasi *Hill*, *Istoria de' Fossili*, pag. 179.

IAIDE marino, *Iris marina*. Questo vaghissimo aspetto vien veduto generalmente dopo una furiosa, impervolantissima tempesta, durante la quale le acque del mare sono state in un violentissimo sbattimento, e commozione. L'arcobaleno, od Iride celeste ha grandissimo vantaggio sopra l'Iride od arcobaleno marino, in rapporto alla lucentezza, ed alla varietà dei colori, come anche rispetto alla netta distinzione di questi dell'uno dall'altro; conciossiachè nell'arcobaleno del mare ravvisasi a stento altri colori, salvochè un giallo oscuro nella parte riguardante il Sole, ed un verde pallido alla parte opposta. Gli altri colori non sono così lucidi, e così appariscenti, da poter esser totalmente distinti e determinati; ma gli archi baleni marini sono più frequenti e più numerosi degli altri. Ella non è cosa rara il vederne sul mezzodi una ventina ed anche una trentina. Veggasi l'Opera intitolata, *Observations sur l'Arc*, pag. 292.

ISCHIUM. Per questa voce intendesi la porzione più bassa dell'osso innominato, come altresì di tutto il tronco. Vien quest'osso distribuito, o diviso in Corpo, in Protuberanza, ed in Ramo.

Il Corpo dell'*Os Ischium* viene a formare la bassissima, e massima parte dell'Acetabolo, e manda fuori un'apofisi rovesciata all'indietro, che addimandasi la spina dell'*os ischium*.

La protuberanza è sommamente fatticia, disuguale, e riguardante all'ingù; ed appunto in questa data parte tutto il corpo si posa, allorchè noi ci pogghiamo a sedere. Ella comparisce cartilaginosa a motivo dei seccati ed induriti rimasugli dei tendini. Tutta la porzione convessa di essa protuberanza è in origine un'Apofisi, i segni, od impronti della quale vengono a designarsi, e sparire più presto in alcuni soggetti, che in altri: in essa possono distinguersi tre impressioni muscolari.

Il Ramo finalmente dell'*os ischium* è una specie di allungamento sottile piatto, oppure un'Apofisi, che ascende innanzi dalla curvatura della protuberanza dell'osso

della pube; ed evvi bene spesso in parte coperto da una continuazione delle epifisi della protuberanza medesima.

Queste tre porzioni dell'*Ischium* prese insieme vengono a formare una grossa apertura, che fa la parte massima del foro ovale. In quest'osso sono osservabili tre altre tacche, vale a dire, una posteriore fra la protuberanza, e la spina, pel passaggio del muscolo Otturatore interno, che è alcun poco cartilaginosa, e divisa in tre, ed in quattro canaletti superficiali; l'altra laterale fra la protuberanza, e l'acetabolo, pel passaggio del muscolo Otturatore esterno; e finalmente la terza anteriore nell'orlatura dell'acetabolo per i ligamenti. Veggasi *Winslow*, *Anatomia*, pag. 71.

ISOLA. Ci parla il Kirker di un cambiamento sommamente osservabile della faccia della Terra nelle parti d'Oriente, per un ingradimento in quella parte del Mondo avvenuto di novanta nove Isole una maggiore dell'altra, sotto l'estensione, o tratto medesimo di superficie, che l'Isole medesime avevano, mentre trovavansi divise dal Mare. Ma noi dobbiamo osservare, come non è da darsi un'assoluta credenza a ciò, che questo Autore asserma delle cose miracolose della China. La sua fondanza delle foglie d'alberi convertentisi, e cangiantisi in neri uccellacci ella si è una prova manifestissima, come quel buon Frate bevevasi molti assurdi sull'asserzione di gente, alla quale un Filosofo non dee dar credenza. Veggasi *Kirker*, *China illustrata*. Veggasi altresì l'Articolo **UCCELLI neri**.

ISOLE nuotanti, o galleggianti. Son piene l'Istorie di racconti d'Isole nuotanti, o galleggianti; ma la parte massima di essi racconti, od è falsa assolutamente, o fondata sopra esagerazioni.

Ciò, che noi generalmente veggiamo di specie somigliante, altro, a vero dire, non è, che una concrezione d'una materia più leggiera, e più viscosa galleggianti, e nuotante sopra la superficie dell'acqua, come in focacce d'ampia estensione, e che unita colle radici di Pianta, viene a formare una congerie, od ammassamento di differenti grossezze; e configurazioni, che non essendo fissata al lido in niuna delle sue parti, vien quò, e là spin-

spinta, ed urtata dai venti, e va galleggian-
do, e nuotando sopra la superficie dell'onde.

Queste congerie vengono d'ordinario tro-
vate nei grossi laghi, ove vengono ad ef-
fere confinate, dall'essere spinte, e porta-
te troppo lontano; ed alcune d'esse in pro-
gresso di tempo vengono ad acquistare un'
ampiezza, e grossezza assai considerabile.

Ci parla Seneca di parecchie di quest'
Isole nuotanti, che trovavansi nell'Italia;
ed alcuni Scrittori più moderni ce ne han-
no fatta la descrizione di parecchie tro-
vantisi somigliantemente in diversi altri
luoghi. Bisogna però che le Istorie loro
s'avverino soltanto di quelle età, in cui
essi scrivevano; avvegnachè ai nostri giorni
pochissime prove rimanganci di loro esi-
stenza, non più veggendosi queste loro Isole
nuotanti in quei luoghi, ove essi cele
fissarono; e forè che quest' Isole, o sien-
osi dileguate di nuovo, o che sienosi at-
taccate ai lati delle acque in alcune par-
ti per sì fatta maniera, che ne sien di-
venute alla perfine col tratto del tempo
una porzione del lido. Ci parla Plinio di
un' Isola grandissima, che tutt' in un su-
bito scaturì fuori intorno al lago di Cu-
tilia nel Territorio di Rieti, la quale ven-
ne manifestata ai Romani Antichi da un'
Oracolo; e ci assicura Pomponio, che nel-
la Lidia trovavansi parecchie Isole così
sciolte, e smosse sotto di se, e nei loro
fondamenti, che qualunque eterno legge-
rissimo urto smovevale, ed allontanavale
dalla presente loro stazione. Erodoto poi
ci fa gran parole del lago Chemide nell'
Egitto.

ISOPERIMETRICO. Le linee, e le
Figure Isoperimetriche hanno grandemen-
te impegnato, e fissato l'attenzione dei
signori Matematici fino dal ritrovamento
delle Flussioni.

L'analisi del Problema generale risguarda-
nte le figure, che fra tutte quelle del
Perimetro medesimo producono massimi,
e minimi, venne somministrata dal famoso
Monsieur Jacopo Bernoulli dai calcoli,
che involgono le Flussioni Seconda, e Ter-
za (a).

Parecchie ricerche poi di somigliante na-
tura sono state fin da quel tempo conti-
nuate con impegno grandissimo in manie-
ra sistematica, ma non sempre già con ugual

riuscita. Il celebratissimo Monsieur Mac-
laurin, per difendere la Dottrina delle Flus-
sioni dall'accagionamento, che gli veniva
dato d'incertezza, o d'oscurità, ha gran-
demente illustrato questo soggetto, il qua-
le viene comunemente considerato non al-
tramente, che una delle più altruse parti
di quella Dottrina, per mezzo di dare lo
scioglimento, e la composizione di questi
Problemi per le sole prime Flussioni; ed in
una maniera, che vien suggerita da una
Dimostrazione sintetica, la quale serve ad
avverare lo scioglimento medesimo (b).

(a) *Analysis Magni Problematis Isoperimetrici*, *Ab. Erudit. Lips. ann. 1701. pag. 213. 214. & seg.* (b) *Veggasi Mac-
laurin, Fluxioni, B. I. Sap. t. 3. pag. 486. & seg. Veggansi di pari Memires Acad. Roy. Scienc. Paris. ann. 1706. & ann. 1718. Gio. Bernoulli Oper. Tom. 1. pag. 202. pag. 208. & pag. 424. & seg.*

ISSOFO. E' l'Issopo nella Botanica il
nome di un Genere di Pianta, i caratteri
delle quali sono gli appresso.

Il fiore composto d'una sola foglia, ed
è della specie labiata. Il labbro inferiore
è eretto, od alzato, tondeggiente, e spaci-
cato in due; il labbro inferiore poi è di-
viso in tre segmenti, quello di mezzo es-
sendo concavo alla foggia di un cucchiaino,
e doppiamente puntuto, e non altramen-
te che rimanesse sollevato. Il pistillo forge
dal calice, ed evvi ficcato come un chiodo
entro la parte inferiore del fiore, e vien-
vi fasciato tutt' all'intorno da quattro em-
brioni, i quali dopoi vengono a diventare
altrettanti semi maturanti entro il calice
del fiore medesimo.

Le specie dell'Issopo noverate da Mon-
sieur Tournesfort, sono le seguenti.

1. Issopo comune dal fior paonazzo. 2. Issopo averse i suoi fiori tutt' all'intorno dei gambi. 3. Issopo spirante soave odore, od odore di mulchio. 4. Issopo dalle foglie arricciate, od increspate. 5. Issopo averse le foglie profondamente divise. 6. Issopo dalle corte spine rotonde. 7. Issopo variamente listato, od Issopo auro. 8. Issopo comune dai fiori bianchi. 9. Issopo comune dai fiori porporini. 10. Issopo peloso. 11. Issopo peloso dal fior bianco. 12. Issopo basso averse foglie di mortella. *Veggasi Tournesfort, Instit. pag. 200.*

Le

Le parecchie specie dell' Issopo, allorché non trovasi in fiore, o fiorito, possono distinguersi dalle loro foglie lunghe, e strette, e dal loro particolare odor soave, e gustoso.

Le forti tette di questa Pianta, non meno le comuni, che le rare, vengono a propagare, o con seminarle o con tagliarle. I semi di questa Pianta fa di metterli porghi in terra nel mese di Marzo in un letto di leggiero suolo arenoso, ed allorché le piantucelle sono spuntate fuori, fa di metterli nettamente ben bene intorno intorno pel tratto di un buon piede; oppure s' e' venga disegnato di tenervele per molti anni, dovranno vili lasciarsi nella distanza di due piedi isolate; avvegnaché elleno crescano, e vengano su con vicacità e spandansi assai più all' intorno. Fanno migliore riuscita queste date Pianta in un terreno secco, e magro, e faranno assai meglio nella ai rigori dell' Invernata in un tal terreno povero, che in un terreno grasso, e ricco.

Allorché poi debbon esser propagate per taglio, la faccenda dovrà farsi nel mese d' Aprile, o di Maggio, in un' orlatura di terreno, ove esser possano difese dal calor violento del Sole; e venendo frequentemente innaffiate, questi loro tronchi gitteranno bravamente le loro radici nel tratto di due mesi; ed in capo a questo dato tempo dovranno trapiantare in quei luoghi, ove dovranno rimanervi perpetuamente, e dovranno trattare non altrimenti, che le piante seminate. Veggasi *Miller*, *Dizionario del Giardiniere*. In voce.

L' Issopo vien raccomandato grandemente per le ammaccature, e graffiature fatte per cadute, per colpi, e somiglianti, usandolo cioè, esternamente a foggia di cataplasma, o facendo semplicemente un fardelletto della pianta medesima ammaccata ed agguistata entro un pezzo di tela di lino, e così applicata alla parte offesa.

Il Sig. Ray ci conta un caso, preso da Monsieur Boyle, di una violentissima contusione della coscia, per un calcio di un cavallo, che venne felicissimamente curata con sola quell' erba fatta prima cuocere, e poi applicata a foggia di Cataplasma. Ci asserisce il Ray, come il dolore acutissimo, che provava il paziente, venne a dileguarsi nell' istante medesimo dell' appli-

cazione, e che il segno medesimo, e la nera lividura svanirono indi a poche ore.

Issopo presso gli antichi Giudei. Una ciotta di Issopo presso gli antichi Giudei dovea soltanto usarsi per ispruzzar l' imposte delle porte, ed i limitari, o soglie delle loro case, intingendole nel sangue dell' Agnello pasquale. Veggasi l' *Articolo*, *PASQUA*. *Ciclopedia*.

Issopo mucchiofolo. Veggasi l' *Articolo* *GRAZIOLA*.

ISTERICI. Effetti isterici, affezioni isteriche, *hysterica Passio*, nella medicina è un' espressione, significante una malattia, che attacca le femmine, e che per moltissimi rispetti ella è della natura medesima della passione ipocondriaca negli uomini. Ma siccome queste sono di ordinario di più tenera, e di più delicata costituzione, e temperamento degli uomini stelli, così questa rea isterica affezione le malmena, e tormentale con violenza maggiore, e bene spesso arreca loro, e le investe con una sensazione veramente terribile, e spaventosa di strettezze atroci del petto, e con una specie di soffogamento, e perciò da alcuni Scrittori delle cose mediche vien chiamata *suffocatio uterina*, soffogamento dell' utero, insieme con orrende convulsioni, e spasmi della specie la più violenta. Quindi non mancano Autori, che abbiano dipinto l' affezione isterica colla particolare appellazione assai propria di epilessia uterina. Accompagnano questo brutto male ansietà violentissime, non disgiunte da nausea, da vergenza al vomito, e da altri dolorosissimi, e bene spesso pericolosi malori, i quali non assalgono gli uomini da indisposizione ipocondriaca attaccati.

Sembra, che questa malattia riconosca principalmente l' origina sua rea da ammassamenti di sangue nella regione dell' addome, e nelle viscere, ivi situate, il qual sangue vorrebbe aprirsi il varco per l' utero, o per le vene moroidali, ma ne viene contrattato, ed impedito. E siccome questa è similmente la cagione delle affezioni ipocondriache negli uomini, così ella non è maraviglia, che la maggior parte dei sintomi sieno i medesimi non meno nelle donne isteriche che negli uomini ipocondriaci stelli, e che il metodo

Y

del-

della cura in ambedue questi casi debba esser fatta a un di presso il medesimo. Esser dee però onninamente osservato, che quantunque la cagione comune di tutt'e due queste fiere indisposizioni sieno le ostruzioni in ambi i sessi, nulladimeno vien trovato, che le femmine sono afflitte, ed attagate alcuna volta da questo malanno anche mentre i loro corsi mestruali mantengono il determinato giusto loro periodo, e che sgorgano nella dovuta, ed adeguata quantità, e per acconcio e dicevol modo. In questo caso pertanto sembra, che lo sconcerto, ed il male ad altro non debba ascriversi, che a certi agri umori stanziati nelle prime vie, eccitanti delle spasmodie atroci, ovunque tocchino. Veggasi l'*Essero* Compend. medic. p. 184.

Nel tempo dell'acceso, allorchè la sciazzione dello strangolamento o soffogamento è assai violenta, e che imperveriano moti convulsivi, o dominano i venimenti e deliqui di animo, le fetide, e volatili medicine servono in tali casi a sollevare, e riavere la paziente. Dicevolissime pertanto esser possono lo spirito di corno di cervo, l'olio di ambra, la tintura di castoreo, ed i sali volatili posti sotto il naso, od anche, potendo, fatti avvaliare per bocca, come anche l'abbrugiare delle penne, del corno, del cuajo, o qualsivoglia sostanza, che spiri odore nauseoso, e disgiutevole in abbrugiandosi: gran servizio farà di pari a queste povere femmine il lgrattar loro, o stroppicciar con forza le palme delle mani, e le piante dei piedi; e certuni raccomandano lo sbarbar loro un capello alla volta dalla testa, il pungerle con degli spilli, od altri somiglianti mezzi portanti del dolore, e ciò per far tornare in loro stesse le afflitte e malmenate pazienti.

Sono questi i metodi da porsi in pratica nel tempo dell' acceso, ma quando la paziente è ravuta dagli attacchi, dee con esse tenersi il metodo a capello il medesimo, che dalla medicina dee tenersi nella passione ipocondriaca; basterà soltanto, che in questo caso si medicamenti salini, e cinabrina venga aggiunta una porzioncella di Castoreo. Dopo di ciò dovrasì aver l'occhio dal saggio medico a far tornare le mestruali evacuazioni ordinarie ai lo-

ro adeguati corsi, e regolari periodi, in evento, che la paziente trovisi in quel punto di vita, od in quella età, nella quale questi sogliono dominare; ma se questo periodo sia oggimai passato, forz' è, che l'evacuazion divisa venga in alcuna forma compensata, e supplita colla cavata di sangue dal piede, e che quella venga cadaun' anno due volte immancabilmente ripetuta, vale a dire nella Primavera, e sulla fine dell' Autunno, ed a questo rimedio dovrannoosi di pari unire alcune dosi di un qualche soave Catartico; ma molto importa, che a tal diviso metodo sia congiunto un proprio e giudizioso governo, e modo di vivere.

Gli emetici sempremai sono stati sperimentati di danno sommo in casi simili; e quando questi sono violenti, in estremo pericolosi. Le medicine purganti energiche, e gagliarde sono similgiatamente soggette alle sobiezioni medesime, e debbon' esser tenute onninamente lontane da sì fatti casi. Sono di pari di non lieve pregiudizio tutti i medicamenti di indole calorosa; e niente meno son di danno gli stessi Elisiri uterini comuni, e gli oli distillati, ed i sali volatili. Sogliono da certuni prescrivere gli alcalici comuni ferrei, ed assordati, ma questi in casi di tal natura non arrecano il menomissimo sollievo; avvegnachè la cagione di questo male, o non è un'acido, od al più al più non è la cagione primaria, ed essenziale.

L'arrecchi medici poi sogliono servirsi per questi sconcerti di sanità delle medicine acciaiate, o come addimandante essi, de' Calibesti; ma anche qui importa infinitamente, che queste vengano prescritte, ed usate, con somma cautela; avvegnachè, parlando generalmente, rarissime volte queste fanno alcun bene; ma bensì assaiissime fiato producono dei gravi mali. Siccome però sonovi alcuni Casi di questa natura, ne quali i Calibesti loppassano di valore qualsivoglia altro medicamento del mondo, sarà quindi sempremai ottimo consiglio il farne uso con assai circospetta esperienza, e con tenere la paziente legata a dicevole, e proprio regolamento di vita.

Le acque calibeste comuni in questa
bene

bene strana infermità affatissime siate riscosso di efficacia, e vantaggio infinitamente maggiore di tutte le medicine del Mondo; ma fa onninamente di mestieri che vengano prese con tutte e poi tutte le più acconce cautele, e con un' assai adeguata regola di vivere. Prima di porsi nel corso di quelle bevute è del tutto necessario il cavarli sangue dal piede, e ciò fatto comincerassi a berle in una quantità mezzana, e moderata, e sempre alcun poco riscaldate, usando nel tempo del prender quelle acque un' assai moderato esercizio. Veggasi l'Articolo ACQUE MINERALI.

ITALIANO. Marmo italiano. E' questa una espressione, di cui servono i nostri artefici per dinotare due, o tre spezie di marmo liscio variamente e macchiato di una bellezza assai rara, che vien comunemente lavorato in pezzi da far cammini, o per altre cose da ornamento Veggasi *Hill*, *Istoria de' Fossili*, pag. 473.

La denominazione è, a vero dire, sommaramente indeterminata, avvegnachè parecchi marmi semplici, di pari che liscii, e variamente macchiati ci vengono dall'Italia; ed a dir vero moltissimi altri marmi macchiati, e liscii hanno altri differenti nomi particolari, tuttochè sappiamo benissimo, che ci vengono condotti dall'Italia, nè tuttavia addimandansi marmi Italiani; di modo che se questa voce dovesse determinarsi, per la medesima intender si dovrebbero quei tali macchiati, e liscii marmi forestieri, che non hanno altra denominazione propria, e particolare. Egli è vero però, che i nostri Artefici sotto questa denominazione di marmo Italiano comprendono cinque diverse spezie, vale a dire, = 1. Marmo variamente macchiato bianco, e porporino comune. Questa è una massa estremamente vaga, e generalmente suol essere mezzanamente fina, ma nelle sue diverse parti di una purezza, ed insieme di una durezza in gradi sommarmente differenti. E' questo marmo generalmente bianco, venato, macchiato, e strisciato variamente di colori porporini; ma in alcune parti il color porporino fa il fondo del marmo, ed il bianco la varia mescolanza,

ed in moltissimi pezzi, oltre quella interstatura di bianco, vien variato, e dislinto di macchie pallide, rosse, e brune, talvolta di giallo, e tal altra di un verdastro scuro; e quello è il comunissimo marmo di Italia. 2. Un marmo bruno, e bianco fragile, o stritolabile. Assomiglia questo rispetto alla figura al primo marmo pur or descritto, rispetto alla disposizione delle sue vene; ma è soltanto di un fondo bianco, venato di un bruno cupo, ed è il più morbido di tutti i marmi. La parte bianca di questo marmo comparisce composta di granellini pendenti insieme legati, ed in riguardandogli da vicino, assomigliansi grandemente allo zucchero in pane della specie più fina; ed in evento, che venga raschiato esso marmo in questa parte con un coltello, vien via, e si cacci interamente con ogni facilità in grossi granelli fomigliantissimi a' granelli di arena. Questa specie di marmo è di pari in Italia comunissima.

3. Un marmo duro interstato variamente di azzurro, e di bianco. E' questo un marmo alcun poco più ordinario, e più rozzo, di una grana grossolana, di una tessitura sciolta, scassinata, ed è variamente macchiato, e strisciato di un color paonazzo cupo, e di un color di perla, o sia di un bianco pendente al paonazzo; cadauno di questi colori viene di ordinario a formare una parte uguale della massa. E' in Italia questo marmo sommarmente comune, e ce ne vien condotto indi copia abbondevolissima.

4. Un marmo finissimo nero, e giallo, le cui vene gialle compariscono all'occhio non altrimenti, che strisce bellissime di oro. Questo marmo è grandemente stimato, e ce vien fatto uso grandissimo. Finalmente

5. Un marmo porporino, e giallo, di somma apparenza, e bellezza, e di prezzo altissimo. Questo marmo ultimamente viene a pagarsi assai più caro di quello ordinariamente pagar solevasi negli anni andati. Veggasi *Hill*, *Istoria de' Fossili*, pag. 476. 477. 478.

ITERIZIA. Distinguono gli Scrittori delle cose mediche l'Iterizia, o sia spargimento di bile in Idiopatica, ed in Sintomatica. L'Iterizia idiopatica è quella,

che nasce per se stessa, nè ha origine, nè dipende da altra, qualunque siasi, indisposizione. La sintomatica poi è quella, la quale suol comparire in un corso di febbri, o di altre infermità, nelle quali il fiele viene a patire, e sconcertarsi.

La giallura della pelle in alcuni bambini, subito che son nati, non dee in verun conto riputarli una specie di spargimento di fiele, avvegnaschè ella sia in essi cosa di leggerissimo momento, e di niuna rea conseguenza, e bene spesso vassene, e dileguasi di per sè, dopo che i bambini si son purgati delle fecce prime.

Segni dell' itterizia. Assacca questa indisposizione la gente sempre, e costantemente con una assai considerabile stanchezza e fiacchezza di tutte le membra, e questa continua per alcun tratto di tempo; e quello avviene anche più particolarmente, ove abbian dato origine a sì fatta malattia violente passioni di animo. Questo sintoma viene poscia seguitato da una sensazione di stringimento, e di compressione nella bocca dello stomaco: quindi ne nascono delle angustie, e degli stringimenti, ed oppressioni de' precordi, con della difficoltà di respiro, la quale è talvolta a segno violenta, che viene a formare un soffogamento; e comunemente havvi una sensazione di peso, e di disagio nel dextro ipocondrio. Il paziente trovasi sempre più comodo standosi a sedere, che rimanendosi coricato nel letto, o camminando. Con gli altri sintomi congiungesi una leggiera febricitattola, trovandosi il paziente colle membra più calorose, che in altri tempi, e sentendo per lo più il paziente alcuna sensazione di freddo, o delle brividi: prima, che questa febricitattola venga in campo. Il ventre alcuna fiata è indurito, ma tal' altra egli è più sciolto dell'ordinario: e le fecce sono costantemente bianchicce. Simiglianti sintomi con estrema prontezza vengono seguitati da una giallura, che comincia a farsi vedere per entro, ed intorno agli occhi e che va poi per gradi successivi allargandosi, e spandendosi per tutta la superficie del corpo. L'urina è di un color giallo finissimo, e tinge i vasi, ne quali trattienisi; e se sopra una pezza di tela di lino bianca ne vengano fatte cadere soltanto poche goc-

cirole, tingonla queste immediatamente di un vero, e genuino colore di zafferano. L'appetito è sempre feconvolto, e cattivo, ed allorchè venga mangiata alcuna cosa dal paziente, prova allora questi costantemente nella bocca dello stomaco con violenza maggiore una disgustosa, e molesta sensazione. Il sonno è di ordinario sconvolto, ed inquieto, e questa infermità in tutti i suoi periodi ha per compagno indivisibile un positivo languore di spirito. E questi sono i sintomi, che accompagnano sempremai l'itterizia della specie gialla.

ITTERIZIA-NERA. L'itterizia viene a distinguersi dalla gialla non meno da un' abbandono più violento, e più affrettivo, ed insieme da una languidezza di spirito maggiore, che dal color nericio, che induce nel corpo del paziente questa malattia; e questo color nericio non occupa soltanto gli occhi, e la pelle di tutto il corpo, ma l'orina eziandio, e lo sputo, o per lo meno questo ultimo è di un color giallo oscuro assai carico. In questo caso particolare trovasi congiunto con i sintomi divisi un calore critico, con inquietudine grandissima, e mancanza di riposo totale, con emaciamento, e perdita grande di carne, e con una assai grande, e terribile deiezione, ed abbandono di forze; e siccome nell'itterizia gialla prova di ordinario il paziente una sensazione di peso, e di compressione nel lato dextro, così l'assalto dall'itterizia nera prova questa inquiete sensazione di peso, e questo stringimento nel lato sinistro degli ipocondri. A questa grave malattia sono di pari soggetti gli uomini, che le femmine, ma più particolarmente quelle tali persone, che sono di abito di corpo collico; e le estremità della vita, gioventù, cioè, e vecchiezza sono quelle età, nelle quali le persone soglionvi essere più soggette, che nelle età di mezzo. Veggasi *Juncker, Conspectus medic.* pag. 440.

Cagioni di questa infermità. Sono queste una dieta asciutta, e grossolana, ed un trasmodatamente caricar di cibo lo stomaco; un troncamento, od ostruzione istantanea degli scarichi moroidali, e di altre usuali, ed abituali emoragie, e nel-

le femmine, più particolarmente, delle scariche usate mestruali. In sì fatti casi questa malattia è simigliantissima con troppa frequenza, o forata, o compagna di un' Epatitide. Viene di pari alcuna fiata a precipitare in questo grave disordine la persona a motivo di una soppressione disaccoppiata procurata dalle febbri intermittenzi, e massimamente delle Quartane, e ciò per mezzo di medicine astringenti, od anche da violente Passioni di animo, e specialmente allorchè veogono strozzate, e tenute con sforzo grande sepolte in cuore, senza il menomo sfogo. Bane spesso precipiteranno la persona in sì fatta indisposizione gli Emetici violenti, e gagliardi, come anche le bevute disaccorde di acqua fresca assai, allorchè il corpo trovasi soverchio incalorito. Uno scirro nel fegato, od una pietra entro la Cistifellea, è stato toccato con mano, aver sovente data occasione a questo male.

Sono queste le cagioni dell' iterizia gialla: ma l' iterizia nera riconosce la sua origine da ostinate, ed abituali ostruzioni della milza, la quale è propriamente, e realmente la sede di questa infermità.

Prognosi in questo male. I giovanirade volte vengono da questa malattia attaccati con quella violenza, colla quale ella investe le persone avanzate negli anni, ed in essi giovani ella si è sempre di più agevole guarigione. Allorchè questa malattia medesima assalisse con un' empito, e violeza maggiore dell' ordinario, vi ha ragione grande di sospettare, che nel fondo stanzi una febbre od ettica, o lenta per lo meno, oppure alcuna fiata una febbre acuta eziandio. Ed allorchè un' iterizia attacca le persone nel quarto giorno di una febbre acuta, od anche in nanz a questo tempo, e farsi sentire con empito, e forza grande, vi ha sempre pericolo non lieve della morte dell' ammalato. Quanto maggiori sono l' ostruzioni delle viscere originanti dalla soppressione delle febbri intermittenzi, tanto maggiore si è il pericolo, che accompagna l' iterizia da sì fatte ostruzioni originaria. Quelle persone, che stanno infestate per ben due e tre volte dall' iterizia, vengono a cadere in una specie di abituale tendenza a ricadervi per ogni

leggiera occasione, e fannosi doppi grandemente soggette a ricadervi sovente. Allorquando trovasi l' iterizia congiunta con una difficoltà considerabile di respiro, con ansietà, e con oppressione intorno ai precordi, e con una sorte di ripienenza asmatica nel petto, ne suol esser costantemente il termine, od ultimo tristo effetto, od una Tifischezza, od un' Ascite, od un' Atrisia, e ciò pur troppo con frequenza. In evento, che in qualsivoglia tempo il color giallo della pelle in simigliante infermità cangisi tutt' in un subito in bianco, egli si è un presagio estremamente fatale, avvegnachè questo faccia vedere, che stanza nel fegato una costituzione sciroso. In evento, che nel tempo di questa infermità avvenga una buona scarica di sangue dalle vene moroidali, egli si è un presagio di pronta, e spedita guarigione, ed i copiosi sudori che tingon assai di giallo le carni, e somiglianti, esser sogliono di pari un fin, torna sommamente propizio. Un' iterizia che attacchi le persone di età avanzata, e che abbia origine dalla soverchia libera pratica, ed uso, che questa faccia di liquori spiritosi, ella si è una malattia di una cura infinitamente più malagevole di quella della specie comune, avvegnachè in sì fatto caso regnivi sempremai un' aridità nel fegato assai considerabile. Suol nascere non di rado un' iterizia da un' imprigionamento, o soppressione di una febbre Quartana procurata dalla sola China, od allorchè questa è stata somministrata senza giudizio, ed impropriamente; ed allorchè questa fa testa ai medicamenti, ed ostinatamente persevera, ella ne è foriera funesta bene spesso di una Tifischezza, o di caparbie ostruzioni del fegato. Soprattutto un' iterizia semplice della specie comune più leggiera, e benigna, ella si è di agevolissima guarigione, nè è di menomo pericolo; ma qualora questa infermità medesima trovasi accoppiata con altre indisposizioni, e che fa testa ai più acconci, ed adeguati medicamenti, ella riesce sempremai fatale, o per se stessa, o nelle sue conseguenze.

L' iterizia nera è sempre più malagevole, e difficiliosa a curarsi dell' iterizia gialla; ed ella ove assalisse le persone assai avan-

zate

zate negli anni, e che ella sia di vecchia data, ella viene pressochè costantemente sperimentata fatale, o per se stessa, o per precipitar la persona, od in Tifischezze, od in altre incurabili malattie. Veggasi *Junker*, *Conspici*. Medic. pag. 442.

Metodo della Cura. Allorchè l'isteria è recente, dovrà il paziente ben per tre o quattro volte il giorno prendere delle adeguate doserelle di polveri di nitro, e di tartaro vetriolato; ed in quei casi, nei quali hanno dato urto, od origine a sì fatto disordine le violente passioni di animo, dovranno esser aggiunte le polveri assorbenti, come gli occhi di granchio, o similgianti. In quelle date volte, nelle quali richiegga la necessità, che somministrasi insieme con quelle polveri, lo che avviene, ed è pur troppo necessario, alcun Catartico, questo dovrà essere od il Rabarbaro in picciole doserelle, od alcun altro purgante benigno, e soave, ed i decotti di quella radice di erba Indiana, ed Arabica appellata Tortumaglio, di Celandina, e di una preferella di Zafferano. Per similgiant metodo una Isteria venuta di fresco vien dilungata bene spesso con somma felicità in breve tratto di tempo, e verrà così sbarbicata nel suo primo germogliare. A questa polvere possono dicevolissimamente essere aggiunti alcuni pochi grani di Antimonio diaforetico, che dovranno esser presi nell'andarsi a riposare; e questo riuscirà di efficacia somma nel dileguar dalla cute la giallura. Allorchè la malattia ha dato luogo per via di sì soave medico trattamento, dovranno esser preferiti al paziente alcuni gentilissimi calibezzi da prenderli due volte il giorno, e dopo di questi dovranno nitidamente ripeterne una competente dose di rabarbaro. Veggasi *Junker*, *Conspici*. Medic. pag. 445.

Quando poi la malattia è più caparbia, dovrà esser conservar perpetuo nel paziente una soave sudore, e dovrà esserli far prendere la polvere della soprascritta radice di Tortumaglio uno scrupolo per cadauna dose; e le polveri di Antimonio diaforetico, e dei sali digestivi, come, a cagion d'esempio, di tartaro vetriolato, dovranno esserli far prendere con frequenza. Nei giovani poco più abbisognavi per curar-

gli da un' Isteria, del mantenerli in un continuato sudore, e del far loro prendere alcune poche dosi di rabarbaro. Ed in generale, siccome l'isteria è un' infermità agevolissima a farsi riveder di bel nuovo in quelle persone, cui ella abbia una volta assalite, dovranno a queste procurare delle gentili evacuazioni di tratto in tratto, per mantenerla dilungata da esse, ed una volta, almeno ogni tre mesi, dovrà esserli far loro fare una buona bevuta medicata, vale a dire di rabarbaro, di senna, o somigliante. E' l'isteria un' infermità, che non comporta alcun metodo burbero, o vemente. Gli Emetici, ed i gagliardi, e fieri Catartici fanno costantemente del male, ed i sudori violentati a forza di calorose medicine rendono sempremai peggiore di assai questa malattia, invece di apportar sollievo al paziente, il qual sollievo è sempre per lo contrario prodotto dalla traspirazione, procurata per i metodi più benigni, e soavi.

I Cavalli sono, di pari che gli uomini, sottoposti all'isteria. I manescalchi chiamanla similgiantemente spargimento del fiele, o giallura, e dividonla anch' essi in due specie, in gialla, cioè, ed in nera.

La gialla in questi animali vien similgiantemente conosciuta dal loro divenir gialla la parte bianca degli occhi, e dal veder partecipare in essi, sebbene in grado minore, la tinta medesima la loro lingua non meno, che le loro labbra. Nella specie nera poi tutte le descritte loro parti appariscono tinte di un colore scuro carico oneruccio. La cura assai comune presso i manescalchi di tal malattia si è lo sciogliere in due bocce, o quartucci di fortissima, e gagliardissima birra un'oncia di Mitridato, e di fare avvallar caldo a queste creature un tal beverone; e questo beverone medesimo ripetono ogni dodici ore, fino a che la malattia non abbia totalmente dato luogo.

JUGERO. E' un Jugero 10. catene quadrate di ventidue pertiche, o braccia Inglese l'una, vale a dire 4840. braccia, o once canne quadrate. Ed un miglio Inglese essendo 1760. pertiche quadrate, così un miglio quadrato noi troveremo, che viene a contenere 640. Jugeri.

Monsieur Houghton ci somministra una

Ta-

Tavola del numero di Jugeri ad un Casamento in cadauna Contea della Meridionale Britannia, che vien toccato con mano come variano dalle Contee Inglese da $3\frac{1}{4}$ Jugeri in proporzione nel Middlesex, e $17\frac{1}{4}$ nel Surry, a 49 Jugeri in Santhampton. Nelle Contee di Welsh dai 51. Jugeri, siccome si trova nella Provincia di Flint, ai 193. come nella Provincia di Merioneth. Veggasi *Houghton*, Collect. nu.28. Tom. 1. pag. 80. & seq.

Il nostro Dottor Grew ha tentato di trovare, e d'assicurarci dell'acerrato numero degli Jugeri dell'Inghilterra, il quale, secondo lui, monta a 46 milioni, ed 80000 Jugeri. Veggansi le *Transaz. Filosofiche* num. 330. pag. 266. & seq.

Il Sig. Guglielmo Petty per lo contrario non ne riconosce oltre soli 28. milioni; altri poi 29. milioni. E dà un piano del

numero degli Jugeri in cadauna Contea, che vien supposto essere stato cavato da certi antichi Registri, il numero degli Jugeri nell'Inghilterra non trascendeva i 39 milioni, ed un quarto. Ma il medesimo Dottor Grew fa vedere, questo essere troppo poco.

Viene asserito, che la Provincia Olandese contiene un solo milione di Jugeri; e venne formalmente pensato, ch'ella contenesse due milioni, 400, 000 d'anime. Ma da i più diligenti, ed accurati calcoli di Monsieur Kerssboom abbiamo con sicurezza, che quella Provincia non contiene un milione d'anime. Se l'Inghilterra fosse proporzionalmente popolata, ella verrebbe a contenere quarantalei milioni d'abitanti, ch'è quanto dire, peravventura oltre cinque volte di più di quello ella contiene di presente.



KALI.

KAL

KAL

KALI. *Erba vitrea.* E' questo nella Botanica il nome d'un genere di Pianta, i cui caratteri sono i seguenti:

Il fiore è della specie rosacea, composto di parecchie foglie disposte, e situate in una forma circolare. Il pistillo sorge dal centro del fiore, ed ultimamente diventa un frutto d'una struttura membranosa, e d'una figura tondeggiata, e contiene un solo seme, il quale è formato di circoli, e girigori non altramente che un guscio di chiocciola, e rimane comunemente coperto colle foglie del fiore.

Le specie del Kali novorate dal Tournefort sono le appresso:

1. Kali maggiore con seme a foggia di chiocciola. 2. Kali spinoso con foglie più lunghe, e più strette. 3. Kali spinoso con foglie più corte, e più dilatate. 4. Kali Siciliano legnoso con fiori membranosi. 5. Kali Spagnolo arbutto, con foglie di Tamarisco. 6. Kali Spagnolo arbutto con foglie simili a quelle della ginestra. 7. Kali Spagnolo arbutto con foglie pelose strettissime. Veggasi *Tournefort*, Institut. pag. 243.

Abbonda questa Pianta grandemente di sal marino, altro i suoi fughi propriamente non essendo, che un fluido salino, e non già un fluido insipido acquoso: ma la differenza, che passa fra il prodotto di questa Pianta medesima quand'è verde, e quando è asciutta, sotto le Chimiche analisi, ed esperienze, è maravigliosa. Se ella venga distillata mentr'è verde o fresca, ella somministra un'acqua insipidissima; se una libbra d'essa Pianta sia colta fresca, e sia attaccata in alcun luogo a seccarsi, ella verrà a somministrar soltanto tre once della Pianta stessa seccata. Se quella venga abbrugiata, ella è più malagevole ad esser ridotta in cenere, di qualsivoglia altra pianta in apparenza della tessitura ad essa somigliante; ed ultimamente le ceneri prodotte da questa quantità abbrugiata in una

fornace da pentolaj, verrà a somministrare niente più di una dramma, e mezzo di un sale bianchiccio, e questo con estrema leggerezza fermenterà coll'acqua forte. Essendo fatta bollire nell'acqua quattro once dell'erba fresca, e lasciata poscia quest'acqua stessa diligentissimamente svaporare, vi si verrà a formare presso a tre quarti di un'oncia di purissimo sal marino, nella sua propria naturale forma cubica, attaccato al fondo, ed intorno ai lati del vaso; e quando non germoglierà più sale, essendo con l'adeguata cura distillata l'acqua rimanente, aumentando ad un certo adeguato grado la forza del fuoco, l'acqua alla bella prima passerà sopra, e poscia verravvisi ad alzare un sal volatile, il quale s'andrà attaccando, ed andrà incrostando la sommità, ed i lati del vaso medesimo. I sali essendo purificati, verrassino a toccar con mano, pel risultato delle divise esperienze, come quest'erba, mentre vegeta e cresce, contiene intorno ad una quinta parte del suo peso di sale marino comune. L'erba poi, che è stata così fatta bollire, se venga seccata, e poscia se venga fatta bollire di bel nuovo, in una quantità di quattro, o di cinque pinte di acqua, e che il decocto sia fatto svaporare fino alla metà della quantità divisa, il liquore, che rimarravvi, somministrerà vari odori differenti, come, a cagion di esempio, quello di miele di alveare, quello di cavolo cappuccio, e di altre erbe da tavola parecchie. E dopo tutte queste divise faccende, se l'erba colta medesima venga lasciata marcire, e putrefarsi, ella somministrerà un'odore a capello somigliante a quello degli escrementi di animali, e diverrà nella maniera di quelli il ricettacolo, ed il ricovero delle mosche, e sarassi acconcessissima abitazione non meno, che grato cibo di infiniti vermiciattoli, usciti fuori dell'uova di questi alati insettucci. Veggasi *Hem-*
kel,

del. de Affinitate Vegetab. & Mineral.

Tutte le esperienze, le quali possono esser fatte con i cristalli cubici del sale, formatosi nel decocto di quell'erba fatto evaporare, fanno toccar con mano, esser quello sale comune; ed il sal volatile sollevatosi doppi per l'accrescimento del fuoco, da quel liquore, nel quale non cristallizzavasi altro sale cubico, venne trovato, altro non essere, pel suo fermentare con gli spiriti acidi, che un'eminente Alkali. Il fugo di questa pianta, allorchè è stato collocato nella guisa recitè descritta a fiorire, e che tutto il sale marino sia stato dal medesimo separato, e disgiunto per simigliante mezzo, sendosi seccato, e dileguato per isvaporamento, ed il rimanente calcinato; vienvi trovata alla per fine una sostanza asciutta, e terrigna, che ha un sapore alcun poco dissolvibile, ma venendo esposta all'aria non si scioglie, nè divien liquida. Si fatta sostanza calcinata essendo mescolata con qualsivoglia degli spiriti acidi, ma particolarmente con quello di vetrolo, diventa di un finissimo, e bellissimo colore azzurro niente inferiore al finissimo oltremarino.

Se l'erba Kali fresca venga posta a fermentare coll'acqua comune, ella viene nelle differenti mosse, o periodi di fermentazione, a somministrare parecchi odori sommaramente l'uno dall'altro differenti: prima ella spira odore di cavoli capucei marinati, dopoi quello di lombrichi fatti morire entro lo spirito di vino, e finalmente quello di pesce secco, o di aringhe. Se questa materia venga dopoi colà distillata, ella somministra un certo spirito in tutto, e per tutto grandemente analogo al più fino spirito di Tartaro, e quindi un olio empirumatico perfettissimamente simile a quello delle sostanze animali. Ma la cosa grandemente osservabile si è, che da questa massa putrefatta non puossi per verun modo, nè per qualsivoglia arte, estrarre sal volatile. Il residuo viene a somministrare una cenere, che solleva, ed eccita una violentissima effervescenza con gli acidi, e mescolata coll'acido vetriolico diviene un sale sforzato, *sal emixum*; coll'acqua forte fassi un nitro; collo spirito di sale, ella somministra il sale co-

Suppl. Tomo III.

mune, simigliantissimo a quello, che viene distillato dallo spirito; e con tutti gli acidi, sienosi quelli di qualunque specie esser si vogliano, con un'acconcio, e discevole manipolamento, somministra il vaghissimo colore azzurro mentovato poc'anzi, approssimantesi più, o meno al finissimo oltremarino, secondo la natura dell'acido, e secondo il metodo usato in questo lavoro. Il sale estratto dalle ceneri putrefatte, procurato in quella data maniera, è di un fondo verdastro, somigliantissimo al Burace nativo; ed il residuo dopo l'estrazione fatta di questo sale, in mescolandosi, ed in digerendosi coll'acqua forte, degenererà in una materia soffice gelatinosa di un veracissimo sapore metallico.

KERMES. E' il Kermes la più famosa, e la più valutabile Creatura della sua specie; ed è propriamente un'insetto della specie degli insetti delle gallozzole, e di quel genere, la cui figura assomigliasi ad una sfera, dalla quale ne sia stata troncata, o recisa una picciola porzione. Questa specie di insetto vien trovata in una specie di elce conosciuto sotto la descrizione di *Ilex aculeata soci-glandifera*. Questa Pianta, o quell'elce non cresce più all'arbusto, nè trascende l'altezza di un'arbutto, od arbolcello, e trovasi in copia sommaramente abbondevole nelle parti incolte della Proventa, e della Lingua di oca nel Regno di Francia, come anche in altre Regioni, vale a dire, nella Spagna, nell'Isola dell'Arcipelago, e massimamente in Candia.

I Contadini in queste divise Regioni fanno la loro raccolta di questi animalucci dai pur or descritti arbolcelli nella propria stagione; e tuttocchè l'istoria di questa droga sia grandemente meritevole dell'attenzione di qualsivoglia naturalista, ed assai acconcio, e degno soggetto di Valeriuomini; nulladimeno sono soltanto pochissimi anni, che è venuto voglia ad alcuno di questi investigatori dei prodotti della natura di potersi ad esaminarlo con alcun comportabile grado di accuratezza. I Signori de la Hire, e Sedileau aperfero la strada alla cognizione di questo ricco prodotto per mezzo della storia dell'insetto gallozzola dell'arancio: ma malgrado

Z

que-

questa dotta fumata, non vennero ad ottenersi incontenente tutti quei vantaggi, che quindi a buona equità altri prometter potevasi, nè la rassomiglianza, e la strettissima analogia, che trovasi fra gli insetti gallozzole piatti, e sferici, venne subito osservata, come potevamo con ogni ragione aspettarsi.

Il Kermes, allorchè trovasi nella sua totale, e piena crescita, ci comparisce una picciolissima conchiglia, o nicchio attaccato ai ramuscelli del descritto arborescello, o sembra una borsetta, o gallozzola, la coperta della quale è sufficientemente resistente, risplendente, e sfavillante, e del colore di uva fusina matura, ed è anche coperta colla specie medesima di polvere bianchiccia, della quale è appunto coperto questo frutto medesimo, quando è maturo. Questa polvere dalla gente del paese addimandasi fiore del Kermes. Coloro, i quali non hanno veduto il Kermes io altra guisa, che nelle botteghe dei Droghieri, possono credere naturalmente di un colore rossiccio seuro; ma questo colore egli è un mero effetto dell'aceto, del quale servovoli coloro per conservarlo; e di vero quel Kermes, che rimansi su i rami, e che non ha provato l'aceto, nemmeno per ombra ha la tiota menoma di questo colore, ma il suo genuino colore vedevansi l'istessissimo di quello delle fusine salvatiche delle siepi, allorchè sono mature.

La gente in quei dati luoghi, ove è prodotto il Kermes, lo conoscono io tre stati differenti, secondo i periodi appunto del suo crescere. Il suo primo stato è verso il principio del Mese di Marzo; ed in questo tempo essi l'addimandano verme fissato. In questa stagione egli è appunto della grossezza di un granello di miglio, e sembra a certuni, che questa sia la stagione, in cui il nobile insetto comincia a fissarsi nel suo luogo, dopo aver vagabondato qua, e là pel tratio dell'invernata sul terreno con tutta la sua libertà; ma egli è assai più probabile, che questa sia la sola stagione, io cui l'animaluccio comincia ad acquistare alcuna grossezza, vale a dire una mole scosibile, ed in cui lascia le foglie dell'albero, per fissarsi sopra i rami di quello. Osservato questo in-

setto in istato tale col microscopio, egli comparisce di un finissimo color rosso lucente, ed ha tutt'all'intorno, e sotto il suo ventre una superficie lanuginosa, che gli serve per letticcio. Ha egli similmente alcune porzioncelle della materia medesima lanosa, o bombagina sopra il suo dorso, ed in quelle parti, ove ei non è per sì fatto modo coperto, il microscopio ci fa scorgere certi specchietti del colore, e della lucentezza dell'oro brunito.

Il secondo periodo, o stato di sua crescita, è nel mese di Aprile. La gente del paese, in cui regna questo amabilissimo insetto, allora distinguono col termine di verme, che è come uccello dell'uovo; ma la maniera di esprimersi di coloro è sommamente irregolare, avvegnachè tutto ciò, che essi intendono per questo, sia, che la creatura abbia allora acquistato la sua piena crescita, e la sua perfetta configurazione di parti. Egli è io questo istato rotondo, e della grossezza di un pisello, ma la sua grossezza non è in verun conto determinabile con esattezza, essendo egli, o più grosso, o più picciolo, secondo la bontà, e consistenza, non meno del suolo, che della stagione, che corre. La sua cute io questo tempo s'è consistente, e solida, e la materia lanosa, o bombagina, la quale stendevasi prima, qua, e là per dati intervalli, ed in picciolissime faldelle, o mucchietti, vedesi allora sparza, e dilatata sopra tutto il suo corpicciolo, e giacevi in forma di una polvere sopra tutta la superficie di quello; ed in tal stato ei null'altro comparisce all'occhio, che una specie di nicchio, o borsetta tutta piena di uovo color rossiccio, ovvero, parlando con maggior proprietà, nel ventre dell'animale trovansi mille ottocento, o due mila picciolissimi corpiccioli rotondi. Sono questi corpiccioli infinitamente piccioli le sue uova, le quali, nel corso naturale delle cose, arrivando dopoi a schiudersi, vengono a somministrare altrettanti animalucci della medesima specie. Queste uova non sono niente più grosse di uovo mezzo granello di seme di papavero, e son tutte piene di un sugo di un colore rosso pallido; ed osservate coll'ajuto del microscopio, compariscono tutte spruzzate, o

di-

distinte al disopra di infinito numero di fogliami di color d'oro. La cute, o pellicina del ventre di questa bestiolina si contrae all'indietro allorchè quest'uova son da essa scaricate, e va approssimandosi alla schiena, e l'uova stesse per somigliante mezzo trovansi un luogo dentro il nichio fatto dal corpo dell'animaluccio; come appunto suole avvenire in tutti gli altri insetti della Classe degli insetti di gallozzola.

Vi ha due spezie di Kermes: Una di questa è quella, che da noi è stata finora descritta, che è del colore di una fusina, e che fa, o partorisce dell'uova rosse. L'altra spezie poi è biancastra, o pure alcun poco pendente al rosso, ed è coperta nella maniera a capello la stessa, e come l'altra spezie, di una polvere bianca, e partorisce somigliantemente le sue uova nella stessa foggia. La sua crescita cammina colle regole medesime della prima spezie, e nelle stesse stagioni, e le sue uova sono bianche.

Gli insettucci tenerelli, ed appena nati prodotti dai genitori di ambedue queste spezie sono somigliantissimi; ed assomiglianti grandemente ai pidocchi boscherecci, o millepiedi, e, a dir vero, nello stato loro primiero di vita sono in tutto e per tutto simili a tutti gli altri insetti della Classe degli insetti gallozzola. Questi però differiscono in rapporto al colore: quelli, che son prodotti dalle uova rosse, sono anche essi stessi di color rosso; e questi sono di una figura, o forma piatta, ed alcun poco più puntuti, od aguzzi nel loro di dietro, che nella loro testolina: il dorso loro è convesso con una prominenzia tondeggiant archeggiata. Ha questa spezie parecchie sfogliature di finissimo color di oro lucente, ed è tutta strisciata sul dorso, ed ha parecchie linee trasversali, la quali incrociansi sulla sua pancia. Possiede quest'animaluccio sei zampoline, e due cornettini lunghi a un di presso come il suo corpicciolo, ed una coda spaccata in due, o dir la vogliamo forcuta, le diverse parti della quale son lunghe a un di presso come le sue corna; ed i suoi occhietti son neri, e brillantissimi.

I giovanissimi insettucci prodotti dall'uova bianche sono di un color bianco su-

dicio: il loro dorso è alcun poco più piatto di quello degli altri, e le sfogliature, che sono improntate sopra essi, osservate coll'ajuto del microscopio non compariscono di un color di oro, ma bensì di un genuino colore argenteo. Questi Kermes della spezie bianca son in numero molto minore di quelli della spezie rossa, e la gente del paese, ove regnano questi insetti, chiamano i Kermes bianchi le madri del Kermes.

Trovansi somigliantemente fra i Kermes parecchi, i quali in vece d'uova contengono le ninfe di due spezie di piccioli moscherini, i quali regolarmente vengono prodotti da essi, e sì gli uni, che gli altri posseggono la famità di saltellare, o di lanciarsi. Una delle spezie de' moscherini, è del colore della pietra nera comune lucida finissima, e l'altra è per lo contrario di un color bianco fosco. Uno di questi è un moscherino dall'ale bianche somigliantissimo in tutto e per tutto alle mosche prodotte dagli insetti gallozzola, e questo senza ombra menoma di dubbio è il Kermes maschio: tuttochè però questa stessa osservazione della mosca, che vien prodotta da alcuni dei Kermes, è stata motivo grande per far credere, che il Kermes sia una vicia, e genuina gallozzola.

Secondo che l'invernata sia corsa più, o meno benigna, la raccolta del Kermes viene ad esser di pari più, o meno copiosa; e quella genere, che fuor parla, o che è in ciò dall'aspettanza bene addestrinata, si presagisce, e promette di sempre un ottimo profitto, allorchè la Primavera è andata libera dai geli, e dalle nebbie. Egli è stato osservato, come gli arborescelli più bassi, e più vecchi trovansi sempre più affai pieni, e carichi di questo insetto; ed il Kermes prodotto sopra quegli alberi, i quali trovansi in vicinanza del mare, è sempre, e costantemente più grosso, più nutrito, e più fino, che quello degli alberi dilungati dall'isole, e lingue di terra marittime.

I Mercatanti, che comprano, ed incertano il Kermes, bagnano sempre più coll'aceto, e dopo espongono al calore del Sole, od ad un calore uguale, ed analogo a quello in adeguata vicinanza del

fueco, e questo col fine di far morire, e di distruggere tutti i giovanissimi infetti usciti dell'uova, o che trovavansi vicina schiudersi dall'uova, medesime.

Ella non è cosa rara il far in un'anno medesimo due raccolte di Kermes. Quei Kermes della seconda raccolta sono più piccioli, e di minor prezzo, di quelli della prima; e questi non trovansi attaccati su i rami, ma bensì alle foglie de' divisi arborescetti: la qual cosa è appunto analoga al costume degli insetti gallozzola delle altre specie tutte. Tutti questi insetti intorno a questa età lasciano i ramuscelli per cibarsi delle foglie, ove però i loro teneri tronchi permettano un agevole ingresso. Veggasi Tavola degli insetti Numero 30.

Da questa analogia, che passa fra il Kermes, e gli altri insetti della Classe medesima, non farebbe cosa fuor di proposito, ed inutile, od incoerente lo sperimentare un poco, se alcuni di questi possedessero per avventura le virtù, e facoltà medesime per la Medicina, o per lo meno, se non le possiedono, per favorir le arti. Ella è cosa certissima, che l'albero della quercia comune è un'insetto gallozzola rosso della grossezza, e forma medesima del Kermes, e del colore di quei della specie più pallida. Veggasi *Reaumur Historia Insectorum*, pag. 45.

KERMES - Minerale. Fu il Kermes minerale una preparazione del Glaubero, che il Re di Francia comprò da Monsieur de la Ligerie, e pubblicolla l'anno 1720. Questa ricetta era nell'appresso forma:

Prenderai una libra di Antimonio di Ungheria, rotto in sottilissimi pezzolini, e ciò secondo la direzione delle sue punte: quattro oncie di nitro, sifistato a forza di carbone: ed una pinta di acqua piovana: farai bollire queste sostanze pel tratto di due buone ore: poscia filtrerai il liquor caldo; e quando sarà raffreddato, il Kermes precipiterà. L'antimonio medesimo si sottopone alle operazioni stesse col liquore rimanente, al quale basterà, che tu aggiunga tre oncie di nitro sifistato, ed una pinta di acqua. In una terza bollitura poi dovrai aggiungere alla prima libbra, due oncie di nitro, ed una pinta di

acqua piovana. Il Kermes nella descritta forma ottenuto è intorno ad una dramma, e rimarrà assai bene raddolcito, se lo laverai diligentemente coll'acqua, e se per entro il medesimo vi farai ardere dello spirito di vino; ciò fatto lo farai asciugare, e lo conserverai per uso.

Il valentissimo Monsieur Geoffroy, per via di moltissime sommanifeste esperienze se vedere, il Kermes minerale essere la parte regolina dell'antimonio unito ad una sorte di quella sostanza appellata dai Chimici *hepar sulphuris*. Questo Valentuomo ci insegna un metodo assai più agevole, e più piano di preparare questo medicamento nell'appresso guisa:

Macolerai intimamente la polvere finissima di due porzioni di antimonio, ed una porzione di qualsivoglia sale alcalico sifistato; squagliarai questi materiali entro un crociuolo; poscia avendogli elastamente ridotti in polvere, mentre ancora erano caldi, gli farai bollire pel tratto di due ore in una abbondante quantità di acqua. Ciò fatto filtrerai il liquor caldo per carta, facendolo cadere entro un vaso, in cui trovisti dell'acqua bollente, e quando questa sarà raffreddata, il Kermes si separerà. Le parti più grossolane, che non sono potute passare per la carta, dovrai farle bollire di bel nuovo, e poscia le filtrerai, come prima; e ripetuta, che avrai per ben tre fiate l'operazione divisa, per mezzo di essa ricaverai sei in sette dramme di Kermes da ciascuna oncia di antimonio.

Ci dice questo grand'uomo, come egli ha veduto degli effetti somigliantissimi a quelli del Kermes misce dell'antimonio, ridotto ad una sì fatta finissima polvere, che non vedevasi più alcuno dei suoi lucidissimi spilli, o punte; e che il Magisterio di antimonio, procurato per mezzo di versare lo spirito di nitro, o l'acqua regia, sopra la polvere di antimonio, e poscia con dolcificare la massa coll'acqua, veniva a produrre gli effetti a capello i medesimi di quelli del Kermes. Veggasi *Memoires Acad. Roy. Scienc. Paris*, ann. 1734. 1735.

Un mezzo grano, od un grano di questa polvere data ogni tre, od ogni quattro ore non viene a produrre effetti violenti;

lenti; ma coll'accreſcer la doſe, la poſſiamo far aver la forza di divenire un'emetico, un catartico, ed un diaforetico. Certuni raccomandano ſi fatto medicamento come un Riſolvente univerſale, ed inſieme deoſtruyente, o ſlegante; affermandoci con ogni aſſeveranza, che non ſulla preſſo che mai di riſanare dalle Pleuritidi, dalle Peripneumonie, dalle Aſſezioni Aſmatiche, dai Catarrhi, dalle Angine, dal Vajolo, e da moltiffime altre infermitadi. Altri poi ſoſtengono per coſa accertata, che un tal medicamento riſcaldi, ed ingroſſi il ſangue; che per eſſo vengano accreſciute viemaggiormente le oſtruzioni, e che ſia di maſſimo danno in tutte le indiſpoſizioni di indole infiammativa.

Una Preparazione ſi fatta fu già famoſiſſima in Francia, ed eravi conoſciuta ſotto la denominazione di *Poudre des Charrenx*, Polvere de' Certofini, e cid appunto, perchè un Monaco Certofino, che fu il primo ad averla da Monſieur de la Li-

gerie, la miſe in voga. Veggafi l'*Hiſtoire desl' Academie de Sciences*, ann. 1720. e le *Memoires dell' iſteſſa Accademia* per l'anno medefimo, ove viene aſſerito, che il Glaubero fu conſiderato non altramente, che il primo trovatore di ſi fatto rimedio.

I ſuoi effetti fomiglianti a quelli di moltiffime altre antimoniali preparazioni, ſono infinitamente varj, lo che è bene poſſo dovuto, ſiccome da ſuo pari faſſi ad oſſervare Monſieur Geoffroy, alla diſſerente foggia, e diligenza di prepararſo. Aggiunge queſto Valentuomo, che quanto maggiore quantità di regolo agevolmente rattivato ſarà dal Kermes annerale contenuta, tanto più riuſcirà un'emetico. E ci fa egli vedere, come ſi debba fare un Cinabro col Kermes, e col Mercurio, e come debbaſi diſtinguere dal Kermes medefimo l'Acido vetriolico. Vegganſi *Memoires Academ. Roy. Scienc. Paris*, ann. 1734.



LAB

LAB

LABERINTO. E' il laberinto nella faccenda dei Giardini una parte del Terreno in coral foggia piantato, ordinato, e distribuito, che venga a rendere difficoltoso, e malagevole a chiunque s'avi entrato, il trovarne l'uscita; e nel tentar, che uno fa di svilupparfene, affinchè il laberinto possa dirsi esser ben posto, debba per ogni parte trovar intoppi, e ripari, e salimenti di tracce più che sia mai possibile. Difficoltà somigliante dee anche di pari incontrarsi nel trovarne il centro.

Vi ha due maniere generali di fabbricare i Laberinti: la prima si è di semplei siepi, e questa è appunto la maniera, che è stata grandemente praticata in Inghilterra; e questa riuscirà sempre migliore ove ristinger debbasi la pianta del Laberinto in un picciol pezzo di terreno; ma ove lo spazio, od area sia assai sufficiente, ed ampia, sarà sempre miglior consiglio il piantar le siepi perpetuamente raddoppiate, e queste riusciranno poi in guisa di tutte l'altre migliore, allorchè infra esse vengansi piantati degli alberi. I vialetti per entro i laberinti dovrebbero esser ben ghiasati, nè dovrebbero essere in conto veruno soverchio angusti. Alle testate dovrebbero esser piantati con dei pali di ferro, e le divise parizzate non vorrebbero esser meno alte di dodici in quindici piedi.

I Laberinti sono soltando dicevoli nei Giardini di grande estensione; e viene asserito, che i migliori, e più perfetti Laberinti, che trovinsi nel Mondo, sieno quelli di Versailles. Veggasi *Miller*, *Dixon*. del Giardinere in voce.

LABORATORIO. Il Dottor Shaw, il quale si è preso brigue, e pensieri indicibili per introdurre nell' Inghilterra lo studio della Chimica più assai di quello, che fiorito vi fosse fino al tempo suo, ha da valent uomo appianato la faccenda, ed ha rendute più agevoli d'affai le operazioni di quest' arte in generale, ed ha altresì ten-

tato di rintracciare i mezzi, per render di minore spesa la pratica d'essa Chimica, coll' introdurre in luogo di quell' ampio numero di fornaci, e di fornelli, e d'altre fabbriche, e lavori, descritti tutti, e figurati eziandio da tutti quegli Autori, che scritto hanno sopra questo soggetto, un laboratorio portatile, per mezzo del qual solo esser possono comodissimamente condotte a termine le Chimiche operazioni tutte. Questo laboratorio nato fatto per tutte le parecchie intraprese della Chimica, vien figurato in distinti pezzi sopra un piano di fornaci e di vasi Chimici, alla qual Tavola noi rimettiamo i nostri Leggitori. Veggasi la Tavola di Chimica Numero 31. & seg.

Tale si è la fabbrica di questo veramente mirabile laboratorio, che non solamente per mezzo del medesimo posson essere comodissimamente condotti a termine corsi compiuti d'Esperienze, e d'Operazioni Chimiche; ma i Medicamenti tutti eziandio esser possono preparati in quelle date quantità, le quali non solamente bastar possano per le occorrenze d'una grossa famiglia, ma ben'anche per una bottega di Speciale di mezzano affare.

La prima persona, che diede la pianta di somigliante fornace, fu Monsieur Beecher; ed il valentissimo Dottor Shaw ne eseguì poscia così da prode il ricevuto modello, che gli venne fatto di migliorarlo d'affai. Questo laboratorio è composto di due parti, oltre la fornace, o forno. Sono queste l'Apparato, e la Materia Chimica, che leggonsi descritti sotto i loro rispettivi capi od Articoli, vale a dire APPARATO chimico, e MATERIA chimica.

Il forno, o fornace ha quattro parti principali, cioè. 1. Il Coperechio. 2. L'anello. 3. Il corpo. E 4. Il piede L'uso, ed uso generale del coperechio si è il tener giù, il comprimere, e tirare, o spingere indietro il calore e la fiamma, affai-

che

chè l'alimento del fuoco non trasformi so-
verchiamente siccome alvamente farebbe
sconceriando facilissimamente parecchie ope-
razioni: conciossiachè non essendo l'azione
del fuoco momentanea, ma bensì succes-
siva, più che veravvi entro conservato, e
tenuto diretto sopra il soggetto, sopra
del quale dee agire, più renderassi vale-
vole a produrre l'effetto suo, e questo con
assai minore spesa, e consumo d'esso fuo-
co. Per aumentar poi la tratta al fuoco,
e premer l'aria con vivacità maggiore per
entro il corpo della materia, che arde,
vi ha una rocca, o gola da cammino mo-
bile, che può, portandolo le occasioni, si-
farsi all'orificio nella vetta del copertojo,
lasciatovi per quest'uso non meno, che
per altri parecchi. Veggasi la Figura nel-
la Tavola sopra citata.

L'Anello è il luogo, o dir la vogliamo
la sede di moltissime Operazioni. Il cor-
po, per lavorarvi sopra per mezzo del fuo-
co, bene spesso vienvi consegnato dentro;
e negli altri casi, è d'aiuto grande per
dilatare, e far più ampio il forno medesi-
mo, e così per renderlo capace di quelle
tali operazioni, le quali altrimenti non
farebbonvisi potute effettuare. Il corpo del
forno serve per contenere il materiale
del fuoco, ed è la sede comune delle ope-
razioni fatte per mezzo del fuoco nel fa-
re scorrer fuori i metalli dalle loro mine-
re; ed in questi non meno, che in parec-
chi altri casi similianti, ci viene a far l'
ufficio d'un crociuolo, di pari che una sede
del fuoco, e contiene il soggetto mesco-
lato per entro il materiale, od alimento
del fuoco, siccome si pratica nelle case sqa-
gliatoje. A questo corpo appartengono tre
assai spesse graticole, le quali possono ivi
esser piantate in differenti altezze secondo,
ed a norma della natura dell'operazione,
e secondo la distanza, che è necessario frap-
porre fra il soggetto, ed il fuoco.

Ultimamente, il piede è di due forti,
e non è soltanto d'uso per sostenere le
altre parti tutte del Laboratorio, ma ser-
ve altresì a ricevere le ceneri del fuoco, e
quella materia squagliata, la quale può,
in alcuna delle operazioni, scorrere, e pre-
cipitar giù dalle miniere dei metalli; op-
pure in altre similianti occasioni, allorchè
al fuoco viene a squagliarsi alcuna cosa al

di sopra. Gli istrumenti più immediati di
questo forno sono materiale da fuoco, e
soffietti. Il materiale generale dee essere
carbone, oppure, siccome vi ha la fabbri-
ca pel vento, o fiano per entro il corpo del
forno medesimo, così potravvisi di pari
impiegare il carbon fossile, o marino, ed
il fumo potravvisi far prender l'asolo sotto il
cammino della Camera stessa, in cui il
forno stesso è situato.

La struttura di questo forno è similian-
tamente egregiamente bene adattabile per
una *Lampade*, come dicono i Chimici,
che è appunto una fonte di calore, in gra-
do eminente appropriato per alcune assai cu-
riose digestioni, e calcinazioni; e per cot-
tal mezzo quelle operazioni le quali altra-
mente esigerebbono un Atanore, possono
essere assai comodamente condotte a ter-
mine, e questo potravvisi anche far in una
manera la più accurata, che far mai si
potea.

Il numero delle chimiche ricette, o me-
todi d'operare, che possono effettuarsi per
mezzo di questo forno, non è cosa age-
vole ad esser compresa; ma non sarà cer-
tamente fuori di proposito l'aggiungere un'
istoria, o sia piano dei parecchi stadi, nei
quali dee esser posto per condurgli ad
effetto.

Lo stato il più semplice del forno si è
una combinazione delle sue due parti in-
feriori, il corpo, vale a dire, ed il pie-
de. Allorchè queste sono unite, ed aggiu-
state insieme, il forno medesimo rendesi
acconciissimo per gli squagliamenti da farsi
a fuoco nudo, ove la materia da liquefarsi
dee essere mescolata fra i carboni, od altro
materiale da fuoco: come, a cagion d'ese-
mpio, nello scorrere delle miniere piombine,
o dello stagno, o del ferro, le quali pos-
sono per similiente guisa, nella quantità
di parecchie libbre tutte in una volta, esser
separate dalle loro scorie, e purgate per
sì non con minore esattezza, che nei
lavori de' Minatori, oppure nelle case, co-
me dicono, squagliatoje, o coll'aiuto, ed
assistenza dei soffietti, o mantici, o senz'
essi, siccome ricerca la natura, ed indole
della miniera medesima. Per mezzo del me-
ramente collocare una graticola nel mez-
zo del corpo del forno, l'istrumento di-
viene una fornace squagliatoja per un cro-
ciuolo.

ciuolo, in cui tutte quelle operazioni, le quali addimandano un fuoco squagliante, animato, o dall'aria, o dai mantici, o fessicci, sono effettuabili con vantaggio sì fatti, che non possono per modo alcuno ottenere nelle comuni fornaci a vento, fatte, e composte per questa intrapresa. Allorché soltanto il corpo del forno colla sua graticola di mezzo è agguistato sopra il piede, corrisponde perfettamente a tutte le funzioni di un forno da bottega, messo in opera dagli speciali per ottenere i decotti, le filazioni, o sia per inspessire le sostanze, per gli Estratti, e per lavori di smigliante natura, ove ricercasi unicamente un fuoco nudo, od aperto; ed oltre a ciò possono di paricomodissimamente procurare per mezzo d'esso forno in questa foggia accomodate certe date particolari distillazioni, e sublimazioni.

In questo stato medesimo può di pari il nostro forno essere assai comodamente fatto servire alle imprese del Bagno maria, di un calor di cenere, di un calor di arena, oppure ben'anche di un calor più attivo, ed energico per la digestione, e per la sublimazione, col solo collocarvi in questo stato un vaso d'acqua, oppure un vasoripieno di cenere, di sabbione, o di limatura di ferro; e così moltissime operazioni, volendo, e richiedendo la specie medesima di calore, possono esser tutte queste condotte al loro termine in uno, ed in un medesimo tempo. Se io vece di una caldaia, o di un vaso comune per contenere acqua, arena, limatura, o somigliante sostanza, vi sia collocato, o combaggiata l'anello, o sia la terza parte del nostro forno armato col suo istrumento da scervir stabili i necessari vasi, allora tutto insieme viene a formare, e ad essere un forno appropriatissimo per quella specie di distillazione, che addimandasi *Distillatio in capella venae*, ove le storte chimiche sono contenute nella cavità delle pentole, o vasi, e veducvi dentro, senza alcun mezzo visibile infra esse. Per somigliante mezzo esser possono condotte ad effetto moltissime operazioni nella distillazione, e nella separazione dei corpi, le quali operazioni non potrebbero procurare così bene con un vantaggio tanto confi-

derabile con qualsivoglia altro metodo. Massimamente il rettificamento degli spiriti acidi gagliardissimi viene ad esservi con somma agevolezza, ed altrettanto comodo ottenuto con pochissima spesa.

Se venga posta una padella, ed altro vaso di ferro nella camera dell'anello pur ora mentovato, allora l'istrumento viene ad essere, e far le veci ottimamente di un forno calcinante, ove possono essere abbrustolite le miniere dei metalli; ed il piombo, l'antimonio, e corpi somiglianti, possono esservi con tutto il comodo ridotti in cenere.

Se venga messa in opera la graticola più bassa delle altre in vece della graticola di mezzo, allora può esser collocato entro il corpo un freddo stillatojo, o, come generalmente addimandano, un caldo, e fatto ivi lavorare nella maniera comune colla sua testa, e col suo rinfrescatojo. Per somigliante guisa tutte le acque cordiali possono esser convertite, o fatte spiriti, possono esser rettificare; e gli oli essenziali possono somigliantemente col mezzo medesimo essere distillati, non altrimenti che per via dei comuni stillatoji stabili, e fissi.

L'ultima parte, o sia il coprehio del forno, può benissimo alcune volte essere applicato all'anello, ed alcune volte al solo corpo del forno medesimo, senza l'aoello. L'istrumento nostro diviene in questo caso un'acconciatissimo forno riverberante, e rendesi sommamente utile per la cementazione, per la faccenda della coppella, e pel saggio delle miniere; e per distillare con un fuoco di soppressione, vale a dire, ove il fuoco vien di pari collocato sotto, che sopra il soggetto, ed il vaso, che in sé la contiene.

Un forno di smigliante natura porta seco moltissimi, e sommamente rilevanti vantaggi, non solamente sopra i forni, e fornaci chimiche, che sono comunemente usate, ma sopra quelle eziandio assai famose oggidì nel Mondo, e celebrate per la lor fabbrica, e struttura, e che secondo varie particolari occasioni ci sono state dagli Autori descritte, senza che debbanvi tampoco eccettuare quelle del famoso Glanbero, e del Viganì. Quei forni son tanta elatrezza, e delicatezza fabbricati, sono generalmente adattati ad alcune poche intraprese,

prese, od operazioni particolari; eppure non ostante ciò, anche rispetto a quelle particolari operazioni medesime il nostro forno Chimico corrisponde in una forma assai più perfetta, e migliore degli altri forni tutti apposta per quelle date operazioni fabbricati con tanto scrupolo, e maestria; e nel tempo medesimo (lo che è grandemente valutabile) egli si è di un'ulo generalissimo in ogni, e qualunque altra intrapresa, o per qualunque Chimica occorrenza. Ha fatto l'esperienza toccar con mano, che egli è migliore per i varj usi dei forni filosofici del Glaubero, di quello sieno quelli stessi stessissimi forni da quel Valentuomo per tale effetto unicamente fabbricati; e per le operazioni più eminenti. com'essi dicono, della Chimica metallica. A cagion d' esempio, per ottenere uno spirito di sale in copia grande, ordina il Glaubero, che il sale sia gettato nel fuoco, ed ha inventato delle macchine, od istrumenti, che acciappino, rattengano, ed imprigionino i vapori ascendenti. Ma questo è un metodo di somma briga, e sommamente tedioso, ed in pratica riesce di leggerissimo vantaggio; nè la materia viene ad essere gran fatto migliorata coll' estinguere i carboni entro una brina di sal marino, e dopo fatti ardere per averne il loro fumo. Ma tutto quello, che altri puossi mai promettere da queste brigosissime capovolte macchine, ed arzigogoli, può con ogni certezza ottenersi comodissimamente dal forno qui descritto, ove il fuoco venendo animato dai soffietti, cagiona, ch'esso fuoco arda più liberamente, e che l'alimento somministrato lo spirito, del quale venne impregnato con maggiore vivacità, e più agevolmente, di quello segua nei forni per tale impresa da quell' Autore inventati, mentre nel nostro forno i materiali pel fuoco vengono a' volta, a' volta, e secondo l'occasione suppliti per la sua bocca, senza alterare, o disturbare d'un menomo che l'operazione. Veggasi *Show*, Saggio sopra un laboratorio portatile.

Vi sono altre parecchie curiosissime Esperienze filosofiche, le quali, a vero dire, non possono eseguirsi con tanta perfezione, e così bene con qualsivoglia altro mezzo, come lo possono essere eseguite con questa specie di forno; e non poche an-

Suppl. Tom. III.

che, starei per dire, con questo solo. Egli è di pari sovrannamente acconcio per ismaltare, per fabbricar delle palle, per macchiare dei vetri, e per fare delle gemme artificiali. Ed oltre ai finor divisati, ed altri moltissimi usi, egli è nato fatto per qualsivoglia delle tante comuni intraprese, ed effetti de' fuochi. Qualunque fiali Artigiano, il quale ricerchi il fuoco in ogni, e qualsivoglia maniera, pel suo bisogno rispettivo, può agevolmente procurarselo coll' applicarlo in questa maniera a suo piacimento: Gli uzi di una stufa comune in una cucina possono di pari essere egregiamente bene suppliti dal nostro forno, ed il far divenir tepida una camera, od una volta vien prodotto da esso forno ugualmente bene, che da qualsivoglia altre macchine, od ordigni da stufa, da furnelli, o da altre similanti cose, fabbricate a bella poila per uso al fatto. La cassa esteriore del nostro forno dee esser composta d'ottime piastre, o laltre di ferro di una grossezza considerabile formata in pezzi separati delle figure espresse nella nostra Tavola, e sua grandezza può esser tale, quale la si brami l'Operatore; basterà solo, ch'egli offervi una proporzione ciattissima nelle varie parti componenti esso forno. I lati interiori di tutte le parti fa di mestieri che sieno intonacati alla grossezza per lo meno di un buon dito di un' accorcio loto, il quale importa infinitamente, che vengavi disteso ugualissimamente, ed a bell'agio fatto asciugare, e quelli scropoli, che questa intonacatura andrà facendo in seccandosi, convertirà onninamente riempirgli con altro loto similante. Puossi altri per questa pasta da intonaco servirsi della sola terra da innestare; ma il nostro Autore raccomanda, e propone la seguente misura.

Prendersi uno stajo di terra da innestare; quattro quartucci di polvere di matton cotto, due quartucci di polvere di vetro verde, due quartucci di limatura di ferro, quattro manciate di peli di vacca, ed otto manciate di sterco di cavallo: queste cose procurerai, che vengano a riscaldarsi insieme; e poi vi aggiungerai un' adeguata quantità di sangue di torcello, o giovinco giovane, per ridurre il tutto in una ben attaccaticcia, ed uniforme pasta, e con

A a

que-

questa nella guisa, e colla diligenza pur ora additatali l'andrai dissendendo sopra tutte quelle parti del forno, che esser possono toccate dal fuoco.

LACCIUOLI. E' questa una sorte d'annodature, o cappi scorsioj di erini di cavallo fatti in guisa, che scorrono con estrema facilità ed appiattati in certi dati luoghi, ove gli uccelli vadano afolando in alcun sentiero particolare, per prendergli nel loro passaggio.

Quegli uccelli, che sogliono frequentare le acque, o che amano di stanziare, e di pascolarsi in luoghi umidi, e pantanosi, con forma agevolezza rimangono colti in simili trappole.

Quegli uccellatori, che vorran usargli per loro vaotaggio, farà di mestieri, che vadano investigando alla bella prima i covili, ed i luoghi, ove gli uccelli vengono a torme, ed in branchi a cibarsi non meno nelle ore prime della mattina, ma anche verso la sera. In questi dati luoghi dovrai dall'uccellatore principalmente aver l'occhio ai folchi, e tracce, o fili d'acqua; e per ogni verso, che i varj girigori, o fili d'acqua vanno a far capo, e ad incontrarsi in uo solo, e che da poi dividendosi in altri parecchi, questi dati luoghi, io dico, debbon'essere sopra tutti gli altri osservati: quei luoghi, ove ravvilassi numero grande di pedate d'uccelli, somministrano una prova più accertata dell'altre tutte, che quivi battezzano gli uccelli con frequenza grandissima. Allorchè scuoprirai sì fatti luoghi, vi anderai piantando un certo numero di piccioli, e corti fuscelletti che vengano per ogni verso incrociandosi, ed impedendo qualsivoglia altro passaggio, un fuscello, o stecca essendo piantata nella distanza di mezzo dito in circa l'una dall'altra, e venendo a formare tutte insieme una specie di chiufura, o riparo, tenendo ferrato ogni luogo dappertutto, a riserva soltanto di un lato, pel quale avrai intenzione, che gli uccelli sieno per passare. Avendo ciò fatto ti dovrai provvedere di una ben fettoia bacchetta, la quale appianerai col coltello da ambi i lati: ambedue le estremità di questa bacchetta dovranno esser piantate sotto l'acqua, dimodochè la parte superiore del lato piatto possa far soltanto livello colla superficie; quindi

formerai un'arco di una bacchetta di nocciolo, o di uno scudifio di salcio in forma appunto di una pera, ampio, e rotondo in una delle sue estremità, e stretto nell'altra estremità, e per lo meno lungo un piede, e largo cinque in sei dita: nella estremità stretta di quest'arco dovrai esserle una tacca, o dente. Ciò fatto dovrai scegliere un ben cresciuto piantone, o d'acero, o d'olmo, o di vineo, e che questo sia ben alborato, e spesso di rami, ma chiaro, netto, e senza nodi, tre o quattro dita verso la sua base, ed un dito in circa verso la sua vetta. Dopo, che avrai ben bene aguzzato quest'albero nella sua base, o piede, ti converrà attaccare alla vetta del medesimo ben validamente un fortissimo cordone, o treccia fatta di circa un centinaio di crini di cavallo, e ben bene compressa, ed appiattata insieme con fortissimo sforzo, o spago torto, e ve l'accomoderai per sì fatto modo, che possa sdrucciolare, e scorrere con ogni maggiore agevolezza, per ogni e qualunque verso. Questa corda, o cappio scorsiojo vorrebbe esserle delle dimensioni a capello le medesime dell'archetto poc' anzi descritto, fatto a foggia di una pera. Allora alla descritta treccia, o cappio scorsiojo un dito in dentro dell'estremità della pianta, o piantone divilato, vi dovrai attaccare con de' ben forti crini di cavallo un grillo, o sia pezzo di ferro così appellato largo, e sottile, aguzzo da ambe le sue estremità. Quindi la parte più grossa puntata, od aguzzata del piantone ficcata in terra a capello sull'orlo dell'acqua come a piano inclinato, l'estremità più picciola del piantone medesimo colla treccia, o cappio scorsiojo, e col grillo di ferro, ti converrà piegarla all'ingiù al primo ponticello, ed essendo collocato l'archetto fatto a foggia di pera sopra il ponticello medesimo, bisognerà, che un'estremità del grillo, o descritto pezzo di ferro aguzzo, venga agguistata sopra la decatura, o tacca sopra descritta nella parte più stretta dell'archetto, e l'altra estremità pure aguzzo del grillo, o ferro medesimo nella dentatura, o tacca fatta nella picciola estremità della piastra, che dalla violenza, e dalla piegatura del piantone, farà, che tutto sia unito insieme sintono che l'archetto ven-

ga rimosso. Fatto quello dee essere steso, ed aggiustato sull'archetto il cappio scorsojo in sì fatta maniera, che venga l'archetto medesimo ad esservi proporzionato: quindi da cadun lato dell'archetto dovranno piantare de' piccioli fuscelletti, o stecche, nella foggia poc' anzi additata, venendo a formare come dicemmo una specie di palizzata, o riparo per ogn' intorno, lasciando per ogni parte dei varchi, e questi facendogli più ampi, e dilatati via via, che vanno approssimandosi all'archetto, e formando un varco così largo nella estremità, che qualsivoglia uccello, che falli di venire per questo varco, o sentiero, possa fare un buon tratto di via innanzi ch'ei s'avvisi della trappola. Per somigliante mezzo verrà l'uccello ad essere impegnato a venirne stretto stretto all'aguato, ed a mala pena arriverà a toccarlo, o colla testa, o co' piedi, rimarrai indubbiamente colto; e così se la piantarella, o piantone sia forte a sufficienza, potranno acciappare degli uccelli grossissimi colla stessa facilità, e certezza, che i più minuti uccellini.

Quando i più piccioli uccelli, che aolano con frequenza nei luoghi acquosi, debbon'esser presi per mezzo di questa macchina, ne dovranno esser fatte soltanto parecchie di picciole somiglianti. Allorché farannosi per le beccacce, pe' galli di monte, pernici, e fomiglianti, potrai scegliere un piantone mezzano di falcio, di noceciolo, o somigliante qualsivoglia altro piantone di bosco, che sia d'agevole, ed obbediente piegatura, e che insieme possiede neibotale d'elasticità, che venga a ricovrarsi del nuovo la sua direzione naturale. L'uso di questa macchina, o trappola da uccellare, è soltanto limitato all'Invernata, ed a quei dati tempi, che il terreno trovasi molto umido. In evento, che accada alcuna brina, o gelo assai grande, di modo che non torni conto il porsi a lavorare in quei dati particolari luoghi umidi poc' anzi da noi descritti; allora dovrà l'uccellatore andare in cerca d'alcun sito ove abbiavi un'assai considerabile china, e scelta, ed ove la corrente impetuosa dell'acqua non lasci luogo all'acqua medesima di ghiacciarsi, e quindi dovrà aggiustare i suoi laccioli, e le sue

sopra descritte trappole; ed in questo caso quanto maggiori, e gagliarde saranno le gelate, tanto più copioso verrà ad essere il numero degli uccelli, ch'ei prenderà. Havvi di pari un'altro uso dei laccioli per gli uccelli, che è il prendere per mezzo d'essi laccioli certi dati uccelli sopra i rami degli alberi, e sopra le collinette, e nelle siepi, e quest'uso ha bene spesso ottima riuscita.

Fa di mestieri, che l'uccellatore per sì fatta intrapresa facciasi alla bella prima a contrassegnare alcuni alberi, ove gli uccelli sogliano posarsi in gran numero: allora fissi sopra alcun ramo particolare quello, che è tollerabilmente diritto, e tagliando via tutti i fuscelletti, o ramuscelli di dentro da un piede, o due dalla cima, dovrà quivi fare un foro per entro il ramo con un succhiello, od altro istrumento, della larghezza, che possa agevolmente ricevere una penna d'oca. Ciò fatto dovrà forare in guisa somigliante un'altro ramo, alla distanza d'intorno ad un piede dal primo ramo forato, e tutti i suoi ramuscelli dovranno netare ad una data altezza. In questo ramo dovrà infilare uno sforzino, o spago torto della lunghezza di un piede, e mezzo, ed all'estremità di questo spago dovrà legare una treccia di crini di cavallo fatta a cappio scorsojo ben piatto. Il ramo, al quale rimane attaccato lo spago, dovrà calare, od abbassar tanto, che il cappio scorsojo diviso possa essere introdotto pel foro, e fatto giungere all'altro ramo, e quivi attaccato per mezzo d'un fuscello, o stecca lunga quante quattro dita, e non più, e che venga a rimaner uncinata nella sua estremità, di modo che il suo uncino sia adattabilissimo a capello al foro, sicchè lo tenga fermo, ed afferrilo in guisa, che venga ad impedire, che l'altro ramo si ripeghi, o torni indietro. Ciò fatto di là dal cappio scorsojo dovrà aggiustare alcun cibo, od erba d'un frutto, di un insetto, come a cagion d'esempio, una ciliegia matura, una coccola, una pera, un verme, od alcuna altra cosa, della quale siamo certi, che l'uccello che ha sì intenzione di prendere, sia goloso. Questa data erba dovrà essere per sì fatta maniera quivi collocata, che l'uccello non possa portarsi a beccarla, senza

toccare la stecca, o stanghetta, che sostiene il lacciolo, o cappio scorlojo descritto, e che chiude a un tempo stesso, e ferra il foro-divisato. Il pelo dell'uccello manderà a basso la stecca medesima, ed allora l'uccello rimarrà legato, e stretto per le sue gamboline, e rimarrassi attaccato al ramo, in cui è il foro, e ciò a motivo dello scorrere, che allora fa all'indietro l'altro ramo, in cui sta attaccato lo spago.

E' in uso similmente un altro metodo per prendere moltissime specie d'uccelli, cominciando dalla pernice, o dal fagiano, fino al merlo. Questo ottienesi nell'appresso guisa, e l'istrumento dee essere posato o sopra il terreno, oppure sopra un albero, sopra una siepe, o sopra un parapetto di buisi, od altri bassi boschetti, secondo l'indole e natura dell'uccello, che si vorrà prendere col medesimo. Dovrai sceglierli un ben diritto ed uguale pezzo di faleto, della lunghezza a un di presso di sei piedi, e della grossezza poco più, poco meno di una canna d'India. Questo lo dovrai per acconcio modo aguzzare alle sue due estremità, e poi lo ficherai entro il terreno, ed all'estremità, che rimane sopra terra, vi attaccherai un picciolo uncinetto: poscia nel suo legno farai due fori, uno largo tanto che basti per passarvi comodamente una penna d'oca, e l'altro più picciolo: sceglierai quindi un pezzetto di legno, il quale venendo piegato possiede l'elasticità facoltà di raddirizzarsi, e di tornar di nuovo alla sua situazione retta naturale, come appunto fa il nocistio, la scopa brannica, o somigliante: questo pezzo di legno vuol essere della lunghezza di tre piedi incirca, e l'estremità più grossa del medesimo dovrà esser incastrata, e far entrare nel foro più largo del nostro pezzo di legno maestro descritto pur ora: nell'estremità poi più sottile dovrai assicurarsi assai bene uno sforzo, o spago torro, nell'estremità del quale siavi legata una treccia di crini di cavallo fatta a cappio scorlojo; questa dovrai far entrare nel foro più picciolo, e dovrai incavigliare per modo, che basti soltanto ad impedire il portarsi all'indietro la bacchetta divisata. Allora il cappio scorlojo, o lacciolo, dovrai stendere ed aggiustare sopra l'incastratura, ed in

una distanza dicevole dovrai collocare quell'esca, che sia a portata di quell'uccello, che habbi in animo di prendere; di modo che l'uccello non possa arrivare a beccar sull'esca, senza inciampare nell'incastratura, o stanghetta, la quale sotto al pelo di lui salterà via, ed il legnetto, al quale è attaccato lo sforzo, tornerà incontanente indietro alla sua natural direzione, e per conseguente l'uccello rimarrà colto nell'aguto del cappio scorlojo, e troverassi colle gambe serrato all'altro legno.

LAGHI. Del Lago Nefs, che trovasi nella Scozia, è stato fatto parola da parecchi Scrittori; ma se vogliamo dir la cosa, com'è in fatto, da niuno ne è stato parlato con alcun grado di faverezza, e di verità, se non ultimamente dal valentissimo Monsieur Fraze, il quale ne somministrò alla Società Reale una perfettissima istoria. Questo Lago non si ghiaccia; tutochè le Invermate sieno delle più severe e erudeli, ed è pieno di polle, o forgeni presto che in ogni parte di sé; e le sue acque nel tempo dei geli più rigidi e più grossi scorrono fluidissime, e fumano per sei miglia di tratto lungo il fiume, entro al quale vanao a metter foca, ed a scaricarsi, mentre ogni e qualunque cosa all'intorno ad esse acque trovandosi è dura ed impietrata dal gelo. Malgrado ciò, il fiume scorre lentissimamente, e da quello fumo delle acque vienvi alzata una specie di nebbia, la quale dilatata, e si spande per tutta quella regione pel tratto di molte miglia. In vicinanza del fianco di questo Lago havvi un monte dell'altezza perpendicolare di due buone miglia dalla superficie d'esso Lago; e nella vetta di questo Monte havvi un altro Lago, che non ha forgente, la quale visibilmente voga a metter foca, e scorrere in esso, nè tampoco alcuna uscita, od apertura, e ciò non ostante conservasi nel grado medesimo di pienezza sì nell'Inverno, che nell'Estate. Ad adeguato aspetto occidentale dal fiume, in cui va a scaricarsi il Lago inferiore, vi ha una bocca di mare, o dir lo vogliamo stretto, o braccio di mare di due miglia di lunghezza, e largo sei miglia: il mezzo di questo braccio trovasi alcuna fissa asciutto, ed allora con ogni facilità ven-

venghiamo a scorgere, come questo era un tempo terra asciutta non solo, ma paese abitato erandio. Trovanvisi per ogni dove ampissimi corpi d'alberi tagliati, e diacetiisfisi sul terreno. Il legname di questi alberi è nero, ma è tuttavia fanissimo, e veggionvisi parecchie macie, o mucchi di fassi, i quali scorgonsi benissimo forte acqua in varie parti dello stretto medesimo, ed uno di questi mucchi, allorchè l'acque son basse, fassi accessibile, ed in esso sonosi trovate delle Urne, le quali fanno toccar con mano, esser quel dato luogo un tempo un luogo di sepolture, o depositi. Veggansi le Trans. Filosof. num. 253. pag. 231.

Via via, che il mare va raschiando, e mangiando le rive di questo Stretto, trovavisi in moltissimi luoghi una quantità prodigiosa di legnami lavorati; razzi della lunghezza di quattordici, ed anche di più piedi, con i legni dell'asse, e d'altri istrumenti sop' essi; ed alla profondità di sedici piedi, nelle disrupate rive del confinante Fiume Beuly, trovavisi degli alberi di quercia, e dei pezzi di legname abbrugiato. Noi scorgiamo da questo, come la faccia di tutto il paese all'intorno è in questo luogo differentissima, e tutt'altra da ciò ch'ella si era alcuna etadi fa: e quivi trovavisi alcuna somiglianza fra la faccia delle cose di questo luogo, e quelle delle paludi, e de' pantani di moltissime parti dell'Inghilterra. Quegli alberi, che quivi trovavisi atterrati, furono messi giù dai Conquistatori antichi Romani, e questi riconoscono per avventura una tale epoca.

Noi abbiamo, a vero dire, cose moltissime assai singolari, offerrete a considerare dai Laghi stessi del proprio nostro paese; e quella del loro ghiacciarsi in certe particolari stagioni, una non è delle più picciole. Havvi un picciol lago in Stratherrick nella Scozia, il quale non ghiacciafi nella sua superficie, innanzi il mese di Febbrajo, tutto che le gelate sieno intensissime; ma dopo la prima parte di questo mese, una notte, che corra brinosa, cuoprirallo tutto al di sopra di ghiaccio, ed una seconda notte simigliante, che vengagli addosso, ingrosserà il ghiaccio diviso assai considerabilmente. Sonvi simigliantemente altri due laghi nella me-

desima Contea, uno appellato *Lach Monar*, il quale è considerabilmente grosso, ed anche questo mantiene perpetuamente lo stesso piede, e regola di gelarsi nel mese di Febbrajo per ogni leggiera brinata, che corra; ma non mai prima di questomese, per quanto rigida, e severa siasi l'Invernata; e l'altro in Straglash, il quale è grandemente osservabile appunto per una qualità contraria.

Giace questo lago in una specie di fondo fra i fianchi di due altissime colline, ed esso stesso trovavisi assai considerabilmente superiore al livello di tutto il rimanente del paese. Questo lago trovavisi perpetuamente gelato. Egli ha sempremai del ghiaccio nel mezzo, poi anche nei mesi i più caldi dell'Estate, quantunque in questo dato tempo sia sghiacciato, e scorsa alle sue orature, o contorni. Il Sole per mezzo di riflettere dalle divise colline in cadauno dei lati di questo lago, somministra un'assai considerabile calore; e trovavisi parecchi altri Laghi nella sorte medesima di situazione, in tutto il paese circonvicino, i quali non somministrano neppur un'ombra di simigliante fenomeno; di modo che questa, e la proprietà degli altri laghi, forz'è, che sia dovuta ad alcuna cosa ad essi stessi particolare, e non già alla loro situazione, o ad altri accidenti. L'erba, che trovavisi intorno ai lati del lago ultimamente descritto, è sempremai in una perpetua primavera; mantenendoli fresca, verde, e vegeta pel corso vario di tutte le stagioni dell'anno, ed è sommamente avuta in pregio dalla gente del paese, sperimentando, che il bestiame, che d'essa si pasce, viene ad ingrassarsi più in una settimana, che in qualunque altro miglior pascolo in quindici giorni. Il lago è profondissimo, e la sua acqua non viene a manifestare alcuna qualità particolare. Veggansi le Trans. Filosof. n. 114.

Gli stranissimi effetti d'alcuni Laghi rispetto all'esser disturbata l'acqua loro, vengono rammentati da parecchi Scrittori con un'aria spirante verità; ma prima di dar loro credenza, importa assaiissimo, che gli andiamo con grandissima cautela esaminando. Il Wagner nella sua Istoria degli Svizzeri, non cita niente meno di trenta cinque Autori, i quali asseriscono, che una

naa cert'acqua ivi appellata il *Lago di Pilato*, è di quella specie, e che viene a cagionare delle Tempeste, della gragnuola, de' tuoni, delle bufere orrendissime, e simiglianti strani fenomeni, se entro essa vengavi alcuna cosa gettata; ma la verità si è, che egli si è una mansuetissima pozzaanghera, o melmoso fosso, che merita a grandissimo scontento il nome di lago, ed è stato da uomini degni di fede sperimentato, e toccato con mano, come ci non fa ombra menoma di risentimento per quanto la sua acqua venga smossa, disturbata, e malmenata per ogni, e qualunque verso. Veggasi *Wagner*, *Historia Helvet.*

LAGHI sotterranei. Che abbianvi in moltissimi luoghi degl' immensi Laghi sotterranei puossi appena rinvocare in dubbio, avvegnachè in alcuni luoghi noi gli veggiamo con occhi proprj; ma son bene spelti compresi, e conosciuti gli effetti loro, ove questi non sono veduti, e così imbarazzano grandemente, e confondono coloro, i quali s'impegnano di spiegare i loro effetti sopra tutt'altri principj.

Il famosissimo Lago di Zurchnitzer nella Carniola, il quale di tempo in tempo s'empie, e si vuota in una maniera impetuossissima, scagliando fuori colle sue acque dei pelci, e degli uccelli salvatichi, comunica con altro immenso Lago sotterraneo stanziante nelle viscere del Monte Javornick, ed a norma, e secondo il suo riempirsi, ed il suo vuotarsi, viene similmente a rimaner pieno, e vuoto il lago superiore. La grotta Podspetschio nella Contrada medesima ci somministra altro esempio innegabile di un Lago sotterraneo. La gente del paese circonvicino intanasi nel fianco della montagna, ove stanziava questo Lago, per una bucca, od apertura assai angusta, per la quale portansi coloro entro una caverna di una grandissima ampiezza, e sommarmente alta; ed all'estremità di quella stessa caverna avvi similmente una medesima bocca, od apertura, per la quale portasi quella gente alle gengive di un' ampissimo fiume d'acqua sotterranea. Introduconvisi coloro con delle grosse torce a vento, e trovano, che quell'acqua è sommarmente chiara, e leggerissima. Questo lago è profondo nel suo contorno, ed al-

le sue rive, per così esprimerci, dieci buoni cubiti; e senz'ombra di dubbio lo farà assai più nel suo mezzo. L'acqua precipitali entro questo Lago da un' assai grosso canale; e sgorga di bel nuovo fuori d'esso per mezzo d'altro canale, cadendo giù precipitosissimamente entro un' altro Lago; e questo ella lo fa con sì tremendo rumore e frastuono, che non puovvis udire lo sparo di una pistola in vicinanza di esso. Le pietre che altri getti già per ogni, e qualunque parte, sentonsi cadere nell'acqua, e vi ha grandissima ragione di supporre, che il Lago si estenda pel tratto d'oltre un miglio Tedesco; avvegnachè a quella medesima distanza, scuopresi altra acqua per via d'altra simigliante apertura, o screpolo nella rupe, che trovasi nella medesima orizzontale altezza di quella, e che nei tempi medesimi trovasi sottoposta agli stessi accidenti. Questo vastissimo corpo d'acqua alcuna fiata sgorga tutto fuori in pochi minuti, e lascia l'alveo, o letto suo asciutto, ed indi a poche settimane torna a riempirsi con un frastuono orribilissimo. Siccome questi accidenti avvengono sempre, e costantemente a tutt'e due queste acque poc'anzi menovate, in un tempo medesimo, così egli apparisce con ogni evidenza maggiore, questi altro non essere, che i due rami, o lati del Lago medesimo. Veggansi le Tradizioni Filosofiche, n. 191.

Noi abbiamo in Inghilterra moltissimi di questi metecosmij acqui, o conservatoj, l'acqua dei quali è sempremai in grado assai osservabile limpida, e fredda, ed è così piena, gravida, e carica di spalto, che ella incrosta generalmente con grandissima forza, e prontezza le cose, che vengonvi poste dentro, e quando vienealzata in vapori, siccome alcuna fiata lega in una parte di essa, a motivo del calore sotterraneo, o che vien portata su da altri vapori, si attacca nel sopraccielodelle volte, a vicini a formare delle stalattite, ed altre simiglianti concrezioni, ed ammassi. In moltissimi di questi Laghi trovanvisi similmente delle rotonde pallottole di spalto, che vengono denominate *Stalagmite*. Sono queste compiete di parecchie incamicature, od incrostature, o strati, che vanno raccogliendosi, e formandosi intorno ad un nucleo centrale.

trale, e bene spesso la grossezza di un marmo da scolare. Vegg. le Tranf. Filosofo. n. 144.

Nel foro, od incavo di Pen-Park, nella Provincia di Gloucester havvi un' esempio grandemente osservabile di questo, contencndo questa veramente strana caverna uno di questi Laghi, che è peravventura il massimo di tutti quelli, che trovansi nel nostro Regno. La bocca, o foro stesso fu a caso rinvenuto da alcuni minatori, i quali scavavano le miniere del piombo: egli è, facendosi dalla superficie fino al suo fondo, cento settantaquattro piedi, ed è una vastissima caverna rappresentante, quanto alla sua forma, un ferro da cavallo, circondata per ogni verso da assai alpestre rupi, e da spezie di rozzi-fimi muri di terra conteneuti nel loro mezzo un fiume, o sia lago sotterraneo largo cento venti piedi, e della profondità di quarantotto piedi, della medesima freddissima, e petrificante acqua, che stanza entro i Conservatoi sopraddeferiti della spezie medesima. La gente del paese porta opinione, che quest'acqua cali, e cresca, non altramente, che fassi nel suo flusso, e refluxo il mare; ma questo è un patente errore.

L'acqua di questi laghi è più alta nell' Invernata, e più bassa nell' Estate, ma lo scemamento di quella è lento, e successivo in quella data propria particolare stagione, ed in guisa simigliantissima ella cresce altresì, nè ciò avviene in altri tempi, salvochè nei divisati. In una parte del sopracciato, o volta della caverna havvi un vasto foro, nel quale hanno alcuni minatori scavato, ed è fama, che abbianvi un tempo trovato del finissimo piombo, ed in grandissima abbondanza: ma una sciocca, e ridicolissima volgare opinione, che ivi asolino perpetuamente degli spiriti, ha fatto sì, che non trovasi uomo, che azzardar si voglia a continuare lo scavo. Il pavimento di questa vastissima caverna è tutto composto di una pietra bianchissima spaltosa, interrotta da strisce di miniera piombina al disopra, e da rialti di rupi, che stanno sospesi sopra la testa, e tutti sono distinti di varj pezzi mezzo staccati di spalto pellucido, e brillantissimo, e di bellissime, e sommanen-

te curiose figure varie. La parte più alta di questo incameramento ergesi pel tratto di novanta nove pertiche sopra il livello dell'acqua, ed in essa stanno come pendenti due grossi massi di scoglio tutti ricoperti di fango, o melma in quei dati tempi, ne quali l'acqua non trovasi sopra, siccome appunto avviene in tempo d' Estate. I passaggi di sotto entro la bocca, o foro, ed entro le cavità delle fiancate, veggionsi tutti coperti di quella spezie di spalto, che non suole d'ordinario trovarsi scompagnato dalle miniere del piombo; ed in questo dato luogo non vi si rinviene alcuna creatura vivente, salvo che alcuni pochi pipistrelli. L'acqua nella parte più profonda è chiara, ed il luogo è assai meno umido, di quello altri peravventura si farebbe a pensare.

LAMBICCO. Per la voce Lambiccio intendesi la cosa stessa che altramente viene anche denominata *Elmo*, *Galen*, *Pileus*, *Capitellum*, ed anche *Ambix*. Sembra che quest'ultima voce per esprimere questo dato istrumento sia molto antica. Dioscoride (a) ne parla, e ci assicura, che fino da quei giorni possedevano gli Artefici un metodo d'estrarre il mercurio dal cinabro per mezzo di sublimarlo in un' *Ambix*, Lambiccio (b).

(a) Vegg. Dioscorides, *Lib. 5. cap. 110.*
(b) *Le Clerc Histor. Medic. Pars. 3. Lib. 1. Nouv. Rep. Lettr. Tom. 24. pag. 407. Journal des Sav. Tom. 75. pag. 643.*

Il Lambiccio aperto viene similantemente appellato *Rostratus*, che vale adire armato di becco, di rostro, &c. Vien questo a scaricare il suo vapore per mezzo di un becco, o naso, entro un recipiente.

Il Lambiccio cieco vien messo in opera nella sublimazione; e questo ancora siata è foracchiato nella sua cima per lasciare, che il vapore faccia la sua montata.

Dai Chimici Tedeschi vengono descritti i metodi del colorirsi che fanno i liquori nell'orlo passaggio pel Lambiccio. Veggansi Ephem. Acad. n. e. Decad. 2. ann. 3. Observ. 28. pag. 83. & seg.

Fannosi alcuni Naturalisti a supporre, che le rupi, e le montagne facciano l'ufficio di lambicchi, in riguardo alle acque del mare, e che alzinsi in simigliante maniera alla superficie della terra, e quindi fanno-

fi a dedurre l'origine dei fonti, e dei Fiumi (c). Altri poi rigettano questa ipotesi dei Lambicchi naturali, e fanno sì a supporre, che le sorgenti d'acqua vengano ad esser formate dai vapori (d). Il Dottore Haley adotta quest'ultima opinione, e ciò non ostante ritiene anch'esso il lambicco, e ne inverte soltanto il suo uso. Fassi egli a supporre, che le vette, o le parti esserne delle colline raccolgano i vapori per ogni dove l'Atmosfera siane caricata, e che servano non altramente, che altrettanti lambicchi per distillare le acque dolci per uso degli uomini, e degli animali bruti (e).

(c) Schench. *Hist. Alp.* 2. pag. 45. & seq. *Trans. Philos.* n. 316. pag. 146. De la Hire in *Histoire de l'Académie des sciences Ann.* 1703. pag. 5. (d). *Giornale de Letterati d'Italia*, Tom. 25. p. 349. (e) *Trans. Philos.* n. 392. pag. 473. Veggansi somigliantemente gli *Articoli* SORGENTE, VAPORE, FIUME. &c.

LAMPANA. La fiamma in una lampana non consuma il lucignolo, fino a che esso lucignolo non venga esposto all'aria, e ciò per mezzo del cadere essa fiamma all'ingiù; e quindi ne può essere a buona equità inferito, che un metodo ne può esser trovato per conservare i materiali del fuoco, e per conseguente la stessa fiamma nell'altezza medesima sopra il lucignolo, per farlo ardere senza consumarsi per lunghissimo tratto di tempo. Molti, e molti trovati stati sono immaginati, e tentati per giugnere ad ottenere questo effetto; ma sembra, che possa ciò unicamente ottenersi in qualche grado di perfezione per via dell'idrostatica. Così supponi, che una lampana sia fatta cupa, o profonda due, o tre dita con un cannetto, che partendosi dal fondo del vaso venga a raggiungere presto che la sommità del vaso medesimo: sarai, che venga esso vaso riempito di acqua a segno, che l'acqua stessa venga a cuoprire il foro del cannetto diviso nel fondo all'estremità, sicchè l'olio non possa entrare nel cannetto, e così venga ad esser perduto. Allora vi verserai l'olio per sì fatta guisa, che venga a riempire il vaso quasi vicino all'orlo, il qual orlo fa di mestieri, che abbia un coperchio, nel

quale sienovi tanti fori, quanti dovranno esser i lucignoli, che vi si vorranno far ardere. Allorchè il vaso farà così pieno, e che i lucignoli saranno accesi, se l'acqua verrà a gocciolarvi nei cannellini, verrà a conservare perpetuamente l'olio all'altezza medesima, o vicinissimo; essendo il peso dell'acqua a quello dell'olio come 20. $\frac{1}{4}$ a 19. che in due, o tre dita non viene a formare differenza gran fatto considerabile. Se l'acqua scorra più violentemente di quello l'olio si consumi, vi scorrerà soltanto sopra l'estremità del cannetto, e quella, che non scorre sopra, verrà sotto l'olio, e verrà a conservarlo nella medesima altezza. Veggansi *Trans. Philos.* n. 245. pag. 388.

LAMPANE, o *lucerne perpetua*. Le Testimonianze di Plinio, di Sant'Agostino, e d'altri gravissimi scrittori, hanno indotto parecchie persone a credere, che gli Antichi possedessero l'invenzione delle lampane, o lucerne perpetue; ed alcuni Moderni hanno altresì tentato di rinvenirne il segreto; ma finora tentato lo hanno in vano. Ed a vero dire, ella sembra questa una materia non così agevole ad esser rintracciata, quella d'inventare, od un lucignolo perpetuo, oppure un perpetuo olio. Potranno i curiosi di sì fatte materie leggere le congetture del nostro Dottor Plot, riguardanti sì fatto soggetto, nelle nostre Filosofiche Traduzioni sotto il n. 166., oppure nel Compendio del Lowthorp, Volume 3. pag. 636. Ma noi siamo di sentimento, che pochi saranno coloro, che prender si vorranno la briga di farsi ad investigare un tal segreto, allorchè saranno a riflettere, che la credulità, massimamente di Plinio, era tale, che la sua testimonianza non sembra di una evidenza bastevole ad indurci a crederne il fatto, vale a dire, che una lampana, o lucerna fosse per modo fabbricata, che durasse ad ardere pel tratto di mille, o mille cinquecento anni: molto meno poi si rende credibile, che gli Antichi possedessero il segreto di fabbricarne una, che ardesse per sempre.

LATTE. E' il latte evidentissimamente uno degli alimenti migliori del corpo: ed ella non è maraviglia allorchè viene sperimentato tale, qualora noi ci facciam

mo a considerare, che in tutti i casi della nutrizione, la materia prossima presta per nutrire dovrebbe' esser più somigliante, ed analoga, che mai esser potesse al corpo, cui essa dee nutrire. Noi sussistiamo per quelle cose medesime, per mezzo delle quali noi siamo generati, ed eziandio mentre ci troviamo nello stato di feto entro la matrice stanziante, noi venghiamo ad esser nutriti, non già dal sangue, siccome alcuni si fanno malamente a supporre, ma bensì da un sugo latteo, che viene ad essere separato dal sangue nell'utero per mezzo della placenta, come si è appunto nelle poppe delle donne lattanti, per mezzo delle glandule, e dei piccioli tubi dalla natura per questa importantissima faccenda destinati. Le vivande, delle quali ci cibiamo alla giornata, passan già, egli è vero, nello stomaco nella loro propria forma; ma queste però non ci nutrono, fino a tanto che non vengono ad esser cangiati in chilo, o sia un liquore lattiginoso.

Sendo il latte analizzato, vien trovato, esser composto di parti grasse, sferose, e terree; e questi suoi elementi, o principi costituenti essendo agevolmente mescolati, e di bel nuovo disgiunti, sono fatti di una materia talc, che viene ad essere sommaramente acconcia, e nata fatta pel nutrimento delle varie parti del corpo. La parte sferosa, che è similmente nitrosa, essendo un proprio, ed adeguato veicolo per condurre per i vasi le parti grasse, le quali sono ugualmente bene adattate agli uffizi tutti della nutrizione, che esser lo possa qualunque altra siasi sostanza. Ella si è cosa agevole, da questa istoria del latte, il vederà ch'ei non è soltanto un cibo assai dicevole, e proprio per i fanciullini, ma acconciissimo eziandio per le persone adulte; ma importa alissimamente, che vengano osservate le lavie, e adeguate regole, rispetto al suo uso nei casi particolari; non avendovi alcun alimento che sia capace ad adattarsi a tutti i temperamenti non meno, che a qualsivoglia circostanza, quanto questo. La carne, od altro cibo entro lo stomaco viene ad esser convertito in esso stomaco in chilo, od una sostanza somigliantissima al latte: questo chilo passa entro il co-

Supp. Tom. III.

re: i vasi sanguiferi, e le parti sue finissime, e sommarmente spiritose, vengono ivi ad essere tramutate nella parte rossa del sangue; e dopo di questo le altre parti più grossolane del medesimo sono per via di diverse prodigiosissime operazioni trasformate in bile, e negli altri parecchi umori del corpo. Egli è evidentissimo, che questi umori, di pari, che il sangue medesimo, foras che tutti abbiano un'alimento, o dir lo vogliamo rinforzo, e supplemento; e che il cibo non può somministrare questo rinforzo, fino a tanto che non venga ad esser convertito in chilo, o latte: quanta gran porzione adunque di fatica verrà ad essere risparmiata alle funzioni, ed operazioni animali per mezzo di introdurre tutti in un subito entro lo stomaco il chilo già bello, e formato, che è appunto il latte; ed in quei casi, ove l'azione, oppure i fughi di quest'organo vitale trovansi a segno indeboliti, ed insievoliti, che non hanno forza talevole per convertire il cibo in chilo, che altro rimane, se non se, che la persona si vada insensibilmente, e lentamente morendo, per mancanza dei necessary soccorsi, e risondimenti dei parecchi fluidi del corpo, qualora alcuna cosa non venga somministrata, la quale valevole sia a passare entro il sangue con minor briga, e con minor preparazione, di quella facciano i cibi; ed in tal fatta occasione quale si è mai quella cosa, la quale sia tanto a portata, quanto lo si è il latte, il quale trovasi già sì dappresso omogeneo, e collegato colla natura di quel fluido, il quale dovrebbe ivi esser separato dal cibo, e che vi supplisca egregiamente, e per intero tutti i suoi uffizi?

LATTEA-dietta. La dieta lattea è incontrastabile oggimai, essere grandemente vantaggiosa a coloro, che sono molestati dalla gotta, non meno, che a quelli, cui martirizza il male della pietra. Veggasi l'Articolo PIETRA.

Il Dottor Cheyne raccomanda il Latte, e la dieta di semi coll'acqua, vale a dire le lattate per usuale bevanda non meno per curare le infermitadi, che per preservarsi da quelle. Veggansi pertanto gli Articoli CANCERO, PARALISIA, FEBBRE, PIETRA, e GOTTA.

Bb

Nell'

Nell' aprirsi una vena , massimamente dopo , che uno siasi cibato , è stato trovato del latte in vece di sangue. Veggansi le *Transf. Filosof.* n. 6. pag. 100.

Il sale del latte può essere preparato , per mezzo di farlo bollire fino a che se ne consumi una metà , e poi col filtrarlo ; la cottura , e la filtrazione debbono essere continuate , fino a tanto che il liquore diventi della consistenza di uno sciroppo. Questo sciroppo-latte adun- , essendo posto in una cantina a cristallizzarsi , il sale verravvi a formarsi in una focaccetta di un sapore zuccherino , somigliantissimo alla manna .

Simigliante preparazione è un trovato del Dottor Gaulius , ed è , a vero dire , alquanto diversa da quella , che il Valentini nel suo Trattato intitolato *Medicina nova , & antiqua* , attesta essere il famosissimo zucchero di Latte *Sacharum lactis* , cotanto decantato da Lodovico Felli , e da altri non pochi raccomandato come un' infallibile specifico per risanare i gotosi . Veggansi Saggi di medicina di Edimburgo .

LAVAMENTO. Lavamento delle Miniere . S' intende per questa espressione il purificare una miniera di qualunque liasi metallo per mezzo dell' acqua dalle parti pietrose e terrose , le quali se vi si lasciassero , verrebbero senza dubbio a rendere malagevolissimo lo sguagliamento .

Il metodo pertanto di far ciò si è il seguente :

Andrai rompendo la tua miniera entro un mortaio riducendola in una polvere grossolana : ne prelerai venti , o trenta centinaja domestiche , e le porrai entro un lavatoio , o trogolo da lavamento , e sopra vi andrai versando tanta quantità di acqua , che la miniera ne possa essere per ogni parte bene immollata : avrai poscia un vaso pieno di acqua , il diametro del qual vaso fa di mestieri , ch' e' sia alcun poco maggiore della lunghezza del trogolo : prenderai il trogolo colla tua mano manca dalla cima della sua parte inferiore , e infilandolo orizzontalmente nell' acqua , l' andrai per gentil modo agitando colla mano destra dalla parte anteriore del trogolo , il quale è sempre fabbricato in guisa , che questa parte viene ad essere la più concava di esso , e l'

agitazione o movimento l' andrai faccendolo alla volta della parte posteriore , che è la più sfondata , o più cupa : eib fatto , eaverai fuori il trogolo , e lo andrai un poco inclinando nella parte anteriore , affinché l' acqua possa uscir fuori , e la parte metallica più grave rimarrassi nel fondo : ripeterai questa faccenda medesima più , e più fiate , ed in somma , fino a tanto che la materia , che rimansi nel fondo del trogolo , sia totalmente pura . Se la pietra , in cui stanza la miniera , sia tantodura , che si stenti a ridurla in una polvere coerente al suo stato naturale , come la pietra focaja , e le miniere cristalline abbassate , eomunemente esser sogliono , farò giuoco forza prima il calcinar tutta la massa , e poi tuffarla , e spegnerla più , e più volte nell' acqua fredda ; e poscia ridurla in polvere , e manipolarla pel lavamento nella maniera medesima pur' or descritta . Lavata che sia per simigliante modo quella polvere , ne faggerai un centinajo , e dalla pallottolina di metallo , che questo centinajo ti somministrerà , potrai con ogni maggiore agevolezza prender norma per stimare il valore della miniera , che imprendi a lavorare . Veggasi *Cramer* , arte del faggiare , pag. 244.

LAVAMENTO. Il lavamento , o lucentezza di alcuni colori può essere condotta a termine ed ottenuta nella maniera seguente :

Prenderai i colori , che dovranno esser lavati , e gli porrai in un vaso di chiarissima acqua : andrai dimenando ed agitando per entro il vaso il tutto fino a tanto che l' acqua sia per ogni parte rimasta ben colorita ; e se alcuna mondiglia si porti a galla sulla superficie dell' acqua , la schiumerai diligentissimamente ; e quando tu potrai credere , che le parti più grossolane del colore sieno calate , e posate nel fondo del vaso , tu verlerai quell' acqua in altro vaso di terra cotta , il quale sia tanto ampio , che vaglia a contenere dentro di sé quattro o cinque volte il primo vaso pieno di acqua . Allora andrai versando dell' altra acqua nel primo vaso , ed andrai dimenando per entro il colore rimanente , fino a tanto che l' acqua venga a spessirsi , e poichè sarassi alcun poco posata , andrai versandola simiglian-

temente nell' altro vaso, cioè nel secondo vaso sopraccennato. Andrai ripetendo questo lavoro fino a che tutta la parte più fina del colore sia estratta fuori, e che altro non rimangavi indietro, che una materia grossolana arenosa. Quindi lasciando, che l'acqua, che trovasi nel secondo vaso, faccia comodamente la sua posatura, e fino a tanto che divenga perfettamente ed interamente chiara, l'andrai poscia delicatamente versando fuori del vaso stesso per inclinazione, e conserverai il color lavato rimasto nel fondo del vaso per servirtene.

I colori, che debbonfi nella descritta guisa lavare, e purificare, sono il rosso-piombino il color azzuro, ed il verde turchino, il verde terrigno, lo smalto verde, e paonazzo, lo scuro spagnolo, il giallo ocraio, e somiglianti. Build. Dizione. in voce.

LEBBRA. Assaiissime siate i gradi minori della lebbra vengono confusi collo scorbutto, ed eziandio non rade volte colla rogna o scabbia medesima; dalle quali indisposizioni e malori però ella può essere benissimo distinta per la durezza della pelle in una od in più parti del corpo umano, accompagnata da una scabbia secca, alcune volte da pustole umide oppure da croste asciutte, e sempre con alcun grado di pizzicore: dove per lo contrario le vere macchie scorbutiche sono sempre mai d'un color livido, comunemente non scabbiose, o rialzanti sopra la cute, e sono accompagnate da segni manifestissimi d'uno stato languido e rilassato delle fibre, e da una corruzione del sangue. Conciossiachè uno scorbutto reale, e genuino porta seco sempre mai una lenta, ma generale risoluzione, od isgreimento, o putrefazione di tutta la macchina, dove per lo contrario le scabbie, le impetigini, o la lebbra può essere sperimentata, che attaccano quelli d'una costituzione sommamente differente. Veggasi *Pringle*, Osservazioni intorno alle malattie delle Armate, pag. 306.

Questa stranissima infermità egli è tanto lontano, che possa esser curata per mezzo de' soli topici medicamentosi esterni, che anzi per lo contrario rendesi alcune siate sommamente pericoloso il tentare di ri-

muovere le incrostature, e le macchie dai corpi de' lebbrosi per somigliante guisa. Per lo contrario egli si è indispensabilemente necessario il cangiare gli umori per mezzo d'assai parca dieta salata; per via dell'esercizio, col prendere degli alteranti mercuriali, oppure colle frequenti purghe della spezie salina. Idem, ibidem.

Dal dotto medico Mead in questa brutta infermità vien raccomandata la Tintura di canterelle. Veggasi il suo Trattato de *Morbis biblicis*.

LEGA. La lega dell'oro viene stimata per carati, e quella dell'argento per danari di peso.

L'oro scevro da qualsivoglia lega viene asserito essere ventiquattro carati fino. Secondo la proporzione dell'oro puro a quello della lega in un'oncia, viene asserito esser la misura altrettanti carati fino. Se vi sieno due carati di lega ai ventidue carati di puro oro, viene asserito esser fino ventidue carati. Se quattro di lega ai venti di oro, fino venti carati, e così intendasi dal rimanente.

Presso diverse Nazioni varie sono le porzioni di lega, che vengono usate; quindi viene asserito, le loro monete essere di gradi assai diversi di finezza, e per conseguente vengono anche eorrenemente valutate nei cambi forestieri.

L'argento coniato presso i Romani, per lungo tratto di tempo venne conservato in una purezza singolarissima; e questa venne per la prima volta imbrattata dal Tribuno della Plebe Livio Druso, il quale sè mescolare nelle monete d'argento un'ottava parte di rame. Ma in progresso gli Atti del suo Tribunato vennero cassati ed annullati, e per conseguente fu la moneta restituita al suo primiero grado di purezza. Le cose pertanto si rimasero su quello piede fino al tempo dell'Imperator Severo, il quale accrebbe la lega anche di vantaggio; e malgrado questa sua non lodevole azione nelle sue medaglie ei volle improntato il Titolo di *Restitutor monete*. Veggasi *Journal des Savants*, Tom. 29. pag. 763.

La lega dell'argento col rame può essere esaminata per mezzo della coppella nell'appresso forma.

Proccurerai di esser prima di tutto prov-

veduto di una pietra da saggio, o del paragone, e di una serie d' aghi da saggio: metterai diligentemente non meno la pietra del paragone, che il metallo, che vorrai esaminare, e poi stropiccerai il metallo stesso sopra la pietra: confronterai poscia i suoi segni con gli aghi da saggio, e per questo mezzo facendo una congettura nella quantità del rame contenutovi, verrai a conoscere che quantità di piombo vorrai per consumare quella porzione di rame. Ma siccome il piombo necessario per

consumare esso rame non è in una quantità proporzionabile a quella del rame stesso, allorchè questo trovasi mescolato coll' argento, così noi vi somministreremo in questo luogo dal prode Lazzaro Erker la quantità, che dovrà essere aggiunta in qualsivoglia caso.

Noi prenderemo per nostri esempi una serie d' aghi da saggio, fatti secondo il marco, od impronto, divisi in mezz'once, ed in grani. Veggasi l' Articolo AGHI da Saggio.

$\frac{1}{2}$. oncia d'argento,	$\frac{1}{2}$. oncia di rame,	Marche di piombo da aggiungersi,
15. $\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$.	4.
15.	1.	6.
14.	2.	8.
12. e 13.	4. e 3.	18.
9 12.	7 4	14.
4 8.	12 8.	15.
1. 4	15. 12	16.

Può chiechessia agevolissimamente ridurre questa Tavola agli aghi fatti secondo la marca di pesi di sedici once per libbra, oppure a quello dei Carati: nè vi si richiede di necessità il proporzionare le quantità di piombo da essere aggiunte, se non se ad un mezzo centinaio. Veggasi *Cramer*, *Arte del Saggiare*, pag. 226.

In questo mentre fa, che il metallo, che dee essere sperimentato, e saggiato con gli aghi, venga sottoposto all' operazione della coppella, insieme colla quantità del piombo indicata dal Saggio, o tocco eseguito; ed importa assai, che il fuoco, di cui ti servirai, sia assai soave, e meno attivo di quel grado di fuoco, che viene assegnato all'argento, con una quantità maggiore di rame, e per lo contrario più piccola quantità che si è la quantità della lega del rame, fa di mestieri, che più energico, e tagliando sia il grado del fuoco, che dovrai metter in opera in questa faccenda. Quando il piombo, il quale bisogna, che sia il primo ad essere posto nella coppella, comincia a fumare, ed a bollire, allora dee essere esaminato il metallo, che dovrà esser aggiunto, ed il fuoco dovrà essere continuato, fino a tanto che il rame sia stato tutto consumato, e ridotto a gialle scorie, e la pallottola dell' argento


lasciata nel fondo, o, per meglio esprimerli, nel centro della coppella, converrà, che sia pelata; e quella sottraendo la quantità conosciuta d' argento nel piombo usato nell' operazione, verrà a mostrare la quantità d'argento, e per conseguente anche quella del rame, che contenevasi nella Lega.

LEGATURA. La legatura nella Musica Italiana viene a significare un' annodamento, cucimento, o congiungimento di più note una all' altra attaccata.

Quindi le sincopi sono bene spesso denominate legature, come quelle, che son composte da una ligatura, o catena di parecchie note. Havvi altra specie di legature fatte per brevi, allorchè sopra differenti linee ve ne ha parecchie di queste, oppure in differenti spazi da esser cantate sopra una sillaba.

Per conoscere questa fa di mestieri osservare, che le sole brevi sono capaci di somiglianti legature, per motivo, che la loro figura comporta, che vengano ad esser piantate così strettamente insieme, non altramente che lembriano un carattere solo, tuttochè collocato in differenti gradi, qualora però non occorra l'opportunità di collocare un semicircolo, o sopra, o sotto esse, per far conoscere, che esse sono legate.

gate. Questa specie di legatura riguarda soltanto il tempo comune. Di più fora' è, che le Brevi vengano considerate come semplici, come avveni una coda, e come quelle, che sono di colori differenti. Primieramente, se queste sieno semplici □, ed ascendano, contengono la lor quantità naturale, vale a dire, cadauna due semibrevi, come appunto s'orgefi nel sottoposto




Esempio A. Ma se queste discendono, al lora cadauna è equivalente a quattro semibrevi, se due soltanto seguanfi l'una l'altra, come nell'esempio B. Se ve ne sieno tre, o quattro, che si seguanfi, la prima, e l'ultima di esse contegono quattro semibrevi per cadauna, e quelle, che trovanfi nel mezzo d'esse, ne contegono soltanto due, come nell'esempio C.

In secondo luogo se queste hanno coda □, e che la coda sia voltata all'insù, le brevi conteranno soltanto una misura, non meno ascendente, che discendente [veggafi l'Esempio D]. Ma se ella sia contrassegnata all'ingiù, allora la breve verrà a contenere la sua quantità naturale. [Veggafi l'Esempio sottoposto E.]

Simigliante specie di legatura venne soltanto inventata, perchè la minima essendo rotonda, non potrebbe usarsi in questa maniera. Ed in questo tempo non era in

uso il semicircolo.

Può quivi a buona equità osservarsi, che la prima sola breve di cadauna legatura ha d'ordinario la coda, e che vien collocata comunemente nel lato sinistro. Ultimamente, se queste sieno di colori differenti, vale a dire, se la prima sia bianca, oppure, che è lo stesso, aperta nel mezzo, e la seconda sia nera, o tutta serrata, la prima conterrà una semibreve, e la seconda conterrà una minima punteggiata [veggafi l'Esempio F.]



Sono queste le legature principali, oltre le quali ne occorrono nella Musica altre parecchie, per le quali potrai osservare l'Articolo NOTÆ *Broffard*.

LEGNAJUOLO. Il Legnajuolo, che gl'Inglefi appellano *Carpenter*, egli si è quell'artigiano, la cui incombenza, o maestria consiste nel tagliare, dar forma, ed unire insieme delle tavole, ed altro legname per i bisogni delle fabbriche. A questi soli lavori ristringono gl'Inglefi il loro *Carpenter*, 'legnajuolo.

La voce loro è formata dal consimilissimo termine Francese *Charpentier*, che presso i Franzesi importa la cosa medesima, e questa formata da *Charpente*, che signi-

fica legno, legname, o piuttosto, lo che meglio ci garba, dalla voce latina *Carpentarius*. Veggafi *Savari*, Dizion. Commer. Tom. 1. pag. 684. & seq. in voc. *Charpente*, & *Charpentier*.

Alcuni vogliono per altra parte, che la voce *Carpentarius* sia stata simigliantemente usata per significare colui, che tirava un *Carpentum*, o carriaggio, [a] corrispondente alla voce Inglese *Coach-man*, Cocchiere; ma l'Henninius non ammette per verun conto tal significato di questa voce [b].

[a] Veggafi *Berg. de Viis Milit. lib. 4. Sect. 10. §. 8.* [b] *Hennin. Nota ad Eundem, ibidem. Pitiscus, Lex. Antiq. Tom. 1. pag.*

1. pag. 367. Veggasi l' *Articolo Carpentum*.

I legnajuoli dai Franzesi de' secoli passati erano chiamati *Charpentiers de la grand Coignée*, legnajuoli da accetta, da alce, e ciò per distinguerli dai legnajuoli di lavoro più minuti, e delicati, che da essi vennero detti *Charpentiers de la petite Coignée*, legnajuoli dall' alce piccola. Veggasi *Synary Dictionarj Commerce*. Supplemento pag. 36.

Legnajuolo da nave è quell' artefice, il cui impiego si è il lavorare nelle Darsene, od Arsenali, il legname: necessario, o per la fabbrica, o pel riattamento de' vascelli, ec. Veggasi *Aubin*, *Dizion. della Marin.* pag. 194.

LEGNAME. Tanti, e così grandi sono gli usi del legname, che sarebbe temere un procurare un bene sovrannamente considerabile a qualsivoglia Stato il procurare di propagarlo in abbondevolezza la maggiore, che mai far si potesse; come appunto si è di necessità uno svantaggio estremamente grande quello di quella Regione, che per avere il bisogno del legname ad essa necessario è costretta a ricorrere a farne le provviste nei paesi a sé vicini, e comprarlo a prezzo assai caro, e quel che è peggio, a rinovare bene spesso sì grossa spesa; quando con una sufficiente economia, in ogni, e qualsivoglia paese potrebbe avere il bisognevole in casa propria.

Simigliante economia però forz' è che venga applicata in tempo; che sciossiachè la nostra naturale indolenza, il nostro amore di raccogliere i vantaggi di ciascheduna cosa per soli noi medesimi, ed il nostro poco pensiero per la posterità, ci dà, a vero dire, grandemente da temere, che le E-tadi, le quali dopo di noi ne verranno, abbiano ad esser prive del legname non meno per i pubblici, che per i privati bisogni della vita. Tutte le arti nostre vorrebbero essere impiegate intorno a sì fatto soggetto con due mire, una di conservare, ed aver cari i nostri boschi, e foreste da crescere, l'altra di ripiantare, e di rinnovare quegli alberi, che veleggono continuo, e giornalmente atterrati.

La quantità delle ghiande, che portano le querce, ha fatto supporre a parecchie persone, che la Natura siasi presa cura di un abbondevole rinnovamento per noi, e

che di questa immensa quantità di semi, che cadono ogni anno dall' albero sia per esservi costantemente un rimpiazzamento più che sufficiente per i novelli piantoncini, i quali verranno su, e cresceranno in luogo dei vecchi. Ma l'esperienza ci fa vedere, non averci ciò in conto veruno. Il massimo numero di queste ghiande, che cadono, vien divorato da storme di differenti animali, pel nutrimento, e mantenimento appunto de' quali ha la provida Natura provveduto in copia così abbondevole questi medesimi semi. Di quelle ghiande, poi, che sfuggono dalla voracità di sì fatte bestie, ci conviene considerare quanto poche sieno quelle ghiande, che riuscir possano in bene, e ciò a motivo dei naturali accidenti, ai quali inevitabilmente trovano perpetuamente esposte: cadono queste sopra un terreno coperto, ove le foglie morte, e le porzioni marcite, o parte dei ramuscelli degli alberi, vengono comunemente ad impedire, che giungano in contatto col terreno medesimo, nel quale esse debbono germogliare; oppure, in evento, che esse possano gittare il tallo, questo trovasi soltanto nel fior fiore della superficie, in cui si trovavano, nella lentissima loro crescita; trovasi di pari, mentre son tenerelli, soggetti questi rampolli medesimi a tutte le ingiurie delle orride stagioni, e de' geli: alla qual cosa dovrassi aggiungere, essere sommamente difficoltoso per simigliantissime pianterelle non meno, che per i giovanissimi polloncini delle medesime, il trovarsi stanza per crescere, o per alimentarsi fra un terreno, che per ogni dove trovasi ingombrato delle radici ineroiche di altri alberi; e l' embra perpetua, e la mancanza dell' asolo dell' aria libera, forz' è, che le renda infinitamente deboli, ed irregolari; nella loro crescita, ancorchè vogliamo farci a sopporre, che faccian tela, e sormontino tutte le altre divinate difficoltà. Egli è certissimo, che gli alberi da legname di questa trovansi frequentissimamente nei boschi tutti intaccati, e circondati per ogni intorno di legne basse, come scope, ginestre, e simiglianti bocherette piante; ma noi troveremo sempre, e costantemente ciò avvenire, non già nei luoghi chiusi, ma bensì in certi dati pezzi di terreno, ove vi è

ilato

fiato già dell'apertura, e dello spiazzo; e che d'ordinario ove quelli spiazzi non vi sono, nè veggionvisi, non sonovisi vedute giammai le querce nei contorni, e vicinanze di quelle macchie. Quelle ghiande, che cascan giù dalle querce, non vengono mai comunemente da nulla, non gittan tallo, non fanno prela, e non divengono alberi, e ciò a cagione dei pur ora additati accidenti; e quegli alberi, che crescono in certe date distanze, sono unicamente dovuti a quelle date ghiande, che sono state trasportate colà dagli uccelli, e che per accidente son loro cadute di bocca. E' questo un esempio familiarissimamente avverato con osservare, che in vicinanza delle boschaglie vi sono assai fucinate dei cespugli, delle fratte, le quali tuttocchè sieno di cornioli, o d'altri alberi, nulladimeno trovansi tutti circondati per ogni verso ed ornati di piccioli quercioli: le ghiaiole, i colombacci, e simiglianti uccelli granivori, sono appunto gli autori di quelli cespugli; e conciossiachè portando via quelli uccelli le ghiande dai boschi circconvicini, per mangiarcele sotto quelle fratte, ne vengono a smarrir molte per istrada; per rintracciar le quali, non prendonsi la menoma briga di portarsi sul terreno, e che ivi trovando un suolo più agevole, e più libero per introdurvi le radici, ed insieme un'aria liberamente afolante, ed aperta per crescerci, così rade sono quelle volte, che una di quelle ghiande falli di divenire un quercio, seppure non venga distrutto da alcun animale, o per altro accidente, allorchè era tenerello.

Per conservar poi la crescita dei nostri alberi da legname, ella farebbe, a vero dire, una legge sommamente utile, che tutti coloro, i quali tagliano, od atterrano qualsivoglia dato numero di querce, ne dovessero di pari lasciare un' egual numero di esse in buon ordine per poter esser tagliate in progresso; e che simigliantemente niun albero da legname potesse essere atterrato, prima d'esser arrivato alla sua piena crescita ed età propria in rapporto all'indole, e natura di quel dato rispettivo suolo; conciossiachè egli sia certo, che gli alberi vengano su, e fanno la lor crescita perfetta in periodi di tempo sommamente differenti, in proporzione della pro-

fondità del suolo, in cui trovansi radicati; e questo, siccome egli è per altra parte, non interesse dello stato, il soffrire, che gli alberi non vengano atterrati, o tagliati, se prima non sono arrivati alla loro perfetta grossezza, e fermezza, e solidità, così egli si è ugualmente certo, che poichè gli alberi son giunti al punto massimo di lor piena crescita, anzichè farsi migliori, e più perfetti, piuttosto danno indietro, e peggiorano gradatamente.

La qualità del suolo, in cui l'albero trovavasi radicato, dee necessariamente per simigliante faccenda essere osservata, e questo può farsi agevolissimamente; ma la quantità, o profondità di esso suolo è il gran soggetto, sopra di cui far dobbiamo le nostre ricerche; e numerosissime osservazioni hanno fatto vedere, che la stagione più propria per venire al taglio delle querce in un suolo della profondità di due piedi, e mezzo, si è sull'età di cinquant'anni d'ella quercia; quelle, che hanno allignato, e stanziano in un suolo profondo tre piedi e mezzo, non vogliono esser tagliate prima dei settant'anni di loro età; e quelle, che son radicate in un suolo profondo quattro piedi, e mezzo, od anche di vantaggio, leguiteranno a crescere sì in mole, o grossezza, che in bontà, e perfezione fino al cento, e più anni. Ed ha fatto l'osservazione toccar con mano, che dopo i divisi vari periodi gli alberi cominciano a dare indietro, ed a patire.

Sembra questa la regola migliore per stabilirli in rapporto ai suoli, o terreni comuni; ma quegli alberi, che vengono su, e crescono in un suolo più leggero superficiale, o più arenoso, possono avere i loro periodi murati dai divisi finora, ai quaranta, ai sessanta, ed agli ottant'anni nella maggiore profondità: e dopo questi fissati periodi sarà sempre cosa migliore il tagliare i boschi dellinati pel pubblico servizio, o ne abbisogni il Pubblico, o non ne abbisogni; avvegnachè sia sempre molto meglio il conservarlo nei pubblici magazzini, che lasciandolo star sul terreno oltre i divisi tempi averlo intristito, imperfetto, e pregiudicato.

I tratti di paese assai caldi, ed altri luoghi incolti, ove non havvi crescita regolare di boschi, o d'alborei; ma dove sem-

bra

bra, che allignano, e regaiuo soltanto delle felci, delle tignamine, ed altre inutilissime piantarelle, vengono di pari a somministrare alcuni alberi erranti di quercia assai comunemente. Questi alberi hanno avuto, e riconoscono similmente l'origine loro con assai probabilità da ghiande scappate di bocca ad uccelli granivari; conciossiachè non essendo state tenute a coperto dalle ingiurie ed insulti del bestiame, vennero tutti al di sopra brucati, e scompaginati, mentre erano tenerelli, e così vennero a crescere tutti archeggiati, malmessi e di cotto pedale, oppure una specie di cepaja. Ma tuttochè questi dati alberi non sieno di ugual valore delle altre querce di perfetta crescita, e più regolati, nulladimeno meritano, che vengano avuta cura in rapporto al loro conservamento non meno, che riguardo al loro taglio; conciossiachè vengano da questi somministrata una quantità d'alberi piegati, ed archeggiati naturalmente, e per conseguente formati, e nati fatti per pezzi di fabbrica da bastimento.

La scarsa cura che comunemente vien presa di questi alberi, tutto che in questa occasione particolare sieno di sommo, ed imprezzabil valore, sembra, che ne induca una perdita universale; ma siccome alberi, così di per sé, e naturalmente archeggiati, e piegati, sono di valore; così farebbe un'assai lodevole tentativo quello d'investigare un particolare metodo per fargli crescere, e venir su naturalmente tali; e questo è agevolissimamente praticabile, con tenere quei metodi medesimi, con i quali questi da noi descritti alberi selvaggi divengono tali. Riconoscono questi totalmente, ed intieramente la figura loro, dal rosciare, che loro ha fatto il bestiame le loro vetterelle, allorchè erano teneri piantoncini, e dopo dall'esser loro stati rotti, e portati via i loro germogli rimessi di nuovo dalla loro ferita stessa. In sì fatta maniera, le venga piantato a parte un dato numero di piantoncini per tale esperienza, e che vengano loro scorovate le loro vette, a due, a quattro, a sei, a otto, ed a dieci, ed anche dodici piedi di distanza dal terreno, e che poi vengano troncati via dissimilmente pel tratto di quattro braccia i germogli, o talli da queste

vette medesime scoronate, o mozzate, verremmo a trovare, che questi alberi verranno su, e cresceranno colla medesima irregolarità archeggiati più di quello anche possa altri immaginarsi; e per sì fatto mezzo può esser trovata una quantità di materiali di legname ottimo naturalmente piegato ed avere per cotai via un perfectissimo assortimento di legname da bastimenti con una facilità infinitamente maggiore, e con più certezza di quello ci possa somministrare il metodo proposto da certuni, di pigargli, vale a dire, all'ingù coll'attaccare dei pelli alle loro vetterelle allorchè son giovani, e nello stato di teneri piantoni.

Quanto al supplimento, o riempiazamento de' giovani alberi, in luogo di quelli, che sono stati atterrati, e tagliati per uso, vi sono alcune circostanze, le quali non sono state osservate, e considerate, quanto si meriterebbono pel vantaggio sommo, che da esse dipende. Le brinate della Primavera, che ne vengono appunto in quel dato tempo, in cui i rampolli, co' quali la Natura dee supplire, e riempiazare quel legname, che è stato atterrato, dispongonsi a crescere, arrecan loro un danno tanto grande, che non è così in un subito concepibile; nè fanno lor male minore queste brinate, di quello facciano alle gentili, delicatissime piante germoglianti degli Orti, e dei giardini, tuttochè il disamore della successione nel proprietario, e comunemente altresì la distanza del luogo, e la mancanza di ripetute osservazioni, facciano sì, che questi danni non vengano concepiti. Eppure questo male può essere in grandissima parte riparato. Le frequenti esperienze, e le ripetute osservazioni, provano, che i danni prodotti da queste brinate di Primavera danneggiano quei rampolli, che trovansi esposti a mezzogiorno in un grado molto maggiore, di quello danneggiano quelli, che trovansi ad aspetto di Tramontana; e quello urto è sommamente più energico, e farà pregiudizio maggiore a quei tali germogli che trovansi esposti al vento, che a quelli, che troverannosi ombra. Conosciute similanti circostanze, possi benissimo rintracciare il metodo di salvarle per lo meno una gran parte del legname da taglio da questa distruzione nei suoi rampolli, con farla una regola, che debbansi

tagliare dalla fiancata di Tramontana; e siccome tutto il taglio è opera di più anni, gli alberi, che rimangono per ogni stagione, verranno a difendere i tenerissimi rampolli, che gitteranno nei nuovi potamenti fatti, nella Primavera seguente, non solo dall'esposizione meridionale, ma serviranno loro altresì di riparo contro il vento.

Parecchi prudenti, e savj proprietari sono stati fatte delle assai buone entrate delle loro boschaglie da taglio, con farne regolarmente tagliare cadaun anno una certa data porzione, e col provvedere un rifondimento pel primo taglio, contro il taglio dell'ultima porzione, e ciò con proporzionare il tempo della crescita alla quantità, che ogni anno dee esser tagliata: ed importa assaiissimo, ed è di un sovrano vantaggio al proprietario l'esser certificato della verace crescita del legname in sì fatta maniera.

Chiunque farassi a considerare la crescita dei piantoni, o giovani alberi, troverà, come la crescita del second' anno è assai più considerabile di quella del primo: quella del terzo anno è maggiore di quella del secondo, e che in somma così questa faccenda cammina per parecchi anni. Le prime crescite dei giovani alberi sono grandemente considerabili cadauna stagione per un certo dato tempo, od età dell'albero, dopo del qual termine l'ingrossamento dell'albero stesso, e la sua ulteriore vegetazione, comincia a camminare a passi più lenti, e ciò avviene gradatamente. Il massimo vantaggio che dalle boschaglie altri ricavar potrebbe, dovrebbe principalmente consistere nel ben conoscere questo interessantissimo periodo, ed allora afferrarlo, nè dipartirne giammai facendo atterrare, e tagliare costantemente gli alberi, allorchè sono appunto giunti al termine, o punto di loro vigorosa crescita; e così lasciando la Natura in piena libertà di operare intorno ai nuovi talli, o rampolli, nei quali per tal modo verrà la medesima ad impiegare il vigore medesimo, che impiegava nell'albero maestro, e così arricchire il proprietario. La sola osservazione, ed esperienza regolare può accertare di questo felice periodo; ma qualunque persona, la quale possiga nelle sue proprie possessioni quantità grande di boschaglie, può agevolmente assicurarsi di questo, con farne tagliare cia-

Suppl. Tom. III.

scun anno una data quantità per successivi dieci anni, ed allora farsi ad esaminare di bel nuovo le differenze dell'annuo prodotto. Veggansi *Memoires Acad. Roy. Paris* ann. 1739.

Consistenza, e forza del Legname. Il celebratissimo Monsieur de Buffon ha tentato un calcolo razionale della consistenza, e consistenza del legname messo in opera nelle fabbriche, sopra i principj dell'eccellente sua dimostrazione della crescita degli alberi. Veggasi l'Articolo LEGNO.

Ha questo valentuomo provato, come tutto il legno è composto di una data serie di coni legnosi dilesi in istrati, o letti di pari legnosi per tutta la lunghezza dell'albero, e connessi, e collegati da una specie di lavoro reticolare di una consistenza molto minore della loro propria sostanza. Quindi Monsieur de Buffon inferisce con somma drittura di mente, che allora, quando in qualsivoglia specie di legno vi sono più di quelli coni, i quali fanno mostra di sè in altrettanti circoli concentrici in una sezione trasversale del legno, e per conseguente più di quelle divise più deboli sostanze retate, che gli legano, e connettono insieme, di modo che for' è, che di necessità il legno sia più debole, e più diletigine di quel tal legno, in cui, in un'eguale grossezza, trovansi questi coni in minor numero, e per conseguente trovansi negli interstizj minor numero di queste più deboli retate sostanze.

Se le irregolarità della struttura del legno fossero soltanto queste, agevole sarebbe il calcolare dalla forza, e consistenza da un bastone del diametro di un dito, di qualsivoglia legno, quale farebbe la forza, e consistenza di una trave del legno medesimo, e di qualsivoglia data grossezza, o diametro; ma la faccenda va tutt'altramente; conciossiachè la disposizione dei coni, dei letti, o strati, e della materia trovantesi infra gli spazi, non è in conto veruno la medesima in un grosso tronco, o trave, formato da un legnaioolo, od altro artefice, che quella si sia di un piccolo ramo nello stato naturale di sua crescita.

Questo viene agevolissimamente a concepirsi, allorchè noi ci facciamo a considerare, che per fare una trave dal legno,

C c

ri-

riquadran gli artefici una parte, o lato dell'albero, od un suo ramo eziandio, e troncano via dal medesimo quattro pezzi cilindrici di quella sostanza che addimandasi il bianco dell'albero. Ora il cuore del legno trovasi, e stanziato nel mezzo del trave: è quello il primo letto, o strato legnoso, che successivamente viene ad essere coperto da tutti gli altri, in forma d'altrimenti circoli concentrici. Il maggiore di questi medesimi circoli concentrici è del diametro di tutto il pezzo del legname allora tagliato, ed i circoli, i quali naturalmente lo falciano, e lo circondano, non sono guai perfettamente più lunghi, ma vengono soltanto a formare porzioni di circoli, che vanno diminuendosi per ogni, e qualunque verso alle costole della trave, e del tronco. Un tronco nella divisura guisa riquadrato è adunque composto di un compiuto pezzo cilindrico di duro, stabile, e consistente legno, e di quattro porzioni angolari, tagliate fuori da un legno, molto meno solido, e consistente. E questa la condizione di un tronco riquadrato fuori da un grosso braccio di un'albero, e stretto a un dipresso del diametro di questo braccio; ma un tronco di famiglia... e grossezza tagliato fuori del tronco di un albero più grosso, o fuori di uno dei lati di un sì fatto tronco, è una cosa sommamente differente, ed è soltanto composto di segmenti longitudinali dei letti, o strati legnosi annuali; ed alcune siate questi stessi segmenti discono paralleli ad una delle superficie del tronco, ed alcune volte più, o meno inclinati o ad uno o ad altro lato: sono questi similmente talvolta più lunghi, e tal'altra più corti: ed alcuna volta più, alcuna volta meno, tagliati per entro i letti, o strati legnosi del tronco dell'albero, dai quali furono tagliati, e per conseguente secondo questa data proporzione il trave viene ad essere più, o meno forte.

Hannovi similmente in un tronco due porzioni, una delle quali è molto più forte, e consistente dell'altra; conciossiachè questi segmenti dei letti, o strati legnosi dell'albero formano altrettanti piani paralleli. Se voi collocherete il tronco in una tal posizione, che questi piani rimangano in una direzione verticale, quello resisterà ad una forza molto maggiore di

quello che se questi piani fossero collocati orizzontalmente nella posizione del tronco.

Da queste osservazioni ella è cosa agevolissima il vedere con quanto gran fallacia i calcoli, e le tavole della forza, e consistenza delle varie spezie di legnami, s'ora è che vengano formate, mentre gli Autori hanno composto, e fondato tutti i sistemi loro sopra esperienze fatte sopra pezzi del diametro di uno, o di due dita al più, nè sonosi presi la menoma briga, o pensiero d'investigare nè nel numero, nè nella disposizione dei letti, o strati legnosi di questi dati pezzi, nè hanno tampoco esaminato le direzioni, nelle quali i parecchi letti, o strati medesimi si trovavano, nel rompergli. Quelle pertanto son circostanze infinitamente necessarie, ed essenziali: nè sono quelle le sole variazioni, le quali da questi Autori sono state lasciate senza essere osservate; avvegnachè ve ne abbiano peravventura altre di pari trascurate in tutti i similgianti tentativi, e disamine, e che sono niente meno necessarie, e niente meno essenziali, come quelle, che riconoscono di un'uso reale. Il legno giovane ha sempre minor consistenza, e nerbo di un legno più vecchio, ed havvi una differenza grandissima fra i pezzi tagliati da una sommamente sana porzione del corpo di un'albero, e quelli tagliati dai rami giovani dell'albero stesso. Un pezzo tagliato dalla parte esteriore del tronco di un'albero vicino al falso bianco dell'albero medesimo, è similmente molto più debole, e dilagino, di un pezzo di uguale diametro tagliato dal centro, o cuore dell'albero stesso. L'è differente, ed altresì il diverso grado d'asciuttezza nel legno, produce similmente delle enormi differenze reali, rispetto alla sua consistenza, e forza; avvegnachè un ramo verde di un'albero sia sempre, e costantemente più siso, e più resistente ad esser rotto, di quello sialo un ramo secco. Ed il tempo impiegato nel porre il legno sotto il cemento, ed alla prova rispetto alla sua stabilità, e forza, è di pari una circostanza sommamente necessaria, e da essere in ogni modo diligentemente osservata: conciossiachè un tronco di legname, il quale sostenterà un certo dato peso pel tratto di pochi minuti, non lo sostenterà peravven-

ra per altrettante ore; ed ha l'esperienza fatto toccar con mano, come il legno porterà bene spesso per un breve tratto di tempo quel dato peso, che non porterà in conto veruno per un tratto di tempo più lungo; avvegnachè siasi veduto, come un tronco ha sostenuto un certo dato peso per un giorno, e che il legno medesimo in capo a sei mesi si è rotto, e sfanciato, facendolo reggere soltanto la terza parte del peso, che la prima volta sostenne pel tratto di un'intera giornata. Si tocca con mano per le divise osservazioni, come tutti quei calcoli, nel formare i quali sono state queste considerazioni, o trascurate, o non avvertite, possono esserci di una grandissima incertezza, e che il formare per lo contrario dei calcoli in sì fatta materia, che sieno in qualche proporzione sicuri, ed accertati, si è un lavoro di somma malagevolezza.

Siccome però i vantaggi, che risultano da simili calcoli sono infinitamente più preziosi, e da farcene conto, di quello sieno le difficoltà, che gli accompagnano, così questo Valentuomo animossi a continuare le sue ricerche, ed i suoi esami con ogni maggiore impegno, ed intenzione.

Procurò egli pertanto, che certi dati pezzi di legno venissero rotti da una forza determinata, e calcolando, secondo questa, quale dovrebbe essere la forza per rompere tali pezzi, che fossero di questi molto più grossi; diedi poscia a sperimentare quale fosse la forza reale, che effettivamente gli romperebbe, e di quanto i suoi calcoli s'approssimassero al vero; ed in questo ebbe il Valentuomo similmente a trovare delle estremamente grandi differenze, fra il calcolo, e la realtà del fatto: e dopo molte, e molte ripetute esperienze, non gli venne mai fatto di ridurre la realtà della cosa ad alcuna comportabile vicinanza del calcolo medesimo. E facendosi a porre sotto la prova altri pezzi di legno di maggiori grossezze, e lunghezze colla regola medesima, in proporzione sempre al pezzo proposto per modello di prova, venne costantemente a trovarne i calcoli di pari, che per l'avanti, difettosi, ed incoerenti. Il non dar egli mai nel legno in questi suoi cimenti, determinollo adunque ad imprendere un compiuto corso, o se-

rie di esperienze, dalle quali esser potesse stabilita una certa Tavola della forza, che richiedessesi per rompere differenti spezie di legno; alla qual tavola non meno esso, che il Mondo tutto ricorrer potesse alle occasioni. E questa ei l' eseguì da prode nell'appresso maniera:

Eccesi pertanto Monsieur de Buffon a scegliere in un certo dato pezzo di una delle sue proprie boschaglie un centinaio di querce, le quali erano tutte santissimi alberi, e di ugualissima crescita, e che si trovavano radicate l'una presso all'altra più comodamente, che esser potesse. Questa cautela venne usata, che il legno, cioè, fosse tutto di un medesimo suolo, da quel Valentuomo, perchè ben conosceva che gli alberi cresciuti, e venuti su in differenti terreni nella spezie medesima di legname, sieno di forza, e consistenza grandemente diversa; e che il non avvertire questa importantissima circostanza avrebbe potuto far prendere dei granchi a secco, ed avrebbe renduto inutile, e vano tutto il cimento. Queste querce erano tutte della medesima lunghezza; e quanto all'altezza esse erano dai due piedi e mezzo ai cinque piedi rotonde, o di circonferenza. A bella posta furono queste scelte di differenti crescite, o grossezze, affinchè le esperienze potessero accostarsi più d'appresso all'analogia delle usuali costumanze dei lavoratori di legname. Coneiossiachè allora quando un legnaiuolo ha l'occasione di mettere in opera un pezzo di legno di quattro, o cinque dita quadrate, ei non fallì per questo a tagliare un'albero, che gli potrebbe somministrare un pezzo di legno di quattro piedi quadrati, e ciò a motivo dell'inutile soverchia spesa: anzi costoro bene spesso hanno in costume di mettere in opera quei dati pezzi, che abbiano entro di sé una grossissima porzione di falso bianco. Non di rado, a vero dire, egli osano similmente dei travicelli, o correnti, cui essi legano fuori di grossissimi pezzi di legname; ma questi dati correnti, o travicelli sono sempre i più imperfetti, e peggiori di tutti gli altri; e nelle fabbriche d'vreb'essere onninamente l'uso di questi vietato; avvegnachè per simili lavori sia di vantaggio infinitamente migliore, e di bontà niente paragonabile il legname forte, o più minuto.

Siccome poi il grado di asciuttezza nel legno altera di lunga mano la sua forza, o consistenza; e siccome è similgiatamente malagevolissimo l'assicurarli con alcun grado comportabile di certezza, del grado di asciuttezza, o stagionamento del medesimo legname; avvegnachè due alberi tagliati in uno stesso tempo, troverassi spessissimo, come asciugarsi assai differentemente, così ebbe a sembrare a questo Valentuomo molto più preferibile il prendere per le sue esperienze, e cimenti il legno verde, che il prenderlo in qualsivoglia grado asciutto, o stagionato.

Gli alberi suoi adunque vennero atterrati l'uno dopo l'altro, e furono condotti in acconcio luogo: il giorno dopo l'atterramento vennero da i legnaiuoli riquadrati, e dai medesimi ne vennero di pari prese le loro giuste dimensioni; ed il terzo giorno i pezzi divisiati furono esposti alla prova; ed il metodo, che qui appreso si leggerà, fu quello, che venne tenuto in moltissime delle esperienze fatte da Monsieur de Buffon: - Furono presi delle validissime e gagliardissime capre di legno di sette dita quadrate, tre piedi alte, e tre piedi lunghe, e fortificate nel loro mezzo con un fortissimo pezzo di legname. Sopra queste due capre, o cavalletti vennero piantate le due estremità del pezzo di legno, che doveva esser rotto: avevanovi di pari in pronto parecchie campelle, od anelli di ferro quadrati, fatti di ritondo ferro lavorato, il maggiore dei quali anelli era largo nove dita, ed era fatto di un ferro di sette dita in circa; il prossimo a quello era largo sette dita, ed il ferro del quale era stato fatto era della circonferenza, o ritondo, cinque dita, e gli anelli sotto questi due, di pari di varj gradi.

Il pezzo di legno destinato per l'esperienza era stato fatto passare per questi anelli: il più grosso anello serviva per i pezzi più grossi, ed i più piccoli coerentemente per i pezzi di legno più sottili. Cadauno di questi anelli aveva nella sua parte superiore, e nel suo lato interno una costola affilata con tutta la maestria, della larghezza di due, o di tre decimi di un dito.

L'ufficio di questa si era l'impedire, che

l'anello venisse ad inclinarsi o da un lato o dall'altro, od in qualunque direzione, allorchè era messo in opera; e nella sua parte posteriore egli aveva due uncini di ferro della grossezza medesima dello stesso anello. Erano questi piantati ad una tal distanza l'uno dall'altro, che venissero come a formare un altro anello di un diametro di nove dita in circa, entro del quale dovevavi esser piantata una chiave di legno del diametro medesimo, e della lunghezza di quattro piedi. Questa chiave carreggiava seco una fortissima tavola, o tavolone lungo quattordici piedi, e sei piedi di largo, ch'era fatto di correnti, o travicelli della grossezza di cinque dita l'uno, incassati maestrevolmente l'uno dentro l'altro, e bene assicurati da gagliardissime sbarre, o traversi di legno. Questa rimaneva sospesa all'anello per mezzo d'una grossissima chiave di legno, e serviva per collocarvi sopra i pesi: Composti erano questi pesi di tre centinaia, o cantara di pietre riquadrate, le quali tutte erano numerate, e pesate, e cadauna d'esse era dalle venticinque alle dugento libbre di peso. Queste pietre venivano posate sopra il tavolone, e tutto per lo lungo della tavola medesima era collocato un mucchio di pietre, che potessero mettersi via via secondo il bisogno per rompere il pezzo di legno del cimento.

Venivavi sempre mai presa cura grandissima nel procurare, che tanto le capre, o cavalletti sopra descritti, che il pezzo da sperimentarsi, si trovassero in un livello perfettissimo; e ciò ottenuto venivano queste capre fissate validissimamente, per impedire il loro slogamento. Otto persone trovavansi perpetuamente impiegate in riempir la tavola, e queste cominciavano dal piantare i pesi nel centro, e questi pesi, prima di dugento libbre, poi di cento-cinquanta, e quindi d'un centinaio, e così finalmente ponevano quelle, che pesavano sole venticinque libbre. Due uomini stantisi sopra un palco, sospeso in aria a forza di corde, andavano ponendo su i pesi di cinquanta, e di venti libbre; la qual cosa nun sarebbersi in altro modo potuta fare, senza manifesto pericolo, che questi operaj rimanessero morti, come fuol dirsi, alla schiaccia: altri quattro uomini

LEGE-

tenevan fiffi i quattro cantoni del tavolone, affinchè non dimenasseli; ed un altro con lungo regolo di legno andava segnando quanto il pezzo del legno andasse piegandosi, e cedesse via via, che i destinati a far ciò andavano mettendo su i pesi; mentre altr' uomo segnava il tempo, e scriveva il peso, il quale assai spesso ascendeva a venti, a venticinque, ed anche a venticette mila libbre.

Il valentissimo Monsieur de Buffon procurò, che nella divisa maniera fosser rotati oltre cento pezzi di legno: alcuni di questi pezzi in travi regolarmente riquadrate, altri in correnti legati fuori di grossi tronchi, oltre trecento stanghe; e questo grandissimo numero fu a mala pena sufficiente per somministrare una scala regolare della forza, e resistenza del legname, in proporzione alle sue lunghezze, ed alle sue grossezze.

Osservò questo valentuomo, come un grosso pezzo di legno non si poteva spezzare, se prima non dava segno di ciò fare: che un legno verde si spezza con maggior difficoltà, che un legno uguale asciutto; ed in generale, che una tal forte di legno, che avesse una qualche elasticità, resisteva più che un altro, che non ne possedesse alcuna porzione. Il bianco del legno, il legno dei rami, quello della vetta dell'albero, ed in generale tutto il legno giovane è sempre più debole di quello, ch'è più vecchio.

La forza o consistenza del legno non trovasi in conto veruno proporzionata alla sua grossezza; ed un pezzo di legno, che sia due volte, ed anche quattro volte più grosso di un altro della medesima lunghezza, è molto più di due, o di quattro volte della sua forza: come, a cagion d'esempio, non richiederebbono intiere quattro mila libbre di peso per ispezzare un pezzo di legno lungo dieci piedi, e quattro dita quadrato; e nulladimeno ve ne vorranno dieci mila per ispezzare e rompere un pezzo di una misura il doppio di questa: e per rompere un pezzo quattro volte maggiore della medesima accennata misura, vorranno venti mila libbre di peso, ch'è quanto dire, per rompere un pezzo di legno lungo dieci piedi, e grosso otto dita quadrato.

L'osservazione medesima torna di pari egregiamente bene in riguardo alle differenti lunghezze non meno, che alle varie grossezze. Ci fanno sapere le leggi delle Meccaniche, come un pezzo di legno della lunghezza d'otto piedi dovrebbe portare a capello il doppio del peso, che porterebbe un peso di sedici piedi. Ma l'esperienza ci fa qui similmente toccar con mano, come il mezzo della lunghezza di otto piedi, conduce molto più del doppio dell'altro di sedici &c.

Quel legno che cresce, e vien su vivacissimo, supponendo sempre il terreno il medesimo, è sempre, e costantemente il più forte. Quello, ch'è venuto innanzi stentatamente, ed a bell'agio, ed i circoli annui del quale, ch'è quanto dire i suoi con i legnosi, sono sottili e dilegini, e magri, è sempre, e costantemente più debole di quello sialo un legno, i cui legnosi con, od annui circoli sieno più faticci e più grossi.

La forza, o consistenza del legno è proporzionabile al suo peso; ed un pezzo di legno della lunghezza, e della grossezza medesima di un altro, ma che a un tempo stesso sia dell'altro più pesante in un grado considerabile, viene similmente sperimentato più solido, e più resistente, e ciò ad un di presso nella proporzione medesima. E' questa un'osservazione di conseguenza non mezzana; e siccome il peso generale del legno è agevolmente conosciuto, così ci può di molto diminuir la spesa della soverchia copiosa quantità di legname nel fabbricare, di pari che il pericolo, che cagionerebbe l'error massimo di metterne in opera soverchio poco.

Questo accuratissimo Osservatore non omette di dire, che alcuni potrebbero immaginare, che le sue Esperienze sieno inconcludenti, perchè il legname, cui egli spezzò, trovavasi alle sue estremità sciolto, e che in una muraglia, od in una fabbrica trovassi questo legname per lo contrario fissato, ed incastrato ad ambe le sue medesime estremità. Ma egli osserva, come la differenza di quella circostanza non merita la menomissima considerazione; avvegnachè il pezzo fissato nel muro è soggetto a piegarsi e far corpo nel mezzo, prima ch'ei si rompa; e che le fissure non hanno

hanno in conto veruno forza di ritenere le estremità , quando elle vengono ad essere scosse da questa forza .

Questo Valentuomo non si curò di prender contezza di alcuni pezzi , che avevano de' mancamenti , come in fatti ne avevano parecchi di quelli , cui egli elpose al divisato cimento , e che si spezzarono con una porzione molto minore del loro assegnabile peso , ma ridusse soltanto le sue osservazioni , ed i suoi raziocinj a quei tali pezzi , che eran sani , perfetti , e di tutta l'adequata fermezza , e resistenza .

Potrebbe altri farsi a supporre , che un numero così grande d'esperienze , quali quelle si furono , e fatte in un soggetto così agevole e piano , non lasciasse che desiderar di vantaggio nell'aver intorno a ciò sicurezze accertatissime : ma l'ingenuo dottissimo Autore medesimo dispense , e volontariamente confessa , come vi rimane per molto da essere investigato , e conosciuto . La porzione della forza longitudinale del legno alla sua forza trasversale è un soggetto , che merita d'esser grandemente investigato : avvegnachè il legname nelle fabbriche viene bene spesso messo in opera in posture , e direzioni sommamente diverse , ed ove la forza agisce sopra il medesimo non trasversalmente , ma assai sovente per lo lungo , ed anche in direzioni oblique , così sarebbe onninamente di mestieri , se fosse possibile , il rimanere anche di questo accertati , che noi siamo nè punto , nè poco . Veggansi *Memoires Acad. Roy. Scienc. Paris* , ann. 1740 .

Stagionamento del legname . E' questa una maniera d'esprimerli de' nostri fattori campanoli per esprimere la preparazione del legname dopo che è stato tagliato , per lavorarlo poscia , e farne le usuali maniffature .

Tutto che gli alberi da legname da lavoro sono stati atterrati , vorrebbero esser distesi , e collocati in alcun luogo asciutto , e dominato dall'aria , ma disto dal soverchio asolare , e sfoliare impetuoso dei venti , o dalla sferza gagliarda del Sole , il quale , allorchè batte con soverchio polso , e forza , produce nel legname medesimo degli screpoli , e degli aridumi . Non dovrali mai questo legname collocare verti-

calmente , ma sieso per lo lungo in una situazione orizzontale , ponendo un'albero sopra l'altro , e basterà soltanto , che vengansi incastrate sotto fra albero , ed albero delle biette , o pezzetti di tavola per dar adito all'aria , che abbia libero perentro i medesimi il varco , e così venga ad impedire , che si muffino , lo che farebbe marciare la supetficie degli alberi stessi , e v'ingenererebbe dei fuoghi . Certuni sogliono tutt'al' intorno inzavardare questi alberi tagliati di sterco di vacca , e questa inzavardatura fa sì che s'asciughino , e seccinfi ugualmente , e ciò , che è assai più considerabile , viene ad impedire di pari che si spacchino , o che saccianfi in essi degli screpoli , al qual difetto sono altrimenti assai sottoposti .

Vorrebbero alcuni , che il legname da lavoro venisse posso sotterra , e pretendono , che questa sia la maniera migliore di stagionarlo . Altri poi ci assicurano d'aver trovato un'eccellentissima foggia di conservare a maraviglia intatto il loro legname con sotterrarlo fra le biade nei loro granaj : ma questa non può esser ridotta , siccome le altre , ad una pratica universale .

Nella Norvegia stagionar sogliono i loro tavoloni legati , col tenergli per entro l'acqua salata per lo spazio di sole tre , o quattro giornate , quando questi tavoloni sono legati di fresco ; e dopo di ciò gli fanno seccare al sole : questo viene sperimentato per un loro sommo vantaggio ; ma nè questo metodo , nè qualunque altra cosa , che immaginar mai si possa , può impedire il difetto loro di screcciarsi .

Lo stagionare il legname per mezzo del fuoco , è il metodo degli altri tutti il migliore , per farne poscia travetti , o colonnini , od altri somiglianti pali , o pezzi , che debbono starsi sotterra , o sott'acqua . I prodi Veneziani furono i primi a rinvenire quest'ottimo metodo , e la maniera , che da essi in ciò vien tenuta , è l'appresso :

Pongono essi adunque il pezzo di legno , che dee essere stagionato , sopra una fortissima , e sommamente violenta fiamma ; perentro a questa fiamma , per mezzo di certo ordigno vanno rivoltolando continuamente questo medesimo pezzo di legno ,

e tirarlo fuori della fiamma soltanto allora, quando veggiono, che è tutto all'intorno, e per ogni verso coperto d'una specie di crosta nera come il carbone. Per similante mezzo la parte interna del legno viene ad indurirsi per sì fatto modo, che nè l'acqua, nè la terra può di un menomo che pregiudicarle per un lunghissimo tratto di tempo dopoi. Similante metodo vien praticato in parecchi altri luoghi sull'esempio dei Veneziani per illaginare i legnami per le palizzate dei parchi, e per usi fomiglianti. Si fatto metodo poi vien fatto vedere ottimo, ed inarrivabile anche da questo, che nelle più antiche rovine, che mai sienosi al mondo, sono stati trovarsi de' grossissimi pezzi di carbone, senz'essere di un menomissimo che danneggiati, tutochè sienosi rimasi sotterra per numero così vallo di intiere Etadi. Veggasi *Mortimer*, della Coltivazione. Volume 2. pag. 132.

Allorchè il legname è stato nelle dicciole, e proprie forme tagliato, e stagionato coll'esser tenuto esposto ad un certo dato grado d'aria, e di sole, havv'ezian-
dio un'altro metodo di conservarlo tale molto migliore che per mezzo di qualsivoglia esteriore applicazione. Quando questi legnami sono lavorati, e filati nei loro rispettivi luoghi, è stato sperimentato grandemente proficuo l'inzavardarli ben bene per ogni verso con della pece liquida, oppure con dell'olio di semente di lino. Gli antichi, e massimamente Esiodo, e Virgilio propongono l'asciugare al fumo tutti gl'istrumenti fatti di legno, col tenergli appesi a quei cammini, ove s'ardono delle legne. Tutto il vantaggio, e beneficio prodotto da questo, sembra che nasca dall'olio del legno, che è abbrugiato, il quale va insinuandosi entro le porosità dell'altro legno appeso sopra sè via via, che vien portato su dal fumo. Ma sarebbe un molto più netto, e più agevole metodo quello d'applicare a questa sostanza dell'olio tutto in una volta, ed in quella quantità, che verrebbe riputata adeguata, e bastevole. Veggasi *Mortimer*, della Coltivazione, vol. 2. pag. 104.

Gli Olandesi, che hanno del legname intorno alle loro Cataratte, ed anche intorno ad altre loro fabbriche piantate so-

pra l'acqua assai più esposte alle ingiurie dell'umido, e delle stagioni di qualunque altro luogo, che noi sappiamo, o possiamo immaginarci, hanno una maniera di conservarlo intatto per lungo tratto di tempo, coll'incamiciarlo, od incrostarlo tutto al di sopra con una mistura di trementina, e di pece liquida, colla quale ne inzavardano, od intridono tutta la superficie; ed immediatamente, mentre si trova umido, lo gittano in un dato luogo, ove trovili quant'è grande d'arena, e di polvere di gusci di testacei, buona porzione della qual materia rimansi per similante modo a questi legni attaccate. Così viene ad essere tutto al di sopra incamiciato, ed intonato d'una ruvidissima crosta valevolissima a farlo far testa a qualsivoglia unto, od ingiuria. Veggasi l'Articolo ZOLFO.

Taglio del Legname. Veggasi l'Articolo TAGLIO.

Indurimento del legname. Veggasi l'Articolo INDURIMENTO del legname.

LEGNE minute. Nel tagliare le legne minute, o legne basse delle boschaglie da taglio, allorchè le stoppie sono grandi, come scope, ginestre, stignamiche, ginepri della specie bassa, e somiglianti, queste vorrebbon'essere non troncate, ma bensì disbaricate, avvegnachè queste prendansi un tratto grande di terreno, e per lo contrario gittan fuori pochissimi rampolli, ed i loro serepoli disannansi in acqua che d'ordinario gli fa perire. Il disbaricare queste legne minute vorrebbe esser effettuato nella Invernata, e quegli spazi, che queste legne lasciano vuoti, vorrebbon'esser to-
stamente rimpiazzati con dei piantoni d'alberi da crescita, altramente un lungo ramo d'alcun albero circonvierno può esservi gittato sopra, e somministrerà incontinente un sufficiente rinfondimento di sugo pel luogo medesimo.

Nel tagliare le legne basse, sarà sempre ottimo consiglio quello di lasciare un bastevol numero di piantoncini. I migliori di questi potranno esser levati via, od atterrati nel prossimo taglio, massimamente, se alcuno di questi venga su in vicinanza di un grande albero, che sia a portata d'esser atterrato nella prossima ventura stagione, avvegnachè questi piantoni

ni possono esser distrutti agevolmente dalla caduta del medesimo albero grande. Quando gli alberi trovansi nella loro piena crescita, danno parecchi segni del loro dare indietro, ed intristire, come a cagion d'esempio, l'imbianchirsi, ed il seccarsi dei rami delle loro vette; il grondar, che fanno delle goccioline d'acqua dai loro nocchi, il loro esser vuoti, e scoloriti, ed il loro gittar fuori picciolo numero di rampolli. Se il picchio col suo becco fa dei fori nel corpo dell'Albero, egli è un pessimo legno; e secondo le apparenze di uno o di più di questi sintomi, farà sempre ottimo consiglio l'atterrar l'albero prima, che vada di male in peggio, come indubitatamente farà, se lasciassi tuttavia radicato nel terreno. I grossi ed assai ramosi alberi, che prendono grandissima area nei boschi di legname da taglio, riescono bene spesso di maggior danno al proprietario, anzichè di vantaggio, come quelli, che fanno andar male parte massima del legname basso loro sottoposto col loro gocciolare.

Fa di mestieri, che i padroni di queste boschagie sieno sommamente guardinghi, e diligentissimi, allorchè tagliano il bosco, standosi ad occhi veggenti, per osservare quali alberi di essi debbano lasciare per crescita, avegnachè quasi mai non fallino i Compratori, se s'evengano lasciati fare, d'atterrarne alcuni di essi. Veggasi *Morimer*, della *Coltivazione* Volume 2. pag. 69.

LEGNO. La struttura, e l'organizzazione del legno è un soggetto, intorno al quale molti e molti hanno i lor penlamenti impiegati; ma niuno peravventura vi si è occupato con maggior merito, e riuscita dell'assai famoso dottissimo Monsieur de Buffon, Membro della Reale Accademia delle Scienze di Parigi.

Osserva questo prode Gentiluomo, come l'organizzazione del legno è tuttora ignota in ogni, e qualunque delle sue parti; e che qualunque il mondo trovisi grandemente prelo, e riconosca sommo debito al Malpighi, al Grew, ed al Ha'cs, nulladimeno, allorchè dietti da dovero ad esaminare, ed a ponderare il soggetto, ebbe con sua meraviglia a trovarvi, come molto più si era, quello, che non era noto, che quello che si sapeva, e determinossi d'osservare dal suo primo stato la crescita,

e vegetazione degli alberi, e la formazione della loro parte legnosa.

Il seme di un'albero, supponi una ghianda, se venga posto sotterra di Primavera, viene a produrte indi a poche settimane un tenerissimo tallo, di una struttura erbacea, il quale va allargandosi, e stendendosi, ed indurendo gradatamente, e nella crescita del suo primo anno, ha decoro di sè un sottilissimo filamento di una sostanza legnosa. Nella estremità di questo giovinetto albero, o piantoncino, vedevsi formato un bottoncino, il quale nel prossimo anno s'apre in fogliami, e dal quale viene ad esser propagato un secondo germoglio in tutto e per tutto analogo, e somigliante a quello del primo anno, salvo, che questo secondo è più rigoglioso, s'estende di vantaggio nella sua crescita, e s'indurisce in un grado assai più considerabile. Questo vien di pari terminato da un bottone, o gemma somigliantissima a quella dell'anno innanzi, e dentro questa stessa gemma è contenuto il germoglio del terzo anno: ed in somigliante maniera va procedendo la crescita dell'albero fino a tanto che ei giugue ad acquistare tutta la sua altezza.

Cadauna di queste gemme, o bottoni, è una specie di seme quale racchiude in sè il rampollo dell'anno susseguente, appunto come il seme medesimo dell'albero contiene, e racchiude in sè il germoglio primo, o del primo anno: e la crescita di un'albero nell'altezza viene ad essere pertanto condotta innanzi, e continuata, e promossa, da una serie d'annue produzioni l'una all'altra elasticissimamente simili, ed analoghe, fino a che l'albero sia perfettamente, ed interamente cresciuto, tuttochè arrivi peravventura all'altezza di un centinaio di piedi, composta non d'altro che di un dato numero di costì alberi, che vanno legandosi, e congiungendosi all'estremità ad estremità, ed il più lungo de' quali non trascende la lunghezza di due soli piedi. Questi piccioli alberi dei parecchi anni non alterano giammai di un menomissimo che, nè la loro altezza, o lunghezza, nè tampoco la loro grossezza. Rimangonsi quelli in un'albero, il quale abbia ben anche l'età di cento anni, della loro lunghezza, e grossezza originale, nè soffrono il meno-

cambiamento, ma vanno soltanto divenendo più, e più duri. Quella pertanto si è la vera, e genuina maniera, colla quale gli alberi crescono in altezza, o lunghezza: ora dov'essi andare investigando, come i medesimi vadano crescendo in grossezza.

La gemma, o bottone, che viene a formare la vetta, o sommità dell'albero del primo anno, cava fuori, e prende il suo nutrimento della sostanza medesima di questo picciolissimo albero; ma i tubi, o vasi principali, i quali servono a condurre il succhio, trovansi piantati fra la buccia, ed il filamento legnoso poc'anzi descritto.

L'azione di questo medesimo succhio in movendosi viene a dilatare, e ad allargare questi vasi, mentre la gemma, o bottone, in alzando se stesso in crescita, va allungandogli; il succhio similmente in passando perpetuamente per essi lasciavi indietro certe parti filate, e faticce, le quali vanno accrescendo la solidità. Così il picciolissimo albero del secondo anno contiene nel suo mezzo, o centro un filamento legnoso, in forma di un cono allungato, che è appunto la produzione del legno del primo anno, ed un letto legnoso per esso, il quale è similmente di una figura conica, e che veste, e circonda per ogni lato il primo filamento, e lo trapassa rispetto alla lunghezza; e questa è appunto la produzione del secondo anno. Il terzo letto viene a formarsi in tutto, e per tutto analogo al secondo, e tutti gli altri, che d'anno in anno vanno formandosi, fanno ciò a norma della Legge medesima, e secondo l'istessissimo ordine, e vanno inviluppandosi l'uno l'altro in una successione, o serie continuata, di modo che un'albero di piena crescita viene ad esser formato di un dato numero di conigli legnosi, i quali ripiegansi, cuopronsi, ed inviluppansi l'uno l'altro, via via, che l'albero va crescendo in grossezza.

Allorchè l'albero viene atterato, può chiechessia contare con ogni maggiore facilità, in una sezione trasversale del tronco, il numero di questi conigli, le sezioni dei quali vengono a formare altrettanti circoli concentrici; e l'età dell'albero viene similmente ad esser conosciuta dal numero di questi medesimi circoli, avvegnachè tutti essi trovansi l'uno dall'al-

Suppl. Tomo III.

tro separati, e disgiunti. In una rigogliosa, e ben'cresciuta quercia, cadauna di queste linee è della grossezza di una testa parte di un dito, od anche di vantaggio; e la sostanza di sì fatte linee, o circoli, è durissima, e formamente resistente; ma la sostanza del legno, che dice, o stanza infra esse linee, e che le congiunge l'una all'altra, è meno dura di assai. Questa materia frapolta, o di mezzo, è sempre, e costantemente la parte più debole del legno, e la sua struttura, ed organizzazione, è totalmente diversa, e tutt'altra da quella dei descritti conigli legnosi, e dipende interamente dalla maniera, colla quale questi stessi conigli vengono ad essere uniti l'uno all'altro. Quello viene ad essere per sì fatta guisa appianato.

I vasi, i quali sono disposti per lo lungo nel legno, e che conducono il nutrimento alla gemma, o bottone sopradescritto, non solamente vengono ad esser distesi, od allungati, ed induriti dall'azione del succhio moventesi e dalle faticce, e stabili particelle, che va depositandovi; ma eziandio essi vanno tentando sempre un'espansione di un'altra specie: son questi per lo lungo per ovunque si portano ramificati, e romponsi in innumerabili estremamente minuti filamenti, i quali spuntano da essi in foggia di altrettanti rami: questi per una parte sono destinati al producimento della buccia, o corteccia dell'albero, e per l'altra vengono ad esser congiunti, e connessi al legno dell'anno precedente, e vengono a formare infra i due letti legnosi una sorte di lavoro spungoso reticolare, il quale, allorchè è tagliato per traverso, eziandio nella massima grossezza, ci mostra delle picciole cavità, e fori senza numero, lavoro somigliantissimo ad una trama, o merletto. I letti legnosi pertanto rimangono uniti l'uno all'altro da una specie di rete: questa rete però non viene ad occupare a capello lo spazio dei circoli legnosi, che la disgiungono, o dai quali è disgiunta, ed è, a vero dire, ordinariamente la sola stessa parte incirca di loro grossezza. Questa grossezza è pressochè a capello la stessa in tutti gli alberi della specie medesima; dove per lo contrario i letti legnosi variano rispetto alla loro grossezza in essi

D d gra-

grandemente; avvegnachè nella quercia ravvisasi dalla testa alla quarta, e per fino della ventesima parte di un dito.

Per simigliante pianissima esposizione della tessitura del legno ella si è cosa sommaramente agevole il rintracciare, come bisogna di necessità, che la coerenza longitudinale delle particelle di esso legno, sia grandemente maggiore di quello sialo la trasversale. Altri vede simigliantemente, che nei piccoli pezzi di legno, come in una slanghetta, o regolo, a cagion di esempio, della grossezza di un dito, se vi abbiano quattordici, o quindici dei divisi letti, o strati legnosi, farannovi altresì trenta, o quaranta di questi spazi frammezzanti; e per conseguente, che sarà grandemente più debole, di quello farebbe, qualora in questo medesimo legno vi fossero soltanto cinque, o sei di questi letti, o strati legnosi, e per conseguente nulla più, che quattro, o cinque di questi stessi spazi frammezzanti.

Può simigliantemente essere osservato, che in queste piccole slanghetta, o regoli di legno vi sono due, o tre dei divisi letti legnosi feriti, od intaccati, lo che avviene assai volte: la forza, e consistenza della slanghetta, forz'è, che quindi sia di necessità grandemente diminuita: ma la pecca, o difetto massimo, al quale questi piccoli pezzi di legno sono soggetti, si è la disposizione differente di questi letti nelle differenti parti del medesimo albero; questa differenza è grande a segno, che la forza, o resistenza e stabilità di una grossa trave di qualsivoglia legno, non può essere in conto veruno dalla proporzione computata sopra di quella di un picciol pezzo del legno medesimo: la qual cosa, a vero dire, qualora fosse possibile, renderebbe assai piani, ed agevoli i calcoli di questo genere. L'ingegnossimo Autore di questo Trattato si è quindi fatto a calcolare la forza, e resistenza del legname, che vien messo in opera nelle fabbriche. Veggansi *Memoires Acad. Roy. Scienc. Paris* ann. 1740. Veggasi di pari l'Articolo LEGNAME, qui sopra.

Tutte le specie del legno debbon'esser conservate dai vermi, o tarli, e da parecchie altre cose, che s'agionar possono il

loro andar male, e perire, per mezzo di sostanze oleose, e massimamente con gli oli essenziali de' vegetabili. L'olio di pino è in sovrano grado eccellente; e l'olio di ginepro, di trementina, o qualsivoglia altro olio di specie somigliante, serviranno tutti ugualmente bene per tale effetto. Questi oli manterranno sane, ed intatte le tavole, gli istrumenti di legno, e simiglianti, ed impediranno, che vengano a pezzi, e brani divorati da questi tarli, o vermi; e l'olio di semenze di lino, produrrà di pari il buon'effetto medesimo in moltissimi casi: non è impronabile, che servir possa ugualmente bene a ciò anche l'olio di noce, e quello di olio più soave, e dà una vernice, ed un lustro assai migliore al legno medesimo. Veggasi *Mortimer*, della coltivazione, Vol. 2. pag. 105. Vegg. di pari l'Articolo LEGNAME, qui sopra.

Da alcuni paesi dell' Indie Occidentali vieni somministrata una forte di legname, il quale, se venisse a corrispondere quanto alla grossezza, sarebbe senza paragone di un vantaggio maggiore di qualsivoglia altro legno Europeo, massimamente per fabbricare delle navi, ed altri bastimenti per servizio dei mercadanti, avvegnachè quello dato legno nemmeno per ombra sia soggetto a tarlare. L' *Acaju*, che è un'albero che produce una specie di noci, è di razza sì fatta. Ed havvi un'albero della Giamaica, conosciuto sotto il nome di legno bianco, il quale possiede la proprietà singolarissima, e così anche sono molti loro alberi di parecchie specie. Veggansene le Tradizioni Filosof. sotto il n. 36.

Per intagliare il legno per servizio della marina con speditezza, è oggimai comune il metodo di cuocerlo nei forni. Vegg. *Boyle Oper. Comp.* Vol. 1. p. 135.

L'arte di dar forma al legno o sia di ammorbidirlo, per farne tavole da stampa, vien proposta, e mentovata dal medesimo Boyle (6), non altramente, che un *Desideratum* nell'arte di intagliare. Afferisce questo Autore, come è stato informato da gente di credito, che quest'arte sia stata benissimo praticata in Aga; ed egli falli a sospettare, che ciò possa essere stato effettuato per mezzo di alcun medicamento, il quale ammorbidisca il legno, e

di poi quest'arte medesima restituisca allo stesso legno la primiera durezza in quella maniera appunto, che vengono ammorbiditi i guci delle testuggini. Oppure, per avventura, per via di ridurre il legno in polvere, e poscia riunirlo in una massa con una tenacissima, ma a un tempo stesso sottilissima, e finissima colla. Ed aggiunge l'Autore, come avendo mescolato della segatura con una sottilissima colla fatta di (c) Cristallo, leggerissimamente levandone via ciò, che era superfluo, con un pezzetto di tela di lino, la parte rimanente essendo formata in una pallottola, e fatta seccare, divenne così dura, che risaltava grandemente, allorchè gittavasi sopra il pavimento.

(b) Boyle *Oper. Compend. Vol. I. pag. 130.* (c) Veggasi l'Articolo COLLA.

La gente, che lavora moltissimo nel legno, e massimamente quegli artefici, che si occupano intorno a piccoli pezzi del medesimo, trovansi una differenza estremamente sorprendente, secondo le differenti stagioni, nelle quali l'albero è stato tagliato, e questo non già regolarmente lo stesso in rapporto a tutte le specie di alberi, ma differentissimo rispetto a ciascuna di esse specie. Coloro, che fanno l'anime da bottoni, trovano, che il legno dell'albero del pero, atterrato, ottagliato nell'estate, è assai spesso, e fisso nel lavorarlo; la seopa per lo contrario è di un lavoro consistentissimo, quando è tagliata di inverno: il busso è sommamente soffice, e tenerissimo, allorchè è stato tagliato nell'estate, e durissimo per lo contrario se stato sia atterrato molto prima. L'albero Spinalba è morbidissimo sotto i ferri dell'Artifice, allorchè è stato tagliato di Ottobre, o lì incirca; e per lo contrario è sempre assai più malagevole a lavorarsi, se venga tagliato di estate. Veggasi Merret, note sopra la *Neri*. pag. 263.

È la cosa a chicchessia notissima, che la qualità dei metalli è più lunga, e maggiore, quando il metallo è caldo; e per lo contrario più corta, e più picciola, quando è freddo. Questo fatto vien comprovato da migliaia di esperienze; ed i Volumi della Spemimentale Filosofia formosi grandemente distesi intorno a ciò, e vi hanno spazato a talento, ed anche

troppo, e più del bisogno. Per lo contrario vien toccato con mano, proprietà del legno essere, che sia lunghissimo nelle stagioni fredde, e cortissimo nelle calde. Questo cambiamento è dovuto ai rimasugli del succhio, trovantisi tuttora nel legno, i quali essendod dal freddo condensati, viene allargato nella sua superficie questo succhio, siccome lo sono, a vero dire, tutti i liquori, allorchè si gelano, e fanno ghiaccio: e concentrandi, e si ritirano in uno spazio minore, ed in una minor mole di bel nuovo, allorchè vengono liquefatti dal caldo.

Da questo ne seguita, che forz'è, che tutti i legni cangino la loro superficie più o meno, a norma, e secondo che contengono maggiori, o minori porzioni di succhio, e questa può essere una norma, o regola di uso grandissimo, per determinare, quali specie di legno abbiano poco succhio, e quali ne abbiano scarsa porzione. Questo esser dovrebbe un ramo di cognizione sommamente prezabile, avvegnachè abbianvi moltissimi usi, per i quali quella data sorte di legno forz'è, che di necessità riesca sempre migliore, la quale ritiene entro di sé pochissima parte dell'originale suo succhio nato. Veggasi l'Articolo IGROSCOPIO, *Ciclopedia*, e *Supplemento*.

Così, nel grande, ed importantissimo Articolo di ben conservare il fior di farina, non si praticano più oggimai gli usati barili, ma bensì quelli di un legno di quercia bene stagionato, ed asciutto. Tutto il vantaggio, che si ritrae da questo legno si è, ch'ei contiene minor porzione di succhio di qualunque altro legno: conciossiachè il succhio stanziante nel legno faccia sì, che il fiore si imbeva di umido, e per conseguente irrancidisca, e divenga nido, e cibo insieme di vermi. Di modo che, se alcun'altro legno possa per il fatto mezzo esser rinvenuro, il quale contenga in sé minor porzione di succhio, allorchè è stato col metodo comune fatto seccare, di quella della stessa quercia, farà sempre più acconcio, ed adattato per tale effetto; oppure se coloro, che son prodi nel lor mestiero vengano a toccar con mano, che abbiavi altro legno, il quale contenga la medesima scar-

fa quantità di fucchio, che contassi nella quercia, potrà servirsi di quello per l'uso del conservarvi il fiore di farina, e lasciare il legno della quercia pel tanto necessario uso della fabbrica dei bastimenti.

Un'altra acconcio metodo per sperimentare, se il fucchio sia sufficientemente esalato di dentro il corpo del legno, potresti avere con questa esperienza; e da ciò ne verrà a noi beneficio grandissimo: conciossiachè i nostri vascelli, allorchè son formati di legname non asciutto quanto si conviene, vengono sperimentati di danno grande a quella gente, che trovavisi stanziata; ed è stato osservato non meno da noi, che dai medesimi Francesi, come di ordinario molto maggior numero di uomini si muore nel primo viaggio, che fa una nave nuova, e di fresco fabbricata, di quello segue nel tempo medesimo in un bastimento vecchio; ed, a vero dire, noi abbiamo parecchie, ed assai accertate osservazioni, che i primi sei mesi in questo caso riescono sempre molto fatali. L'esalamento del fucchio dal legno del nuovo vascello è certissimamente la cagione di questo pur troppo rilevante disordine; e se questo fucchio medesimo fosse stato lasciato, o fosse stato fatto esalare, prima di servirsi, e di mettere in opera il legno nella fabbrica del bastimento, non solamente sarebbe impedita questa mortalità di quella povera gente, ma il vascello sarebbe riuscito esso stesso migliore, più forte, e di maggior durata. Veggasi *Deslandes*, Trattato di Esiica.

Il legno messo in opera per alimento, o materiale del fuoco vien ricercato di diverse spezie, per rapporto alle varie faccende, e lavori, che debbon' essere per mezzo di quello condotti a termine.

Il Neri raccomanda grandemente, ed in ogni luogo la quercia, per esser abbruciata nelle fornaci dei vetrarj, come un legno sommamente acconcio per produrre un'altra energico, e durevol fuoco, con un'altra fiamma.

L'Imperato per lo contrario commendatamente il frassino per la faccenda, e lavoro medesimo; avvegnachè, come egli asserisce, quello legno somministra, anzi che una fiamma di grande appariscenza, piuttosto di somma sostanza, e polso. Ed il

Camerario, non senza ragione grandissima, vuole, che a tutt'altri s'anteponga il ginepro, come un legno, che somministra un fuoco assai energico, di lunghissima durata, ed il più dolec insieme, e soave, che possa mai ottenersi. Fra gli Antichi raccomanda Plinio il legno leggermente seccato; e Plutarco antepone il Tamarisco in modo speciale per i fuochi delle fornaci dei vetrarj. Ma i vetrarj richieggono un fuoco così grande, che non possi con questa facilità trovar tanto legno di Tamarisco, che lor possa bastare. Nè similmente esser può loro dicevole, ed adeguato il frassino, perchè quantunque somministr un buon fuoco, non istà gran tempo a dar'addietro, ed inievolirsi. Veggasi *Mettes*, note al Neri, pag. 275.

LEGO fossilis. Per legno fossile si debbono intendere tutti quegli alberi, o parti di essi, che vengono con moltissima frequenza trovati sepolti nelle viscere della Terra, e questi in differenti strati, alcuna fiata nelle pietre, ma assai più comunemente nel terreno; ed alcune siate ancora trovantisi dei piccioli perzetti sparsi qua e là fra i suoli arenosi, e fra la ghiaia. Questi legni a norma del tempo, che trovansi distesi entro il terreno, o secondo la materia, che è passata lor sopra, o che trovasi, ov'essi giacciono, veggonsi assai diversamente alterati dallo stato loro primiero, ed originale; conciossiachè alcuni di questi legni, abbiano sofferto un leggerissimo cambiamento, ed altri, per lo contrario, sieno rimasi grandemente impregnati di una materia cristallina, spatica, piratica, od altra similiane eterogenea sostanza, di modo che altro a prima fronte non compariscono, che mere masse di pietra, o mucchi della materia, che è comune alle piriti, o pietre focae, e fomigianti, delle dimensioni, o più, o meno della figura interna di quei corpi vegetabili, per entro le porosità dei quali si son fatti strada.

Il legno fossile, cui noi troviamo di presente, può secondo queste additate differenze esser disposto, e collocato sotto tre Classi, o spezie, vale a dire, 1. Meno alterato. 2. Piratico, e 3. Petrificato.

Degli alberi, o parti di essi meno alterate

verate dallo stato loro originale, lo strato massimo vien trovato entro picciola profondità nelle Paludi, e fra quella data sostanza, che viene appellata pietra, o tuffo, che è quella sostanza medesima appunto, che in moltissime parti del nostro Regno viene usata per alimento, o materiale da fuoco. In izzappando, o scavando fra quella, di ordinario in grandissima vicinanza della superficie trovano i nostri lavoratori o scavatori quantità immense di materia vegetabile sotterra, e queste di specie varie infra loro. In alcuni dati luoghi trovansi degli alberi, belli, e intieri, appena in null'altro magagnati, od alterati, salvo che nel colore; e massimamente le querce, le quali son divenute di ordinario di un color nero brunito, o di getto: i pini, e gli abeti, i quali trovansi di pari frequentissimamente, sono anche meno alterati, e trovansi sempre in uno stato come infiammabile, e questi bene spesso contengono fra la loro corteccia, e la sostanza interna legnosa un' evidentissima resina. Grossissimi pezzi di alberi similmente stati sono non di rado trovati non alterati di un menomo che in letti, o strati di altra specie, ed in assai più alte profondità, come a cagion di esempio in ultrai di argilla, o di terra grassa, fra la ghiaia, e ben'anche talvolta fra la solida pietra. Veggasi *Hill's* Istoria dei Fossili, pag. 638.

Oltre quelle più dure parti di alberi trovansi assaiissime fiate fra questi nostri terreni pietosi, o di tuffo combustibile, quantità immense di foglie, e di frutti, e de' gusci di nocciuole, e frondi, e frutti, e gusci di altri alberi: e queste stanziano comunemente fra la carice, e fra le radici dell'erba, e sono appena in parte menomissima queste sostanze alterate dallo stato loro originale, e natto. Le più comuni fra queste sono le nocciuole, *Nuxes Avellane*: ma trovansi eziandio con assai frequenza dei ramuscelli non meno, che delle foglie di pioppo-bianco; ed alquanto più addentro, o più al fondo diaciovni di ordinario dei pezzi di legno tutti screpolati, e magagnati, le crepature dei quali sono tutte piene di una spzial materia bituminosa nera; e fra queste due legna trovansi bene spesso dei noccioli

di fusine, od anche de' noccioli di altre frutta, ma questo con maggiore rarità.

In quei luoghi, nei quali stanziano sotterrati gli abeti, ed i pini, i piccioli ramuscelli, o le pine, e frutta de' medesimi alberi sono frequentissimamente trovate in vicinanza della superficie, mentre i corpi degli alberi travansi stanziare ad una maggiore profondità nel terreno medesimo. Le querce sono in parecchi luoghi così sane ed intatte, che il legno loro è di pochissimo inferiore quanto alla sua durezza, a quello dagli alberi di quercia i più perfetti tagliato. Gli alberi fossili nei nostri terreni pietosi, o di terra combustibile, e nelle nostre paludi, vengono non di rado trovati perfettamente intieri, colle loro radici rimanentisi per ancora ad essi attaccate; ma con maggior frequenza trovansi spezzati in vicinanza appunto delle radici loro, come anche nelle vette dei rami che veggionsi coi rispettivi loro frutti, i quali però sono di pari bene spesso dai rami separati, e questi trovansi talora in picciolle varie distanze dalla palude medesima. Molti de' grossi rami sono similmente trovati staccati da quelli alberi, e veggionsi giacere ad alcuna distanza dai loro rispettivi tronchi. Allorché le radici trovansi rivolte all'insù, e che diaciovni in direzioni irregolari, le loro estremità veggionsi di pari mozzate, e troncate, ma con somma frequenza le radici medesime degli alberi rimangonsi nella loro diacitura naturale, e le loro radici più grosse, e la radice maestra, o di mezzo scorre giù diritta diritta per entro l'argilla, o per entro altro solido strato, che viene appunto ad essere il fondo della palude; rimanendosi il ceppo, o tronco sopra la superficie, e l'albero giacendosi orizzontalmente ad una picciola distanza sotterrato ora in una maggiore, ora in una minore profondità.

Ella è cosa grandemente incoerente quella di farsi ad immaginare, che questi dati alberi sieno stati in similguisa guisa sotterrati, o nella erazione, o siccome moltissimi amano meglio di credere, nella tremenda Catastrofe dell' Univerale Diluvio: Nel primo di questi due tempi, forz'è, che gli strati sieno stati formati prima degli alberi, in quei dati strati, io dico, nei quali puranche stanziano; ma i nostri ter-
reni

reni pirofosi, o combustibili, egli è così lontano che sieno di una data antediluviana, che parecchi d'essi è cosa indubitabilissima, e sommarmente accertata, che non sono niente più antichi di trecento anni fa, in quello tratto di tempo soltanto essendosi formati in quei luoghi stessissimi, ove di presente trovansi sotterrati.

In questo stato, che è di pochissimo alterato dalla loro condizione originale, vengono appunto a trovarsi comunissimamente i frutti, e le parti più grosse degli alberi divisiati; e ciò, che noi troviamo d'essi maggiormente alterato, sono pezzi talvolta grossi, e lunghi, tal'altra rami, di alberi più minuti, e più corti; alcuna volta piccioli frammenti di rami e con maggior frequenza pezzetti di legno informi. I rami più grossi, e più lunghi trovansi comunemente inceppati, ed incorporati entro gli strati pietrosi, ed ora più ora meno trovansi alterati e cangiati nella sostanza dello strato medesimo, in cui si giacciono. I rami più corti, e più minuti trovansi in immense varietà per entro gli strati d'argilla azzurra, della quale servono i fornaci per farne delle tegole e delle piastrelle nei sobborghi di Londra: quisti dati rami trovansi in copia abbondevolissima in tutte le cave di questa particolar terra di questa specie, e d'ordinario portano seco, e conservano tutta la somiglianza esterna di ciò, che essi erano un tempo, ma nulla conservano della struttura loro interiore; avvegnachè le loro porosità sieno in tutto, e per tutto ripiene, ed indistinguibilmente chiuse, e ferrate, dalla mattria, onde son composte le comuni Piriti vetrioliche in modo, che compariscono alla prima, senz'essere esaminate, mere masse semplici della materia divisa. Questi rami, che vengano per lungo tratto di tempo a rimanere esposti all'umido, vanno in pezzi, e si sbriciolano, e son così pregni di vetriolo, che di questi principalmente gli operai si servono per fare specialmente il vetriolo verde in Deptford, ed in altri luoghi eziandio.

Le masse irregolari, o frammenti di legno, sono principalmente di quercia, e vengono assai comunemente trovati fra la ghiaja; tuttochè alcune volte trovansi di pari in altri strati. Queste masse, o frammenti sono variamente alterati dall'infu-

nuazione, che in essi vi si è fatta delle particelle cristalline, e petrose, e vengono a fare una appariscente vaghissima figura, allorchè son tagliati, e ridotti a pulimento, avvegnachè sogliano per lo più conservare la grana regolare del legno, e vengano esatissimamente a mostrare i parecchi circoli, che contrassegnano gli anni differenti di crecita dell'albero medesimo. Quelli secondo la varia materia, che ha riempite le loro porosità, assumono colori differenti, e l'apparenza dei varj fossili, che gli hanno impregnati. Alcuni sono perfettamente bianchi, e mezzanamente duri: altri poi sono di un color nero bruniccio, o perfettamente neri, e molto più duri: altri di un color nero rossiccio, altri giallognoli, ed altri alquanto bigi, ed altri di un color di ferro. Son questi frammenti di pelo vario, non meno che di varj gradi di durezza, secondo la natura, e la quantità delle particelle pietrose, che in essi contengono. Di questi pezzi alcuni sono stati trovati con ogni loro porosità ripiena di puro trasparentissimo cristallo; ed altri in grosse masse, parte delle quali trovavansi interamente petrificate, e sembra in essa pietra genuina pietra, e tutto il restante d'essa massa si è per lo contrario sbriciolabile, e non alterato legno.

Che somigliante alterazione sia fatta nel legno eziandio in quello tempo, egli è somigliantemente più che abbondevolmente provato dagli esempi del legno, che essendo collocato nelle cavità delle miniere come per sostegno, e contrafforte per sostenere la volta d'esse cavità, dopo un dato numero d'anni è stato trovato veramente petrificato non altramente che quello, il quale viene scavato dagli strati naturali della terra. Nei prezzi di legno petrificato trovati nella Germania, veggionvisi assai frequentemente delle vene di spalto, oppure di cristallo puro, alcuna fatta delle sostanze terrigne, e bene spesso della materia delle comuni felci, o pietre vire. Quelli frammenti di legno hanno talvolta l'apparenza di porzioni di rami d'alberi nello stato lor naturale; ma con assai maggior frequenza assomigliansi a pezzi di tavole rotte, e quelli secondi son d'ordinario capacissimi d'una somma, e vaghissima ripulitura, e brunitura.

Egli

Egli è certissimo, che parecchie sostanze sono state conservate nelle gallerie, e musei dei dilettanti Raccoglitori, sotto il titolo di legno petrificato, alle quali non conviene per modo alcuno si fatta denominazione. Ma ove tutta l'intera esterior figura del legno, gli elastissimi lineamenti della corteccia, oppure la fibrosa, e fistulare tessitura delle scanellature, ed i vestigi dei piccioli otri, e delle trachee, o dire gli vogliamo vasi aerei, per ancora si ravvisano, e mantengono, e seguivano tuttora ad esser visibili i parecchi circoli, i quali dinotano le crescite annuali dell'albero, non vi ha chi possa farsi a negare, che si fatte sostanze sieno realmente, e veracemente legni fossili. Veggasi *Hill*, *Istor. de' Fossili* pag. 639. Veggasi di pari l'articolo *PIANTE fossili*.

Uno di quelli esempi grandemente singolare che noi abbiamo della materia, in cui il legno fossile può conservarsi, si è nell'Istoria della Polonia del Razynski. Ci dice questo Scrittore, che allora quando uno dei Re di Polonia faceva a meno di visitare le ampie miniere del sale di quel Regno, il Soprintendente ai lavori fecigli osservare non altramente che una rarità una massa vastissima del sale della specie durissima, entro la quale trovavasi sepolto un pezzo di un braccio di un'albero: il sale con istrumenti adeguati venne spezzato, e ne fu cavato fuori il legno. Si toccò con mano, questo legno esser faggio, avvegnachè la sua tessitura rimanesse così patente, che poteva ravvisarsi agevolissimamente; ma le sue porosità trovavansi tutte piene del sale, entro al quale era sepolto. Questo pezzo, di cui favelliamo, era della grossezza dell'osso del braccio di un'uomo, e vedevasi così intero, e perfetto, come quando trovavasi sopra il suo albero. Questo è il solo esempio, che noi ci abbiamo del legno conservatosi nella divisa maniera; e sarebbe un'altra bella cosa, se noi ci potessimo accertare del tempo in qualche forma, che questo dato pezzo andò a depositarsi in corpo a questo sale. Veggasi *Razynski* Istoria della Polonia.

Un'altro assai considerabile esempio del cambiamento venuto a lavorarsi nel legno col rimanersi stanziato sotterra, si è quello, dell'essersi esso legno trovato tralma-

tato in ferro; vale a dire, che il legno siasi per ogni, e qualunque parte impregnato delle particelle del ferro; in quella stessa istissima guisa, che quel legno, cui noi appelliamo legno petrificato, si è impregnato delle particelle pietrole.

Monsieur Liebknecht Professore di Matematica in Gissen, si fu il primo, il quale a considerare si facesse questo singolare procedimento della Natura nel Mondo fossile. Trovò egli in una Cava, in cui trovavansi stanziati parecchie varie masse, o miniere di ferro, un pezzo di legno di frassino, che agevolmente conoscevasi esser tale pel corlo, o diacimento delle sue fibre; la parte corticale, o scorza del quale era petrificata, o divenuta pietra, siccome noi ci spogliamo comunemente esprimere, e per lo contrario la sua interna, o centrale parte erasi convertita in vero, e genuino ferro assoluto. Quella parte della sostanza era del color del ferro, e prendeva una pulitura somigliantissima a quello: aveva lo stesso suono, che ha un pezzo di ferro, allorchè vien colpito con altro corpo solido, e soffriva i colpi del martello senza spezzarsi non altramente, che facciasi il ferro medesimo.

La sua gravità specificava era similmente maggiore di quella di qualsivoglia ferro in miniera. Tutte queste circostanze diedero probabilità grande del suo essere ferro assoluto, ma, oltre a queste, avevanvene delle altre, che somministravano assoluta, e fisica certezza del fatto. Un pezzo di questo ferro, ed un pezzo similmente di ferro in miniera della specie più ricca, ed abbondevole, furono ridotti in pezzi separatamente, e lavati, secondo l'arte, a parecchie acque. La miniera del ferro comparve alla bella prima evidentemente più leggiera, e sporcava benissimo l'acqua, ma il ferro, che fu trovato nel legno diviso, andava incontanente al fondo tutto in un subito senza mandar fuori porzione menomissima di materia avventizia. Dopo parecchi, e parecchi lavamenti peraltro, tendo rimase la miniera, o ferro in miniera nettato, e rimasto sicuro delle sue parti terrene, &c. divenne più pesante di quello si fosse il ferro del legno.

Dopo d'aver posto a cuocere l'un è l'altro al fuoco, il ferro del legno fece una gran-

grandissima ebullizione coll'olio di vetrolo, e mandò fuori dei grossi vapori: dove per lo contrario il ferro di miniera fece una leggerissima ebullizione, ed appena alzò, o mandò fuori alcun vapore. Questo è il più maraviglioso, come il trovare il nativo ferro anche nei più ricchi pezzi, ella siasi cosa sommanente rara. Nè puossi per chiechessia dalle divise esperienze tutte rivoicare in dubbio l'indubitata certezza, che questa sostanza fosse veracemente, e realmente ferro perfettissimo. Osserva per ultimo l'Autore, come dopo, che questo ferro venne squagliato col sale di tartaro, venne attratto bravamente dalla calamita. Veggasi l'Atta Euditorum, Anno 1710. Veggasi l'Articolo *Ligno di palude*, qui appresso.

Legno della Giammaica Veggasi l'Articolo *BAASTLE*. (*Ciclopedia*)

LEGO petrificato. Le opinioni del dotto Mondo state sono in grado sommo differenti rispetto ai corpi conservati nelle gallerie, e ne' Musei dei Curiosi Raccoglitori sotto la denominazione di *Legno petrificato*; asserendo costantemente certuni, questi corpi essere stati soltanto felci, oppure pietre focae per puro accidente in questa configurazione formati, e con semplici vene a quelle assomiglianti del legno: Altri poi con ugual fidanza, ed animosità affermando, questi pezzi essere stati realmente legno, entro al quale stata sia introdotta per mezzo dell'acqua la materia pietrosa.

Parecchi non dispregevoli argomenti sono stati messi in mezzo per ambedue le parti di tal questione. Ma il valentissimo Monsieur De la-Hire ha impreso di ridurre la disputa ad una certa conclusione per mezzo di alcune mostre sommanente particolari ottenute con somma felicità, e questi erano pezzi di albero di palma petrificati, i quali furono trovati nelle campagne deserte dell'Africa. Questi pezzi posti a confronto con altri pezzi di albero di palma tagliati a bella posta dal legno fresco dell'albero medesimo, comparvero possedere a capello in tutto, e per tutto, e per ogni verso le vene bellissime, appariscenti, rilevate, e regolari di questo legno, e non lasciavano ombra menoma da dubitare, che questi realmente, e verace-

mente stati fossero un tempo legno vegetante di quell'albero, tuttochè di presente convertiti, e trasformati in durissima pietra. I pezzi petrificati erano perfettissima pietra per ogni, e qualunque rispetto, ed in tutte le loro qualità r'avvegnachè possedessero la durezza di quella, il suo suono, allorchè percuotevansi con alcun corpo solido, ed erano, siccome lo sono parecchie altre pietre, in alcuni luoghi opachi, in altre per lo contrario trasparenti. In pelando questi stessi pezzi venivano bene spesso trovati della gravità specifica medesima de' pezzi recenti del legno fresco della palma, e delle dimensioni a capello le stesse. Uno di questi pezzi era lungo due piedi, e largo quattro, o cinque dita: era questo parte del tronco spogliato della sua scorza: in questo tutta le fibre scorrevano per lo lungo, o lungheffo, ed intieramente comparivano analoghe a quelle del verace legno di palma recente: una certa porzione di esse fibre era forcuta nelle sue estremità, come appunto lo sono nel legno; le fibre medesime erano tutte concave eziandio nella pietra, come lo sono nel legno, e la materia trovantesi fra gli spazi, che avevale congiunte insieme nell'albero, compariva, aver formato nella pietra una validissima, e consistentissima specie di cemento avvicinatasi alla pietra focaja. Siccome le cavità, che erano un tempo state legnose comparivano grossissime, così il prode Monsieur De-la-Hire diè la seguente istoria di questo fenomeno:

Osservò questo Valentuomo, come i corpi lunghi soffici, e massicci, nell'alcantararli bene spesso rialzano, e sgonfano tutte le loro parti interne verso la circonferenza, e per conseguente le tiran fuori dal centro; e che assai volte siate la conseguenza di questo era, che quando il corpo divenuto era perfettamente asciutto, comparivasi nel mezzo una varietà maggiore, o minore in forma di un tubo, o canaletto vuoto. I rami più piccioli di moltissimi alberi, osserva questo dotto Naturalista, che seccansi in questa guisa, ed alcune volte anche i loro bracci più grossi, ed i tronchi eziandio; e ciò massimamente suole addivenire allorchè il legno era di una natura più morbida, e soffice.

Fatti

Fatti egli pertanto ad immaginare, ciò essere avvenuto nel tronco di quell' albero di palma, e che le sue varie fibre essendo tutte lunghe, e soffici in seccandosi abbiano avuto in esse tutte le loro parti scollate in guisa fomigliante dal centro alla circonferenza, per sì fatta maniera, che si sia formata di cadauna di esse una specie di lungo tubo, o canaletto; e che qualora fosse in esse avvenuto ciò, allorchè il pezzo era legno, e che esse per conseguente erano legnose, non poteva essere a meno, che colla medesima medesimissima regolarità si conservassero nello stato loro petrificato.

L'altra mostra era del fondo del tronco con una parte delle radici. Era questo non solamente composto non altrimenti che il primo pezzo di fibre lunghesso il legno scorrenti perfettissimamente analoghe a quelle del legno recente, ma dalla sua parte inferiore eranvi cresciute parecchie radici della grossezza di un dito grosso, e della lunghezza di tre buone dita, ed anche di vantaggio. Queste, le quali erano coperte con una sottilissima buccia, ed avevano per entro di sé moltissime fibre di una finezza inconcepibile, venivano a comporre il corpo di cadauna radice, non altrimenti che le fibre longitudinali di diametri maggiori avevano composto il legno del tronco: e dentro di queste trovavasi incorporata un' assai forte, e resistente sostanza della natura del cuore nelle radici degli alberi, la quale conteneva somigliantemente dentro di sé ancora un'altra differente sostanza assomigliantesi per ogni rispetto alla midolla della parte inferiore delle piccole radici di questo medesimo albero. Tutto questo essendo esattamente, ed a capello lo stato delle piccole radici fresche, o recenti dell' albero della palma, non pare in veruna maniera, che debba esser supposto, che la natura, tuttochè ella avesse nudamente imitato le fibre longitudinali di un evidente, e pieno pezzo di legno, per accidente nella pietra, si fosse fatta ad imitare eziandio tutte le parecchie parti, delle quali quelle ultime radici sono composte, le quali tutte sono tanto differenti in se stesse, e tutte disposte in un'ordine esattamente, e particolare. I colori medesimi delle va-

Suppl. Tom. III.

rie parti di queste radici trovavansi, e vedevansi differenti nella pietra, alcuna specie di materia pietrosa essendo probabilmente stata più acconcia, e disposta per penetrare le porosità di una parte, ed alcun'altra specie di un'altra parte. Le parecchie finissime fibre, che compongono il corpo di ciascheduna radice, essendo di un color nero pietroso lustro, della natura del selce, o pietra forte nera comune, e la parte interna, o dir la vogliamo midolla, venendo ad esser supplita da una pietra bianca, e più morbida, quella midolla, o sostanza interna, avendo in asciugandosi, e seccandosi osservata la legge medesima, che fu da noi poc'anzi mentovata, in rapporto alle fibre del legno, era divenuta concava, come le medesime appunto fanno in seccandosi, e per conseguente questa pietra bianca comparisce concava, ed in forma di un tubo, o canaletto in moltissimi luoghi. La comparazione o confronto di siffatta petrificazione nella divisata maniera col recente legno dell'albero medesimo, non lascia luogo a dubitare nemmeno per ombra menoma della sua verace origine.

Il Padre Duchať Autore di sommo, ed inappuntabil credito, somigliantemente asserma, e ciò per sua propria particolare cognizione personale, come nel Reguo di Ava vi è un fiume, le cui acque petrificano il legno fresco convertendolo in selce, o pietra viva; ed attesta, come con gli occhi suoi ha egli veduto assai sovente degli alberi entro esso fiume piantati, la cui parte inferiore, o fondo, o sia tutta quella porzione dell' albero che rimaneva coperta dall'acqua, essere vera e genuina selce, dove tutta la parte superiore, o quella che rimaneva fuori d'essa acqua, era veracissimo e genuino legno seccato, ed acconciissimo per esser arto, e fattone fuoco. Veggansi Memoir. Acad. Roy. Scienc. Paris. ann. 1691.

LEGOE rilucente. Hannovi moltissime cose, nelle quali un pezzo di legno marcito, che luce o risplende fra l'ombre, si conviene, ed accordasi con un acciaio carbonaceo; ed hannovi somigliantemente moltissime altre cose, nelle quali questi infra sé differiscono. Convengono adunque, e si accordano nelle appresso cose, vale a dire:

E c

1. So-

1. Sono tutt' e due quelle sostanze propri e veracissimi luminari, avendo luce in essi stanziante, nè sono simili alle sfere o specchi da rimirarvisi, oppure a bianchi corpi, i quali sono soltanto luminosi secondo la quantità di luce, che viene a cadere sopra essi da altri corpi, e la quale essi riflettono. 2. Tutt' e due, vale a dire, il legno rilucente, ed il carbone acceso, richieggono e vogliono la presenza dell'aria per conservarsi luminosi, e sì l'uno, che l'altro richieggono, e vogliono di pari un'aria d'una densità considerabile; e sì l'uno che l'altro corpo essendosi spogliati della lucida loro qualità coll'esser loro tolta l'aria per mezzo della macchina pneumatica; la riacquisiranno bravamente di bel nuovo nell'ammettere in essi novellamente l'aria fresca, e recente. 3. Ambedue questi corpi agevolissimamente verranno ad essere spenti col tuffargli nell'acqua non meno, che in altri parecchi liquori. E 4. Siccome un vivo carbone non verrà ad estinguersi per quanto fredda l'aria si sia, alla quale trovisi esposto; in modo affatto similgiante, nè anche il legno rilucente verrà ad esser privato e spogliato della sua luce per qualsivoglia altra freddezza, che a questo medesimo elemento venga aggiunta. Veggansi le Transaz. Filosofiche sotto il num. 32.

Sono queste le cose, nelle quali tanto il legno rilucente, che il carbone acceso accordansi fra di loro, e convengono: quelle poi, nelle quali disconvengono, sono le seguenti: 1. Un carbone acceso viene agevolmente ad essere spento per via di compressione, percuotendolo, o premendolo insieme, e ciò viene a spogliarlo e privarlo affatto della sua luce: dove per lo contrario, miuna compressione, stritolamento, ammacciamento, o qualsivoglia altra cosa di questo genere sembra, che non abbia la menoma facoltà, o forza di spogliare della sua luce un legno rilucente; avvegnachè le sue parti l'iminzate e stritolate lucano e risplendano di pari, che le sue parti intiere. In evento, che un pezzo di sì fatto legno lucido venga premuto fra due cristalli, questa esperienza verrà a far toccar molto evidentemente la cosa con mano: ed in similgiante caso, quantunque la confestitura del tutto venga a rimanere

evidentemente rotta e scompaginata, e le parti vengano ad essere disgiunte, nulladimeno la luce ravvisasi di pari forte e vivace in esse, come lo si era nel pezzo intiero ed intatto. 2. Un pezzo di carbone acceso estinto, con estrar dal medesimo l'aria, dopo alcuni pochi minuti, rimarrassi senza luce nell'esporsi di nuovo all'aria viva in qualsivoglia maniera: ma per lo contrario, il legno rilucente, o legno lucido, allorchè vien conservato estinto per un tratto di buona mezz'ora eziandio nella medesima guisa, riaccenderassi, e riacquisirà la sua luce primiera nell'istante medesimo, che verrà di nuovo esposto all'aria. 3. Un carbon vivo, od acceso racchiuso entro un picciol vaso di vetro, vi continuerà a risplendere per pochissimi minuti; dove un pezzo di legno lucido posto nelle circonstanze medesime, continuerà a risplendere bravamente per parecchi giorni. 4. Il carbone, mentre arde, e risplende, va consumandosi e divorandosi in grandissima parte, ed il legno marcito rilucente, non si consuma nè disperdesi di un menomissimo che. Ed ultimamente il carbone acceso è attualmente e veramente caldo; ed il legno marcito, tuttochè attualmente lucido e risplenda tutavia, non è tampoco tepido, nè riscalda. Veggansi le Trans. Filosof. num. 32.

La luce, la quale viene osservato procedere dal legno marcito sotto alcune circostanze particolari, vienisi coll'esperienza a toccar con mano, come per nutrirsì, e per conservarsi richiede l'aria onninamente: in collocando un pezzo di questo diviso legno lucido entro il recipiente di una macchina pneumatica, estrarne l'aria, la luce dileguasi incontanente, e per intiero dal medesimo, ed il legno rimansi di pari oscuro, che un altro pezzo di legno comune sano feccato: ma nell'atto, o momento medesimo, che novellamente s'espone all'aria viva, la luce vi si riaccende al grado di forza il medesimo di prima, e sembra, che tolto una gran copia di scintille lo riaccenda, o come un subitaneo lampo illumini il legno medesimo,

mo, e quindi continua dopoi a risplendere come per l'innanzi.

Nelle Esperienze di simigliante specie l'effetto della macchina pneumatica viene ad essere più forte, ed energicamente concepito un minuto, o due dopo essere stato prodotto, di quello sì concepisca durante il tempo dell' estrazione: e quello stesso grado d' esaurimento, che lascia simiglianti corpi luminosi alla bella prima alquanto rilucanti, andrà successivamente distruggendolo: di modo che se la macchina sia chiusa, e fermata subito che la luce comincia ad illanguidirsi, e divenir pallida, e che il corpo venga esaminato per rilevarne i suoi cambiamenti dopoi, vedrassi patentemente in ogni minuto divenir sempre più pallido e smorto, fino a tanto che alla per fine la luce dileguasi in tutto, e per tutto.

La luce delle carni, e dei pesci, allorchè queste sostanze son potrefatte, è totalmente, ed a capello della natura medesima di quella dei legni infraciditi, rispetto al suo dipender dall' aria, quanto al suo splendore; e coerentemente nella maniera medesima vengono queste sostanze a perdere la loro luce nel recipiente esaurito della Macchina pneumatica, ed a riacquistarla in restituendo alla macchina medesima l' aria tolta nell' istessa instantanea maniera. Veggansi le Filosofiche Transaz. num. 31.

LEGNO di palude, o LEGNO sotterraneo. E' quella una denominazione attribuita da gli abitatori di parecchie Regioni, o parti di questo nostro Regno, a certo tal legno, che vien trovato sepolto nelle viscere del terreno in alcuni luoghi paludosi, e si è anche a' di nostri conservato durissimo, e sommamente resistente. Veggasi quel sopra l' Articolo LEGNO fossile.

Nelle nostre Transazioni Filosofiche leggesi un piano, od istoria d' immense quantità di questa specie di legno trovato sotterra nella foresta, o Caccia di Hatfield. Quivi vengono trovati milioni infiniti sì di radici, che di corpi d'alberi: sono questi di qualunque eresia, o grossezza, e sono a capello grassi, e della specie medesima, e ben cresciuti, come lo sono i perfetti alberi del nostro proprio suolo, come a cagion d' esempio, querce, abeti,

scope Britanniche, faggi, tassi, o nassi, falci, frassini, e fomiglianti. Le radici d' ogni e qualunque de' i divisi alberi trovansi piantate nelle loro naturali direzioni, non altramente che quando vegetano, e trovansi radicati nel terreno, e sono anche in questo lor stato così fitte e terrate insieme, siccome si starebbero in una foresta vivente. I corpi di questi alberi veggonsi d' ordinario rotti e staccati, e di assionfi lunghesso le radici medesime.

Gli alberi di maggior grossezza trovansi comunemente caduti in una direzione, che riguarda l' aspetto di Tramontana Orientale, ed i più piccioli veggonsi diacere a qualunque direzione. L' abete si è l'albero ivi il più comune di qualsivoglia altra specie, e trovane ivi talvolta della lunghezza di venti, di trenta, ed anche di trentacinque perliche l' uno, e così sani, duri, e perfetti, che non pochi di essi sono stati comprati per farne degli alberi maestri da balimento. Le querce sonosi trovate della lunghezza medesima, quantunque mancassero loro alcune braccia delle loro vette naturali. Queste sono state pagate dieci, ed anche quindici lire sterline l' una, e sono egualmente nere, che l'ebano, e sommamente sane, e d' infinita durata, qualunque stato siasi il lavoro, in cui sono state messe in opera. I frassini non conservano la loro fortezza e resistenza in sì fatta maniera; conciossiachè alcuni di essi siano così soffici, e cedenti, che gli scavatori giungono a troncarne via de' pezzi colle loro zappe; e quando vengono esposti all' aria aperta, se ne cadono per lo più a pezzi e brani; ma il falcio, tutto che sia un albero di grandissima lunga più tenero e soffice del frassino, mantiene bravamente la sua tessitura, e trovasi consistentissimo, sanissimo, e sommamente gagliardo. In alcuni alberi dell' abete, ella si è cosa sommamente osservabile, il vedere, che hanno evidentemente gittati dei germogli di rami nelle loro staccate, dopo esser caduti, e come questi sonosi alimentati, hanno vegetato, e son cresciuti in grossi alberi. Molissimi di questi alberi soffici compariscono evidentissimamente tali, che s' sono stati come messi sul fuoco, ed abbronzati. Gli alberi dell' abete trovansi assai comunemente

te in questa condizione, e di questi alcuni sono abbronzati, e bruciati tutti per lo lungo, ed intorno intorno, altri soltanto da un lato. Alcuni di questi sono stati similmente trovati con evidentissimi segni di lavori umani fovr' essi: parecchi con i loro rami mozzati, o troncati, e co' loro tronchi tagliati in due, od in tre pezzi; alcuni riquadrati, ed alcuni in alcuna parte spaccati; e perfino sono state trovate le feuri biette, che sfansi dai tagli legne per fender gli alberi, dentro il corpo dei medesimi. In alcuni in vece di biette spaccatoie di legno vi si son trovate delle pietre, ma non è mai venuto fatto di trovare uno di questi istrumenti di ferro. Trovasi di pari alcuna fiata le teste od intestature delle accette. Sono queste d'una forma stravagantissima, ed accostansi alquanto alle bipenni, o scori, che usavansi nei sagrifizj d'agli Antichi. Queste date feuri vengon trovate in questi luoghi talmente per entro le viscere della terra approfondate, eh' è affatto impossibile, che sieno rimaste soltanto fin da quel tempo, che questi dati luoghi erano foreste, e che non mai prima sieno stati rinvenuti; ma che intanto sieno non ha guari trovati per lo scemamento, che successivamente sia seguito dell' altezza del terreno. L'opinione generale rispetto a questi dati alberi si è, che sieno ivi rimasti sepolti nel tempo del Diluvio Universale: ma con buona pace di questi Autori, ella è cosa evidentissima, che questi alberi medesimi riconoscono un'origine assai più moderna, come di fossili, avvegnachè sotti' essi sieno state trovate sepolte alcune Medaglie degli antichi Imperatori Romani. Veggansi le *Tranfaz. Filof.* n. 275. pag. 983.

La terra delle nostre paludi non è il solo suolo, che conservi entro le sue viscere questi alberi: avvegnachè nelle parti basse, od inferiori della Provincia di Lincoln, fra le fortezze di *Burningham*, e di *Brumley* sonovi parecchie ampie colline composte soltanto di sabbione slegato, e via via, che vanno rovinando, vengonvi continuamente scoperti degli alberi interi, o delle parti de' medesimi, e massimamente le radici, e le ceppaje o bassi tronchi di abeti, come anche alcun' altra specie

di alberi tutti coi segni dell' accetta, o scure sopr' essi, e comparrendovi così evidenti, ed appariscenti questi segni, come le vi fossero stati fatti l' altri ieri. Sotto queste montagne, o colline non meno, che peccato le paludi poc' anzi descritte, non solamente trovavansi de' pezzi moltissimi di legno di abete, ma trovavansi eziandio le sue ghiande in immenso numero, vrggendosene assai fiata parecchie staja tutte in un mucchio. Nel tagliare uno sgorgo o condotto per un fiume di assai considerabile profondità, vennevi trovata nel fondo stesso copia grande di legname tagliato in pali, in travi, in travicelli, e somiglianti. L' intestatura di un' accetta, o bipenne sovvi similmente trovata, assomigliantesi alcun poco ad un' antica bipenne da battaglia, ed insieme una Medaglia del Romano Imperatore *Vespasiano*; ma ciò, che meritavasi maggior considerazione, si fu, che quel terreno, ove queste sostanze trovavansi approfondate, sembrava risere la superficie, originale, non essendo ivi il terreno slegato, simile a quello, che sopr' esso trovavasi, ma dura, e consistentissimo, e diacente in iscannellature, e solehi, con segni evidentissimi del suo essere stato un tempo arato formalmente. Di maniera tale che tutto il terreno paludoso, o tutta la palude sopra diacente sembra evidentissimamente essersi aggiunta fin da quel tempo; e che il legno fosse supposto di origine antediluviana, non riconosca origine effettivamente più antica di quella del tempo degli antichi Romani, od anche per avventura più vicina alle età nostre.

Tutte le paludi, e terreni melancoli, che trovansi in questo nostro Regno, somministrano in maniera somigliante degli alberi fossili, e non solamente in quelle nostre paludi, ma in quelle di altri luoghi eziandio, sonosi in ogni tempo trovati, e scoperti di al fatti alberi accidentalmente. Ci dice *Girardo Cambrésie*, che fino dal tempo del Regno di *Arrigo Secondo* le arene dei lidi della Provincia di *Pembroke* furono alzate, e portate via da particolari busere, e tempesti, e che nelle profonde parti di questi greti, o sabbioneti vennevi scoperto numero immen-

meno delle radici, e dei corpi di alberi trovantisi nella positura loro connaturale; e parecchi di questi mostravano i colpi, e le intaccature delle feuri sopr'essi, rimanendovi così evidenti fin' allora questi segni, come la prima volta, che furono vi fatti. Alcuni di questi assomigliavano all'ebano; e moltissimi di tali alberi vennero di pari scoperti in Neugall nella Contea medesima gli anni di nostra Redenzione 1590. Ci favella il Camdeno di un sì fatto legno trovato nelle paludi in Somersetshire, in Cheshire, in Lancashire, in Westmoreland, nella Provincia di York, in quella di Stafford, ed in quella di Lincoln; e fino dal tempo di questo Scrittore molte, e molte altre delle nostre Contee venger trovate pienissime di tali legni. Il Dottor Plot fa parola di moltissimi di questi legni nella sua Istoria della Provincia di Stafford, e dal loro trovarsi sopra le loro radici, e nelle loro naturali positure, fassi assai più prudentemente a congetturare, e conchiudere, che questi alberi allignavano, e venivano su realmente in quel dato luogo, e che non sono stati colà in modo alcuno condotti altronde.

Il Dottor Leigh nella sua Istoria della Provincia di Lancash ci fa il racconto della medesima sorte di alberi trovati nel trasportare a viva forza i terreni paludosi nel Mare Marino, e pretende, questi alberi non riscocere in verun conto l'epoca del Diluvio Universale, siccome vogliono molti Scrittori.

Osserva questo Valentuomo, come questi evidentissimamente non sono di data più antica del tempo dei selvaggi abitatori dell' Inghilterra intorno appunto i tempi delle Romane conquiste; conciossiachè in questo luogo, oltre le radici, ed i corpi degli alberi, ed il loro frutto, furono vi eziandio trovati otto *canotti*, o fossero specie di piccioli navicelli, che da quella barbara, e selvaggia popolazione di quel tempo venivano appunto usati. Ed in un' altro pantano della Contea medesima fuvi trovata una caldaja di rame, con una picciola macina, ed alcune paltozzine di ambra lavorate. Nel luogo medesimo vengervi similmente trovati parecchi corpi umani belli, ed in-

tieri per lo meno all' esteriore apparenza, e tutta una testa di un Ippopotamo, o Cavallo di fiume. Questa è per avventura la cosa più dura ivi trovata, vale a dire, ad appiattare come la testa di sì fatto animale quivi trovar si potesse, e come potesse colà essere stata condotta. I luoghi paludosi nell' Anglesca non meno, che nell' Isola di Man, son tutti ugualmente pieni di alberi sotterrati della specie medesima, nè meno ne abbondano le paludi dell' Irlanda.

L' Inghilterra, e le Isole ad essa adjacenti, non sono già i soli luoghi, ove trovisi un sì fatto legno sotterrato: avvegnachè ci assicuri il Signor Veritegan, che le paludi, ed i pantani, che trovansi in Netherland, ne sono similmente pienissimi, e questi diciano colla direzione all' aspetto di Tramontana orientale di pari, che i nostri. L' Elmonzio anch' esso parla di un luogo di questa istessa Regione, che è una palude dell' ampiezza di otto in nove miglia, ivi detto Peel, che è piena di copia abbondevolissima di questi alberi, e parti di essi. Ci parlano i Naturalisti Franzesi di pari di certi alberi fossili, che trovansi nel Regno loro; e nelle Terre degli Svizzeri non meno, che nella Savoia, ma sempre costantemente in luoghi bassi e paludosi.

Ci dice il Ramazzini, come quei bei Territorj di Modona, che di presente si trovano asciutti non meno, ma eziandio terre, e campagne coltivate, e fruttifere, null' altro si erano al tempo degli antichi Cesari, che un vastissimo Lago, e che quivi alle profondità di trenta, di quaranta, ed anche di cinquanta piedi trovavasi evidentissimamente, ed innegabilmente il suolo di un paese paludoso, con delle carici, con altre erbe, che nascono nelle paludi, e cose somiglianti proprie soltanto di questi terreni bassi, umidi, e melmosi; e che sotto quell' erbe giacevano vi degli alberi, e tronchi di alberi, e che in vicinanza di questi tronchi stanziano le radici loro nella connaturale lor positura, e direzione usata, appunto come quando trovavansi vegetanti, e vengenti su nel terreno. Quivi stite sono di pari di tratto in tratto rinvenute delle vecchie Medaglie, e Monete dei Romani antichi Impera-

pera-

peratori, non meno, che parecchi busti di marmo scolpiti, e delle pietre riquadrate, le quali cose fanno evidentissimamente toccar con mano, come i Romani antichi possedevano non meno tali istrumenti da lavori particolari; ma eziandio, che ne 'conoscevano l'uso. Alcuni di questi alberi Modonesi sono stati trovati con una posizione contraria, vale a dire fottinsù. Veggansi le Transf. Filosof. n. 275. pag. 986.

LEGNO indorato. Veggasi l' Articolo **DO-RATURA in legno.**

LEGNO di bosaglia da taglio. Nella prima piantagione di una bosaglia da taglio, debbonsi innanzi a tutto avere in mira, e considerare due cose: la prima la natura, ed indole del terreno, affinchè in esso possanvi esser piantati quei tali alberi, che vi possano allignar bene, e farvi buona riuscita; ed in secondo luogo, debbonsi considerare gli usi ai quali hansi intenzione di destinarne il legno, che dovressi vendere, affinchè possanlene ivi piantare di quelle tali specie, che sieno acconce, e proprie per gli usi medesimi.

Se la vendita principale, che abbiasi in animo di fare, sia quella di legne da fuoco, converrà piantarvi quei dati alberi, che sieno i migliori per abbrugiarsi, quali sono, a cagion di esempio, la quercia, il faggio, e tutti gli altri alberi di legno duro, e fatticcio. Si farli alberi sono di grandissimo profitto pel taglio delle legne da fuoco, ed uno, od anche più di uno di questi alberi, farà bene, e riuscirà in qualsivoglia terreno.

Se il paese sia tale, che vengavi fatto spacio grande di cerchi, e di pali, e perciò debbanfi far delle nuove piantare di boschi in queste stesse contrade, allora dovranno piantare degli abeti, dei noci, delle querci, degli ontani, e de' nocciuoli.

Secondo i proventi, e vantaggi del legname basso, dovranno sene regolare le distanze degli alberi da crescita; conciossiachè a norma, che questi vengano piantati più, o meno spessi, così verranno a pregiudicare più o meno il legname ad essi sottoposto, o sia legname basso. Dovrassi di pari considerare di qual crescita, o di quanti anni dovressi tagliare, e ven-

dere il legname basso medesimo. Più alto, e più grosso, parlando generalmente, che farà il legname minuto, o basso di una bosaglia, di maggiore uso, e profitto riuscirà pel fuoco, e per gli altri usi tutti, e gli alberi lasciati, od eletti per piena crescita riusciranno sempre più vegeti, migliori, e verranno su ad un' altezza conveniente, conciossiachè i corpi di questi dati alberi, qualora però non vi s'interpongano accidenti o di grande considerazione a portarsi all' insù dirritti via via, che verranno ad essere, ed a rimanere ombrati dal legname della bosaglia.

Un terreno, o suolo profondo fa sì, che gli arboscelli non meno, che gli alberi stessi, vengano su con maggior vigore, forza, e rigoglio, che in qualsivoglia altro suolo, oltre all' altro vanraggio considerabilissimo, che le bosaglie radicate in suolo di buona profondità faranno venirne prestamente il legname, e con maggior prestezza gli alberi troverannosi in punto di taglio opportuno. La persona, cui apparterranno sì fatte bosaglie, forz' è, che procuri di regolarli onninamente in guisa, che ne venga atterrata soltanto una certa quantità cadaun anno, e che regoli questa faccenda per sì fatto modo, che possa avere una successione costante di sì fatta quantità in ogni, e qualunque anno: conciossiachè quella parte di bosco, che è stata la prima tagliata, possa trovarsi in punto di esser tagliata di nuovo nel tempo, che ne viene atterrata l' ultima quantità. Questa faccenda, in luoghi differenti, in tutte le varietà di numeri, dovrà essere calcolata fra gli otto, ed i venti, o trent'anni.

I tagli de' boschi assai rari, e di buona età somministrano il legno non solamente in copia assai maggiore, ma di molto migliore qualità: ma il tagliare le bosaglie con molta frequenza è soggetto a parecchi disadvantages, avegnachè cid venga a far sì, che il bosco cresca più spesso, e più fitto, e dia alle sementi tutto l'agio di spuntar fuori, e di assepare vie maggiormente. Se nelle bosaglie da taglio sieno vi parecchi alberi da legname, e che debbano essere atterrati, questi dovranno-

vanno esser tagliati insieme colle legne basse, o minute da fuoco, tagliandone le ceppaje più ferratamente al terreno, che far mai si possa negli alberi; e per lo contrario negli arbolcelli, e nelle legne basse, e minute, le ceppaje vogliono esser lasciate alte un mezzo piede incirca, e dovrannoossi tagliare a sgimbescio, e sommamente uguali, e lisce.

Il metodo migliore di atterrare gli alberi da legname da lavoro si è quello di segarli; sebbene ciò viene alcuna fiata ad uccidere la radice; e se questo si conosca, ed osservi avvenire nei boschi da taglio, che non forgano su dalle radici nuovi rampolli, in tal caso converrà disbarbarne fuori per intero queste radici cieche, affinchè non occupino, ed ingombrino inutilmente il terreno, e perchè quel beneficio che esse si prendono dal terreno medesimo senza frutto, possano perderlo, e passare alle tenere piante, che vengono su.

Nel primo alzare, che fatti una nuova bosaglia a forza di semenza, fa innanzi a tutto di melieri che il terreno sia ben lavorato, coltivato, e preparato coll'istesso amore, e fatica, che se vi si dovesse far la semina del grano. I semi di moltissimi alberi debbon esser gittati in terra nel mese di febbrajo; e se il suolo sia di poco fondo, il terreno dovrà essere arato in gran porche: similgiante lavoro farà sì che il suolo medesimo giaccia più siso sopra la sommità di cadauna porca, o rialzamento, e per sì fatto mezzo le radici verranno ad avere una maggiore profondità per scorrere all'ingù, e trovarsi il dicevole nutrimento, e così in pochissimi anni il solco, od incavo della porca verrà a riempirsi delle foglie morte, ed a parggiarsi a livello col rimanente del terreno; e queste foglie via via, che vanno marcendosi nel fondo, vengono a fare una specie di suolo, per cui andranno spandendosi ed allargandosi le tenere radici, e verranno ad esser condotte da una porca all'altra, e per similgiante modo tutto il terreno rimarrà per ogni verso ingombro. In evento, che la bosaglia da taglio debba esser alzata, e piantata nel fianco di una collina, converrà avere le porche incrociate alla china della collina medesima, affinchè l'acqua

possa essere fra esse ritenuta, che non abbia agio di scorrere all'ingù, siccome altrimenti di necessità seguirebbe; se fosse solcata in linee longitudinali non incrociate; ma se egli avvenga, che il terreno sia per ogni verso umido, lo che assai di rado suole accadere, allora dovrà si tenere un metodo totalmente a questo contrario, e le porche, o solchi dovranno farsi ben fondi, e diritti all'ingù; affinchè da le cavità di essi solchi l'acqua esser possa tutta condotta al piè della collina, come da altrettanti fossi, o canali.

Sogliono alcuni fare una semina di grano insieme colle semenze delle legne basse, o minute da taglio pel vantaggio del primo anno; ma siccome la stagione della semina delle semenze degli alberi è soverchio tarda rispettivamente alla semina del grano, rado si è che venga a procurarne un vantaggio di alcuna considerazione. Egli si è per tanto sempre un consiglio migliore il seminare le semenze degli alberi sole, e di perse, ed il conservarle ben rimonde, e ripurgate per i primi due anni dalle mal'erbe: avvegnachè in capo a questo tempo i piantoncini sieno dispersi tanto forti, che vagliano a difendersi essi stessi bravamente da sì fatti loro nemici.

Nei terreni sommamente nudi, ove gli alberi tenerelli a fatica soffrir possono in tempo d'Estate la cocente sferza del sole, ed il caldo grande, sarà sempre dicevole cosa dopo d'averli seminati, lo spargervi per tutto qua e là una conveniente quantità di semi di ginestra: le ginestre vi cresceranno con prontezza, e vivacità, e soverchieranno alla bella prima le vetterelle de' piantocini, ma serviranno loro nell'accennata stagione come di difesa, e riparo, difendendogli dalle ingiurie, e conservando umido il terreno intorno alle loro radici. In pochi anni gli alberi verranno su, ed alzeranno la testa sopra quella specie di siepe, la quale verrà in progresso di tempo distrutta dal gocciare di questi alberi essa soverchianti.

Nel piantare, od alzare le bosaglie da taglio, la propriissima, e sommamente adeguata distanza per le piantagioni dovrebbe essere que' cinque piedi pel legname, o legne basse, o da fuoco, ma quanto al numero, ed alla misura del legname, che

dee

dee esser lasciato in cadauno jugero, dirigono altrui i nostri stessi Statuti, e così altro non diciamo, dovendosi stare a quelli: ma ella si è una bosaglia ordinaria quella, la quale non verrà a somministrar tre, o quattro prime ondate, quattordici seconde, e così in seguito; e secondo questa proporzione le grossezze de' piantoni degli alberi nelle boschaglie da taglio debbono l'una all'altra succedere. Nella macchia o folto del bosco, o legname minuto e basso atterrato, o tagliato della crescita od età di venti quattr'anni, sopra cadauno spazio, o tratto di un jugero dovranno esser lasciati dodici querce di riserbo, oppure, in mancanza di quelle, il numero medesimo d'olmi, di frassini, d'abeti, o simiglianti. Questi sono alberi di tronco diritto, e dovranno esser lasciati finché giungano ad esser d'un diametro di dieci dita alla distanza di un braccio Inglese dal terreno; ma farà sempre cosa migliore per un Proprietario l'aver un numero molto maggiore d'alberi da legname da lavoro, massimamente in quei dati luoghi, ove il legname minuto, e basso trovasi a buon mercato; e quanto al taglio egli è sempre necessario il cominciare da un lato del bosco, affinché i carri, necessari per condur via le legne atterrate, possano venire senza danneggiare il rimanente sul terreno; e nelle grosse, ed ampie boschaglie, farà sempre ottima cosa il lasciarvi nel mezzo una carreggiata, o viale, che possa esser batuto dai carri, della lunghezza, e tratto del bosco medesimo. Il legname del bosco basso, e minuto potrà tagliarsi cominciando dal mese d'Ottobre fino al mese di febbrajo; ma questo ultimo mese è senza paragone migliore, e più acconcio in quei dati luoghi, ove ne dee soltanto esser tagliata una picciola quantità e che può esser tutta atterrata innanzi, che la Primavera trovisi di lunga mano avanzata. Qualsivoglia legname tagliato dovrebbe esser condotto fuori del bosco nella metà dell'Estate, ed alla più lunga dovrebbe accatastarsi nel mese d'Aprile; conciossiachè allora quando i fiumi, e le siepi stanno per terra un tratto di tempo più lungo senz'essere assaitezzate, e legate, vengono a perdere molti dei loro germogli, e bottoni da semenza. Sarà cosa sempre più proficua

senza paragone al proprietario il porre in sicuro il bosco tagliato, e riserrarlo prima, che le venga addosso l'invernata, e così tenerlo a coperto del bestiame, il quale verrebbe eziandio ad arrecare un danno grandissimo al risondimento procedente dalle semenze, e dai teneri rampolli.

I caprecci di fresco spoppati sono i meno pregiudiziali agli alberi di fresco tagliati di qualsivoglia altra creatura, e possono esser lasciati a solare a talento in tutti quei luoghi ove trovisi quantità grande d'erba; dopo di questi i meno pregiudiziali a questi alberi medesimi di fresco atterrati sono i puledrini non più vecchi di un'anno, e possono di pari lasciarsi in questi dati luoghi pascolare infino a tutto Aprile; ma nell'apparire del mese di Maggio debbon tutti tener quindi onninamente dilungati.

Se avvenga, che gli alberi sieno stati brucati dal bestiame, farà sempre minor male il tagliargli alla bella prima, che aspettare che rigermoglino; avvegnachè quell'occhio, che è stato mozzato, e portato via dal dente di questi animali, non verrà fu in alcun grado, nè crescerà per anni parecchi.

Se le boschaglie da taglio sieno soverchio sottili, dovranno riparar si fatto inconveniente col porvi già i lunghissimi, ed i picciolissimi rampolli di quelli arbusti, od alberi, che sono più vantaggiosi nel luogo, o di quelli, che trovinsi in grandissima vicinanza dello spazzo: cadauno di questi rampolli manderà fuori numero grande di gemme, e per si fatto modo tutta la bosaglia verrà a spessirsi quanto mai altri possa desiderare, in brevissimo tratto di tempo. Veggasi *Motimer*, della Coltivazione, Vol. 2. pag. 64.

LEPRE. Distinguono i cacciatori quattro forti di questo animale: la prima di quelle lepri, che vivono su i monti: la seconda specie di quelle, che vivono nei campi aperti, ed alla pianura: la terza specie di quelle, che stanziano in terreni paludosi; e la quarta in lepri vagabonde, come quelle, che non hanno stanza fissa. Ella è cosa agevole a conoscersi, che quelle distinzioni non cadono per conto veruno sotto l'occhio dei Naturalisti; ma tuttavia non mancano di possedere le loro parecchie proprietà.

prietà rispettive, secondo queste additate differenze di luoghi, le quali sono di momento, e di conseguenza al Cacciatore. Così le lepri montagnole sono le più veloci, e snelle di tutte le altre; dove per lo contrario le lepri, che amano di stanziare in luoghi umidi, sono le più pigre: le lepri de' campi aperti hanno un grado di mezzo di velocità e sveltezza fra queste due prime; e le lepri erranti finalmente sono le più difficili ad essere inquisite, e colte alla caccia, delle altre tutte come quelle, le quali non solamente son le più snelle, e veloci di qualunque altra leprie, ma perchè elle conokono molto bene tutti gli andirivieni, le fratte, ed i nascondigli, e posseggono l'arte di fare mille giravolte, e scappatoie, alle quali le altre non badano.

Le lepri non meno, che i conigli, sono perniciosissime alle nuove piantagioni dei broli, massimamente dei meli, come quelle, che vanno radendo via, e divorandosi la tenera buccia de' piantoncini per ogni, e qualunque verso: la specie medesima di malanno producono questi flussi animali a tutti i seminarij d'alberi; ond'è che certuni per impedire sì fatto malanno circondano tutt' all' intorno questi alberi tenerelli di corda ad una tale altezza dell'albero stesso, che esser possa raggiunta da questi animali stanziosi su le tampe di dietro: alcuni altri poi imbrattano questi piantoncini con della pece liquida; ma tuttochè questa difenda l'albero dall'esser malmenato da sì fatte bestiole, nulladimeno l'albero medesimo viene dallo stesso rimedio danneggiato, e pregiudicato: questa proprietà offensiva però della pece liquida può in alcun grado esser minorata col mescolarvi qualsivoglia specie di grasso d'animale, procurando, che queste due sostanze vengano a forza di fuoco ad incorporarsi ben bene l'una l'altra. Questa mescolanza dovressi applicare all'albero nel mese di Novembre, e basterà a conservarlo difeso dalla divisata ingiuria fino allo stesso termine del vent'ro anno, senza che questi animali tampoco vi si appressino. Quelle bestiole cibarsi di queste scorze, o bucce d'alberi tenerelli nell'Invernata, vale a dire, allorchè si scartellano per ogni dove di qualsivoglia altro cibo loro appropriato.

Suppl. Tomo III.

Quelle persone che hanno la cura delle conigliere, o de' ferbatoy, con una scaltrezza loro arte pretendono d'ingrassare le leprie, allorchè colla entro le pongono. Costoro chiudon loro le orecchie colla cera per modo, che rendon lordo l'animale. E' la leprie un'animale a segno timoroso, che flussi eternamente coll'orecchie tese per udire qualsivoglia strepito, benchè menomo, ed all'ombra menoma di sospetto di trovarsi in pericolo alla corre precipitosamente; di modochè cibasi sempremai la leprie con timor sommo, e continuatamente perciò ella smagrisce. Ambedue questi pregiudizj le vengono tolti coll'esser posta a cibarsi in luogo sicuro, e senza apprensione, o timore, e questa gente, che usa tal'arte, ci assicura, che per simigliante guisa non falla mai la leprie di divenir grassa, ben nutrita, e fatuccia.

LETTO. Letto di Giustizia, *Lit de Justice* nelle Leggi della Francia viene a denominare un Trono, nel quale flussi collocato il Re nel Parlamento. Veggasi *Tillet*, sur le lit de Justice par. 1. pag. 255. & seq. & Par. 2. pag. 67. & seq. Trev. t. 3. pag. 1495. in Voce *Lit de Justice*.

In questo senso vien ivi detto, che il Re tiene il suo letto di Giustizia; allorchè egli si poria al Parlamento di Parigi, e tienvi una sessione solenne sotto un'altissimo baldacchino, quivi per tale effetto innalzato.

Il Letto di Giustizia è soltanto tenuto sopra quei tali affari, che hanno relazione allo Stato: nella quale occasione gli Uffiziali tutti del Parlamento compariscono in toghe rosse; ne' tempi andati comparivano in toghe nere. Parecchi Scrittori hanno trattato ex professo delle ceremonie del letto di Giustizia. Veggasi *le Long Hist. Bibl. S. 10825. & seq. pag. 363.*

LETTO di un cannone. Per questa espressione intendesi un pezzo di ravola aggiustato dentro le intellature del carretto, in mezzo al traverso, per la culatta del cannone, per ivi posarsi. Veggasi *Goullier*, Dizion. Gent. Par. 2.

LETTO, o *sedile di un mortaro*. E' questo un fondo pezzo di goercia tagliato in forma di un paralleloipede più, o meno grosso, secondo, ed a proporzione delle dimensioni del mortaro medesimo, alcun

F f poco

poco incavato nel mezzo, per ricevere la culatta, e la metà dell'imbracature.

Nelle fiaocate, o lati del letto trovansi affisse le brachette per mezzo di quattro chiovistelli di ferro. Veggasi *Guillet*, ibidem.

Nei Vasecelli, allora quando il ponte d'esso vasecello giacesse soverchio basso dai porti, di modo che i carretti dei pezzi d'artiglieria, colle ruote, non possono montare l'ordinanza tanto, che bassi, ma trovansi troppo dappresso alle bande, o gradini del cannoce, il metodo usato si è di fare un falso, o polliccio d'esso tanto che bassi perchè il suo traverso trovisi più elevato, e questo i marinaj dicono similgiamente letto. Veggasi *Manu Dizion.* della Marina, pag. 7.

LETTO da mensa. *Letus Trinitarius*, oppure *Disfrutietius* appellavasi uo letticiuolo, io cui gli Antichi giacevansi allora che stavano a mensa.

I letti da mensa erano quattro, o cinque piedi alti. Tre di questi letti erano originalmente disposti da una tavola quadrata (quindi è, che tanto la tavola, quanto la camera, o salotto, o tinello, ove gli Antichi si cibavano, appellavansi *Trinitium*) io sì fatta maniera, che uno dei lati, e fiancate della tavola veniva a restare aperta per l'accesso alla mensa di coloro, che serviv dovevano i convitati. Cadaun letto era capace di tenervi tre, o quattro persone, radissime volte cinque. Veggansi *Memoires Acad. Inscript. Paris*, Tom. 2. pag. 428. & seq. *Pitiscus*, *Lexicon Antiq.* tom. 2. pag. 448.

Non erano questi letti conosciuti innanzi la seconda Guerra Punica. I Romani adunque fino a quel tempo corcavansi già a cibarsi sopra tavoloni piani di legno, ad imitazione degli Eroi d'Omero, o, come ei esprime Varrone, alla foggia dei Lacedemoni, e dei Candiotti. Scipione Africano fu il primo che inducesse intorno a ciò una novità. Condotta aveva seco questo immortale Capitano d'armata alcuni di questi piccioli letticiuoli appellati *Puniri*, o *Punicani*, ovvero *Arbacei*, (a) essendo di un legno sufficientemente usato, sommamente bassi, ripieni od aggiustati di sola paglia, o fieno, e coperti con delle pelli o di pecore, o di camozze, *bedinis*

pellibus strati. Non viera in realtà gran differenza, quanto alla delicatezza, fra questi nuovi letti, e le antiche tavole piane; ma la costumanza del frequentissimo uso del bagno, che allora appunto principiò ad aver voga, coll'ammorbire, ed infievolire il corpo, mise gli uomoi nella necessità di sperimentare, e tentare per le medesime di giacersi più comodamente con adagiarsi per lo lungo, e distesi, che collo starsi a sedere per terra. Quanto alle fermioe non sembrò alla bella prima adirsi gran fatto colla loro modestia l'adottare la nuova moda di coricarsi alla tavola lunghe distese: e celeremente elle conservarono il vecchio costume tutto il tempo della Repubblica: ma fino dal tempo dei primi Cesari elleno stavansi a tavola bravamente oci loro letti. Quanto alla gioventù, che per anche assueto non aveva la Toga virile, per tutto questo tratto di loro età conservavano l'antica disciplina. Allorchè questi ammessi venivano alla mensa, assidevansi soltanto sull'orlo dei letti dei loro parenti più stretti. Nè tampoco, dice Suetonio, gli stessi giovani Cesari Cajo, e Lucio, cibavansi alla tavola d'Augusto; ma si adagiavano in *imo loco*, oppure come Tacito s'esprime, *ad lectifulera*. Dalla massima semplicità i Romani grado per grado, fecero montare i loro letti da mensa ad una magnificenza veramente sorprendente. Plinio (b) ei assicura come non era già cosa ova il vedergli tutti vestiti di piazze d'argento, ornati con morbidissime materasse, e con ricchissime e vaghissime coperte.

(a) Veggasi Horatius, *Epist.* 5. *Libri* 1. e Galland nelle *Memoires dell' Acad. delle Iserizioni ann.* 1702. pag. 220. (b) Plinio, *Hist. Natur. Lib.* 33. *cap.* 11.

Parlando Lampridio d'Elogabalo, dice come questo marcio Epiearco aveva dei letti di solidissimo argento, *solido argento habuit lectos, & trislinares, & cubiculares*.

(c) A tutto ciò noi possiamo aggiungere, che Pompeo nel suo terzo Trionfo venne condotto in letti d'oro. (d)

(e) Veggasi Lamprid. in *Heliogabal.* *cap.* 20. (d) Plin. *Hist. Natur. lib.* 37. *cap.* 2.

In Seneca, e presso i Poeti leggiamo molte cose intorno a questi letti, vale a dire,

dire,

dire, rispetto alla lor materia non meno, che alla lor forma, eui addobbavano colla più fina porpora, e contornavano con i più ricchi, e liguisti galloni. (e) Il Ciacconio nella sua Dissertazione *De Triclinio* ha parlato di simigliante soggetto ampiamente. Il contrapposto è a maraviglia bene espresso in quel passo d'Ovidio. I letti dei Padri nostri erano soltanto adornati d'erba, e di foglie: gli stessi ricchi uomini fra essi, e facoltosi, non oltre passavano, rispetto alle coperte dei loro letti, le sole, e semplici pelli: *Qui poterat pelles adde, dives erat.*

(e) Veggasi l'Abbè Couture; *Dissertation de la vie privée des anciens Romains*, §. 4. in *Memoires Acad. Inscript. Paris*, Tom. 2. §. 429. & seg. Potter. *Archaeol. Lib. 4. cap. 20. pag. 376. & seg.*

LETTI nella faccenda de' Giardini, e degli orti, sono denominate certe porche, o rialzamenti di terreno assai comunemente preparati per meloni, per funghi, e somiglianti.

I funghi fatti venir su in questi rialzi, o letti di terra di giardino, non sono così buoni, e gustosi, come quelli che nascono nelle foreste, e nel loro suolo connaturale. Veggasi *Bradley*, Nuove Esperienze intono alla Giardin. Parte 2. pag. 135.

LETTI caldi, nel medesimo affare degli orti sono quei particolari spartimenti di terreno governato con una copia straordinaria di concimatura, e tenuti difesi dall'aria fredda con copertoi di paglia, o di strame, con stuoje, fabbriche, e tettoie di legno, e somiglianti, e servono per fiancheggiare, solleccitare, e promuovere la crescita delle piante, e per violentare una vegetazione in quei dati luoghi, ne quali, od il clima, o la stagione del medesimo non è bastantemente calda per promuovere per se stessa questo lavoro della natura. Veggasi *Bradley*, Nuove Esper. sopra la Giardinier. Par. 3. cap. 1. pag. 131. Veggasi l'Articolo CALDO letto.

Per formare un letto caldo nel mese di Febbrajo, od anche innanzi, per farvi dei quadri di cavolfiore, di cocomeri, di pomoni, di radici, o d'altre pianterelle d'indole tenera, e delicata, oppure eziandio dei fiori, scelgono i nostri Ortolani, e Giardinieri un luogo tepido, ben difeso da tut-

ti i venti, rinchiuso con una palafitta, oppure con un rialzo di canne, o di paglia legata insieme, ed incatramata tutta bene con dello sterco di cavallo, che abbia otto giorni ben incatramato, ed induritosi perentro, e bene spianato, e livellato sopra questa specie di graticciata per tutta la sua cima: sopra questo concio vi distendono della ben grassa terra alla grossezza di quelle tre in quattro dita. Quando l'estremo caldo del letto è giunto al suo punto, lo che può conoscersi dal suo pungere le dita, piantarvi colloro le loro semenze. Fatto questo piantano de' sorconi della sola altezza di cinque sopra il letto, e quelli per sostenere una specie di stuoja, o graticcio fatto di stecche, cui essi cuoprono con dello strame, e ciò per assicurare i talliti semi dall'ingurie della stagione. Via via, che le Pianterelle vanno alzandosi, vanno loro dando terra; e poichè sono a segno forsi da poter far tela all'aria fredda, le trapiantano in letti di terreno naturale. Veggasi *Bradley*, loco citato *Diét. Rust. in Voce.*

LETTO di paglia, lettiera per i cavalli. Allorchè un cavallo arriva stanco alla sua stalla, la lettiera, o letto di paglia rinfrescatogli sotto, ha sempre e costantemente la virtù di farlo immediatamente orinare, che in vero, e genuino termine appellasi stallare. Questa faccenda è oggimai conosciuto, arrecare un sommo beneficio ad un cavallo affaticato, e stanco; ed allorchè questa lettiera o letto di paglia è vecchio, e schifo, e fangoso, non produce alcun buon'effetto nel cavallo medesimo. Se i padroni dei cavalli conoscessero, quanto grande sia il vantaggio, e beneficio, che ne risulta ai suoi cavalli dal rinfrescar loro questo letto di paglia, per fargli bene orinare, allorchè tornanti stracchi dalle loro carriere, e fatiche, sarebbero indubitabilmente assai più diligenti di procurar loro per ogni verso simigliante scarica. Si fatto stallare dei cavalli, dopo la fatica, impedisce assolutamente quelle ostruzioni nel collo della vescica, e nei canali urinari, alle quali con grandissimo danno loro sono i cavalli pur troppo sottoposti: conciossiachè avvenga assai spesso e siate, che la vescica loro venga ad infiammarsi a motivo della lunga ritenzione, o stanziamiento in essa

dell'orina riscaldata, e per sì fatto maleore la bestia perisce sicuramente, e si perde. Al uni dei nostri fattori, od agenti fanno un pessimo male rispetto a questa faccenda del letto di paglia dei cavalli, e questo non già per trascuratezza, ma per principio, e per massima: Ordinano pertanto coltore, che quelle vecchie lettieri sieno per lungo tratto di tempo lasciate nella stalla, affinchè possano rimanere impregnate in un grado, quanto mai esser possa maggiore, d'orina, di sterco, &c. dell'animale, e così, vengano ad esser fatte più grasse, e più ricca concimatura per le campagne. Non può negarsi, che il concime venga per cotai mezzo a rendersi infinitamente proficuo ai terreni; ma questo beneficio viene senza proporzione contrab bilanciato dal male, e pregiudizio grande, che una tal faccenda cagiona indubitabilmente ai cavalli. Il calore, che questo concio viene ad acquistar dallo starsi questa paglia mescolata quivi coll'altre mondiglie insieme, divorasi i piedi di queste creature, e rende inabili a qualunque servizio, e produce in loro moltissime malattie; le quali vengono ad essere continue non meno, che accresciute dal continuo novello accrescimento del calore prodotto da questo concio fermentante, di modo che, se la faccenda va punto punto a lungo, ella viene alla per fine a terminare nella perdita dei cavalli, e ciò per mera, e preta ignoranza.

LEVRIERO. Fra una covata di levrieri lattanti, i migliori per allevare sono sempre e costantemente quelli, che sono leggerissimi. Questi allorchè saranno cresciuti diverranno i più leggieri, i più snelli, ed i più veloci levrieri, che dar mai si possano. Queste covate di levrieri, od i levrieri giovanetti farà sempre meglio sargli in campagne aperte, ove siavi poco tratto di terreno coperto: in questi luoghi appunto, ove avravi una corsa, o carriera di due miglia, e di vantaggio per dar dietro ad una lepre, e nei quali non meno il cane, che la lepre siano per ogni, e qualunque verso visibili. Vien supposto, che una cagna levriera la vincerà sopra un maschio in correndo; ma questo sembra un'errore: conciossiachè il levriero maschio egli è non solo più lun-

gho di vita, ma etiandio più gagliardo di una cagna levriera di assai. Nell'apparire siffatta razza di cani degli massimamente aver l'occhio alla Cagna; avvegna- chè tocchisi con mano per esperienza, che il migliore e più perfetto levriero accoppiato con una cagna levriera di inferior qualità, ed imperfetta, non genera così buoni levrieri, come lo fa un levriero non perfettissimo, ed inferiore anzichè ad, con una levriera ottima, e ben tenuta. Bisognerebbe, che non meno il cane, che la cagna fossero a un di presso dell'età medesima, e per avere un levriero da razza veramente buono, non dovrebbe passar l'età di quattr'anni. Una Cagna vecchia può benissimo essere accoppiata con un levriero giovane; ma i cagnolini nati da cagna, e can levriero ambedue vecchi, non sogliono riuscire mai buoni a nulla. Il cibo comune, ed universale de' levrierotti esser dovrebbero croste di pane, con delle ossa sottili di tenerume, e cartilaginose, e queste croste dovranno loro inzuppare in brodo di manzo, o di castrato; e quando questa specie di zuppa è prestochè fredda, dovravvisi mescolare una porzioncella di latte. Si fatto cibo apprestato ai levrierotti mattina, e sera, i gli manterrà sanissimi, vigorosissimi, e pieni di spirito, e di brio. Fa onninamente di metterli il guardarsi da lasciare aver loro dinanzi delle ossa dure; avvegna- chè queste induriscan sempre loro la bocca, e danneggino i loro denti. In evento, che con una sì fatta pultura il levriero venga fitrillo, e debole, ed infermiccio, allora prenderai delle teste di pecora colla lor lana sopr'esse, le laverai ben bene, e le farai cuocere in adeguata quantità di acqua, per quindi cavaroe un'ottimo, e gagliardissimo brodo; ed a questo vi aggiungerai una buona quantità di farina di vena. Quando le teste saranno morbichissime, e sommamente tenere, ed il brodo assai siso, e ben ricco, allora farà ottimo per porli innanzi al tuo levriero intristito, ed ora facendogli mangiare la farina, ora le teste cotte nella divisa maniera, il tuo cane riavrassi, ed in breve lo rivedrai ben palciuto, sano, e vigoroso.

Se tu voglia far correre uno di questi cani

cani per una scommessa, o per qualunque altra occasione particolare di tuo impegno, lo andrai cibando con un pane fatto nell'appresso maniera: Prenderai un quartiero di ottima farina di grano, e la quantità medesima di perfettissima, ed asciutissima farina di vena, che sieno state macinate insieme, quindi procurerai, che quella mescolata farina venga stacciata in guisa, che ne venga fuori il solo finissimo fiore: a quello fiore v'aggiungerai una polvere di liquirizia, e di anaci in quella data porzione, che non possa compartire al pane un sapore disgustoso, e di questa massa così preparata ne farai una pasta a forza di chiare di uovo. Di questa pasta ne andrai componendo dei piccioli panettini, e procurerai, che il Fornajo gli cuoca a segno, che vengano, e riescano considerabilmente duri; e quando ne dovrai cibare il tuo levriero, gli dovrai questi panetti medesimi inzuppare in brodo di bue, od in altro brodo a tuo piacimento. Ogni mattina sul levar del sole lo farai fare una passeggiata di una buona mezz'ora, e similantemente un'altra passeggiata ogni sera pure di una mezz'ora verso il tramontare del Sole, e nel tornarvene che farà a casa, lo ristorerai colle sopradescritte zuppe.

Il proprio ed acconcio esercizio per un levriero giovanetto si è il farlo correre tre volte la settimana, ricompensando la sua fatica nel suo ritorno con una porzione di sangue di animali, lo che animerà in grado estremo, e l'incoraggerà grandemente a dar dietro alla preda. Ma farebbe altresì di mestieri, che la lepre giuocasse alla scoperta, ed in campo aperto. Ella dovrebbe essere una legge, siccome è stato detto, che la lepre si fosse alzata a segno, che trovasse dilungata dal covo, ove è stata trovata a cavaliere, pel tratto di buone dodici braccia Inglese, prima che il levriero se la lasciasse dietro, e questo affinché il cane possa trovare alcuna difficoltà nell'inseguirla, e che non acciuffi con soverchia prestezza la preda. Se egli uccide la lepre, fa onninamente di mestieri il non permettergli in conto veruno, ch'ei la sbrani, o la eri; ma conviene prontamente strappargliela di bocca, e poscia nettargli ben bene la bocca

sua medesima colla pelle, o pelo della lepre, e poscia per incoraggiarlo vicinaggiamente dargli a mangiare il fegato, ed i polmoni dell'ucciso animale. Ciò fatto dovrai condurre a casa, e se gli dovranno lavare i piedi con del burro, o della birra, ed un'ora in circa dopo, ch'ei si sarà riposato, gli darai l'usato suo pasto.

Allorchè dovrai condurre alla corsa il tuo levriero, null'altro dargli dovrai quella mattina, salvo che una sola fetta di pane abbrustolito inzavardata di burro, e poscia lo leggerai alla sua catena, ove lo terrai fino a che l'ora sia di condurlo ai campi. Di grandissimo uso si è il tener quella razza di cani in catena, dando loro spirito, e sveltezza grandissima il vederle quelle date volte, che debbono operare, disciolti; ed il metodo migliore di allevare un' eccellentissimo levriero si è quello di non lasciarlo uscir di catena, e del suo canile giammai, salvo che nei soli tempi di cibarlo, e di farlo passeggiare, o di condurlo alla caccia, od in corlo.

LIDI. Vengono i lidi del Mare divisi dal famoso e dotto Conte Marigli in tre porzioni, secondo le quali tutte le sue descrizioni sono date, nelle sue istorie dell'alveo del mare. La prima parte del lido è quel tratto di terreno, al quale arriva appunto il mare nelle maree, e nelle tempeste, ma che non è mai dal mare medesimo coperto: la seconda parte del lido è quella, che riman coperta allorchè il mare è grosso, e nel suo flusso, ed anche in tempo di tempesta; ma che rimansi asciutta in altri tempi; e la terza si è il declive dalla medesima seconda parte, e quella riman costantemente coperta dall'acque.

Altro non è la prima parte, che una continuazione del continente, e che non soffre alterazione dalla vicinanza del mare, se quella s'accettui, che è stata renduta acconcia per la crescita, e piantagione di alcune piante, e che per lo contrario non è nè poco, nè punto propria, ed adattata alla piantagione di parecchie altre, e ciò a motivo degli strati, ed impregnamenti salini; ed è appena cosa da poter esser concepita da chicchessia, salvo che da quei soli, che l'hanno offerta,

vata,

vata, quanto lontano si stendano sopra i terreni gli effetti del Mare, fino a ridurre il terreno medesimo proprio, ed acconcio per le piantagioni, che non vengono innanzi, senza una somigliante particolare influenza; parecchie piante assai frequentemente trovandosi nelle alte colline, e nei luoghi asciutti in distanza di quelle tre, quattro, ed anche più miglia dal mare, le quali tuttavia non allignerebbono, se non in vicinanza di quello, e che per conto alcuno non vederebbonfi, nè triverebbonfi altrove.

La seconda parte, o porzione dei lidi è molto più infestata dal mare di quello sia la prima porzione, come quella, che assai sovente viene ad esser bagnata, e percossa da quello. I suoi prodotti sono il sale depositato dall'acqua, e che ivi rimanfi coperto dall'arena, oppure da frammenti, e rottami di nicchi, e conchiglie in forma di sabbione, ed in tali particolari luoghi da una materia tartarosa, ivi dall'acque depositata; ed il colore di tutto questo particular tratto di terreno è comunemente cupo oscuro, massimamente ove vi sieno foci, e pietre, e quelle son tutte coperte da una materia assai viscosa.

La terza porzione finalmente dei lidi è assai più investita dal mare medesimo delle altre due finora divise, e questa è tutta coperta di una crosta, od incrostatura uniforme della vera, e genuina natura del fondo stesso del mare, salvo che vi risorgono delle marine piante, ed animali, le parti perite dei quali prodotti l'alterano di alcun poco.

LIMITI. Nelle Matematiche viene talvolta fatto uso di questo termine in generale, per esprimere quantità, delle quali una è maggiore, e l'altra è minore di un'altra quantità. Così, a ragion d'esempio, nelle quantità a, x, b , se a sia minore di x , e b sia maggiore di x , a , e b , vengono detti i limiti di x . Il termine occorre appunto in questo senso, allora quando noi parliamo dei limiti delle Radici delle Equazioni.

Alcuna siata vien detto, una quantità essere un limite fra due altre quando ella si è maggiore dell'una, e minore dell'altra. Così una Ragione, o Proporzione vien detto, essere un limite fra due altre Ra-

gioni, o Proporzioni, quando appunto ella viene ad essere maggiore dell'una, e minore dell'altra.

Ma la voce Limite vien bene spesso usata in un senso assai più circoscritto: Così, quando una quantità variabile va continuamente avvicinandosi ad alcuna quantità determinata, e che può avvicinarsi più dappresso alla medesima di qualsivoglia altra differenza data, ma che non può trapassarla, allora vien detto, la quantità determinata essere il Limite della quantità variabile.

Quindi può dirsi, che il Circolo sia Limite de' suoi Poligoni sì circoscritti, che inseriti, perchè questi coll'accrefcere il numero dei loro lati posson'esser fatti differire dal circolo medesimo meno di qualunque altro spazio, che esser possa proposto, per quanto picciolo esser si possa.

Il Limite di una Ragione, o Proporzione variabile, è alcuna Ragione, o Proporzione determinata, alla quale la Ragione variabile può continuamente avvicinarsi, e venir più dappresso alla medesima di quello far possa qualunque altra differenza, ma non può trapassarla. Quindi la Ragione dell'Ordinata alla sotto-tangente di una curva vien detto, essere il limite della Ragione variabile delle differenze delle Ordinate alle differenze delle Abscisse.

Il termine Limite in questo senso vien ad importare la cosa medesima, che dall'immortale Isacco Newton appellasi prima, ed ultima Ragione.

Vi sono due casi di una quantità variabile, o variabile Ragione, tendenti a quel dato limite, che noi siamo appunto andati descrivendo.

Nel primo caso la quantità variabile, o dir la vogliamo Ragione, non solo s'avvicinerà al suo limite più di appresso di qualsivoglia data differenza, ma arriverà attualmente al suo limite stesso.

Nel secondo caso la quantità variabile, o Ragione, approssimerà soltanto al suo limite dentro meno di qualsivoglia data differenza ma non lo raggiungerà, come l'altra, attualmente.

Il grande Isacco Newton per ischifare appunto la durezza della Ipotesi degl'indivisibili, e la tediosissima prolissità delle di-

dimostrazioni, secondo il metodo de' buoni Antichi, per via di deduzioni *ad absurdum*, ha premesso parecchi Lemma nella prima Sezione del primo Libro de' suoi Principi, aventi relazione alla prima, ed all'ultima somma, e Ragione. Simigliante Dottrina dipende massimamente dal primo di questi Lemma, i termini del quale sono.

„ Quantitates, ut & quantitarum Rationes quæ ad æqualitatem tempore quoque vis finito constant tendunt, & ante finem temporis illius propius ad invicem accedunt, quam pro data quavis differentia, sunt ultimo æquales. “

I dottissimi Valentuomini che hanno scritto in difesa del grande Isacco Newton, contro l'Autore dell'Analisi, non si accordano fra di loro, rispetto all'intelligenza precisa del soprascritto Lemma. Uno di questi Sapienti (a) dice, che il genovino importare di questa Proposizione si è, che quelle quantità debbono essere per ultimo riputate uguali, e quelle Ragioni per ultimo le medesime, le quali trovansi perpetuamente l'una all'altra in una siffatta maniera, che qualsivoglia differenza, per quanto ella siasi minuta, essendo data, possa essere assegnato un tempo finito innanzi del termine di essa, la differenza di queste quantità, o Ragioni verrà a divenir minore di quella data differenza.

(a) *Veggosi presente stato della Repubblica della Lettere pel mese di Ottobre dell' 1735. e per l'Ottobr. del 1736.*

Ciò, che intendasi Isacco Newton, che noi dobbiamo prendere per ultima uguaglianza di grandezze, e per ultima Identità di Ragioni, proposte in questo Lemma, verrà assai meglio ad esser conosciuto dalla dimostrazione annessa al medesimo. Da questa egli apparisce evidentemente, come Isacco Newton non intese, che qualsivoglia tempo che fosse assegnabile dentro quelle grandezze varianti, divenisse attualmente uguale, oppure le Ragioni realmente, ed identicamente le medesime; ma soltanto che potesse esser nominata qualunque esserli volesse differenza, la quale queste grandezze, e Ragioni non passassero.

L'ordinata di qualsivoglia diametro di un' Iperbola è sempre, e costantemente

minore della medesima continuata all'Asintote; tuttavia la dimostrazione di questo Lemma può essere applicata, senza neppur cangiare un sol termine, per provare la loro ultima uguaglianza.

La cosa medesima è evidente pel Lemma, che immediatamente ne seguita, ove vengono inscritti i Parallelogrammi, e gli altri circoscritti ad uno spazio curvilineare. Ivi il primo Lemma viene applicato per provare, che per via di moltiplicare il numero, e per diminuire l'ampiezza di questi Parallelogrammi in *infinitum*, che è quanto dire, perpetuamente, e senza confine, le figure tanto iscritte, che circoscritte, divengono ultimamente uguali allo spazio curvilineare, ed a cadaun' altro; dove per lo contrario egli si è evidente, che non può essere assegnato punto di tempo dentro del quale vengano ad essere attualmente uguali. Per supporre questo ci converrebbe asserire, che la variazione ascritta a queste figure, qualunque senza termine, venisse condotta ad un periodo, e fosse perfettamente compiuta; e così noi verremmo di bel nuovo ad inciampare nel non intelligibile linguaggio degli indivisibili. L'eccellenza di questo metodo consiste nel fare il vantaggio medesimo di questa approssimazione senza termine verso l'uguaglianza, e per l'uso degl'indivisibili, senza venire a rimanerci involti nelle affurdità di questa Dottrina. In breve, la differenza fra queste due può essere appianata così.

Sonovi in natura sole tre maniere di comparare gli spazj: una si è col mostrare, che sieno per sì fatto modo composti, che venendo ad addossare l'uno sopra l'altro, comparisca, che occupino il luogo medesimo: La seconda è con mostrare la loro proporzione ad alcuna terza: e questo metodo può essere soltanto direttamente applicato a spazj simiglianti, non altrimenti, che il primo: perchè questa proporzione fa di mestieri, che sia finalmente determinata col mostrare, quando i multipli di tali spazj sono uguali, e quando differiscono in fra essi: il terzo metodo dovrà essere messo in opera, allorchè i due sopradescritti manchino fra mano, e non riescano, ed è con descrivere sopra gli spazj, de' quali parliamo,

mo, quelle tali figure, che esser possano comparate per via dei primi metodi; e quindi deducendo la relazione fra questi spazj, per mezzo di quella indiretta maniera di prova, che comunemente addimandasi *deductio ad absurdum*; e questa è una dimostrazione di pari concludente, che qualsivoglia altra; avvegnachè sia indubitabile, che quelle cose sono uguali, le quali non hanno differenza. Così Euclide, ed Archimede dimostrano tutto ciò che hanno scritto in rapporto al comparare, ed al misurare gli spazj curvilineari. Il metodo proposto dal grande Isacco Newton per l'impresa medesima differisce soltanto dai metodi loro per applicare questa forma indiretta di prova ad alcune Proposizioni generali, e quindi dedurre il rimanente da una forma diretta di raziocinio. Chiunque facciasi a comparare il quarto Lemma di Isacco Newton col primo, vedrà, come la prova degli spazj curvilineari, ivi considerata, avendo espressa la proporzione, dipende interamente da questo, che se fosse altrimenti, la figura inscritta dentro di uno di essi non si approssimerebbe per alcuna certa distanza alla grandezza di quello spazio; e questa si è precisamente la forma del raziocinio, per cui Euclide fassi a provare la proporzione fra Circoli differenti. Siccome questo metodo nelle scritture de' buoni Antichi è in estremo diffuso, ed esile; e siccome Isacco Newton in ciò si è espresso con una sì fatta brevità, che il giro del suo argomento può agevolmente sfuggire dalle menti di chi lo legge; così forse, che il leggere gli Antichi divenga la migliore introduzione per arrivare a ben comprendere il suo metodo. L'impossibile tentativo di comparare spazj curvilineari, senza ricorrere né poco, né punto al poco anzi mentovato metodo indiretto di argomentare, venne a produrre l'Assurdo degli indivisibili.

Siccome le grandezze chiamate in questo Lemma ultimamente uguali, non possono assolutamente esistere sotto quella uguaglianza: così le grandezze varianti sostenendo l'una all'altra le Ragioni variabili, ivi considerate, non possono esistere sotto quella, che ivi è appellata loro ultima Ragione. Di questo somministra

Isacco Newton un' esempio preso da linee aumentantisi insieme per mezzo d'aggiunte uguali, ed aventi una data differenza dalle prime. Conciossiachè la Ragione ultima di queste linee, nel senso di questo Lemma, siccome fassi ad osservare Isacco Newton stesso, sarà la Ragione di uguaglianza, non potendo in conto veruno esser assegnato punto di tempo, quando una non trascenda, o soverchi.

In guisa similante, le Quantitati da Isacco Newton appellate dileguantisi, non possono sussistere sotto quella proporzione riputata ivi la loro ultima.

Nel caso di tirare le tangenti alle curve, ove l'ordinata porta la medesima Proporzione alla sottotangente, come quella colla differenza delle Ordinate, alla differenza delle Abcisse, svanisce, e dileguasi; così forse, che queste linee non vengano ad essere concepite, per mezzo del nome d'una dileguantesi, o per qualsivoglia altra appellazione, per sussistere sempre sotto quella Proporzione: conciossiachè se noi concepiremo, che queste linee in qualunque maniera sussistano sotto questa Proporzione, tuttochè nell'istante medesimo di loro dileguamento, noi verremo a cadere, e ad impastoiarci nella non intelligibile nozione degli indivisibili, per via di andarci studiando di rappresentare all'immaginazione alcuna non concepibile specie d'esistenza di siffatte linee fra il loro avere una grandezza reale, ed il divenire un assoluto e mero nulla. Isacco Newton medesimo temeva, che fosse per esser preso questo granchio a secco; conciossiachè, siccome egli pensa dicevole e proprio (nella condiscendenza pel pravo e cattivo gusto, che allora dominava) il continuar l'uso di alcune sconciute ed indistinte espressioni, assomigliantisi a quelle degli Indivisibili, per le quali quell'immortale Matematico vindicò se medesimo, egli si fa espressamente ad avvertire, che noi non lo interpretiamo per avventura malamente in questa maniera: e ciò appongo egli fa, quando dice: *Si quando dixerit Quantitates quam minimas, vel evanescentes, vel ultimas, cave intelligas Quantitates magnitudines determinatas, sed coram semper diminuendas sine limite*. Con sì evidente espressione ci ha quel grand' uomo dichiarato,

RATO,

rato, che Quantitati dileguantisi, o qualunque altra siasi meno accurata appellazione, onde distinguerle, debbon' esser considerate non altramente che Quantitati indeterminate portanti l'una all'altra, sotto le loro grandezze differenti, proporzioni differenti; le quali dalle medesime Quantitati esser non possono ottenute, ed il limite di queste Proporzioni è quello, per amor del quale quelle Quantitati vengono ad essere considerate: di maniera tale, che poichè queste Quantitati hanno proporzioni differenti, mentre ottengono il nome di Quantitati dileguantisi, il termine Ultima viene di necessità aggiunto, per dinotare appunto quella Proporzione, ch'è il limite di un numero senza confine di Quantitati varianti. E' similgiante osservazione necessarissima, quando queste quantitati vengono considerate in altro aspetto, come presentantisi innanzi l'immaginazione: conciosiacoschè allora è giuoco forza, che venga ad essere specificata la Proporzione proposta, e ciò con addimandar la prima Proporzione di quelle medesime quantitati. E siccome questo epiteto addizionale, o sia questo aggiunto, è necessario per esprimere la proposta proporzione, così viene ad essere un assurdo l'applicarlo alle stesse quantitati, siccome dice Isacco Newton: hannovi *Rationes prima Quantitatum nascentium*; ma non già, *Quantitates prima nascentes*. Veggansi le Transaz. Filosof. sotto il num. 342. pag. 205.

Di maniera tale, che secondo l'Autore che noi abbiamo alle mani, e che andiamo citando, gli Esempi tutti somministrati da Isacco Newton nella Sezione poc' anzi mentovata, esser debbono intesi di tali limiti, od ultime ragioni, che non s'attengano ad esse per Quantitati e Ragioni limitate, ma alle quali queste possono indefinitamente approssimarsi, ch'è quanto dire, che vengano a differir meno, che per qualsivoglia data quantità.

Dall' altro canto un sommamente doto valent'uomo, il quale prese il finto nome di *Filalete Centalrigense* (a), è di sentimento, che Isacco Newton per i termini sopra espressi del suo Lemma intenda e provi nella sua Dimostrazione, non già, che le quantitati o ragioni debbano nudamente e semplicemente essere considerate co-

Suppl. Tom. III.

me divenenti ultimamente uguali, o che debbano essere riputate ultimamente uguali; tuttochè realmente esse non possano avere quella Proporzione l'una all'altra, ma bensì, che alla perfine elleno divengono, e fanno attualmente, perfettamente, ed assolutamente uguali.

(a) Veggasi l'Opera intitolato Stato Presente della Repub. delle Lettere pel Novembre dell'anno 1735. pag. 371.

Egli distingue similgiatamente, come sopra, fra Quantitati, e Ragioni, che pervengono nei loro Limiti, ed in Quantità, e Ragioni, che ciò non fanno.

E quivi ci fassi ad insistere, e volere, che cadauno degli esempi somministrati nel Lemma di questa prima sezione del primo libro dei Principi d'Isacco Newton, sono di tali Quantitati, e Ragioni, le quali arrivano attualmente nei loro limiti rispettivi; nè che ivi trovassero tampoco un' esempio dato d'una Quantità, o Ragione, la quale non arrivi nel suo limite, salvo quel solo esempio esposto nell'estremo termine dello Scolio di questa sezione medesima (e questo soltanto per via d'illustrazione di una particolare obiezione) di due quantitati aventi una differenza data, ed essendo ugualmente accresciute ad *infinitum*, e la cui ragione vi è ammessa, nè arriva nel suo limite. Ma che le quantitati diminuenti possono realmente, ed in fatto essere diminuite ad *infinitum*; e avvegnachè elleno possano dileguarsi, e divenire un mero nulla.

La Ragione per tanto, dice egli, di queste può benissimo arrivare nel suo Limite tutto che non lo possa quella delle altre.

Nè l'uno, nè l'altro di questi due dotissimi Gentiluomini è convenuto rispetto al senso della voce *Evanescent*, dileguantisi, che leggesi nello Scolio di questa prima sezione dei principj d'Isacco Newton.

La questione si è, se le quantità, che dileguansi, e svaniscono, debba intendersi, che spendano, od impieghino un tempo finito, od alcun tempo finito in svanendo; o se svaniscano, e si dileguino in un'istante, o sia punto di tempo; e per conseguente, se elleno portino l'una all'altra un numero infinito di differenti Ragioni, o Proporzioni successive durante il

Gg

loro

loro dileguarsi, od una sola Ragione, o proporzione nel punto, od instante di loro dileguamento.

Quei ultimo è appunto il senso, in cui Filalete Cantabrigense prende la voce *Evanescens*, dileguantesi; e la disputa fu questo capo, siccome egli osserva, (*b*) non è di alcun' altra conseguenza, se non se di peterminare, se il scolo, in cui egli usa la voce, s'accordi ad Isacco Newton, e sia coerente colla Dottrina di quello. Conciossiachè se le quantità si dileguino, e s'vaniscano in un instante, ed io prendo la sola ragione, o proporzione, colla quale queste dileguansi; o se esse spendono un tempo finito in dileguandosi, ed io prendo l'ultima delle Ragioni, che esse portano successivamente l'una all'altra durante questo tempo; sempre la ragione, o proporzione presa nell'uno, o nell'altro di questi due casi sarà una, e la medesima.

(*b*) Veggasi *Stato presente della Rep. delle Lettere pel Mese di Novembre dell'anno 1835. pagg 383. 384.*

Noi non ci possiamo compromettere di somministrare tutto l'intero piano di questa controversia, ma ci è giuco forza il rimetterne i curiosi allo stato presente della Repubblica delle lettere per l'anno 1735.

Noi adunque ci faremo soltanto ad osservare, come si fatta disquisizione ella si è in parte critica, ed in parte scientifica. La inchiesta critica si aggira nel senso d'Isacco Newton, per quanto possa questo essere determinato dai suoi propri termini; e quivi noi non possiamo dispensarci dall'immaginare, che questo sia alcun poco dubbio. L'altra inchiesta si è rispetto alla verace, o scientifica nozione, sopra la quale questa dottrina dovrebbe essere fondata. Per rapporto a tutta questa faccenda, noi ci faremo soltanto a fare due domande, le quali cadaun Leggitore potrà sciogliere per se medesimo, per sapere, 1. se il concepimento, o nozione, cui egli ha della ragione, o proporzione delle quantità dileguantisi, "*Evanescensium quantitarum*", nel momento, o punto di loro s'vanimento, o dileguamento, sia più chiara, e distinta, di quello sia la nozione degl'Infinitesimi?

2. E se la nozione dei Poligoni inscritti, o circoscritti a qualsivoglia curva, ot-

tenenti la loro ultima forma, e perciò coincidenti col loro limite curvilineare, sia più chiara e più distinta di quello sia la nozione di Poligoni di un numero infinito di lati giusta il metodo degl'Infinitesimi?

Prima, che noi abbandoniamo simigliante soggetto, non sarà se non dicevole, e proprio l'esporre i sentimenti di un sovrano Matematico (*e*) intorno alla Dottrina dei Limiti, o dire la vogliamo Prima, ed Ultima Ragione, e di far vedere l'alleanza, e congiunzione di questa Dottrina medesima colla Dottrina delle Flussioni.

(*e*) Veggasi *Monsieur Mac-Laurin nel suo Trattato delle Flussioni* sotto l'art. 502.

Considera Isacco Newton gl'incrementi simultanei di quantità scorrenti, o fluenti, come finiti, e quindi falsi ad investigare la Ragione, la quale è il limite delle varie Proporzioni, che si fatti incrementi portano l'uno all'altro, mentr'egli gli suppone per il fatto modo, che vadano insieme diminuendosi e scemando, fino a che vengano alla per fine a s'vanire e dileguarsi affatto: e questa ragione è a capello la medesima, che la ragione delle Flussioni. Per scoprir poi questo Limite egli falsi prima a determinare la Ragione degl'incrementi in generale, e la riduce ai termini i più semplici del mondo, di maniera tale, che (generalmente parlando) una parte per lo meno di cadaun termine possa essere indipendente dal valore degl'incrementi medesimi: quindi col supporre, che gl'incrementi scemino e diminuiscono fino a che vengonsi a totalmente dileguare, apparisce interamente il Limite.

A cagion d'esempio, poni, che *a* sia una quantità invariabile, *x* una quantità scorrente, o fluente, ed *o* qualsivoglia incremento di *x*: allora gl'incrementi simultanei di *xx*, e di *a x* saranno $2x \cdot o + oo$, ed ao , i quali incrementi sono l'uno all'altro nella Ragione medesima, come $-2x + o$ è ad *a*. Questa ragione di $2x + o$ ad *a*, continuamente diminuisce, e scema, mentre diminuisce e scema *o*; ed è sempre maggiore della Ragione di $2x$ ad *a*, mentre *o* è qualsivoglia incremento reale: ma egli si è manifesto, che si accosta continuamente alla ragione di $2x$ ad *a* come a suo Limite: quindi ne seguita, che la Flusione di *xx* è alla

Flu-

Flussione di ax come ax è ad a .

Se venga supposto, che x scorra uniformemente, ax scorrerà di pari uniformemente, ma xx con un moto continuamente accelerato: il moto col quale scorre ax può esser misurato per ao ; ma il modo col quale fluisce, o scorre ax , non dee essere misurato pel suo incremento $axo + o$, ma soltanto per la parte axo , che viene ad essere generata in conseguenza di quello moto; e la parte, o porzione oo dee essere rigettata, perchè viene ad essere generata soltanto in conseguenza dell'acceleramento del moto, col quale fluisce, e scorre il quadrato variabile, mentre viene ad essere generato o , ch'è l'incremento del suo lato, e la Ragione di axo ad ao è quella di ax ad a ; che già fu trovato essere il Limite della Ragione degli Incrementi $axo + o$ ad ao . Veggasi l'Artic. FLUSSIONE.

Contro il metodo di rintracciare, ed investigare questo Limite d'Iacopo Newton viene obiettato, ch'egli fallì prima a supporre, avervi degli Incrementi, che quando si dice: *poni, che gli incrementi s'vaniscano*, la prima proposizione viene ad esser distrutta; e ciò non ostante vien ritenuta una conseguenza di questa medesima supposizione, vale a dire, una espressione fatta in virtù di quella. Ma le supposizioni, che vengono fatte in questo metodo d'investigare il Limite, non sono così contraddittorie, come pare, che voglia significare una simile obiezione. Fallì egli prima a supporre, avervi degli incrementi generati, e rappresentar la loro Ragione per quella di due Quantità, una delle quali è data in guisa, che non venga a variare con gli incrementi. In evento, che dopo egli avesse supposto, che non fossero stati generati incrementi, questa allora stata sarebbe, a vero dire, una supposizione direttamente contraddittoria alla prima. Ma quando egli suppone, che quelli incrementi vengano ad essere diminuiti fino che giungano a totalmente frangere e dileguarsi, questa supposizione non può sicuramente dirsi, che sia a segno alla prima contraddittoria, che venga come ad impedirci il conoscere, quale si fosse la Ragione di quelli incrementi, in qualsivoglia termine del tempo, in cui i medesi-

mi avevano un'esistenza reale: quanto quella ragione variasse, ed a qual limite ella si approssimasse, mentre gli incrementi erano continuamente diminuiti. Per lo contrario si è quello un metodo sommamente conciso, e giustissimo di rintracciare, e trovare il limite, ch'è ricercato.

Dee essere osservato, come la Ragione prima od ultima limitante degli incrementi, rigorosamente, e strettamente parlando, non è già la Ragione di alcun reale incremento, quale questo esser si voglia. Ma siccome la tangente di un arco, è la linea retta, che limita la posizione di tutte le secanti, che passar possono pel punto di contatto, tuttochè rigorosamente, e strettamente parlando, ella non sia secante; così può di pari una Ragione limitare le Ragioni variabili degli incrementi, quantunque non possa esser detto, ch'ella sia Ragione di alcun reale incremento, qualunque questo siasi. La Ragione de' moti generanti può similmente dirsi, esser l'ultima Ragione degli Incrementi, mentre vien supposto, ch'essi sieno diminuiti fino che vengano a dileguarsi, e svanire, e ciò per una ragione somigliante.

A tutto quello, che dei Limiti abbiamo esposto finora, noi possiamo a buona equità aggiungere, come avendovi due casi di Quantità variabili, e di Ragioni eziandio tendenti ad un Limite, farebbesi schiarita, e renduta evidente la materia, e ad un tempo stesso ovviato alle dispute, se fossero stati distinti con alcuno proprio aggiunto questi Limiti differenti. Come nel primo caso potrebbe essere stato appellato un Limite, oppure un'ultima Ragione *inclusive*; e ciò perchè il limite è l'ultima delle quantità, o Ragioni limitate: E nel secondo caso potrebbe essere stato detto un Limite, od ultima Ragione *exclusive*; avvegnachè le quantità limitate non pervengano al limite, tuttochè elleno si appressino al medesimo indefinitamente.

Distinzione somigliante può peravventura ricevere alcuna illustrazione ulteriore dall'appresso esempio. Ella è cosa notissima, che il Circolo osculatore è un circolo, il quale tocca una curva sì strettamente, che non può esser tirato niun altro circolo pel punto di contatto fra essi, tutti gli altri circoli passando o dentro o fuori

Gg 2 d'en-

d'entrambi; e quindi è, che venga supposto, il Circolo oscillatorio avere una curvatura uguale colla curva medesima in quel dato punto. Veggasi Monf. *Mac-Laurin* nel suo Trattato delle Flussioni sotto l'Art. 364.

Ora se noi concepiamo il Circolo Oscillatorio nella estremità dell'asse maggiore di un'Ellissi, questo verrà interamente a cadere dentro l'Ellissi; e le curvature dell'Ellissi e del Circolo Oscillatorio, possono tutt'e due addimandarsi Limiti delle curvature di tutti i Circoli cadenti per intero dentrovi, e toccanti l'Ellissi nell'estremità del suo maggior asse. Ma il termine Limite non avrà precisamente in ambedue questi casi il significato medesimo; conciossiachè il Circolo Oscillatorio ha un Limite *inclusivo*, avvegnachè niuno dei Circoli limitati venga a coincidere con esso. Rispetto poi ai circoli, che cadono interamente fuori della Ellissi, e che vengono a toccarla nella estremità del suo maggior asse, questi non hanno limite *inclusivo*, non toccando alcun circolo l'Ellissi tanto strettamente, che niun altro possa passarvi perentro: il solo limite, che ivi è *esclusivo*, si è l'Ellissi medesima.

Tutto l'opposto di ciò addivene poi nell'estremità dell'asse minore. In qualsivoglia altro punto dell'Ellissi una metà di ciascheduno de' Circoli Oscillatori, si è un limite *inclusivo* dei semicircoli, che cadono dentro, e l'altra metà è un limite *inclusivo* dei semicircoli, che cadono fuori.

Non possiamo noi domandare, se una curva sia il Limite de' suoi Poligoni inscritti, o circoscritti in alcun' altro senso, di quello, che la Curvatura dell'Ellissi si è il Limite delle Curvature dei Circoli qui sopra descritti, i quali s'approssimano sempre più d'appresso alla curva, ma che non coincidono colla medesima? Egli è vero, che udiamo bene spesso, esser detto, che il Circolo Oscillatorio è *Eguicurvo*, e che così viene a coincidere coll'Ellissi; ma questa sembra appunto una conseguenza del Linguaggio degl'Infinitesimi. Sarebbe un parlare molto più accurato il dire, che la Curvatura della Ellissi è il Limite *esclusivo* di tutti i Circoli poc'anzi menovati, e che il Circolo Oscillatorio è il loro Limite *inclusivo*. Questo Eccellentissimo, e Sovrano Geometra Monsieur Sim-

pion nel Trattato delle sue Sezioni Coniche, Lib. V. Proposizione 36. Cor. dice soltanto, dopo di aver dimostrato la principalissima proprietà del Circolo Oscillatorio, che "Eandem habere cum Sectio-
ne Conica Curvaturam dicitur," dandoela soltanto non altrimenti che un'appellazione, ma non mai come una Proposizione.

LIMOSINE. Limosine Pasquali. *Elemosyna Paschales* erano quelle, le quali venivano distribuite per la Solennità della Pasqua, accompagnate in alcuni luoghi con altri atti d'umiltà, come, accegn d'esempio, del lavare de' piedi, e somiglianti. Veggasi *Du Cange*, Gloss. Latin. in voce *Elemosyna*.

Le Limosine dai Maomettani vengono divise in Limosine volontarie, e Limosine Legali.

Le Limosine volontarie son quelle, che sono, od erano lasciate alla discrezione di cadaun uomo, di dare, cioè, o più, o meno a norma di ciò, ch'ei vedesse tornare in acconcio, e ben fatto.

Le Limosine volontarie dagli Arabici sono appellatione propria delle medesime vengono denominate *Serdeck ad*.

Non vi ha sistema di Religione nel Mondo, il quale sia tanto frequente, ed impegnato con ogni maggior calore nelle sue esortazioni, e conforti a dare delle Limosine, quanto il Sistema Maomettano. L'Alcorano rappresenta le Limosine non altrimenti che un mezzo indispensabile necessario per fare, che la Preghiera venga esaudita. Quindi quel famoso detto di uno dei Calif di questi Idolatri.

"L'Orazione ci conduce a Dio a mezza strada, il Diggiuno ci accompagna fino alle Porte del suo Palagio, e le Limosine ci fanno entrare nella stessa Stanza, ov'ei trovasi colla sua preferenza." Quindi è, che noi leggiamo tanti e tanti segnalatissimi esempi di questa virtù presso i Maomettani. Hasau figliolo di Ali, e Nipote di Mohacumed in particolare viene iscritto, avere per ben tre fiato in vita sua diviso ogni sua facoltà usualmente fra se stesso, ed i poveri, e due fiato aver erogato ai medesimi tutto ciò, ch'ei trovavasi possedere. La massima parte dei Maomettani è per sì fatto modo inclinata a far

far del bene altrui, che giungono per fino a stendere la loro carità ai medesimi bruti animali.

LIMOSINE Legali. Per Limosine Legali s'intendono quelle, che sono di un obbligo indispensabile, come quelle, che comandate vengono espressamente dalla Legge, la quale dirige, e determina non meno la porzione, che esser dee dispensata, che i generi delle cose della Limosina stessa, che dee esser fatta.

Le Limosine legali con proprio vocabolo son dette dai Maomettani *Zakat*, od in rapporto all'accrefcere l'abbondevolezza delle facoltà di un'uomo, oppure del loro purificar, che fanno la parte, che rimane della sostanza di quello.

Alcuni Scrittori hanno dato alle Limosine la denominazione di decime, ma con somma improprietà; conciossiachè in alcuni casi elleno sieno minori della decima, ed in altri elleno trascendono, e soverchiano questa medesima proporzione.

Le Limosine, secondo la prescrizione delle Leggi Maomettane, debbono esser fatte di cinque cose, vale a dire, 1. Di Cammelli, di Vaeché, e di Pecore. 2. di Danaro. 3. di Grano. 4. di Frutti, vale a dire, di dattili, e di uva ec. 5. di Mercanzie vendibili.

Di cadauno dei divisati generi di cose, una certa data porzione esser dee erogata in limosine, essendo di ordinario, od uno per ogni quarantina, o due parti, e mezzo del valore per ogni centinaio. Ma niuno dei Maomettani è tenuto per legge a fare le divise limosine, se non arrivano a possedere una certa data quantità, o numero, nè prima che un'uomo non sia stato possessore pacifico di tutte queste sostanze pel tratto di intieri undici mesi, non essendo obbligato a fare le limosine dentro questo periodo di tempo, e cominciando il suo obbligo soltanto nell'entrare del duodecimo di suo possesso delle sostanze medesime. Non debbono stampo movere per le limosine quei dati bestiami, che altri tiene impiegati, od in lavorare il terreno, od in portar pesi, e carriaggi. In alcuni particolari casi però vien riconosciuto esser dovuta per le Limosine una porzione maggiore della po' anzi divisa: Così per ciò, che è stato

cavato dalle Miniere, o dal Mare, o per qualsivoglia arte, o professione, o possessione, oltre di quel cumulo o copia, che è necessaria al mantenimento rispettivo di quella data famiglia, e massimamente ove siavi una mescolanza, o sospetto solo di un guadagno trasmodante, ed ingiusto, dee in tali casi da quei rispettivi Maomettani esser erogata in Limosine una quinta parte di ogni loro avere. Oltre di ciò nella fine della solennità del loro Ramadan, cadauno Morlem è tenuto a dare per se stesso, e per ciascheduna persona di sua famiglia medesima, se egli ne abbia, una misura di farina di grano, una di orzo, dei dattili, dell'uva, del riso, e di altre provvisori, che mangiate vengono comunemente.

Il medesimo Maometro si fu il primo il quale si addossasse il carico di Raccogliere in persona le Limosine non meno, che quello di farne la distribuzione; ed i Successori di lui continuarono a far lo stesso, fino a tanto che vennero ad essere introdotte altre tasse pel mantenimento del governo, alle quali queste Limosine erano originalmente appropriate; avvegnachè allora i Califfi stancaronfi di tener sopra di sè il peso di fare da Limosinieri ai loro sudditi, e lasciarono alle loro coscienze la soddisfazione delle Limosine dalla legge prescritte.

Le Limosine dai Giudici appellate *Sedaka*, che è quanto dire Giustizia, Equità, ec. vengono dai Rabbini preferite, e messe innanzi ai medesimi Sagrifizj. Oltre le cantonate dei campi, e lo spigolare dei loro poderi, e delle loro Vigne, che per la Legge di Mosè dovea esser lasciato per i poverelli, e per i forestieri, veniva posta a parte per sollievo di questa gente miserabile una data porzione di grano, e di frutti, e questa porzione appellavasi la Decima per i Poveri. Erano i Giudici similmente assai segnalati in questo atto di Carità. Noi leggiamo, come alcuni giunfero a vendere ogni loro avere, e facoltà; di modo che i loro Dottori si videro nella necessità di decretare, siccome fecero, che non fosse lecito ad alcun uomo l'erogare in Limosine più della quinta parte dei propri beni. Veggasi *Sale*, Discorso Preliminare all'

all' Alcorano , Sezione 4. pag. 109. & seq.

LIMOSINE. Viene usato similantemente quello vocabolo per esprimere quei datti terreni ; e possessioni date alle Chiese, od alle Case Religiose, colla condizione di far' orazione per l'anima del Donatore sì vivente, che morto. Queste appellansi altramente *Limosine libere*, alcuna volta *Limosine Ecclesiastiche*, *Elemosyna Ecclesiastica*.

LIMOSINE libere. *Libera Elemosyna*, oppure *Limosine pure*, *pura elemosyna*, viene in un senso più particolare ad usarsi per dinotare quella Limosina, la quale non è soggetta ad alcuna rendita, ad alcun servizio, od a cosa similante; (a) oppure quella, che è data alla Chiesa senza alcun'altra riserva, salvo quella della Giurisdizione Temporale, o diritto di Patronaggio. (b)

(a) Veggasi Du-Cange *Glossar. Latin. T. 2. pag. 224. & seq. in voce Elemosyna*.

(b) Aubert, *apud Richel. Diss. Tom. 1. pag. 155. in voce Aumone*.

Carta di Limosine. *Charta elemosynaria*, intendesi quella data particolar Carta, o scrittura, per cui una cosa vien donata alla Chiesa.

LIMOSINA, *Aumone*, presso i Francesi, viene similantemente usata per esprimere un pagamento forzato, o fatto fare per forza, imposto od ingiunto altrui per via di castigo, e per esser poscia convertito in usi pii, o caritatevoli.

In tutte le cose aggiudicate al Diritto Reale, vi ha sempre riservata una Limosina. Simigliante fatto viene a un di presso ad essere in sostanza una cosa medesima di ciò, che presso noi altri Inglese addimandasi *Forfeiture to the poor*, Confiscazione per i Poveri. Veggasi Trev. Dict. Univer. in voce *Aumone*.

LIMOSINE delle terre arative, *Elemosyna Carnarum*, oppure *Elemosyna pro Aravis*. Era questa una Tassa, la quale anticamente pagavasi a pro dei poverelli alla ragione di un soldo per ogni campo arativo.

LIMOSINE regie, *Elemosyna Regis*, altro non viene a dinotare, se non se quello, che altramente fu detto *PETER PENCE*, Paga di S. Pietro.

Questa fu anche appellata altramente *Limosina di San Pietro*, *Elemosyna Sancti Petri*.

LIMOSINE Ragionevoli, *Elemosyna Rationalis*. Era quella una certa data porzione degli effetti, ed averi di persone morte ab intestato, e che veniva messa a parte per erogarli in usi della Chiesa, e dispendiare ai poverelli del Signore.

Hanno parecchi Autori fatto degl' intieri Trattati ex professo sopra il Soggetto delle Limosine in Latino, in Inglese, in Franzese, in Ispagnolo, ec. Il Camerario, il de Lugo, il Dresselius, il Granada, l' Iperio, il Merula, il de Morques, il Novarano, il Trussillo, il de Valdes, il Vasquez, ed il Villanova, il Thiers, ed il Gaetano hanno trattato del debito delle Limosine: il de Marini, ed il Wheatley, dell' utilità delle Limosine: il Downham, ed il Quarre, della necessità delle Limosine: il Morques, ed il Pancorvo, dell' eccellenza delle Limosine; ed il Watson rispetto alle Controversie intorno alle Limosine. Veggasi *Lipsen*, *Bibliotheca Theolog.* pag. 589. 590. e seq. Et *Bibliotheca Juris*, pag. 167.

Cassetta delle Limosine. E' quella una cassetta, o borsolo detto dalla voce Greca *Kisavrior*, in cui raccoglievansi ab antico le Limosine non meno per le Chiese, che per le case dei privati. Questa rimane tutto dì in uso in moltissimi luoghi. Veggasi *Switzer*, *Thest.* Tom. 2. pag. 100.

Le Casette per le limosine nelle Chiese sono una ben forte e gagliarda cassetta, talvolta armata tutta di ferro, ben fissata, ed incatenata, avente una spaccatura, o fessio nella sua parte superiore, avente tre chiavi, una da conservarsi dal Curato, e le altre due dai Guardiani della Chiesa medesima.

Il piantare, o tenere esposte in ciascuna Chiesa le casette per le limosine, vieneci espressamente comandato dai libri dei Canonici, come anche ne vien ingiunta similantemente dai Canonici medesimi la distribuzione di ciò, che verrà raccolto in queste medesime casette, ai Poverelli della Parrocchia. Veggansi *Constitutiones, & Canones Eccles.* 84.

LIMOSINERIA. Gli Inglese esprimono ciò,

cioè, che in Italiano suona Limosineria, *domus Eleemosynaria* colle varie appresso voci, cioè, *Almonry, aulmy, aumry, almry*, ed eziandio *ambry*. Degli Scrittori Latini poi viene espressa colle seguenti, *Almonaria, Almoneria, Almonerium, Eleemosynaria, Eleemosyna*, oppure anche *hospitale pauperum*: e finalmente alcuna fiata, che è per avventura l'espressione più acconcia, *Domus Eleemosynaria*, Limosineria.

La *Limosinetia* è uno degli uffizj claustrali pertinenti alla Casa Religiosa. Vien trovato in antichissime Badie, e Priorie Conventuali, e vienvi riputato fra il numero dei Benefizj. A questo uffizio venivano date rendite particolari dai Benefattori, oppure eraoo al medesimo assegnate dalla Casa, fuori della cassa comune, per supplire al carico delle Limosine. Nelle Congregazioni Riformate la Limosineria è stata soppressa, e l'entrate di questo uffizio sono state unite alla Mensa Conventuale. Veggasi Trev. Dict. univer. Tom. I. pag. 733. in voce.

Limosineria viene similmente a significare nelle antiche scritture una borsa, fuori della quale solevansi cavare le Limosine. Veggasi *Du Cange*, Glossar. Latin in voce *Eleemosynaria*.

In questo senso appunto debbon' intendersi, allorchè noi ci incontriamo a leggere, Limosineria di seta, Limosineria galionata, guarnita, e somiglianti, intendendo dovendosi di queste antiche borse.

LINEA. Una linea nella Geometria dee esser concepita non altramente, che il termine, o limite di una superficie, e non già come una parte di quella superficie, tutto che piccola. Hobbes, e parecchi altri Scrittori, i quali l'hanno presa in questo secondo senso, son venuti a cadere in molti, e sommamente rilevanti affurdi.

LINEE *Algebriche*. Le Linee algebriche sono divise in Ordini differenti secondo, ed a norma del grado di loro Equazioni. Questi gradi vengono riputati non altramente che nelle Equazioni determinate, dal grado del Termine più eminente, od altissimo della Equazione.

Così $a + by + cx = 0$ è un' Equazione generale esprimente la natura

di linee del primo Ordine, oppure di linee rette.

L' Equazione $a + by + cx + dyy + exy + fxx = 0$ viene a rappresentare le linee del second'ordine; che è quanto dire, le Sezioni Coniche, ed il Circolo, che è una di esse.

E l' Equazione $a + by + cx + dyy + exy + fxx + gyy^2 + hxyy + ix^2y + lx^3 = 0$ viene ad esprimere in generale le linee del terz' Ordine. E le linee del quart'ordine, e degli ordini più eminenti esser possono espresse in simigliante maniera. Veggasi Cramer Introduzione all'Analisi delle linee curve, pag. 52. & seq.

Uta Monsieur Cramer i Termini, linea del secondo, del terzo, del quarto ec. Ordine, e Curva del secondo, del terzo, del quarto ordine, ec. ec. indifferentemente. Isacco Nevton vi ha fatto della differenza, e perciò secondo lui

LINEA del terz' ordine si è la medesima, che Curva della seconda specie; conciossiachè una linea del prim'ordine non possa, rigorosamente, e strettamente parlando, esser detta una curva.

Le linee del terz' Ordine posson' esser tagliate da una linea retta in tre punti, e da un Circolo in sei punti.

Noi abbiamo un corto Trattatello composto dal grande Isacco Newton sopra le linee del terz' ordine, intitolato: *Enumeratio linearum Tertii Ordinis*, che venne per la prima volta stampato in fine della Versione latina dell' Ottica d' Isacco Newton fatta dal Dottor Clarke; e poscia pubblicato con maggiore accuratezza, e correzione dal poe' anzi defunto Monsieur Jones l'anno 1711. insieme col Trattato delle quadrature, ed altri Trattati dell'istesso suo immortale Autore.

Questa numerazione è per sì fatto modo concisa, e ristretta che alla abbisogna onninamente di alcun Comento. Monsieur Stirling ne diè uno l'anno 1717. ma questo suo Comento riesce soverchio duro, e malagevole per i principianti. Il valentissimo Monsieur Cramer ha ultimamente appianato questo soggetto amplissimamente nel suo Trattato intitolato: *Introduzione all'Analisi delle linee curve algebriche*, stampato in Ginevra nel 1750. in 4. al quale posso-

possono riportarli le persone vaghe di questi profondi studi; come anche all'Appendice all'Algebra del gran Matematico Monsieur Mac-Laurin, intitolata: "De Linis, nearum geometricarum Proprietatibus generalibus" ed all'Analisi Infinitorum di Monsieur Euler. Vol. 11.

Una linea Algebrica dell'Ordine m può tagliare un'altra linea algebrica dell'Ordine n , nel numero di punti espresso da $m \cdot n$, ma non in più.

Così se $m=1$ ed $n=2$, le linee di questi Ordini possono intersecar l'una l'altra soltanto in due punti, e non in più; e se $m=2$, ed $n=2$, in tal caso alleno possono intersecarsi l'una l'altra in quattro punti, siccome è ben noto: Conciossiachè una linea retta non possa intersecare una sezione Conica in più di due punti; nè possa una Sezione Conica intersecare un'altra sezione conica in più di quattro punti.

Nella guisa medesima se $m=5$, ed $n=4$, in tal caso possono le linee di questi Ordini intersecare l'una l'altra in 20. punti, ma non in più. Veggasi Cramer, Analisi delle linee Curve pagg. 75. 76.

Il numero delle specie delle linee del terz'Ordine ascende a 78. Veggasi il Trattato di Monsieur Murdoch intitolato Genes Curvarum per umbras.

Il grande Isacco Newton riconosceva di linee del Terz'Ordine non più di 72. specie; ma Monsieur Stirling, e Monsieur Stone hanno fatto vedere imperfetta una siffatta enumerazione; e Monsieur Murdoch ne ha quindi rinvenute alcune nuove specie.

Aduque Isacco Newton (a) nominò soltanto settantadue specie delle linee del terz'Ordine. Monsieur Stirling ne rinvenne quattro di vantaggio: (b) e finalmente Monsieur Stone (c) ne rintracciò ancora altre due, che erano sfuggite non meno ad Isacco Newton, che al medesimo Monsieur Stirling.

Queste due ultime specie aggiunte debbono essere riconosciute fra le linee Curve Iperbolico-paraboliche.

(a) *Enumeratio linearum tertii Ordinis.*

(b) *Lineæ Tertii Ordinis Newtonianæ, Oxon. 1717. in 8.* (c) *Veggansi le Trasazioni Filosofiche sotto il Numero 456. sezione 6.*

LINO. Lino in erba, *linum*. E' questa una Pianta, la quale verrà su, e crescerà bene in qualunque sano, e buon terreno; ma riuscirà sempre meglio, se quello terreno sia stato lasciato alcuna volta senza essere arato. Quanto migliore sarà il terreno, tanto migliore, e più perfetto sarà il lino, che somministrerà, e produrrà un massimo miglioramento, e soprattutto egli è un'egregio, ed eccellente comodo, ed il coltivare, ed aver a cuore questo prodotto è un pezzo di Coltivazione così buono, che si meriterebbe d'essere assai più praticato da noi di quello al presente si faccia. Ella è questa una pianta che impoverisce grandemente e sfrutta il terreno, e lo stesso Virgilio nelle Georgiche ce lo avvertì: "Urit enim lini campum feges, urit Avena"; e perciò sarà sempre miglior consiglio quello di seminarlo in un terreno lazzo, o racido, e non già più volte nel luogo medesimo. Il tempo opportuno di seminarlo si è nel mese di Marzo, il terreno vorrebbe esser ben preparato, e renduto perfettamente uguale, e piano, e per seminarlo fa di mestieri eleggere la più asciutta stagione, che esser possa mai. Le sementi procurate dalle nostre proprie raccolte non sono così buone, e perfette, come quelle che sono, che ci vengono portate dal Levante. Vero si è, che queste sementi di lino si comprano a più caro prezzo; una egli è vero altresì, che quella spesa vienci poi grandemente compensata dalle abbondevolissime raccolte, che ei producono; e questo seme riuscirà bene fino per tre raccolte; ma poscia vuolsi onninamente rinnovare: due bucelli, o staja di buona semente di lino bastano benissimo per un'jugero di terreno: Fa onninamente di mestieri, che non lasci si stramaturare, o maturar di soverchio; ma conviene divellerlo subito che il suo seme comincia ad imbrunirsi, e che la pianta pieghia la testa verso il terreno. Se il lino venga divello, mentre la pianta è in fiore, il prodotto riuscirà certamente più bianco, e più forte, ma in tal caso la semente sarà perduta.

Nella Provincia di Derby, o sia in Derbyshire, ha quella gente un metodo veramente egregio di battere la sua canapa, ed il suo lino, che è l'appresso: Fanno colo-

coloro l'asse della principal ruota della loro maciulla più lungo dell'usato, e piantarvi dei chiodi da ruota, per alzare de' grossi marcelli, simigliantissimi a quelli usati nelle carriere, e nei mangani, e con questi maciullano, o battono i gambi, e così vengono a risparmiarsi una grandissima parte di fatica. Veggasi *Mortimer*, della Coltivazione, pag. 154.

LINO. *Linum*. Nella Botanica è questo il nome di un genere di piante, i cui caratteri sono i seguenti.

Il fiore è della specie de' garofoli, essendo composto di un dato numero di filamenti disposti in una forma circolare, e forgenti fuori da un calice d'altrettante foglie della forma di un tubo. Il pistillo sorge dal calice medesimo, e finalmente diviene un frutto di una forma alquanto globulare, ma nella sua estremità aguzzo, o puntuto, e composto di un dato numero di capsule, che apronsi all'indentro, e che contengono i semi di una forma piatta, e di una figura ovale, tondeggianti in una delle loro estremità, ed aguzzi, o puntuti nell'altra. Veggasi la Tavola I. della Botanica, Classe 8.

Le specie del Lino novcrate da Monsieur Tournefort sono le appresso = 1. Lino comune coltivato — 2. Lino Africano dall'ampie foglie di frutto più grosso. — 3. Lino grande perenne di fiore azzurro, dalle grosse teste. — 4. Lino minore perenne dai fiori azzurri, con picciole teste. — 5. Lino salvatico comune affomigliantesi alla specie coltivata. — 6. Lino salvatico peloso dal fiore azzurro, e dalle foglie dilatate. — 7. Lino salvatico peloso dal fior bianco, e dalle foglie dilatate. — 8. Lino alborato, od arbutto dai fiori bianchi nevati. — 9. Lino salvatico dall'ampie foglie, di fior giallo. — 10. Lino salvatico di fior giallo, con foglie tondeggianti. — 11. Lino dal fior giallo con fiori nelle giunture, o nodi dei gambi. — 12. Lino arborato, od Arbutto dai fiori di color giallo scuro. — 13. Lino selvaggio giallo albero di Candia. — 14. Lino salvatico annuale dalle foglie picciole dilatate di fiori gialli. — 15. Lino picciolo dalle strette foglie annate dal fior giallo. — 16. Lino marino dai fiori gialli. — 17. Lino salvatico dal fiore azzurro con foglie di pun-

Suppl. Tomo III.

ta aguzza. — 18. Lino salvatico dalle anguste foglie con grossi fiori bianchi. — 19. Lino salvatico dalle anguste foglie con grossi fiori di colore azzurro carico. — 20. Lino salvatico dalle strette foglie con grossissimi fiori brunicci, o bigionoli. — 21. Lino salvatico dalle foglie anguste, con fiori bianchi variamente striscicati di rosso. — 22. Lino salvatico rampicante per terra, o proscritto dalle strette foglie, e di fior bianco. — 23. Lino salvatico dai fiori piccioli, con foglie strette, e ferratamente unite insieme. — 24. Lino salvatico dalle strette foglie, con foglie più rade. — 25. Lino salvatico dalle foglie anguste con foglie rade, e con fiori bianchi. — 26. Lino ultimo salvatico dai fiori minutissimi, da alcuni appellato Centonchio ultimo liscio di Primavera. — 27. Lino dalle ruvide foglie, con fiori gialli ad ombrello. — 28. Lino giallo Portoghese con fiori a dirlo. — 29. Lino arborato, od arbutto dalle strette foglie, con foglie aspre e spinose. — 30. Lino Portoghese dalle foglie capelline. E — 31. Lino alpino avente le foglie analoghe al Larice. Veggasi *Tournefort*, *Instit.* pag. 340.

LINO di Carpalo, *Linum Carpasium*. Questa espressione lino di Carpalo, o tela di Carpalo, leggesi bene spesso nelle antiche scritture, e da vari Autori viene usata in sensi sommarmente differenti.

Il primo uso, che sia stato fatto anticamente di questa voce, si è per esprimere una specie di lino, che era più fino, e più picciolo, e ad un tempo stesso più lucido, e più lustro di qualsivoglia altro. Usò Plinio la voce in questo senso, e ci dice, che un lino di tal fatta veniva massimamente dalla Spagna; e che non meno questo lino, che la tela fatta del medesimo, nel tempo suo venivano appellati lino, e tela di Carpalo; e da ciò ne venne in costume il denominare qualsivoglia lino, e tela finissima, tela Carpasia, lino Carpasio, e così questa voce nulla più importava, che delicato, fino, &c.

I Greci moderni usano la voce in questo senso; e Suida per esprimere delle vele di finissima tela, le chiama Vele Carpasie. L'Autore del *Periplus Maris Euythrazi*, che era contemporaneo di Plinio, chiama il lino, del quale erano fatte le tele In-

H h diane

diane, *Carpasos*; ma questa voce non trovavasi giammai presso alcuno degli antichi scrittori Greci. Quello Autore però non dee esser riguardato come un seguace, ed imitatore dell'ottimo linguaggio, e della purità dello scrivere de' buoni antichi; avvegnachè sia più che evidente, eh'ei si è servito a ota a ota di moltissime voci, e termini che non son buoni Greci, ne' giammai usati da alcuno Scrittore accreditato, e di conto, ma sono soltanto voci, termini, e frasi tecniche di Negozianti, e Mercatanti di quella età.

Pausania servesi della voce *Carpasium linum* in un senso tutt'altro, e sommarmente differente dai divisati finora: avvegnachè egli prendalo per esprimere il lino fatto della famosa pietra asbello, e la tela o panno composto di questa specie di pietra, la quale veniva posta sul fuoco per nettarsi, e rendersi terla. In questo senso medesimo usa la voce similantemente *Solino*; e questo Scrittore afferma, che in *Carystos* trovavasi quella specie di lino, che nel fuoco non pativa, nè pregiudicavasi di un menomo che. *Girolamo Mercuriale* poi falsi ad immaginare, che il *Carbasus* degli antichi Romani fosse una voce propriamente usata unicamente per significare il lino *Carpasio* di *Pausania*, il quale non veniva ad esser distrutto dal fuoco, e che era il genuino, e verace *linum incombustibile*, o dir le vogliamo le fila della pietra asbello, oppure il panno, o tela fatta di similante materiale. Questo però non è il senso della voce nei tempi più recenti, avvegnachè noi la troviamo usata evidentissimamente per ogni, e qualunque manifattura di tele, di qualunque specie esser si volesse.

LINO Carisio, *Linum Carysium*. Nell'*Istoria Naturale* è questa una denominazione data da *Paulania* all' *Asbello*, vale a dire una pietra lanosa, della quale venivano fatte delle tele non meno, che della catta, la quale coll'esser fatta venire entro il fuoco rossa rovente, veniva a schiarirsi, e divenir bella, e nitida, senz'istete del fuoco medesimo nemmeno per ombra consumata, o pregiudicata. Si fatto prodotto trovavasi ai tempi di questo Autore in copia abbondevolissima nelle vicinanze, e contorni di *Cariotto*, che è una Piazza di Ne-

groponte, onde ne guadagnò la sua particolare denominazione. Veggasi l'*Art. ASBESTO*.

LINO Cataratico, *Linum Catarricum*, lino purgante. Questa è una medicina della quale servonsi comunemente i nostri Contadini. E' questo un Cataratico, o Purgante niente meno ruvido della stessa *Graziola*. Veggasi l'*Articolo GRAZIOLA*.

E' questo una specie di lino salvatico, che prendesi stato in molle, od in infusione nella birra. Una dramma della polvere di quell'erba seccata, oppure delle foglie fresche della medesima pestate, e ridotte in pillola, corrisponderà egregiamente all'effetto.

Quell'erba da alcuni Medici vien commendata altamente nelle *Idropisie*; e per impedire il suo urto, ed i dolori, che suol produrre, foglionvi mescolare degli anaci, oppure alcun'altro dei semi carminativi. Vien quell'erba prescritta in moltissimi casi Cronici, ove però le persone trovansi tanto forti da poterla soffrire; e le temperamenti di queste tali persone la possono reggere, ella suol produrre bene spesso degli effetti maravigliosi.

LIPOTHYMIA. E' questo nella Medicina il nome di una Malattia, che d'ordinario vien messa a marzo, e confusa colla *Sincope*; ma ell'è, a vèr dire, tutt'altra da quella per parecchi rispetti.

E' la *Lipothymia* una distruzione, od abolimento sommarmente considerabile delle facoltà vitali ed animale, per lo meno in apparenza: e la *Sincope* è una piena, o totale distruzione od abolimento delle medesime facoltà, tale quale appunto ci comparisce in quel dato tempo. Ella si è però cosa agevole il vedere, come questi altro in sostanza e realmente non sono, salvo che due stati differenti del male medesimo. E' talvolta la *Lipothymia* un' infermità idiopatica, ed alcuna fiata un' infermità, meramente sintomatica, ed assai frequentemente ella accompagna lo scorbutto, le febbri maligne, ed altri malori eziandio: la *Sincope* è idiopatica, ed invelsse non meno le persone, che sono inferme, ma quelle eziandio, che trovansi in istato sano. La *Lipothymia* viene ad essere agevolissimamente distinta, e conosciuta da uno stato del corpo convulso, da questo, che in essa le membra son tutte rilassate, e cadenti. La *Sincope* differisce dalla mor-

te soltanto in grado; ed il corpo in questa essendo rilassato, cadente, abbandonato, e sotto le ultime convulsioni nella morte irrigidendosi, questa si è nei casi estremi la sola distinzione.

Segni della Lipothymia. Viene la Lipotimia d'ordinario preceduta da un assai considerabile affanno, ed ansietà intorno alla regione del cuore, e questo segno viene incontinentemente seguito da una perdita di vita, e di moto per un tal dato tempo. I sensi, i movimenti animali, e perfino il polso medesimo sembrano per un dato tempo tutti perduti: ed il cuore batte languidamente, o piuttosto tremola, ed il respiro è a stento grande sensibile. Nella sincope il respiro, di pari che il polso, sembrano intieramente impediti, ed il paziente comparisce veracemente morto: la faccia è per sì fatto modo pallida, che il paziente non è nulla differente da un cadavere, e le membra sono intieramente abbandonate, caccanti, e senza ombra di moto. Le estremità della persona sono freddissime: gli occhi, o son chiusi, o turgidi, ed infiammati: la bocca è talvolta serrata; ma non inchiodata come avviene nelle convulsioni, ed effetti isterici, ed alcuna volta ella continua a starsi spaventevolmente aperta; e tosto che il paziente comincia a tornare in sé, manda fuori varj altissimi sospiri, e la respirazione comparisce in esso grandemente affannata, e faticosa.

Persone sottoposte alla Lipothymia. La Lipotimia Idiopatica è un' infermità sommaramente rara, e le persone alla medesima sottoposte son quelle tali, che hanno una disposizione tenera, e sensibile, le quali vengono ad essere malmenate da parecchie passioni, e massimamente dal Timore, oppure quelle tali, che trovandosi inferme, sono state grandemente soggette a siffatto disordine, o finalmente quelle che sono di un' abito di corpo melancolico. Quelle Persone, che applicansi ad uno studio incessante per un lungo tratto di tempo in parecchie occasioni, cadono talvolta di pari in siffatto malanno. Le donne rimangono soggette, sendo incinte, e eib per una compressione del petto fatta dall' addome; e le donne non maritate, allorchè cadano in bimbicante disordine nel tempo, che si cessano, danno un' indizio pressochè univoco

di trovarsi incinte. Alcune persone, che trovansi appassionate, e che loppimano i violenti accessi della passione, meotere cibansi, cadono di pari in questi tali sfinimenti.

La *Lipotimia* Sintomatica è uno sconcerto comunissimo ad accadere, e nasce da numero grande di differenti cagioni. Sono grandemente soggette alla lipotimia sintomatica quelle donne, che sono oppilate, o nelle quali sonosi troncati i cordi mestruali. Le persone battute, e stancate da emetici violenti cadono bene spesso in questo male e cadonvi similgiamente quelle persone, che son rimase spollate da violentissime emorragie, da trasmodanti sudori, da copiosissime diarree, da dolori veementi, ed acuti di qualsivoglia specie, e da mancanza di cibo. Le persone per lo contrario, che sono estremamente voraci, e che caricasi lo stomaco con copia soverchia di cibo, vengono di pari assai sovente dalla lipotimia sintomatica attaccate; e le femmine dopo parti malagevoli, e duri, o che ne' puerperici corsi hanno avuto degli sbocchi trasmodatamente copiosi, cadono assai sovente in questo malore. Le persone, che hanno preso dei veleni, ed ancor quelle, che hanno avallato dei medicamenti d' indole soverchio fredda, sono alcuna fiata sottoposte a tal disordine: e quelle altresì, che nelle febbri raffreddansi tutt' in un subito, e che reprimono i lor sudori, oppure quei tali, che appena tiavutisi da una qualche infermità, caricansi di cibo lo stomaco più di quello comporti lo stato di convalescenza. La lipotimia è bene spesso similgiamente la trista foriera di una febbre maligna epidemica: ed ultimamente sono soggette a tal disordine quelle persone, le quali traslascino alcuna di quelle evacuazioni, alle quali era usato il corpo loro da alcun tempo.

Prognostici nella Lipothymia. Una Lipotimia idiopatica, la quale avvenga, trovantesi la persona in istato sano, ma che sia di un temperamento sommaramente tenero delicato e sensibile, oppure di abito melancolico, ed abbia avuto una qualche paura, od alcun' altra passione per sua origine, ella si è una cosa allora per allora non gran fatto di conseguenza; ma ella è però una disposizione a farsi tale, ed in

evento, che non vengavi preso pensiero, la persona ad ogni lieve occasione pottravvi paravventura render soggetta.

Le Lipotimie allorchè sono sintomatiche, sono di una conseguenza molto maggiore. Nelle malattie croniche sono queste sintomi meno pericolosi, di quello sienolo nelle malattie acute, se queste vengano accompagnate da sfinimenti, e deliquj di animo nel lor principio; avegnachè riescano assai sovvente pericolosi. In altri periodi delle malattie acute, gli sfinimenti, e le lipotimie son sempremai tristi, e rei sintomi, ma allorchè questi riconoscono l'origine loro da soppressione di alcun' abituale evacuazione, o scarica, durante il corso della malattia, elleno sono di pericolo minore, che alloraquando si fanno vedere senza siffatte cagioni. Per tanto tutti gli sfinimenti, e deliquj d'animo, che accompagnano altre malattie, debbon' esser considerati soltanto come sintomi, e non già distintamente trattati, e medicati; e quando l'infermità, la quale ragionavagli, si dilegua, e dà luogo, essi sfinimenti naturalmente se ne vanno, e dileguansi con essa. Le Sincopi, che assalgono assai frequentemente una persona, e che continuano per lungo tratto di tempo, lasciano d'ordinario dopo di sè la febbre. Le Sincopi procedenti da emorragie riescono assai fiate pericolose, massimamente in quelle persone, che non vi sono ule, ed in quelle tali, che sono di un temperamento timoroso. Quindi le donne di parto, le quali sono soggette a svenimenti, debbon' esser con estrema diligenza osservate, ed avute cura, avegnachè non sia cosa rara, ch' elleno muovansi in questi accessi.

Metodo della Cura. Nelle Lipotimie Idiosomatiche i Clisteri stimolanti, lo spruzzare dell'acqua assai fredda sopra la faccia, gli odori grandemente penetranti, quali sono appunto quelli dei sali volatili, dello spirito di corno di cervo, e dell'acqua della Regina di Unghera, tutti tendono di pari a ricovrare il perduto moto. A questi dovranno aggiugnere gli slasciamenti delle vesti, delle legature delle calze, e somiglianti, lo stendere, e coricare la persona in un letto ben caldo, le fregagioni, le polveri starnutatorie, ed il porre una presolina di pepe pesto, od alcun sale pungente

te volatile sopra la lingua. Poichè sarà il paziente per i divisati mezzi riavuto, e tornato in se stesso, rioscirà assai giovevole per rimetterlo in forza un buon bicchiere di vino riscaldata con alquante gocciolate di una tintura di Zafferano entro mescolate; ed in evento, che siavi pericolo di una sopravveniente febbre, al che deesi onninamente aver l'occhio, dovravvisi apporre il dovuto riparo col far prendere al paziente le polveri di nitro, d'occhi di granchio, d'antimonio diastoretico, ed una preferella di cinabro.

In quei casi, ove gli svenimenti dipendano da un sopracarico di ripientenza di stomaco, o da una debolezza delle prime vie, con delle cruderezze ivi stanzianti, ed accompagnate da rutti, rendesi oltremodo dievole, ed opportuno l'uso dei medicamenti digestivi; ed insieme con essi di tratto in tratto debbonsi somministrare i competenti vomitori. Allora quando gli svenimenti avvengono dalla violenza delle medicine Emetiche, dovrassi prendere il vino renduto aromatico, fra giorno, e la sera una competente, ed adeguata dose di Triaca.

Allorchè gli sfinimenti, e deliquj di animo sono stati cagionati da passioni violente, dovrassi perpetuamente prescrivere al paziente un' emetico; ed a capo che sia l'operazione di sì fatto medicamento, dovranno somministrare al medesimo per un giorno, o due le medicine nitrofe ed assorbenti, e ciò appunto per impedire una febbre, la quale suole bene spesso accompagnare gli svenimenti da sfinigianti cagioni provenienti. Qualora questi sfinimenti accadano alle persone dall'esser rimase spollate dalle frequenti emorragie, oppure da trasmodanti diarre, sudori, od altre evacuazioni somiglianti, i propri, e dievoli medicamenti sono gli analettici per liberarsene, e dovranno somministrare gli elettuarii ristorativi, insieme col corallo, o cosa somigliante; ed il frequente cibarsi di gelatine, e d'altre vivande sostanziose di questa specie, valeranno non poco ad impedirne la recidiva. Le cruderezze delle prime vie forz'è, che vengano diradate, e nettate a forza di medicamenti digestivi, e purganti; e la mente converrà che venga dilungata dallo

dallo studio, e dall'applicazione, e mantenuta libera dalla violenza di qualsivoglia passione. Le escrezioni, od evacuazioni necessarie, ed abituali, fa di miglior, che per ogni, e qualunque mezzo vengano onninamente promosse; e farà necessario similmente, che i pazienti abbiano sempremai indosso, ed in pronto dei sali, e degli spiriti volatili, per servirvene incontante, che sentonsi presso ad essere investiti dal male. Ultimamente dovrasì amare il moderato esercizio, non abbandonandolo giammai. Nel tempo degli accessi non dovranossi somministrare i clisteri stimolanti prima che abbiano continuato per un buon quarto di ora; ed in generale ove rimangavi alcun segno di vita, sì fatti clisteri non sono in conto veruno necessarij: Durante poi il tempo dell'accesso fa di miglior che con somma cautela venga somministrato un'interno medicamento, e quella cautela somma tanto più rendesi necessaria, quanto ella è dispotissima, e sommamente acconcia a passare nell' aspra Arteria. Quelle persone, che appena farannosi rinviate da uno di questi accessi, o svenimenti, non dovranossi tosto lasciar dormire, tuttochè anche se ne sentissero estremamente invogliate; e poichè il parossismo farà in tutto, e per tutto svanito, il procurare di divertirsi, e di passarla allegramente, e con giocondità di animo, eondurrà più verso una perfetta cura, ed impedirà con maggior efficacia una recidiva di quello far possano i migliori, e più acconci medicamenti del mondo.

In evento, che immediatamente dopo lo svenimento assalisca il paziente una febbre, allora l'uso di un buon bicchiere di vino, che suol essere di sovrano beneficio in tutte le altre occasioni di spezie somigliante, non dee in verun conto permettersi al paziente; ma debbonsi incontante abbracciare dal valente, e giudizioso medico i medicamenti febrifughi.

Le medicine emetiche rendonsi estremamente proprie negli svenimenti cagionati da passione, o da spavento preso, nel tempo di trovarsi attualmente cibando di tutto cuore, oppure dopo immediatamente essersi cibato; conciossiachè sia infinitamente meglio, che venga fuori il cibo così indi-

gerito, di quello che in tale occasione si rimanesse entro lo stomaco.

Parecchie sono quelle persone, le quali sono grandemente soggette a deliqui di animo, e svenimenti, dopo essersi cavate sangue. In questo caso dovrasì lasciar loro il braccio bel bello, ed assai delicatamente, nè dovrasì giammai cavar sangue a questi tali dopo che sienosi ben cibati, nè mai dovranossi alzar dal letto subito, che sia terminata la cavata del sangue.

Ella è cosa sommamente osservabile, che negli svenimenti, o deliqui di animo originati da una cagione presente, quale appunto farebbe quella dell' aito del cavar sangue pur' ora elpota, il paziente ha alla bella prima alcuna facilità di moto, tuttochè sopra un principio confuso, e bene spesso prima, che la persona cada in insinimento, con empito, e violenza grande tenterà di vietare al Cerusico, che gli fasci il braccio: ma in insvenimenti di questa fatta, i quali son sempre, o per lo più fumate, e presagj di futura malattia, il paziente cade tutto in un subito a corpo morto per terra, e nel loro avvicinarsi non ha facilità di moto, o sentimento. Veggasi *Juncer*, *Compest*, medic. pag. 673. 674 & seq.

LIRA. Nella Ictiologia è questo il nome di un pesce della spezie de' Cuculi, o sia spezie gurnardica, della quale vi sono due spezie.

La prima di queste spezie vien formata dal *Tibicen*, per la quale veggasi il suo rispettivo Articolo *TIBICEN*.

L'altra spezie addimandasi *Lyra cornuta*, o sia pesce dalla testa cornuta, aguzza. E' questo secondo un pesce di una forma ottagonale, coperto tutto al di sopra di scaglie ossute: sono queste scaglie di una figura romboidale, e cadauna di esse scaglie ha nel suo centro, o mezzo un'acutissima tagliarda spina ripiegantesi all'indietro. Sonovi realmente soli sei ordini, o filari di queste scaglie, ma ad uno, che facciasi ad osservarle così di passaggio, e senza badarvi gran fatto, questi filari compariscono otto, avvegnachè due di essi sieno più grossi degli altri, e compariscano doppi, tali in realtà non essendo. Questo pesce è di un colore rosso, e la sua testa è grossissima. Il suo grugno divi-

desi verso la sua estremità in due lunghe corna, sopra le quali son piantate due spine, od aculei perpendicolari, ed una terza spina al di sopra, che con queste viene a formare un'angolo acuto. Ha questo pesce una lunghissima pinna sul suo dorso, ed un'altra ad essa corrispondente di dietro l'ano: similmente ne possiede due altre ben grosse sulle squame della testa, e due più picciole sopra la pancia. Egli ha due soli filamenti, appellati dita, e questi dietro le pinne della testa. Larga e spaziosa è la sua bocca, ma non è armata di denti, e sopra la sua mascella inferiore veggionvisi piantate parecchie barbe, due delle quali sono più lunghe delle altre tutte, e sono ramificate. Pescasi questo pesce nel Mare Mediterraneo, e vendesi nelle pubbliche Pescherie di Roma. Negli altri luoghi è un pesce assai raro, ed in Montpellier fu una volta mostrato al famoso Monsieur Ray per una Remora. Veggasi la Tavola dei Pesci sotto il n. 45. Veggasi altresì *Gesner, de Piscibus* pag. 610.

LITARGIRIO. Questa preparazione di piombo è di un'uso grandissimo nel cuocere le durissime, e resarde miniere dell'oro, dell'argento, e del rame, conciossiachè squagli, e liquefaccia tutte le specie di pietre e di terre in cristalli più presto che i metalli; e per questo mezzo il metallo, che è più pesante, precipiterà giù pel cristallo, che è una sostanza sottile, e leggiera, e verrà a raccogliersi, ed unirsi sort'esso cristallo in un regolo, soltanto con una porzioncella di scorie polverose aderenti al medesimo. Ma se sia rame quello, che è così separato, viene ad esserne sempre mai distrutta alcuna picciola porzione del medesimo; e s'è sia oro, od argento, una similante picciola porzioncella viene a fermarsi, e trattenersi entro le scorie.

Ma siccome il Litargirio passa, e penetra per tutti i vasi, sieno di qualsivoglia forte si vogliano, e mentre sta liquefacendosi, alzasi in una schiuma, che bene spesso trasceude i loro contorni, od orature, così i faggiatori non lo mettono mai in opera solo, ma sempre, e costantemente lo mescolano con quelle tali date sostanze, le quali possan dargli una

viscosità, quali appunto sono, il vetro di rocca, il sabbione, l'argilla, o similante sostanza. Mescolano essi pertanto due parti di Litargirio con una sola parte di alcuna di queste diviate sostanze, ed aggiugnongli alcuna porzione di nitro, oppure anche di sal comune, e ciò affinché il tutto possa scorrere con maggiore agevolezza. Alzano allora i vasi, i quali fa di mestieri, che sieno ben fissi, consistenti, e solidi, con un picciolo coperchio, tagliato strettamente, e collocando questo in un forno a vento, mantengonlo fuso, o liquefatto pel tratto di un buon quarto di ora, avendo l'occhio di tratto in tratto al foro delle ceneri, per vedere, se per avventura il cristallo non si sieno uscito, e scapolato fuori pel vaso, e che siasi ivi precipitato a basso. Assai volte vien trovato gonfiante, e trasfandente per i lati del vaso, non altrimenti che l'acqua, e gocciolando entro il foro delle ceneri; ed in questo caso, non vi ha modo, nè verso di conservare il residuo, se non se con levar via dal fuoco il vaso medesimo.

Allorchè il tutto sarassi totalmente raffreddato, forz'è rompere il vaso, e nella base, o fondo del medesimo troveravvisi una picciola quantità di un regolo di piombo, rattivato per mezzo del sale; nel mezzo troveravvisi poi il cristallo del piombo, il quale fa mestieri conservarlo per uso, e finalmente nella sommità un'incrostatura salina, la quale dee essere gettata via.

LITOTOMIA. Noi abbiamo un'istoria dell'operazione laterale per la pietra difesa dal prode, ed esercitatissimo Monsieur Morand, il quale arguisce, che i metodi di Celfo, di Frate Jacopo, del Rau, e del Cheselden, sono in sostanza rispetto all'essenziale i medesimi. Veggansi *Memoires Acad. Roy. Scienc. Paris. ann. 1731.*

Il metodo di Monsieur Cheselden è descritto nella sua *Anatomia*, sotto il Capo VI. della prima Edizione. Questo metodo di fare il taglio per l'operazione della pietra è grandemente commendato dal dottissimo Medico Monsieur Mead, il quale ci assicura, che con sì fatto metodo recentemente inventato non solamente i fanciulli, ed i giovani, ma le persone medesime.

desime avanzate negli anni, possono sot-
tomettere a questa particolare operazione,
senza grave pericolo; ed in evento, che
la pietra riesca soverchio grossa per esse-
re estratta, senza intaccare, o lacerare il
collo della vescica, ora non è più neces-
sario di scagliare con sì fatto metodo al-
le mani la pietra stessa, prima della estra-
zione. L'invenzione dell' estrazione della
pietra viene attribuita ad Ammonio Gre-
co medico, il quale da questo suo utilissi-
mo trovato guadagnossi il soprannome
ab riupe, il Litotomo Ammonio. Veg-
gi Mead, *Monit. & Pract. Medic.* pag.
103.

Ha raccolto Monsieur Houstet nume-
ro prodigioso di esempj di pietre stan-
zianti in borse, o sacchetti formati
nella vescica, dai quali egli rendevasi im-
possibile l'estrarre la pietra medesima, sen-
za malmenare, e lacerare la stessa vesci-
ca, oppure senza fare un taglio nel lato
del sacco, lo che una volta venne con
ottima riuscita eseguito dallo sperimenta-
tissimo Cerulico Monsieur Garengot. In
alcuni dei casi, de' quali quel valentu-
mo fa parola, i vasi della vescica trova-
vansi apparentemente cangiati, e divenuti
pietra, ed in questi stessi casi l'opera-
zione della pietra veniva tentata con uno
sgorgo di sangue realmente mortale. Veg-
gansi *Memoires de l'Acad. de Chirurg.*
de Paris, Tom. I.

L'allungamento, o distensione della ve-
scica con un liquore nell'effettuare l'altra
operazione per la pietra, viene accom-
pagnata da difficoltà grandissime, spezial-
mente nelle donne. Il dotto, e sperimenta-
tissimo medico Monsieur Kulm ha per-
ciò inventato, e fabbricato un Catatere
elevatorio per questo sesso. L'inclinazio-
ne, o piegatura dell' istrumento è accon-
tissima alla voltata dell'osso della pube,
e la sua gran curva, in vece di essere soltanto
solcheggiata, viene ad essere interamente
per entro foracchiata. Questo valentissimo
Medico, e Litotomo introduce questo Cata-
tere colla sua convessità in un'ano, quin-
di per gentil modo lo solleva all'Ipoga-
strio, e sopra esso taglia con tutta la sicu-
rezza. Veggansi *Nov. Act. Erud. Lips. Mens.*
Mart. Ann. 1732.

LOCHIA. Il flusso dei Lochj, o sia

del sangue, e degli umori sgorganti dall'
utero, intorno il tempo del parto, è di
due specie: uno viene denominato *legittimo*,
e questo avviene appunto dopo l'ef-
fusione del Feto maturo, nel suo pro-
prio tempo: l'altro *abortivo*, il quale ac-
compagna le sconcature, od aborti, ed,
a vero dire, non gli seguita, ma, o gli
precede, od avviene immediatamente nell'
atto medesimo dell'aborto, e ciò di ordi-
nario in guisa violentissima, e veramen-
te terribile. Il flusso legittimo suole simi-
gliantemente assai spesso esser soverchia-
mente abbondevole, e tramodante.

Segni del medesimo. Il flusso legittimo
dei lochj altro non è, che un'erezione
del sangue dalle parti genitali pel tratto di
otto, di dieci, di dodici, o di quattordi-
ci giorni dopo il parto, ed alcuna fiata
per un tratto di tempo più lungo di que-
sto. Durante la prima giornata vien dalla
puerpera scaricato, e mandato fuori puro
sangue aggrumato, e coagulato, o per lo
meno un fluido colorito, e tinto di san-
gue. Dopo il quarto, o quinto giorno è
questa scarica accompagnata da un odore
disaggradevolissimo, ed alcuna fiata anche
manifestamente fetent. Nelle successive
giornate l'umore diviso diventa meno
languigno, e via via va sempre più in-
giallendosi, e dopo di ciò va divenendo
gradatamente pallido ed acquoso, fino a
tanto, che viene alla per fine a perdere
qualsivoglia colore, ed odore: in questa
successione di cose il flusso stesso va simi-
gliantemente facendosi sempre più mode-
rato, finchè arriva finalmente di persè a
mancare del tutto. Questo è lo stato na-
turale e legittimo di siffatto flusso; ma in
evento, che le secondine sieno state sover-
chiamente ritenute, o se una parte del-
le medesime siasi staccata, e rimasta in-
tro l'utero, allora il flusso medesimo tra-
scende i dovuti suoi confini, e la puerpe-
ra viene a provare moltissimi dolori, e
movimenti spastici intorno all'utero mede-
simo, e per tutta la regione dell'addome.

Nei flussi lochiali accompagnanti gli
aborti innanzi che segua l'atto abortivo
il sangue vien fuori soveramente, e bel
bello; quindi durante l'immatura ef-
fusione del feto, sgorga, e sbocca fuori in
copia grande, e con empito eccessivo.

Tal-

Talvolta ancora, allorchè hanno preceduto sì fatto disordine passioni d'animo violentissime, questo sangue medesimo suole sgorgar fuori con violenza grande nel bel principio stesso dell' attacco, ed innanzi che l'immaturo feto siane escluso: questo vien segurato dall' acerbo feto, o dir lo vogliamo falso concepimento, che sempre trovasi nell' utero, e questo assai sovente non suole esser disgiunto da svenimenti e deliqui d'animo, e da dolori acutissimi e veementissimi di ventre. Le femmine grandemente soggette al frequentemente sconcertarsi, provano in simiglianti casi disturbi e dolori meno violenti delle altre, che a ciò non son use, e in esse meno abbondevole è sempre mai il divisato flusso Lochiale.

Il soverchio copioso, e trasmodante flusso de' i Lochj è cosa di momento, e di conseguenza assai perigliosa, e le femmine grandemente a tale sconcerto sottoposte, quelle massimamente esser sogliono, le quali sono d'un abito di corpo pletorico, e quelle tali, che vengono assai agevolmente dominate, e battute da passioni violente. Quelle ben' anche sonvi soggette, che use sono a stravizzare, massime nel vino, od in altri spiritosi, ed energici, e gagliardi liquori, e che sogliono cibarsi di vivande soverchio condite, e di grande alimento, come quelle altresì, le quali ai tempi dovuti hanno fatto di meno di cavarli sangue nel periodo di loro gestazione; e finalmente quelle tali femmine, le quali sogliono abitualmente mandar fuori negli ulati loro corsi mestruali abbondevolissime scariche di sangue.

Nei casi degli aborti quelle femmine sono assai più delle altre tutte soggette a trasmodanti corsi di sangue lochiali, le quali non sono state a dovere medicate, e trattate, e con dievolezza purgate, e ben rimonde dopo il primo loro parto, o sconcertatura. Le occasioni principalissime dei trasmodanti, e strabocchevoli flussi dei Lochj dopo il parto, sono però od un' abito grandemente pletorico, oppure l' uso di violenti medicamenti per promuovere lo sgravamento, o finalmente l' esser rimasa, e stanziate attualmente nell' utero una parte delle scondine.

Prognostici da ciò. Il Flusso dei Lochj,

allorchè è moderato, e regolare, arreca sovrano beneficio alla persona sgravata, e per lo contrario il troncamento, o soppressione del flusso medesimo non trovasi giammai disgiunto da grave pericolo. Di tutti i flussi sanguigni questo sì è il più soggetto a trascendere l' usuale adeguata quantità; ed in quelle sconcertature, od aborti, seguite dopo il terzo mese della gestazione del feto, egli sì è di ordinario più copioso, e maggiore, che alloraquando il parto è giunto alla perfetta sua maturità. Allorchè questo flusso è strabocchevolmente grande, in brevissimo tratto di tempo le forze della paziente son rovinate, e distrutte; e quando non mantienfi successivamente, e continuamente tale, ma tratto tratto, dopo corti intervalli, torna colla stessa violenza a sgorgare, egli è questo un segno univoco, che la matrice non trovasi adeguatamente nettata, e rimonda, e quindi in progresso di tempo quella tal femmina rimansi sterile, ed infconda, o se s' impregna trovasi a novelle sconcertature grandemente soggetta. Nei casi, ove venga minacciato un' aborto, qualora seguita sia già una scarica abbondevole di sangue, non dovrà mai il prudente Medico, od altra persona, che se ne addossi il pensiero, fare il menomissimo tentativo per trattenere nell' utero il Feto acerbo.

Metodo del Trattamento. Alloraquando il flusso dei Lochj è moderato, non vi si richiede aiuto, od assistenza di medico, ma il corso di questo flusso dee esser lasciato totalmente in mano della sola natura: ma in evento che questo flusso sgorgi con empito trasmodante, ed in copia soverchio abbondevole, non dovrafti intraprendere altra cura, o metodo da quello diverso, che vien messo in opera nei casi medesimi degli eccedenti corsi mestruali. Dovrannosi con frequenza ripetere quelle medicine, le quali possiedono la facoltà di attutare, e di acquietare i moti violenti del sangue, quali appunto sono, il nitro, gli Assorbenti di indole alcalica, come, a cagion di esempio, gli occhi di granchio, e simiglianti; e finalmente una preferella di cinabro. In evento, che questi fallino fra mano, dovrà il prudente Medico ricorrere in

in tal caso agli astringenti di piacevolissima, e benignissima natura, quale appunto si è il croco di marte antimoniaca, *Crocus martis antimoniatis*, o la Tintura di sale di Aaccio, oppure l'Estratto del Millefoglie comune. Il Flusso abortivo dei Lochj dovrà esser trattato nella maniera medesima, e collo stesso metodo, di quel flusso, che è soverchiato trasmodante nelle femmine dopo lo sgravamento di un parto perfettamente maturo. L'aborto dee esser sempre affrettato, ed il feto, la mola, o qualsivoglia altra cosa siasi, dee procurarsi che venga fuori, e sbocchi più prontamente, che esser mai possa, allorchè il flusso è violento, avvegnachè, se si sardi, la paziente andrà in infinitismo, morirà eziandio lo stesso.

Il mezzo per impedire un trasmodante sbocco dei Lochj nel Parto, si è quello di cavar sangue con frequenza alladonna nel tempo di sua gravidanza; e qualora ciò sia giudicato da un saggio Medico necessario, gran bene sarà alla paziente una cavata di sangue appunto avanti ch'ella si sgravi, e mentre ha le doglie. Le accouche e savi allacciatore sopra il ventre dopo l'espulsione del feto, arrecano similgiatamente sovrano beneficio in similgiante indicazione, ed il conservare la puerpera perfettamente quieta, e tranquilla, ed il procurare, che non cianci soverchio, faranno cose tutte grandemente giovevoli ad impedire al fatto disordine.

La recidiva di un' aborto viene, più che da qualunque altra cosa, impedita da un rimondamento sufficiente della matrice fatto, e procurato in tempo opportuno, e col cavar sangue alla pregnantessa appunto in quel dato tempo, in cui seguita intesa l'aborto antecedente.

Le donne gravide, poichè avranno partorito, non altramente esser debbono considerate, che come persone ferite, nelle quali con grandissima agevolezza possono ingenerar delle febbri; che perciò qualsivoglia cosa, la quale ponga in alcun moto il sangue, dee esser da loro *cave prius*, e *angue dilungata*. I medicamenti astringenti debbon di pari tener lontani, più che mai sia possibile, in casi di questa na-

Suppl. Tom. III.

tura; ed ove vengano trovati indispensabilmente necessari, dovranno dare alle pazienti sgravate quei soli di questa classe, che sono i più benigni, e piacevoli; fra essi dovranno sempre, e costantemente prescrivere alle medesime i medicamenti di indole atteroperante. Tanto ciò importa, ed è di tanto peso, che se venga imprudentemente, od ignorantemente trascurato, la conseguenza di sì fatta ignoranza, o trascuratezza sono febbrirorribili infiammatorie, Etisie, ed Idropisie. Veggasi onninamente *Juncker, Conspect. Medic. pag. 60. de seq.*

Suppressioni o trancamenti dei Lochj. Queste suppressioni sono di due specie, vale a dire, o totali, o parziali. Nel trancamento, o suppressione totale, che diceasi anche dai medici plenaria, non vedevansi la menoma gocciola di sangue sgorgante; oppure se ne seguì sul bel principio una scarica dicevole, ed adeguata, questa fermossi in tronco la stessa prima giornata dello sgravamento.

Nella suppressione parziale, o, siccome amano meglio alcuni Scrittori delle cose mediche di chiamarla, *semmamento, diminuzione dei Lochj*, mantengono questi il loro periodo per otto, dieci, o dodici giornate, ma sgorgano in quantità così picciola, che a grandissimo stento possono averli sotto uno sgorgo, o flusso di questa natura. Nel far giudizio di un siffatto diminimento, egli si è grandemente necessario il farsi a considerare lo stato naturale, ed il temperamento, e costituzione della paziente sgravata; e se nel tempo, che questa non trovavasi incinta, ella sia stata usa ad aver soltanto scarie, e leggieri scariche negli usi suoi corsi mestruali, da costei non dovraffi altri promettere un abbondevole sgorgamento di flusso lochiale. Se poi la donna avrà per innanzi partorito altri figliuoli, dovraffi somigliantemente ricercar dal medico saggio quanta stata sia la copia del sangue, di cui in quei dati tempi, ed occasioni, siasi ella scaricata, e da questa dovrà il medesimo determinare ciò, che debba prometterli pel caso presente.

Le persone soggette alla suppressione, o troncamento dei Lochj, sono massimamente quelle di un' abito pletorico, e le

i i

cuj

cui vene son picciole: quelle che sono di una disposizione pavidà, e che son grandemente soggette ad aver paura, ad attristarsi, ed all'isteria, ed a passioni di siffatta specie. Sono queste principalmente le cagioni naturali di un troncamento dei Lochj; ma a queste debbon'essere a buona equità congiunte parecchie altre cagioni avventizie, ed accidentali; quali esser possono, a cagion di esempio, un istantaneo raffreddamento del corpo, il somministrare delle grandemente violentanti medicine innanzi lo sgravamento del feto, e l'uso secon-sigliato, ed improprio di medicamenti calorosi, ed accefi. Questi medicamenti vengono bene spesso somministrati per promuovere i Lochj, allorchè vien giudicato, che non isgorghino in copia sufficiente, e quelli per lo contrario (e sapianlo pure coloro, che nel sangue, e saper lo dovrebbero) e quelli, io dico, anzichè produrre una buona cura, altro non fanno che troncarli in tutto, e produrre una plenaria, o totale soppressione. Di questa Tribù di medicine son appunto la mirra, lo zafferano, ed i sali volatili tutti, allorchè senza giudizio, ed imprudentemente, vengono somministrati. Alcune fiata i troncamenti dei Lochj vengono in un subito cagionati da alcuna violenta passione, e dai ripetuti, e violentissimi sforzi, che la povera femmina è stata suo malgrado obbligata a fare durante un duro malagevole e faticoso parto.

Prognostici da ciò. Non vi ha specie d'Emorragia, il troncamento, o soppressione della quale sia accompagnata con un così grande, e con così imminente pericolo, come quella dei Lochj.

Le soppressioni naturali dipendono comunemente, o da una sovrabbondevole copia di sangue, il quale abbia anche il difetto, o pecca d'essere soverchio spesso, oppure da una turgescenza, od una emozione violentissima del medesimo. Nel primo caso i sintomi, che ne nascono, sono meno veementi, ma nel secondo comparsissimo con più orrido cefalo, e sono assai più terribili. Quei della prima specie esser sogliono sempremai un' inquietudine, un non potere star ferma con quiete, ed agio in alcuna postura, un affanno, od anie-

tà, uno stringimento dei precordi, dolori di testa, e mancanza totale d'appetito. Nel secondo caso poi ne seguono bene spesso incontrante delle febbri d'indole, e specie infiammatorie, ed alcuna fiata delle febbri miliane, e scarlatine, non disgiunte da orrida, e truce malignità. Sogliono eziandio alcune povere femmine cadere immediatamente in uno strano delirio della specie la più violenta, ed anche in iniquità. Sono questi i subitanei effetti di soppressioni di questo genere; ma oltre a questi, vengono bene spesso ritenuti nell'utero dei coagulamenti, od aggrumamenti di sangue: questi vengono ad impedire ulteriori concepimenti, ed impediscono, in evento, che concepiscano, che il feto ricevà il dovuto necessario nutrimento, e per conseguente per tal motivo solo producono degli aborti; e qualora ciò non avvenga, soggeranno le povere femmine in progresso bene spesso a malori tremendissimi isterici, e convulsivi, ed a frequentissimi svenimenti, e deliqui d'animo.

Metodo della Cura. Allora quando il troncamento, o soppressione dei Lochj è soltanto parziale, e che quelli sgorgano lentamente, tuttocchè in troppo picciola quantità, in questo caso doviansi preferire i medicamenti stimolanti d'indole la più mite, e benigna, e quelli dovranno darli alla paziente soltanto in picciolissime doserelle. La Tintura di Mirra, e di Zafferano, e l'Essenza d'ambra, possono in questo caso essere mescolati, e dati nella dose di venti, o venticinque goccioline ogni giorno due volte: questa mistura medica produce soventi volte dei prontissimi, e maravigliosi ottimi effetti.

Quando poi la soppressione è plenaria, o totale, e massimamente allorchè ella ha tenuto in tale stato la paziente per più giornate, egli è del tutto inutile, e vano il promettersi di procurare con questa felicità una scatica regolare tutt' in un subito per mezzo di medicine stimolanti. Allora debboni con ogni maggiore accuratezza esaminare, ed investigare le cagioni della soppressione, ed i bollori, e movimenti febbrili del sangue debbon essere alleviati per mezzo dei medicamenti febrifughi, e per via di medicine nitriche; ed allorchè il sangue sarà stato ricovrato allo

stato

flato suo naturale, il flusso de' lochj v. daffili ripinciare il suo regular corso con felicità.

Il metodo comunissimo di cavar sangue per richiamar di nuovo i troncati corsi lochiali, radissime volte partorisce un prospero effetto: egli è vero però, che qualora la paziente abbia trascurato di farsi cavar sangue ai tempi dovuti entro il periodo di sua gravidanza, questa cavata di sangue non sarà se non bece; ma radissime siate quando il sangue pecca anzi in qualità, che in quantità. Il Mondo pressochè generalmente fassi una paura grandissima del nitro in casi simili, e questo per tema, che non produca nelle puerpere delle diarre; ma dee saperfi, che un sì fatto disordine non è io verun conto dovuto al nitro, ma bensì ad un soverchio abbondevole uso, od abuso di quello; conciossiachè questo sovrano rimedio se verrà fatto prendere in doselle di quattro, di cinque, o di sei grani, verrà sicuramente, anzichè a produrre in questi casi una diarre, piuttosto ad impedirli. Veggasi *Sancker*, *Conspect. Medic.* pag. 80. Vegg. altresì l'Articolo PARTO.

LOGARITMO. Sono i Logaritmi non solamente di uso grandissimo per agevolare i calcoli nell'Armetica, e nella Trigonometria, ma stati sono sperimentati altresì di sovrano, e sommamente essensivo servizio, e comodo nella più alta, ed eminente Geometria, a massimamente nel metodo famoso delle Flussioni. La natura, e la generazione dei logaritmi è stata già appianata nella *Ciclopedia*, secondo la maniera, della quale è stato fatto uso in parecchi Trattati Elementari; ma non sarà se non grandemente proficuo, e discevole l'aggiungere a tutto quello alcuna cosa di vantaggio intorno al soggetto medesimo, e questa toltà di peso dall'egregio Trattato delle Flussioni del massimo Matematico Monsieur Mac-Laurin, il quale ha spiegato, ed appianato la natura, e la generazione dei logaritmi, coerentemente, ed a norme della nozione del primo loro grande Inventore il Lord Napier.

I Logaritmi, e le Quantità, alle quali questi corrispondono, può essere supposto, esser generate dal moto di un punto. Se questo punto muovasi sopra spazi uguali,

in tempi uguali, la linea da esso descritta aumenterà ugualmente.

Oltre di ciò, una linea diminuisce, e scema proporzionalmente, allorchè il punto, che muovesi sopra essa, descrive tali parti in tempi uguali che trovinsi perpetuamente nella medesima costante ragione alle fiocce, dalle quali esse sono sottratte, oppure alle distanze di quel punto, nel principiare di questi tempi, da un termine dato nella linea. In similgiante guisa può una linea aumentarsi ed andar crescendo proporzionalmente, se il punto moventesi venga in tempi uguali a descrivere spazij proporzionali alle sue distanze da un certo dato termine, nel principiare di ciascun tempo. Così nel primo caso, poni che ae sia ad ao , ed a ce , de a de , ef ad eo , fg ad fo sempre nella Ragione

$$\frac{P}{QR} = \frac{a}{c} = \frac{d}{e} = \frac{f}{g}$$

ne medesima di QR a QS , e supponi che il punto p partuto da a venga a descrivere ae , ed , de , ef , fg , in porzioni uguali di tempo; e poni, che lo spazio descritto da p , in qualsivoglia tempo dato, trovissi sempre, e costantemente nella ragione medesima alla distanza di p da a , nel principiare di questo tempo, allora la linea retta ao scemerà, e diminuirassi proporzionalmente.

Nella maniera medesima la linea oa cresce, ed aumenta proporzionalmente, se il punto p descriva in tempi uguali gli spazj ae , ed , de , ef , fg , &c. di modo tale che ae è ad ao , ed a ce , de a de , &c. &c. in una Ragione costante.

$$\frac{A}{B} = \frac{C}{D} = \frac{E}{F}$$

Ora se noi ci facciamo a supporre un punto P descrivente la linea AB con un moto uniforme, mentre il punto p descrive una linea aumentantesi, o diminuentesi

proporzionalmente, la linea AP descritta da P con siffatto moto uniforme, nel tempo medesimo che oa coll' accrescersi, o col diminuirsi proporzionalmente, falsi si diviene uguale ad op , è il Logaritmo di op . Così AC , AD , AE , &c. &c. sono i Logaritmi di oc , od , oe , &c. &c. rispettivamente; ed oa è la quantità, il cui Logaritmo vien supposto uguale a nulla.

Noi ci siamo qui fatti ad astrarre da i numeri della dottrina, la quale esser può la più generale; ma egli è piano e certo, che se AC , AD , AE &c. &c. vien supposto 1. 2. 3. &c. &c. in progressione aritmetica; oc , od , oe , &c. &c. faranno in progressione geometrica, e che il Logaritmo di oa , che può esser preso per unità, è nulla.

Il Lord Napier nel suo primo schema dei Logaritmi falsi a supporre, che mentre op aumentasi, o scema proporzionalmente, il moto uniforme del punto P , dal quale il Logaritmo di op viene ad essere generato, sia uguale alla velocità di p in a , ch'è quanto dire, nel termine di tempo, in cui i logaritmi principiano ad essere generati. Quindi i logaritmi formati a norma di siffatto modello son appellati logaritmi Napieriani, o Napier, ad alcune volte logaritmi naturali.

Allora quando una Ragione è data, il punto p descrive la differenza dei termini della Ragione in un tempo medesimo. Alorchè una Ragione è duplicata di un'altra Ragione, il punto p descrive la differenza dei termini in un tempo doppio. Quando una Ragione è triplicata di un'altra Ragione, ella descrive la differenza dei termini, in un tempo triplo; e così in seguito. Simigliantemente allora quando una Ragione è composta di due, o di più Ragioni, il punto p descrive la differenza dei termini di questa Ragione in un tempo uguale alla somma dei tempi nei quali ella descrive le differenze dei termini delle Ragioni semplici, delle quali ella è composta. E ciò che qui vien detto dei tempi del moto di p , quando op aumentasi, si cresce proporzionalmente, dee essere omniaamente applicato agli spazi descritti da P in quelli tempi, col suo moto uniforme.

Quindi vengono ad essere dedotte le pro-

prietà principali dei logaritmi. Sono queste, le misure delle Ragioni. L' eccedimento dei logaritmi dell' antecedente sopra i logaritmi del conseguente, misura la Ragione di questi termini. La misura di una Ragione di una Quantità maggiore ad una minore è positiva, come questa ragione composta con qualsivoglia altra Ragione aumentavisi. La Ragione d' uguaglianza composta con qualsivoglia altra Ragione, nè aumentasi, nè si diminuisce; e la sua misura è nulla. La misura della Ragione di una quantità minore ad una maggiore è negativa; e questa Ragione composta con qualsivoglia altra Ragione diminuiscevisi, e scema. La Ragione di qualsivoglia quantità A all' unità, composta colla Ragione di unità ad A , viene a produrre la Ragione di A ad A , oppure la Ragione di Uguaglianza; e le misure di queste due Ragioni distruggonsi l'una l'altra, allorchè sono aggiunte insieme; di maniera tale, che quando una di esse vien considerata come positiva, l'altra dee essere considerata come negativa.

Allora quando op aumentasi proporzionalmente, il moto di p viene ad essere perpetuamente accelerato; e per lo contrario, allorchè op diminuisce, si scema proporzionalmente, il moto di p viene ad essere perpetuamente ritardato.

Se la velocità del punto p sia sempre come la distanza op , in tal caso questa linea aumenterassi, o si diminuirà nella maniera supposta dal detto Lord Napier; e la velocità del punto p essendo la Fluzione della linea op , ella varierà sempre, e costantemente nella Ragione medesima della stessa quantità. Veggasi *Mac Laurin* Fluzioni dall' Articolo 151. all' Art. 160.

La fluzione di qualsivoglia quantità è alla fluzione del suo Logaritmo, come la quantità stessa è all' Unità.

Quindi la Fluzione del Logaritmo di

$$x \text{ sarà } \frac{x}{x}. \text{ Conciossicché } x : 1 :: x' : \frac{x'}{x}$$

la Fluzione del Logaritmo ricercato.

Allora quando op aumentasi proporzionalmente, gli incrementi generati in quelli esser si vogliono tempi uguali, sono esattamente, ed accuratamente nella Ragione medesima delle velocità di p , oppure delle Fluzioni di op , nel principiare, nel

di 10 folle ricercato supporrai di $\frac{1}{2} = \frac{1+x}{1-x}$, allora $x = \frac{1}{19}$. Al Logaritmo di $\frac{1}{2}$ aggiungerai due volte il Logaritmo di 3, e la somma verrà ad essere il Logaritmo di 10, che sarà trovato essere 2.30258509. ec. ed il suo reciproco, oppure $\frac{1}{2.30258509}$, ec. Sarà = 0.43429448, ec.

Ora per convertire qualsivoglia Logaritmo del Lord Napier, od alcuno dei Logaritmi naturali in Logaritmi di Monsieur Brigg, ove il Logaritmo di 10, è unità, dirai, come il Logaritmo Napier di 10, è a 1, così è qualsivoglia altro dei Logaritmi del Napier, al Logaritmo del Brigg del numero medesimo. Quindi il Logaritmo Brigg sarà uguale al Logaritmo Napier diviso da 2.30258509, ec. oppure, che viene a riuscire la cosa medesima, moltiplicato pel suo reciproco 0.43429448, ec. E viceversa, essendo dato il Logaritmo del Brigg, per trovare il Logaritmo corrispondente del Napier, moltiplicherai il Logaritmo del Brigg per 2.30258509, ec.

In generale per trovare il Logaritmo del Brigg di qualsivoglia numero n . Ponni, che $\frac{1+x}{1-x} = n$, e per conseguente

$x = \frac{n-1}{n+1}$. Moltiplicherai x per 0.43429448, ec. (= 2.30258509, ec.) ed allora continuamente moltiplicherai questo prodotto per x , e dividerai i prodotti risultanti, rispettivamente per via dei termini della progressione 1, 3, 5, 7, ec. ec. La somma di questi Quozienti verrà ad essere il ricercato Logaritmo del Brigg.

Qualunque volta, che sieno trovati i primi Logaritmi, noi possiamo quindi formare il Logaritmo di qualsivoglia primo numero. A cagione d'esempio, poni, che venga ricercato di trovare il Logaritmo di 19. Prenderai due interi, uno immediatamente maggiore, l'altro minore del 19, vale a dire il 18, ed il 20. Questi, non essendo primi, i loro Logaritmi possono esser trovati da quei del loro Fattori, 2, 3, e 5. Così $l. 20 = 2l. 2 + l. 5$, ed $l. 18 = 2l. 3 + l. 2$. Ma il qua-


drato del numero di mezzo 19 trascende, ed eccede sempre il rettangolo del due sopra, e sott'esso per 1. (Conciosiache in generale, $nn = n + 1 \times n - 1 + 1 = n - 1 + 1$). Troverai perciò il Logaritmo di $\frac{1+x}{1-x} = \frac{1+\frac{1}{19}}{1-\frac{1}{19}}$, ove $x = \frac{1}{19}$.

A questo Logaritmo aggiungerai il Logaritmo di 360 = $l. 18 + l. 20$, la somma verrà ad essere $l. 361$, la metà del quale è il Logaritmo di 19. Veggasi il Trattato di Monsieur Cotes intitolato Harmonia Mensurarum, Proposizione 2.

Rispetto poi ai varj compendj originati nella pratica di costruire una Tavola di Logaritmi, noi ci riportiamo alle Tavole dei Signori Gardiner, e Sherwin.

Noi abbiamo già osservato, come il Logaritmo del Lord Napier, o sia Logaritmo naturale di qualsivoglia quantità, vien trovato col supporre il moto uniforme del punto P, da cui viene ad essere generato il Logaritmo di a p essere uguale alla velocità di p , nel termine di tempo, in cui appunto i Logaritmi principiano ad essere generati.

Ma il moto uniforme di P. può esser supposto uguale al moto di p in qualsivoglia altro termine, come quando ei perviene ad e ; nel qual caso la velocità costante di P. è alla velocità, colla quale p lorge da a , allorchè il Logaritmo comincia ad essere generato, come oa è ad ea . Così noi possiamo ottenere tanti Logaritmi, quanti ci sia in grado di ottenere; e la linea oe è appunto ciò, che Monsieur Cotes addimanda Modulo, o modello del sistema.



Le misure di una data Ragione nei differenti sistemi trovansi, e sono nella medesima proporzione delle linee oe , essendo a sempre costantemente il termine, ove la velocità di p diviene uguale alla costante velocità di P. Quindi il Logaritmo di qualsivoglia quantità nel primo sistema del Lord Napier diventa uguale al Logaritmo della quantità medesima in ogni, e qualunque altro Sistema, il cui modello sia oe , dal moltiplicare pel numero

mero, il quale esprima la Ragione di oe ad oa ; ed il modulo di qualsivoglia altro Sistema, come il Logaritmo di qualsivoglia data quantità nel primo è al suo Logaritmo nel secondo.

Così nel primo schema del Lord Napier, nel tempo medesimo, che op , dall'essere uguale ad oa diviene uguale a dieci tempi oa , il punto P descrive una linea, la Ragione della quale ad oa è quella di 2. 30258509, ec. alla Unità. Ma vennevi trovato conveniente, che il Logaritmo di 10. fosse 1., ed il moto di P venne supposto essere a segno diminuito, che lo spazio del medesimo descritto in questo tempo fosse uguale soltanto ad oa ; che è quanto dire, la sua velocità in questo caso venne supposta minore di 2. 30258, ec. Se oe venga presa per minore di oa nella Ragione medesima, la velocità di P sarà uguale in questo caso alla velocità di p in e ; ed oe sarà il modulo di questo sistema, che perciò verrà ad essere espresso da 0. 43429448, ec.

$\frac{1}{2.30258509}$, ec. oa essendo Unità. Veggasi M. Mac Laurin, loco citato Articolo 174.

Allorchè una Ragione è data, la sua misura è sempre, e costantemente come il modulo del sistema. Ella si è pertanto la medesima Ragione invariabile, sempre, e costantemente misurata dal modulo del sistema, che da Monsieur Cotes viene appellata, *Ratio modularis*. Questa Ragione è quella di om ad oe , se op dall' aumentarsi proporzionalmente dall' essere uguale ad

$o \quad e \quad a \quad m$

$A \quad P \quad p$

ae , diventa uguale ad om , nel tempo medesimo, che P , pel suo moto uniforme, descrive una linea uguale al modulo e . M. Mac-Laurin, ibid. Art. 175. ed Art. 753.

Questa Ragione modulare vien trovata, esser quella di 2. 718283828499, ad 1, oppure di 1. ad 0. 367879441171, &c. Veggasi M. Cotes, Harmon. Mensurar. pag. 7.

Se sia dato un Logaritmo x , il nome-

ro corrispondente, qualora x sia un Logaritmo naturale, verrà ad essere espresso dalla seguente serie $1 + x + \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{4}x^4 + \frac{1}{5}x^5 + \frac{1}{6}x^6 + \frac{1}{7}x^7 + \frac{1}{8}x^8 + \frac{1}{9}x^9 + \frac{1}{10}x^{10} + \text{ec. ec.}$ oppure generalmente, se il modulo sia M ,

dall' appresso, $1 + \frac{x}{M} + \frac{x^2}{2M^2} + \frac{x^3}{3M^3} +$

ec. ec. la quale, allorchè $x = M$ viene ad essere cambiata in $1 + \frac{1}{1} + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{5} + \text{ec. ec.}$ oppure $1 + \frac{1}{1} + \frac{1}{1.2} +$

$\frac{1}{1.2.3} + \frac{1}{1.2.3.4} + \frac{1}{1.2.3.4.5} + \frac{1}{1.2.3.4.5.6} + \text{ec. ec.}$ 2. 7182818,

ec. la ragione della quale ad 1 è appunto la Ragione modulare. Veggasi Monsieur Mac-Laurin, Fluxioni, Art. 753.

Monsieur Cotes, Harmon. Mensurar. pag. 6. 7.

Noi abbiamo detto, come nel primo Sistema del Lord Napier la velocità costante di P , dalla quale viene ad esser generato il Logaritmo AP , è uguale alla velocità, colla quale p si parte da a . Se pertanto noi supponghiamo, che AP , ed ap vengano ad essere continuamente diminuente,

essendo $A \quad P$ sempre, e costantemente il Logaritmo di op , la loro Ragione verrà continuamente ad approssimarsi alla Ragione di uguaglianza, come suo limite. (Veggasi l'Articolo LIMITE). Ed oa essendo supposto, che rappresenti unità, se ap sia semplicissimamente comparata con oa , vi può esser supposto nelle approssimazioni, che sia il Logaritmo di op , nel presente sistema: e qualsivoglia picciolissima frazione può esser supposto, che sia il Logaritmo della somma di unità, e di questa frazione aggiunte insieme. Da quello ne seguita, che se una serie di medie proporzionali venga interposta fra oa , e qualsivoglia data linea ob , ed il numero di tutti i termini ad esclusione di a sia x ; ed a essendo il secondo termine della serie, an sia ad ab , come l'unità è al numero x :

$a \quad b$

$A \quad P \quad p$

allora

allora per via di accrescere continuamente il numero delle medie proporzionali fra oa , ed ob , la Ragione di x a g andrà continuamente approssimandosi alla Ragione di AB (Logaritmo di ob) ad ab , come suo limite. Conciosiachè il numero x è all'unità, come AB è ad AN (Logaritmo di an ;) e l'unità è a g , come an (che s'approssima continuamente ad AN) è ad ab . La Ragione pertanto di x a g s'approssima continuamente a quella di AB ad ab . A cagion di esempio, se ob sia doppia di oa , la Ragione di x a g s'approssima continuamente alla Ragione del Logaritmo naturale di 2 all'unità, che è a un di presso quella di 7 a 10 Vegg. *Mac-Laurin*, Lib. citato Art. 179. e *De Moivre* Dottrina dei Camb. Problema V.

LOGARITMI Iperbolici: La cosa medesima sono i Logaritmi Iperbolici, che i Logaritmi naturali, o dire gli vogliamo quelli del primo schema del Lord Napier.

La ragione di simigliante appellazione si è la Analogia, che gli spazj Iperbolici hanno coi Logaritmi. Così



Egli è noto, che se sopra l'Asintote OS di un' Iperbola LMN , le Abscisse OA , OP , OG , OR , ec. vengano prese in progressione geometrica, i Settori corrispondenti LOM , LON , LOQ , ec. oppure i Segmenti $LAPM$, $LAGN$, $LARQ$, ec. saranno in progressione Aritmetica. Quindi i Segmenti, o Settori verranno ad essere i Logaritmi delle loro abscisse corrispondenti OP , OG , OR , ec. Ed il Settore LOM , oppure il Segmento $LAPM$ misurerà la Ragione OP ad OA . Il modulo del presente sistema di Logaritmi si è il parallelogrammo $OALB$, il quale essendo supposto unità, questi Logaritmi vengono a coincidere a capello con i Logaritmi del Lord Napier.


I Settori Iperbolici misurano le Ragio-

ni non altrimenti che i Settori Circolari, o gli Archi, misurano gli Angoli. Veggasi *M. Mac-Laurin*, loco citato, Art. 177. *L'Hospital*, Sezioni Conièhe Art. 22.

LOGARITMICO. Curva Logaritmica. Quella curva fu denominata Logaritmica, oppure Logistica da *M. Huygens*. Tuttochè altri Matematici l'avevano prima di lui considerata, non le avevano dato quella particolare denominazione. Ci ha questo Valtuotuo fornito parecchie assai curiose proprietà relative alla medesima nel fine del suo Trattato della cagione della Gravità, ma però senza Dimostrazioni. Queste perciò sono state supplite da par suo dal Sovrano Matematico dello studio di Pisa in Toscana Padre Abate Guido Grandi. Veggasi *Huygens* Oper. Vol. II. Amsterdam, 1728.

Queste proprietà pertanto sono;


1. Gli spazj compresi fra due ordinate, sono come la differenza di queste ordinate. Così pont che AVD sia un Logaritmo, e le sue ordinate AB , VC , DQ ; poni, che le due ultime continuate incontrinsi con AK , parallela all'Asintote BO , in E , ed in K , allora gli spazj $ABCV$, $ABQD$ verranno ad essere l'uno all'altro come EV a KD .



2. Se AO sia una Tangente in A intersecante CE , e KQ in I , G ; gli spazj AVE , ADK verranno ad essere l'uno all'altro come VI a DG .

3. Lo Spazio $ABQD$, è allo Spazio infinito di h da QD , e diacente fra la Curva, e la sua Asintote, come KD a DQ . Osserva l'accuratissimo Autore, che quando egli dice, che spazio infinito ha una certa proporzione ad uno spazio finito, egli intende, che quello spazio infinito, o dir vogliasi indefinito, possa approssimarsi così dappresso ad uno spazio dato avente quella certa proporzione ad un'altro

Noi abbiamo fatto parola di un metodo di trovare la sotto-tangente di una data Logaritmica, inventato da Monf. Huygens nel Numero 4. Ma ciò puossi altramente ottenere così: allungherai qualsivoglia Ordinata CD da C fino ad E , di modo che la Ragione di CE a CD venga ad essere



uguale alla Ragione modulare; e la linea retta EB tirata d' E parallela all'asintote, ed incontra la curva in B , verrà ad essere uguale alla sotto-tangente. La Ragione modulare è 2.7182818, &c. ad 1; oppure 1 a 0.3678794, &c. per cui esser possono sostituite le approssimazioni 11 a 4, 87 a 32 &c. maggiori del vero; ed 8 a 3, 19 a 7, 106 a 39, &c. minori della vera Ragione. Veggasi Monsiur *Cotes*, *Harmon. Mensurar.* pag. 7, e 16.

Mentre la base OP aumenta uniformemente, poni, che l'Ordinata Pp aumenti, o diminuisca proporzionalmente, siccome additammo sotto il precedente Articolo LOGARITMO; che è quanto dire, poni, che la velocità di p nella direzione Oo sia sempre come l'Ordinata Pp ; allora il punto P verrà a descrivere la Curva Logaritmica.




La base Op è sempre il Logaritmo dell' Ordinata Pp ; e se il moto uniforme di P sia uguale al moto di p in o nella direzione Oo , allora l'Ordinata Oo è il modulo di questo sistema a i logaritmi; e la

Flussione di qualsivoglia Ordinata è alla Flussione della base, come questa Ordinata è ad Oo .

Per la proprietà generale delle tangenti, la Flussione di qualsivoglia Ordinata è alla Flussione della base, come questa Ordinata medesima è alla sotto-tangente. Quindi la sotto-tangente OT , oppure AT , sarà uguale ad Oa . Per tanto la sotto-tangente sarà costante. In qualsivoglia altra Curva logaritmica la sotto-tangente sarà sempre uguale a quella Ordinata, la Flussione della quale è uguale alla Flussione della base, ch'è quanto dire, il modulo esprime sempre la sotto-tangente della Curva logaritmica. Veggasi l'antecedente Articolo LOGARITMO.

La sotto-tangente della Curva logaritmica esprime il modulo di questo sistema di logaritmi, la sotto-tangente sarà il logaritmo della Ragione modulare, ch'è quanto dire, della Ragione di due Ordinate alzate nelle estremità della sotto-tangente; e siccome la Ragione modulare è la medesima in qualsivoglia sistema di Logaritmi, così la Ragione delle due Ordinate piantate nelle estremità delle loro rispettive sotto-tangenti è la medesima in tutte le Curve Logaritmiche, sieno quali esse si vogliano.

Quando vien supposto, che la Curva logaritmica sia descritta, per mezzo della medesima vengono a determinarsi agevolissimamente le quantità esponenti. Poni, che l'Ordinata Aa venga ad essere espressa da A ; poni, che Op sia ad Oa , come qualsivoglia quantità espressa da x è ad 1: allora l'Ordinata Pp può essere espressa da A^x , ch'è una quantità esponente del primo grado, quando x è variabile. Veggasi l'Artic. ESPONENTE, *Ciclopedia*.



Per rettificare la Curva Logaritmica. Poni, che venga ricercato di trovare la lunghezza dell' Arco logaritmico Ea . Tirasi

rai le perpendicolari *EL A*, e *la* all'asintote, ed avendo tirate le tangenti *E F*, *ef*, prenderai *A L* uguale al di più, o sia eccelfo della Tangente sopra la Sotto-tangente *A F*; ed *al* uguale al di più, od eccelfo della tangente *ef* sopra la *af*, allora avendo tirato *L M*, *lm* parallele all'asintote, se la differenza delle Tangenti *E F* — *ef*, venga aggiunta alla differenza delle parallele *L m* — *L M*, l'aggregato verrà ad essere uguale all'Arco *E e*. Veggasi Monsieur *Cotes*, *Harmonia mensurarum*, pag. 23. 24.

LOGARITMO. Nelle Tavole comuni dei Logaritmi noi troviamo il logaritmo corrispondente a qualsivoglia dato Numero dentro i limiti della Tavola, coll'osservare nella medesima: ma riesce similmente di uolo grandissimo l'aver una Tavola, in cui trovino i logaritmi piovati nell'ordine loro naturale, da 1, a 100,000 per esempio, e con i Numeri naturali corrispondenti: di modo che essendo dato un logaritmo, noi possiamo trovare il numero corrispondente; la qual cosa radissimamente volte può ottenersi per mezzo delle Tavole comuni: nè può il numero corrispondente al logaritmo essere similmente trovato, salvo che in quella Tavola, senza briga, e disturbo grande.

Una Tavola di simigliante natura viene appellata dal dottissimo Dottor Wallis un *Canone anti-logaritmo*: e da siffatto Canone essendo dato un logaritmo, può esser trovato il suo numero colla medesima facilità, che per mezzo del Canone comune esser può trovato un logaritmo di un numero dato.

Ci dice il Dottor Wallis, che un Canone di simigliante specie venne formato moltissimi anni sono. Questo adunque fu per avventura principiato da M. Harriot, e da M. Warner non fu egli, che cominciò, certamente egli si fu, che terminollo per lo meno, e che preparollo per la stampa. Sembra, che questo Canone siasi perduto: ma la perdita venne riparata dal valentissimo Monsieur Dodson. Veggasi il *Canone logaritmico* per Monsieur Dodson, Londra 1742. in foglio, ove il profondo Autore fa similmente vedere la costruzione, e l'uso di questa Tavola assai ampiamente.

LOGARITMO immaginario. Vien fatt'uso

di questo pel logaritmo di quantità negative, ed immaginarie (*a*), quale, a cagion d'esempio $a = \sqrt{-a}$, &c. Così similmente i Fluenti di certe flussionarie espressioni immaginarie, quali, a cagion d'esempio, $\frac{x}{x\sqrt{-1}}$, $\frac{ax}{2bx\sqrt{-1}}$ &c, addimandansi, e sono Logaritmi Immaginari. ((*a*) Veggasi *Euler*, *Analysis Infinitor*. Vol. 1. pagg. 72. 74.)

L'espressione $\frac{x}{x\sqrt{-1}}$ rappresenta la Flusione del Logaritmo di *x*; ma niun Logaritmo può rappresentare il Fluente di $\frac{x}{x\sqrt{-1}}$, che perciò viene appellato un Logaritmo Immaginario.

Adunque allora quando occorrono simiglianti Logaritmi Immaginari negli scioglimenti dei Problemi, questi possono essere trasformati in Archi, o Settori circolari; che è quanto dire, il Logaritmo Immaginario, oppure il Settore iperbolico Immaginario, diventa un Settore Circolare reale. Veggasi *Bernoulli*, Tom. 1. pag. 400. e pag. 511. Vegg. *Mac-Laurin*, *Flussioni* Art. 762. & seq. Vegg. *Walmesley*, *Analisi delle Misure* pag. 63.

LOGISTICO. Questa voce logistica vien usata nella Geometria comunemente per esprimere, e significare la sopra esposta Curva logaritmica. La prima volta venne questo termine introdotto dall'egregio Matematico Monsieur Huygens nel suo Trattato intitolato *la Cagione della Gravità*, nel fine del qual Trattato ci somministra il medesimo parecchie assai curiose proprietà di questa Curva logistica, o logaritmica. Veggasi l'antecedente Articolo **LOGARITMICO**.

LOGORO. Tre cose debbono omninamente essere osservate, e considerate prima, che il logoro, o zimbello, sia mostrato, e fatto vedere ad un falcone di nuovo richiamo: la prima si è, che questo sia mansueto, e familiare in compagnia, e che non facciasi paura, o si prenda ombra nè di cani, nè di cavalli: la seconda si è che il falcone sia sommamente affamato, avendo sempre riguardo sì all'ora della mattina che della sera, qualora dee

essere zimbellato: e la terza si è, che fa di mestieri che sia ben netto dentro, e che il logoro sia pieno di cibo da ogni banda; e quando il falcone è sulle mosse, ed è vicino al logoro medesimo il tratto, o lunghezza di un guinzaglio, fa omninamente di mestieri, che il falconiere si asconda. Importa similantemente che non sia incappucciato, e che abbia fatto due o tre bocconate sopra il logoro la prima fiata, che ei siavi posato sopra; e fatto che avrà ciò, il logoro gli dovrà esser levato dinanzi, e dovrà essergli nascondere, quindi dovrà essergli gittar per terra di nuovo ad una data distanza da esso, che ei possa raggiungerlo colla tratta del suo guinzaglio, e tosto che il falcone lo avrà afferrato, il falconiere dovrà allora far' ufo della sua voce, e porgergli in terra per suo cibo una coscia di un pollastro calda.

Dopo di ciò un'altra persona tratto tratto dovrà alzare il falcone medesimo, mentre il falconiere andrà alzando il logoro, affinché il falcone s'ingelosisca, e corra con ansietà a cibarsi. Questo dee esser fatto ora in una maggiore, ora in una minor distanza; e finalmente, allorchè siasi ausato a questa sola faccenda, dovrà in tal caso ciò farsi in compagnia, prendendo cura grandissima, che non si faccia paura di checchessia: ed allorchè sarassi usato a cibarsi nella sopra descritta maniera, dovrà cibarlo a cavallo.

LONICERA. Nel Sistema del Linneo di Botanica è questa la denominazione di un ampio genere di Pianta, abbracciante, secondo questo Scrittore, il Caprifoglio, il Periclimeno, il Chameceraso, e lo Xilostico di Monsieur Tournesfort, e degli altri Botanici; insieme col Triosteospermo ed il Sinforicarpo del Dillenio. Veggansi gli Articoli CAPRIFOGGIO, PERICLIMENO, &c. (*Supplemento*)

I caratteri sono i seguenti. Il calice è un picciolo perianthio piantato nel germoglio, e diviso in cinque segmenti. Il fiore è composto di un semplice petalo, il tubo è bislungo, e gibboso all'inghiù: il lembo è diviso in cinque segmenti, uno dei quali è intaccato più profondamente degli altri quattro, e tutti sono rivoltati all'indietro. Gli stami sono cinque filamenti a foggia di lesina, della lunghezza

a un di presso del fiore: le antere sono bislunghe, il germe è tondeggianto, ed è piantato sotto il ricettacolo: lo stilo è filiforme, e della lunghezza a capello del fiore: e lo stigma è ottusamente in restato. Il frutto è una coccola tondeggiente, umbilicata, contenente due cellette: i semi son tondeggianti, e piatti.

Siccome adunque tutte quelle Pianta convengono in ogni, e cadauno di questi caratteri generali, così elle debbon' esser tutte collocate sotto uno ed un medesimo genere. Veggasi *Linnaei*, Genera Plantarum, pag. 75.

LUCE. Il moto della Luce venne dedotto dalle Osservazioni, che diedi a fare Monsieur Romer (a) sopra un'apparente disuguaglianza nei tempi delle immersioni, od Eclissi dei Satelliti di Giove, o Stelle Medicee: ma questa Conclusione venne attaccata validamente da Monsieur Cassini. L'opinione però di Monsieur Romer trovò nel dottissimo Halley un'affai valente Avvocato; (b) il quale dileguò da parte la difficoltà promossa da Monsieur Cassini, e ricovrò l'opinione di M. Romer, e la sua conclusione a tutta la sua primiera forza. L'anno 1707. Monsieur Maraldi tentò, e studiosi per ogni via per dare una nuova forza agli argomenti di M. Cassini; ma anche questa fiata la Dottrina di M. Romer ebbe la fortuna di trovare nel valentissimo Monsieur Pound un Difensore novello (c).

(a) Veggansi *le Transf. Filosof.* n. 136. *Compend. Lounbop.* vol. 1. pag. 409.

(b) *Transf. Filosof. Comp. Lounbop.* Vol. 1. pagg. 409. 422. (c) *Gravel. Elem. Physic.* n. 2636. *Op. seg.*


La deduzione di Monsieur Romer dalla sua teoria era, che la luce spende intorno ad undici minuti nel passaggio, o transito, che ella fa dal Sole a noi; ma venne quindi concluso da altri, da simiglianti immersioni, od Eclissi dei Satelliti di Giove, che la luce viene ad esser propagata intorno a soli sette minuti. (d)

(d) Vegg. *le Transf. Filosof.* n. 406. *Gravesand, Elem. Physic.* n. 2638.

Un sovrano Astronomo, vale a dire il nostro Dottor Bradley, dalle sue estremamente esatte ed accuratissime Osservazioni, e per una sua ingegnosissima Teoria, ha trovato


vato a un di presso la medesima velocità della Luce, in rapporto ad alcuni apparenti moti nelle stelle fisse. Veggasi l'Articolo STELLA, (Supplemento)

Affine d'intender ciò fa onninamente di mestieri il premettere, che le stelle fisse son corpi luminosi, ed in quiete, in rapporto al nostro Sistema Planetario, dal quale queste trovansi enormemente remote, e dilungate. In questo Sistema somigliantemente la Terra vien considerata non altrimenti che uno dei Pianeti, e muovendosi intorno al Sole.



Supponi il sole rappresentato in S (Figura 1.) e che il Circolo ABCD rappresenti il sentiero della Terra, o sia l'Eclittica. Nel centro S supponi, che venga alzata una linea SP perpendicolare al piano dell'Eclittica, e che questa linea perpendicolare passi per qualsivoglia stella fissa. Se uno Spettatore venisse piantato in S vedrebbe la Stella nella medesima perpendicolare; ma se lo Spettatore passasse sopra il Circolo ABCD, il diametro del quale vien supposto portare una proporzione, benchè picciola, tuttavia sensibile alla distanza della stella, verrebbe ad esser conosciuto, che cambia la sua situazione nel Firmamento. Conosciossiachè uno Spettatore in A vedrebbe la stella nella linea APa; in C ei vedrebbe la stella medesima nella linea CPc; e così in qualsivoglia altro punto di sua progressione. Quindi ne seguita, che la stella sembrerebbe descrivere un circolo nel firmamento rappresentato da abc d.

Se la distanza della stella fosse così enormemente grande, che in rapporto ad essa il diametro dell'Orbita della Terra AC venisse stimato un punto, in tal caso il sopradetto Circolo verrebbe ad essere interamente insensibile: tutte le linee tirate dai punti dell'orbita alla stella passerebbero per perpendicolari al piano dell'Eclittica, e, ed in apparenza verrebbero a corrispondere al medesimo punto nel Firmamento colla perpendicolare in S, nel qual punto la stella sempre comparirebbe, se la sua luce pervenisse a noi in un istante. Ma se in questo caso, ove la stella è tanto dilungata, vien supposto, che la Luce sia propagata dalla stella con una certa velocità, nel tempo medesimo, che la Terra s'avanza nella sua Orbita, la stella verrebbe ad esser veduta in una direzione obliqua al piano dell'Orbita stessa, perchè del moto composto, del moto di luce, ed di quello dello Spettatore.




Suppongasi, che la Luce muovasi nella linea EG (Figura 2.) formando un'angolo colla linea FG, lungo la quale lo Spettatore vien guidato. Questo noi lo concepiremo postato in F. Poni, che la velocità dello spettatore sia alla velocità della Luce, come FG ad EG. Mentre lo Spettatore muovesi lungo FG, la Luce fa lo stesso lungo EG; e la particella di Luce, che trovasi in E, quando lo Spettatore si trova in F penetra soltanto l'occhio di lui, quando egli arriva in G. Ora la direzione della Luce in rapporto all'occhio, viene a formare colla linea FG l'Angolo EFG. Imperciocchè se noi concepiamo la linea FE tirata ed esser condotta insieme coll'occhio di conferma con un moto parallelo, di modo che in rapporto al

al medesimo trovifi in quiete, mentre quello continua a muoversi, la Luce raggiungerà l'occhio nella direzione della detta linea; conciofiachè quando l'occhio si troverà in *f*, punto di mezzo fra *F*, e *G*, la linea trasferita verrà a tagliare *EG* nel suo punto di mezzo *g*, al quale è pervenuta la particella di luce *Ee*, che è similgiamente il punto di mezzo della linea trasferita *fe*. Dove per lo contrario la particella di luce, che trovavasi in *E*, nell'estremità della linea *EF* arrivavi, e penetrerà l'occhio nella direzione e *g*.



Poni, che l'Angolo *EGF* (Figura 3.) sia un'angolo retto, ed *EG* ad *FG*, come la velocità della Luce alla velocità della Terra nella sua Orbita; allora *EFg* farà l'angolo, che il raggio di luce entrante nell'occhio forma col piano, in cui la Terra muovesi intorno al Sole.



Se la Terra trovifi in *B* (Figura 4.) ella muovesi nella direzione della Tangente alla sua Orbita in questo punto; che è quanto dire, se noi supponghiamo lo spettatore nel Sole, la direzione del moto della Terra è parallela ad *SC*; e facendo l'angolo a *SC* uguale all'angolo *EGF* nella prima figura, la linea *Sa* verrà a rappresentare la linea nella quale lo Spettatore vedrebbe la stella.

Nella maniera medesima, alloraquando la Terra trovifi in *D*, lo Spettatore nel Sole vedrà la stella in *Se*, gli angoli *PSe*, e *PSa*, essendo uguali; e la linea *Sa*, ovvero *Se*, per mezzo del suo ravvolgimento intorno a *PS*, verrebbe a descrivere un Cono, la cui base nel Firmamento verrebbe ad essere un Circolo rappresentante l'apparente sentiero della stella per un'anno intero. Poni, che noi ci facciammo a supporre quello Circolo, effe *abcd*, come nell'annessa Figura.

Alloraquando la stella non trovafi nella perpendicolare al piano dell'Eclittica, ma la Linea *PS* (Figura V.) è inclinata a quello piano, le linee, le quali determinano il moto apparente della stella nel Firmamento, verranno a formare dei Coni, come nei casi già appianati, e spiegati: soltanto questi sarebbero obliqui; ed in tutt'e due i casi il sentiero apparente della stella nel firmamento verrebbe ad essere determinato, come sopra; ma in quell'ultimo caso vi verrebbe ad essere un'Ellissi, il massimo diametro della quale sarebbe uguale al diametro del Circolo *abcd* delle prime figure; di modo che conoscendo questa Ellissi, verrebbe agevolissimamente ad esser trovato il Circolo, che descriverebbe la stella, se fosse piantata nella perpendicolare al piano dell'Eclittica.



Il solo modo per determinare, se le stelle descrivano simiglianti Ellissi, è dalle Osservazioni; nel fare le quali incontravisi difficoltà grandissime, le quali perciò il dottissimo, e sommamente prode Mon-

signor

seur Bradley ha con industria inarrivabile formontate.

Nulla può immediatamente essere determinato rispetto al poc' anzi mentovato moto Ellittico. La distanza della stella dal polo del Mondo for' è, che venga misurata in differenti tempi dell'anno; e dalle differenti distanze, dee per via di calcolo essere determinato il moto ellittico, concedendo pel moto del polo medesimo durante lo spazio di tempo fra le Osservazioni; conciossiachè il polo muovesi in un circolo minore un grado del quale vi passa sopra in settanta anni. Monsieur Bradley facendo tutte le necessarie concessioni, fececi ad osservare parecchie stelle in tempi differenti dell'anno, per la qual cosa egli ebbe immediatamente ad scuoprire, che le loro distanze dal polo del mondo variavano: e venne ad esser convinto, che questa variazione non potrebbe essere attribuita a barcollamento del polo: conciossiachè egli si fece ad esaminare due stelle in distanze uguali dal Polo, ma per sì fatta maniera opposte, che l'una non avrebbe potuto scostarsi dal Polo, senza che l'altra si fosse altrettanto approssimata al medesimo, qualora il moto si trovasse nel Polo medesimo. Ma ciò non avvien così in verun conto: conciossiachè il cambiamento di una di queste stelle fosse doppio di quello dell'altra: essendo sempre fatta una dicevole concessione pel moto del Polo, originante dal soprammentovato ravvolgimento. Questo infaticabile Osservatore adunque ebbe ad inferire dalle accuratissime sue Osservazioni, che le stelle in certi dati tempi si dilungano dal Polo del Mondo, ed approssimansi al medesimo con un moto in tutto, e per tutto analogo a quello, che viene ad effettuarsi in una Ellissi; e similgiatamente, che esse stelle muovonsi in tali Curve, per ciascuna delle quali il moto nel medesimo picciolo circolo, come *abcd* (Figura 5.) corrisponde, allora quando le stelle vengono ad essere riferite alla perpendicolare in *S* sul piano dell'Eclittica; ed il diametro di quello minuro circolo per tutt'esse è di 40. $\frac{1}{2}$.

Egli si è piano, ed evidente dalle Osservazioni, a quale delle soprammentovate cagioni noi dobbiamo attribuire il moto della stella. Conciossiachè se avesse

luogo la prima, in tal caso la stella verrebbe ad esser condotta da *aac*, mentre la Terra passerebbe sopra la parte *ABC* della sua Orbita: ma ciò essendo totalmente contrario all'Osservazione, così non può questa essere la vera, e gruuina cagione. Ma siffatto cambiamento nella situazione della stella prende luogo secondo le osservazioni, mentre la Terra descrive la parte *BCD* della sua Orbita, che è appunto ciò, che ricerca la seconda cagione.

Se ambedue le cagioni avesser luogo nel tempo medesimo, l'Arco descritto dalla Terra differirebbe da quello dall'una e dall'altra d'esse indicato, inoltre siffatta concorrenza delle cagioni è contraria alle Osservazioni; seppure non possa peravventura esser pensato ragionevole l'attribuire una picciola influenza alla prima cagione, ma una porzione così estremamente picciola, che nelle Osservazioni non possa essere per modo alcuno conosciuta sensibilmente.

Da tutto questo possono essere dedotte le appresso Conclusioni.

1. Che la sola seconda cagione quivi ha luogo, cioè. Che la distanza delle Stelle è così grande, che il diametro dell'Orbita della Terra non ha proporzione sensibile ad essa.

2. Che l'Angolo *FEG* (Figura 2.) nel Triangolo soprammentovato è 20. $\frac{1}{2}$. e per conseguente, che la Ragione di *EG* ad *FG*, oppure la velocità della Luce alla velocità della Terra nella sua Orbita, è come 10110. ad 1.; quindi ne seguita, che la Luce vien dal Sole a noi in otto minuti, e mezzo.

3. Che la Luce procede colla medesima velocità da tutte le stelle, avvegnachè tutte abbiano l'angolo medesimo *FEG*. Quindi (se noi ci facciamo a supporre, che tutte le stelle non trovinsi ugualmente distanti da noi, siccome provano parecchi argomenti) ne seguirà, che il moto della Luce per ogni dove, ch'ei passi per l'immenso spazio sopra la nostra Atmosfera, sia equabile, od uniforme.

4. Ultimamente for' è che venga considerato, come le differenze sì, e momentaneamente picciole e minute esser non possono rilevate; nè avravvi chi osi negare, che nel misurare un picciolissimo angolo possa essere agevolissimamente commesso un'errore di un minu-

to Secondo, per quanto grande esser possa la cura, che altri prendasi per impedirlo; e perciò, quantunque noi abbiamo detto, che dee essere rigettata la prima cagione, noi non neghiamo però tuttavia, che le stelle possano pervia dell'influenza di quella descrivere un minutissimo, e picciolissimo circolo, il cui diametro sia un minuto secondo, od eziandio alcuna cosuccella di vantaggio. Veggasi *Gravesand, Element. Physic. Mathem. Lib. 2. cap. 1. pag. 708. & seq.*

Quindi egli apparisce, che la successiva propagazione della Luce cagionerà un traviamiento, *aberrationem*, nelle apparenze delle stelle, de' Pianeti, e delle Comete. Poichè il prode Monsieur Bradley ebbe scoperta questa Cagione dell'errore nei Luoghi apparenti delle stelle fisse, Monsieur Clairant, (a) ed altri (b) diedero ad investigare parecchie Regole pel calcolo del divistato traviamiento. Monsieur Euler (c) ci ha di pari ultimamente somministrato una Scrittura intorno a siffatto soggetto.

(a) Veggansi *Memoires Acad. Roy. Science. Paris.* (b) Vegg. *Monsieur Simpton ne'suoi Saggi* (c) Vegg. *Memoir. de l'Acad. de Berlin, Tom. 2. pag. 141. & seq.*

LUCÉ. Luce dai diamanti, e da altri Corpi. Si è la luce in queste ultime età di renduta assai più comune fra noi di quello ella si fosse per innanzi. Hanno i Fosfori Chimici di lunga mano cresciute le sue spezie, moltissimi corpi elettrici sono luminosi, ed altri corpi moltissimi pure vi sono, i quali senz'esser dotati di questa elettrica facoltà sono di pari luminosi.

Gli Antichi naturalisti, e fin dal tempo di quelli parecchi altri Scrittori inepidici varj di tempo, hanno rinvenuto, e sonosi accertati di molte di somiglianti proprietà in corpi moltissimi, tuttochè assai imperfettamente. Si fecero essi ad osservare sì fatte sostanze con soverchia superficialità e con pochissima cura, bene spesso tramodarono nei loro racconti in vergognose esagerazioni, ed assai sovente perder fecero il credito tutto alle loro narrazioni col miscolarle; che si fecero tratto tratto il vero col falso. Il valentissimo Monsieur du Fay, il quale non intendeva, ed impegno sommo occupatosi in

simiglianti inchieste, stenti, e brighè grandissime ebbe ad incontrare nel mettere insieme, ed unire dagli Autori tutti i racconti di sì fatta spezie, e molto più però il valentuomo nel farsi a disgiungere la verità, e la probabilità da ciò, che in questi racconti medesimi degli antichi è manifestamente falso, od assurdo; e ciò da grand'uomo avendo adempiuto, fecesi a presentare alla Reale Accademia delle Scienze di Parigi le sue proprie esperienze intorno ai medesimi, in numero non mezzano.

Fra i corpi luminosi dee il diamante essere riconosciuto, avvegnachè sia oggimai notissimo, che alcuni diamanti lucano all'ombra. Ma a motivo della languidezza di loro splendore, giuoco forza è alla persona, che vuole osservargli, il prenderli l'incomodo di trattenerli fermo all'oscuro il tratto di un buon quarto di ora, innanzi che veder possa la loro luce, affinchè la pupilla dell'occhio possa essere allargata, e dilatata, e per sì fatto modo renduta atta, e valevole a ricevere quantità più copiosa di raggi di luce. Monsieur du Fay ha somigliantemente osservato, come per questo tratto di tempo gli occhi dovrebbero tener chiusi, o per lo meno uno di essi, e che in questo caso la luce del diamante è dopo soltanto veduta da quell'occhio, che è stato chiuso. Prima che il diamante venga portato nella camera oscura, fa di mestieri che sia stato tenuto esposto alla luce del Sole, o per lo meno alla luce aperta del giorno, affinchè possa imbevverli di una quantità sufficiente di raggi; e quello vien da esso eseguito nel brevissimo tratto di un minuto, od anche in meno; avvegnachè sia stato toccato con mano, come otto soli minuti secondi bastano a far sì, che la gemma imbevvasi di tutta quella quantità di luce, cui ella è capace di ricevere; ed allorchè vien condotta nella camera ombrosa, la sua luce persevera in essa pel tratto di dodici in tredici minuti primi, andando però via via a questo mentre succellivamente il languendosi vien maggiormente in guisa appena sensibile. Ella è cosa sommarmente considerabile, come in corpi sì estremamente similari, ed analoghi l'uno all'altro

altro, quali appunto sono i diamanti, alcuni abbiano, e posseggano questa particolare proprietà di imbeverli dei raggi solari, e di risplendere fra le tenebre, e che altri di essi per lo contrario non la posseggano. Di più è stato trovato per via di esperienza, moltissimi diamanti, tuttochè in ogni e qualunque rispetto l'uno all'altro somigliantissimi, uno di essi possedere siffatta proprietà, e l'altro esserne totalmente privo; dove per lo contrario moltissimi di essi diamanti infra loro grandemente differenti, sono stati trovati possedere la proprietà stessa in comune. Sembra non avervi, non solamente alcuna regola, ma nemmeno le menomissime tracce di alcuna regola la più imperfetta per giudicare, quali diamanti posseggano, e quali non posseggano siffatta proprietà, nulla affatto a ciò contribuendo, nè la loro lucentezza brillantissima, nè la loro purezza, nè la loro grossezza, nè la loro forma, o figura; e tutto ciò, che è stato finora scoperto della più perfetta regolarità infra essi, si è, che tutti i diamanti gialli posseggono la divisata proprietà. Questo potrebbe peravventura provenire dal trovarsi nella loro composizione; porzione più abbondevole di zolfo, e che perciò s'illumina più perfettamente, ed agevolmente, oppure mandin fuori una fiammella più appariscente, e visibile.

L'incendio, o fuoco dei diamanti è un termine usato fra gioiellieri per porgli in un violentissimo fuoco; siccome essi frequentemente far sogliono, quando sono macchiati, o sporcati di scuro, di giallo, o somigliante. Questo fuoco gli spoglia sempre del lor colore, senza intaccargli, o pregiudicargli di un menomo che. Monsieur du Fay essendo stato informato di siffatta pratica comune presso di questi operai, ebbe a formare congettura, che la differenza dei diamanti nel loro risplendere all'oscuro, o nel non risplendervi, fosse dovuta a questo; e che tutti quei diamanti, che lucono fra le tenebre fossero quei che non fossero stati messi nel fuoco, o viceversa. Ma ebbe quel valentuomo a toccar con mano, come la sua congettura era falsa; conciossiachè due diamanti, uno luminoso fra le

Supp. Tom. III.

tenebre, l'altro non tale, furono tutt'e due posti nella sopraddata maniera nel fuoco, e dopo di ciò venne trovato, come non erano rimasti quindi di un menomo che alterati, e che possedevano le proprietà medesime di prima. Non è già la sola luce del Sole, od il lume aperto del giorno quello, che somministra a questi diamanti la proprietà di risplendere fra le tenebre, avvegnachè ricevanla eziandio s'è vengano posti sotto un cristallo, o s'è sieno tuffati entro l'acqua, o nel latte.

Dieffi l'ingegnossimo Monsieur du Fay a sperimentare se gli potesse venir fatto, che il diamante ritenesse imprigionata dentro di sé la luce per più lungo tratto di tempo di quello, in che da essi involasi naturalmente con tanta speditezza; e trovò, che, se il diamante, dopo essere stato tenuto esposto alla luce, venisse coperto con della cera negra, verrebbe a risplendere fra le tenebre pel tratto di sei buone ore dopo l'essere stato imprugnato dei raggi della luce medesima. Veggansi *Memoires Acad. Roy. Scienc. Paris.* ann. 1735.

L'imbevimento della luce, nella maniera divisata essendo una proprietà così delicata, che non trovasi posseduta da parecchi diamanti, non dovrà percidesser supposto, che ella possa trovarsi in qualsivoglia altra pietra preziosa: conciossiachè per le coerenti esperienze nè il rubino, nè lo zaffiro, nè il topazio posseggono nemmeno per ombra; e fra un'ampissimo numero di smeraldi grezzi venne trovato possederla uno solo. Tanta si è la strana incertezza di somiglianti accidenti.

Vennero poste a cimento tutte le altre pietre meno preziose, e venne trovato, come niuna di esse possedeva questa facilità di imbeverli nè della luce del Sole, nè del lume di giorno pieno ed aperto; ma bensì tutt'esse si fecero luminose per via di varj mezzi di riscaldarle, o di fregarle; con questa diversità, che alcune di esse vennero ad acquistare la divisata proprietà per via di uno di questi due metodi, ed altre per l'altro, cadauna di esse non venendo ad essere punto alterata da quel metodo, che valevole era di al-

LI

terar

terar l'altra, vale a dire, di parteciparle la divisa proprietà di risplendere fra le tenebre. Il diamante per lo contrario acquista la proprietà di risplender fra l'ombra per tutti i finora descritti metodi. Ibidem.

LUDUS. *Ludus Helmontii.* Nell'Istoria naturale così addimandasi un Fossile opaco di una grossezza e configurazione eterna irregolare, ma di una lommamente regolare, e singolarissima struttura interna. Egli è quello di una tinta, o colore terrigno, e sempre, e costantemente diviso in masse separate, da un numero di vene di colori differenti, e di una materia più pura di tutto il rimanente della massa. Queste masse, nelle quali il Fossile vien diviso, sono alcune volte picciole, e di una figura efatissimamente regolare; ed in tal caso vengono dette *ludi*, *talì*, cioè dadi; ma con frequenza maggiore vengon trovati in grossezze, e configurazioni di niuna stabile forma regolare. Hannovi altri di questi Fossili incrostati, oppure composti di incamiciature parecchie, l'una disposta, e diacente sopra l'altra intorno un nucleo centrale. In questi le *Septa*, o dire le vogliamo, le vene dividenti, sono estremamente sottili, e finissime; negli altri per lo contrario sono più fatticce, e più grossolane.

Quelle vene pertanto sono la parte di questi Fossili, della quale vien fatto uso nella medicina, e vengono con riuscita grande prescritte nelle affezioni nefritiche. La dose di questo particolarissimo Medicamento è da uno scrupolo ad una dramma.

LUMINOSO. Sono stati oggimai bene osservati gli sgorgamenti, od emanazioni luminose ulcenti fuori non meno dai corpi umani, che da quelli degli animali bruti.

La luce uscente fuori da un cavallo nello strigliarlo, o da un gatto in istropicciandolo sul dorso è un fenomeno lommamente noto. Abbiamo simigliantissimi esempi senza contrasto verificati nel pettinar la testa di una femmina. Il Bartolini (a) ci somministra un'istoria, cui egli intitola: *Mulier Splendens*, di una Dama Italiana, il cui corpo mandava fuori la luce, e realmente risplendeva,

qualora fosse leggerissimamente stropicciato con un pezzo di tela di lino. Questi effluvi dei corpi degli animali posseggono parecchie proprietà in comune con quelli prodotti dal vetro, come appunto il loro esser lucidi, il loro scoppiettare, ed il loro non essere eccitati, senza alcun grado di fregamento, o stropicciamento; al che può essere aggiunta a buona equità l'Elettricità, come è stato appunto trovato elettrico all'estremo grado il dorso di un gatto posto alla prova della macchina (b).

(a) *Comt. 3. Hist. 70.* (b) *Veggansi le Trasazioni Filosof. n. 476. pag. 444. C' seq. Veggasi l'Articolo ELETTRICITÀ' (Appendice)*

I corpi umani non solamente compariscono luminosi, ma eziandio le elazioni da essi uscenti, ed attaccate alle loro camicie, e vestimenti, verranno di pari a cagionare, che questi risplendano. Veggansi le *Trans. Filosof.* loco citato, &c. pag. 477.

LUNA. Convengono universalmente i Filosofi, e gli Astronomi tutti, che la Luna sia il suo giro intorno alla Terra: ma il Padre Alessandro alzando la testa contro tutti, fallì a supporre, che sia ciò il prendere una cosa per un'altra, che tutti sienosi ingannati, e che la Terra veramente, e realmente muovasi, e si raggiri intorno alla Luna; e da Ipotesi tanto straordinaria si studia, e s'arrabatta per ispiegare il flusso, ed il riflusso del mare. Veggasi *Journal des Scav. October 1727.*

Monsieur Grand-jean de Fouchy s'ingegna di provare, non avervi materia intorno alla Luna, la quale sia valevole ad inflettere sensibilmente i raggi della luce. E quindi, che quello Pianeta secondario non ha atmosfera, la cui rifrazione sia osservabile. Ella potrebbe, a vero dire, avere un fluido intorno intorno circondantela, la orizzontale refrazione del quale montasse ad 1° od a 2°, nè mancanvi alcune osservazioni, le quali sembrerebbe, che luministrassero qualche ombra di traccia per ammettere alcuna cosa di spezie somigliante. Ma in rapporto agli Astronomi può dirsi, che la Luna è priva di Atmosfera. Veggansi on-

nina-

minamente le *Transf. Filosof.* n. 455, Sezione 3.

Noi abbiamo alcune osservazioni non meno, che certe Tavole riguardanti il moto della Luna, fatte da Monsieur Riccardo Dunthorn nelle nostre *Traslazioni Filosofiche* sotto il numero 482. alla sezione decimaterza, ove questo Valentuomo ci somministra un centinaio di Longitudini osservate della Luna, comparate colle Tavole, vale a dire, venticinque Eclissi della Luna, prese (a riserva della sola prima) dalla libreria celeste di Monsieur Flamsteed, dalle *Traslazioni* nostre *Filosofiche*, e dalle *Memorie della Reale Accademia delle Scienze di Parigi*: le due grandi Eclissi del Sole degli anni 1706, e 1715; ventidue luoghi scelti della Luna, computati dalle Osservazioni Flamsteediane pel famoso Halley, e pubblicate nella prima edizione del pur'ora citato Trattato intitolato " *Historia Caelit.* "

Nelle nostre *Traslazioni Filosofiche* sotto il numero 473. noi troviamo un nuovo metodo di calcolare gli appulsi della Luna alle stelle fisse, ed ai Pianeti; come similmente delle Eclissi della Terra, appellate comunemente Eclissi del Sole, composto dal dottissimo Monsieur Gersten Professore delle Matematiche in Gießen.

La Luna piena comparisce all'occhio nudo più ampia d'un oggetto circolare sottendente un'angolo uguale veduto da un'occhio perfetto. In una Luna di soli tre, o quattro giorni, la parte illuminata comparisce soverchio ampia in proporzione alla parte oscura, e similmente sembra che tendasi più all'intuori, o che abbia un diametro maggiore della parte oscura. Similmente in una Eclissi del Sole, o della Luna, la parte luminosa comparisce soverchio ampia in proporzione alla parte tenebrosa, e l'Eclissi comparisce minore di quello ella si è realmente.

Simigliante osservazione venne fatta da Monsieur Horrox, e vien riferita dal Dottor Jurin nel suo Saggio sopra la visione distinta, e la visione indistinta.

Il piano, od eclittica della Luna è concavo verso il Sole per ogni, e qualunque verso.

Negli altri pianeti secondari, quella parte del piano di quei Satelliti, che è vicinissima al Sole, è convessa verso il Sole medesimo, ed il rimanente è concavo. E noi assai sovente troviamo nei Trattati Elementari d'Astronomia, il piano della Luna rappresentato nella maniera medesima, vale a dire, parte convesso, e parte concavo verso il Sole; e questo si chiama realmente l'insegnare una cosa per un'altra, così non essendo. Conciossiachè dee essere osservato, in generale, che la forza, la quale piega il corpo dei Satelliti in una curva, oppure, che gli fa nel corso loro descrivere una curva, allorchè il moto vien riferito ad un piano immobile, è nella congiunzione la differenza di sua gravità verso il Sole, e di sua gravità verso il Primario. Alloraquando il primo viene a prevalere sopra l'ultimo, la forza, la quale piega il corpo del Satellite, tende alla volta del Sole; e per conseguente la concavità del piano è verso il Sole; e questo avviene a capello nella Luna. Allorchè la gravità verso il Primario soverchia, od eccede, o trascende la gravità verso il Sole, nella congiunzione, allora la forza, che piega il corpo del Satellite, tende verso il Primario, e per conseguente verso la parte opposta, od opposizione del Sole medesimo: per conseguente il piano è ivi convesso verso il Sole; e questo avviene a capello dei Satelliti di Giove, o Stelle Medicee. Allorchè queste due forze sono uguali, ha il piano, nella congiunzione, ciò, che dai Matematici addimandasi Punto di Rettitudine; nel qual caso perciò il piano viene ad esser concavo verso il Sole per ogni, e qualunque verso.

Essendo stato trovato, che la gravità della Luna verso il Sole è maggiore nella sua congiunzione, che la sua gravità verso la Terra, di modo che il Punto di uguale Attrazione, ove quelle due forze sostenessero l'una l'altra, verrebbero a cadere fra la Luna, e la Terra, sonosi quindi certuni (a) fatti a dubitare, che, o la Parallassi del Sole sia sommamente diversa, e tutt'altra da quella, che viene assegnata dagli Astronomi, o che bisognerebbe che la luna abbandonasse di necessità la Terra. Ma questa apprensione

age volissimamente esser può deleguata col solo fare attenzione a ciò, che è stato mostrato dal grande Isacco Newton, e che è stato poscia illustrato da volgari esperienze riguardanti i moti dei corpi dell'uno intorno all'altro, che sono tutti mossi da una terza forza nella medesima direzione. I loro moti relativi non essendo di un menomo che frattornati da questa terza forza, se ella agisca ugualmente sopra essi in linee parallele: non altrimenti che il moto relativo delle navi in una Flotta condotta via da una corrente, non è in conto veruno disturbato da essa, qualora egli agisca sopra esse navi ugualmente; oppure come la rotazione di una palla, o bomba intorno al suo asse, mentre ella viene scagliata nell'aria; oppure la figura di una gocciola di cadente pioggia, non vengono ad essere in conto veruno forzate dalla gravità delle particelle, delle quali esse sono composte, verso la Terra. Questo dipende dalla disuguaglianza dell'azione del Sole sopra la Terra, e sopra la Luna, e dalla mancanza del Parallelismo nelle direzioni delle divise azioni. A ciò noi dobbiamo, e non ad altro, attribuire soltanto le irregolarità nel moto della luna.

(a) *L'ingegnossissimo Monsieur Baxter, Autore del Matho, o sia Cosmotheoria Puerilis.*

Ma potrà di pari contribuir grandemente al deleguamento di siffatta difficoltà l'osservare, che se la velocità assoluta della Luna nella congiunzione fosse minore di quella, che ricercasi per condurre un corpo ivi in un circolo intorno il Sole, supponendo, che questo corpo venisse mosso dalla forza medesima, che ivi agisce sopra la Luna (vale a dire, per l'eccesso di sua gravità verso il Sole, sopra la sua gravità verso la Terra) in tal caso, a vero dire, la Luna verrebbe ad abbandonare la Terra. Conciosiachè avendo la Luna in questo caso minore velocità di quella, che sarebbe necessaria per impedire, che discendesse dentro questo circolo, ella verrebbe ad approssimarsi al Sole, ed a dilungarsi dalla Terra. Ma tuttocchè la velocità assoluta della Luna nella congiunzione sia minore della velocità della Terra nell'Orbita annua; ciò non ostante la sua

gravità alla volta del Sole viene ad essere altrettanto diminuita dalla sua gravità alla volta della Terra, di modo che la sua velocità assoluta seguita ad essere grandemente superiore a quella, che ricercasi per condurre un corpo in un circolo, ivi, intorno al Sole, e vieni sopra mosso, e portato dalla sola, e semplice forza rimanente. Per la qual cosa dal momento della coaggiunzione la Luna viene ad esser condotta senza un tal circolo, dilungandosi continuamente dal Sole in distanze sempre maggiori, fino a tanto, che viene a giungere nella opposizione, ove essendosi mossa, e portata dalla somma di queste due gravità, e la sua velocità essendo in tal caso minore di quello si richiederebbe per condurre un corpo in un circolo, che è ivi intorno al Sole mosso da una forza uguale a questa somma, quindi la Luna comincia novellamente ad approssimarsi al Sole medesimo. Così, ella dilungasi dal Sole, ed approssimasi al medesimo a volte a volte, ed in ciaschedun mese il piano, od eclittica della Luna ha due *Apsidi*, un *Perielio* nella congiunzione, ed un *Afelio* nella opposizione, fra quali ella viene ad essere sempre, e costantemente condotta in una maniera similare, ed analoga a quella, in cui i Pianeti primari risolvon si fra i loro *Apsidi*. Il Pianeta dilungasi dal Sole nel *Perielio*, perchè ivi la sua velocità è maggiore di quella, colla quale verrebbe ad essere descritto un circolo intorno al Sole nella distanza medesima dalla medesima forza centripeta; ed avvicinali verso il Sole dall'*Afelio*, perchè la sua velocità ivi è minore di quello si richiede per condurlo in un circolo, nella distanza intorno al Sole. Veggasi *Mar. Laurin*, Istoria, o piano del Dittorio Filologico d'Isacco Newton, lib. 4. cap. 4.

LUOGO. Luogo, *locus* presso gli Antichi Mulici veniva usato per significare l'intervallo fra la corda acuta, o grave di un suono, e di un altro, o di una voce, e di un'altra. Usarono i Greci la voce *μῆτρος* nel senso medesimo, per lo spazio, per cui la voce muovevasi. Veggasi *Wallis Appendix*, ad Harmon. Ptolem. pag. 152. *Aristoxenus*, pagg. 3. 8. 9. e 10. Edit. Meibem. Veggasi di pari l'Artic. MOTO.

Que-

Questo moto distinguevano i Greci in due specie, uoo continuato, *συνεχες*, l'altro disgiunto *διασπαστος*. Gli esempi della prima specie sono in parlando; della seconda in cantando; e questo addimandarono essi l'moto di melodia, o pure quello che era adattato al Canto. Tolomeo nella guisa medesima s'assi a dividere i suoni d'altezza disuguale *ἁποδιδιχαστος*, in continui, ed in discreti, ed asserisce, che i primi sono improvvisi per l'armonia, e propri i secondi.

Da Aristide Quintiliano (α) venne interposta una terza specie di moto fra questi due quivi mentovati, quale sarebbe, a cagion d'esempio, quello di una persona, che recitasse un poetico componimento.

(α) Vegg. *Id. pag. 6. Edit. Meibom.*

LUPO. Il Lupo, *Lupus* nella Zoologia è una fiera pradicatrice, ma della specie interamente dei Cani mastini, ed è il più grosso animale non meo che il più feroce degli altri di quella razza di bruti. Quanto alla configurazione del suo corpo è il Lupo perfettamente simile ai mastini domestici, e se la sua testa non fosse alcuo poco differente rispetto alla figura, chicchessia, in veggendolo, lo battezzerebbe per uno de' nostri mastini domestici. Intorno alla faccia egli ha una ferocissima guardatura: i suoi occhi sono infiammati, abbaglianti, e sommamente truci; ed i suoi denti di pari, che l'apertura della sua bocca, son fieri, e spaventevoli. I buoni Antichi portarono opinione, che il collo del Lupo fosse tutto di un osso folido, o tutto di un pezzo; ma per lo contrario questo fiero animale volge a rivolger per ogni lato il suo collo con una svel-

tezza, ed agevolezza migliore di quello facciasi un Can mastino. Vegg. Ray, Syn. Quad. pag. 171.

Il Lupo non altramente che tutte le altre belve predatrici, può rimanersi a digiuno per tratto lunghissimo di tempo, tuttochè sia sommamente vorace, allorchè s'imbatta nel cibo.

Differisce il Lupo dal Cane nella sua voce, od urlo, avvegnachè in vece dell'abbajamento del cane, questo animale urla. Le sue orecchie, che rimangono perpetuamente ritte innalzate, e la sua coda cel-pughiola fanno che assomigli di pari grandemente ad una Volpe.

LUSTRAZIONE. La maniera, onde i Macedoni purificavano i loro Esercizi per via di Lustrazione, era la seguente:

Nel tempo dei loro festivi *Xantica*, facevanli i Macedoni dividere in due metà, o parti uguali una Cagna, una delle quali metà insieme colle interiora, veniva piantata a mano destra, l'altra metà dalla sinistra: fra queste due metà della divisa Cagna l'Esercito marciava coll'appreso ordine: Dopo che le Armi dei Re Macedonici preso avevano la prima linea dell'Esercito, che era composta di Cavalleria, queste venivano seguitate dal Re, e dai Figlioli di quello: quindi ne venivano le Guardie del Corpo, e poscia seguiva loro tutto il restante dell'Armata. Ciò fatto l'Armata medesima veniva divisa in due parti; una delle quali fendosi posta sull'armi, ed in atto di combattere di contro l'altra, seguivavi un corto badalucco, o scaramuccia, imitante una specie di vera battaglia. Veggasi *Potter*, *Archzol. Græcor. Lib. 2. cap. 20. Tom. 1. p. 417.*

MAC

MAC

MACCHINA. Le macchine semplici, o sieno forze meccaniche, secondo la loro varia struttura, servono per effetti, ed imprese differenti; ed appartenenti al prode, sperimentato, ed avveduto Meccanico lo sceglierle, od il combinarle in quella data maniera, che riuscir possano meglio adattate, ed acconce a produrre il ricercato effetto, per via della forza, cui egli s'avvisa che queste debbano possedere, e ciò anche colla spesa la minore, che sia possibile. Le leve esser possono impiegate ad alzar pesi per lieve, e picciolo tratto, seppure non venga mossa la stessa macchina, od ordigno; come, a cagion d' esempio, per alzar delle pietre fuori dei loro letti nelle Cave. Ma l'asse e la ruota servie possono ad alzare dei pesi da grandissime profondità, ed altezze. Le carrucole venendo condotte, e maneggiate con agevolezza, perciò vengono grandemente impiegate nei bastimenti. Il conio si cende eccellente per separare le parti dei corpi; e la vite, per ferrarle, e combagnarle strettamente, e validamente insieme; e la sua grandissima frizione rendesi alcuna fiata d'uso per mantener l'effetto da essa già prodotto. La forza, ed energia della macchina, e delle parti di quella, forz'è che sia proporzionata agli effetti, che debbon' essere dalla macchina stessa prodotti. Così, allora quando il centro di moto è piantato fra la forza, ed il peso, forz'è che sostenga la somma dei loro urti: per la qual cosa non dovrebbe esser messa in opera una picciola bilancia per pesare pesi grandi; avvegnachè questi disordinino, e scompongano la sua struttura, e rendanla disacconca a produrre questo effetto con accuratezza. Simigliantemente le macchine grandi non sono al caso, nè atte per produrre de' piccioli effetti. Dobbiamo essere avvertiti, come abbiamo un piano sommamente esatto di tutte queste cose, messe insieme da un Meccanico il più esatto, ed

accurato, che immaginar mai si possa.

Da queste macchine semplici, pe' mezzo di varie combinazioni vengono ad esser formate delle macchine composte, che servono per usi ed effetti di genere vario; ed in tutt'esse hanno luogo, e dominano le Leggi generali; e massimamente questa, vale a dire, che la forza, ed il peso sostentansi a vicenda l'un l'altro allora, quando trovansi in proporzione inversa delle velocità, che avrebbero in direzioni, entro alle quali agissero, qualora venissero poste in moto.

Ma in pratica la frizione delle macchine esser dee considerata senza badare a ciò, che assai sovente noi troveremo in perdita. Veggasi l'Articolo FRIZIONE (*Appendice*).

Le descrizioni estremamente accurate delle Macchine, come anche dei momenti di loro forze sarebbe una sommamente curiosa opera ed insieme utilissima. Ma pe' farce una Raccolta di siffatta natura più vantaggiosa, che possibile mai fosse, questa contenee dovrebbe, oltre le descrizioni d'esse macchine, un'accurata Analisi delle medesime: accennando i vantaggi, e gli svantaggi di quelle; le ragioni delle rispettive loro fabbriche; ed i problemi generali impiegati in queste fabbriche medesime, colle loro soluzioni; in corto, ma chiaro, esatto, e sommamente giusto compendio. Niuna, a vero dire, delle cose puote divise e stata fatta finora in una maniera compiuta, e che possa veramente appagare, in qualsivoglia di quei Trattati, che sono usciti sopra tal soggetto alla luce fino a di nostri. Nulladimeno però assai curiose cose particolari esser possono raccolte, e messe insieme dallo Srrada, dal Besson, dal Beroaldi, da Agostino de Ramellis, dal Bocklero, dal Leupold, dal Beyer, dal Limpergh, dal Van-Zyl, da Monsieur Perault, e da altri parecchi, una breve istoria delle Opere dei quali leggesi nel Commenta-

rio del Wolfso nella sua Opera intitolata: "De principis scriptis Mathematicis." Veggasi Element. Mathes. Univerf. Tom. V. pagg. 84. 85. & seq.

A quelli conviene omninamente aggiungere l'Architettura Idraulica di Monsieur Belidor; e come anche il corso di Filosofia Sperimentale del Dottor Desaguliers. La Reale Accademia delle Scienze di Parigi ci ha similamente somministrato una Raccolta di Macchine e di Invenzioni da essa approvate. Quest'Opera pubblicata da Monsieur Gallon, comprende sei Volumi in quarto, contenenti i disegni d'esse macchine colle rispettive lor descrizioni ivi sottoposte. Con tutto questo però desiderasi pur anche dal dotto Mondo una compiuta Instituzione delle Macchine pratiche. Veggasi l'Articolo MECCANICHE, (Appendice.)

MACCHINA di Marly. Questa particolarissima Macchina venne inventata, e composta da un Meccanico comune di Liegi, e contiene, a vero dir, un numero grandissimo di ordigni veramente eccellenti: ma con tutta questa sua rara eccellenza, questa macchina non viene ad alzare la quantità tutta dell'acqua, che alzar potrebbe, e ciò appunto perchè il suo fabbricatore non conosceva, come ci potesse dare al Fiume Senna tutti quei vantaggi, de' quali era capace.

Quindi apparisce l'indispensabile necessità, in cui è un meccanico di essere perfetto possessore delle matematiche; oppure quanto sarebbe necessario, che gli stessi matematici di professione s'applicassero allo studio delle Meccaniche assai più di quello di ordinario si facciano, senza aver paura di avvilirsi, sendo le meccaniche, vogliano, o non vogliano, cibo loro, nè li facessero a credere di perdere un menomochè di lor dignità, per cui menano così gran boria, col somministrare le opportune giunte direzioni agli Operaj. Veggasi omninamente Monsieur Desaguliers, Filosofi. Speriment. Vol. II. dalla pag. 442. alla pag. 449.

Secondo il calcolo di Daniello Bernoulli l'effetto della macchina di Marly tantodecantata non oltrepassa $\frac{1}{2}$ della sua forza assoluta; che è quanto dire, che havvi una perdita di $\frac{1}{2}$ di questa forza. Veggasi

Dan. Bernoulli Hydrodynam. pag. 182.

MACCHINE per alzar l'acqua. Veggasi l'Articolo ALZAR l'acqua. (Appendice.)

MACCHINA da fuoco. E' quello il nome di una macchina per alzar l'acqua a forza di fuoco, oppure per la forza dell'acqua, voltata in vapori.

Il primo, che diè una specie di traccia, o fumata della possibilità di una tal macchina, si fu il Marchese di Worcester nella sua Centuria di Trovati, od Invenzioni, stampata in Londra l'anno 1663. Il famoso Capitano Savery prese il modello da esso, e ridusse la macchina alla pratica. La Macchina di questo prode capitano viene accuratamente descritta nel Lexicon Technicum di Monsieur Harris sotto il Capitolo *Engine macchina*. Ulteriori miglioramenti furono poi fatti dai Signori Newcomen, e Cawley, che la ridussero a quella perfetta forma, in cui di presente viene comunemente messa in pratica.

La forza movente in questa macchina è l'espansione dell'acqua in vapori; e questa forza medesima viene alzata dal fuoco, dal quale la macchina prende il suo nome *Fire-engine*, macchina a fuoco, o da fuoco.

Non è in conto veruno riuscibile il somministrare in pochi tratti, e senza le sottoposte figure alcuna dievole, ed adeguata idea di questa sommaramente Filosofica utilissima macchina, vale a dire della maravigliosa fabbrica di quella. Il valentissimo Dottor Desaguliers ce ne ha fatta una piccolissima, ed diligentissima descrizione nel suo corso di Filosofia Sperimentale, e siccome noi ci facciamo a buona equità a supporre, che niuno di coloro, i quali son vaghi delle meccaniche, e che bramano di avanzarsi nelle medesime, non sia provveduto di un libro ad esser tanto necessario, così noi ci contenteremo di rimettere i nostri lettori vaghi di tali materie al secondo Volume dell'utilissima divisa Opera di questo Valentuomo dalla pagina 465. alla pag. 490.

Questa macchina lavorando a forza dei vapori, nei quali alzasi l'acqua, poichè ella bolle, sembrerebbe, che le se addirebbe più la denominazione di macchina *vaporosa steam-engine*, che quella di macchina

china a fuoco, o da fuoco, avvegnachè così vengano denominate con ispezial proprietà piuttosto quelle tali macchine, che son fatte per estinguer gli incendi.

Vien considerato, e preso per un difetto in questa macchina vaporosa, o a fuoco, che il vaso, in cui l'acqua vien mantenuta bollente perpetuamente, sia così ampio, quando una sola parte non gran fatto considerabile dell'acqua vien messa quivi in opera. Monsier Blakes pertanto li è studiato di regolar la giusta, ed adeguata proporzione fra l'altezza, e la base del vaso cilindrico impiegato in questa macchina; ed egli ha toccato con mano, come più ampio, o largo, che siasi il Cilindro, tanto migliore riesce pel divisato effetto. Veggansi perciò le *Transf. Filosof.* Volume XLVII. pag. 197. 198.

Questa macchina per alzar l'acqua a forza di vapori pare, che sia stata migliorata non poco da Monsiur de Moura, che è un Gentiluomo Portoghese, il quale per via di una ingegnositissima fabbrica ha renduta la macchina capace di lavorar per se sola. Vegg. *Transf. Filosof.* Vol. XLVII. pag. 436. 437.

Rispetto poi alle Macchine per estinguer il fuoco, sembra che quelle di Monsiur Newsham sienosi meritate l'approvazione universale. Per un'esatto piano della lor fabbrica potrai vedere il corso di *Filosofia Sperimentale del Desaguliers*, Vol. II. pag. 505. 506.

MACELLARI denti. I Denti macellari, *dentes molares*, sono venti di numero, cinque di essi trovandosi piantati in cadaun lato di ambe le mascelle immediatamente dopo i denti canini, od occhiali. I due primi di cadaun ordine, o filare sono piccioli, gli altri due a questi vicini, sono più grossi, siccome si è similmente il quinto o sia l'ultimo, che è il tezzajo, od ultimo a spuntare, e bene spesso manca interamente. I denti macellari, secondo la divisata varietà rispetto al a loro grossezza, sono stati distinti in denti macellari piccioli, in macellari grossi, ed in denti della sapienza, *dentes sapientia*, così appunto denominati, perchè rade volte sogliono spuntare alle persone, prima che queste sien giunte agli anni della discrezione.

I corpi dei denti macellari sono generalmente assai fissi, corti, ed irregolarmente cilindrici, o piuttosto con quattro lati alcun poco tondeggianti, e terminati da un' estremità larga, e dilatata, ripiena più o meno di ottuse punte, tagliate in qualche proporzione alla foggia de' diamanti. La denominazione di *Corona* viene similmente data alcune volte ai corpi di questi denti macellari, e ciò da certa specie di somiglianza, che vien supposto, che abbiano alla corona. Nei due macellari piccioli la corona è minore di quello sialo negli altri, ed è bene spesso non così grossa, come i corpi dei denti canini: questi hanno di ordinario due sole punte. Nei due macellari più grossi la corona prende un'estensione molto maggiore, e le sue punte sono tre, quattro, od anche cinque di numero. Il quinto dente macellare, o sia dente della sapienza, ha comunemente una corona assai somigliante per lo più a quella dei due primi macellari, ma di ordinario più tondeggiata, e con minori punte. Le radici dei denti macellari son lunghe e più, o meno piate, in alcuni di essi denti queste radici son semplici, in altri son due, in alcuni tre, o quattro, ed alcuna fiata, sebben rado ciò accade, queste barbe, o radici son cinque. alcuna fiata tutte queste radici son distinte, alcun' altra sono totalmente unite l'una all'altra, e talora trovansi unite soltanto in parte. Sono queste ordinariamente diritte, e piantate l'una dall'altra ad una tal distanza, che è maggiore nelle loro estremità, che nella corona stessa del dente. Le barbe dei piccioli macellari compariscono assai sovente semplici, e sole, tuttochè tali realmente non sieno; conciossiachè in esaminandole strettamente, vien trovato avervi due radici unite, e saldate insieme; ed alcuna fiata tutta la distinzione, che vi comparisce, si è nel loro avere due punte separate.

I macellari più grossi hanno comunemente parecchie radici, il primo tre, ed il secondo quattro: oppure alcune volte il primo ne ha quattro, e cinque il secondo: quelli numeri però non sono costanti, ma bensì variabili. Le radici trovansi, e veggiamvi alcune volte tutte per-

fer-

setteamente distinte, ed alcune altre veggionfi in parte sfaccate e distinte, ed in parte unite, e congiunte nel dente medesimo in gradi differenzi; ed in alcuni soggetti, una, od anche più delle loro punte veggionfi piegate all'insuori, all'indietro, oppure in altre direzioni; e non accade sempre, che più radici incontrinsi insieme più nei denti superiori, che nei denti inferiori. Il primo dente macellajo non ha bene spesso, che una sola radice, e questa è ancora alcune volte cortissima, ed alcune volte per lo contrario considerabilmente lunga. Ella è cosa comunissima l'imbarbarli in questo dente assai coperto e come sepolto presso che totalmente entro la sua gengiva nelle persone ben' avanzate, ed in quelli tali casi, non vedevansi per questo dente medesimo, che una picciolissima apertura. In tutti i denti macellari in vicinanza del collareto, le radici, sienosi quante essere si vogliano, incontransi, e vanno a congiungere, ed unire in un solo corpo. Veggasi *Winslow*, *Anatomia*, pag. 43.

MACROCEFALO. I macrocefali, o dalle lunghe teste è una appellazione assai particolare data ad una certa popolazione, la quale, secondo che ce ne hanno scritto gli Autori, era famosa per la sproporzione, e disdicevolezza delle teste dei suoi individui: malgrado ciò eransi coloro per sì fatto modo accostumati a questo, che in vece di riputarla, e considerarla non altrimenti, che una deformità ed era veracemente graditissima, essi tenevanla, e prezzavano non altrimenti che una bellezza; e subito che i loro figliolini erano usciti dal ventre della madre, andavano impastando, e formando le loro testoline in guisa, che quelle venissero più lunghe, che mai si potessero, e dopo di questo primo bellissimo lavoro, andavano legando le teste medesime, e fasciandole con sì fatte bende, e nastri strettissimamente, affinchè crescer potessero, ed indurirsi così per lo lungo.

MACULA. Presso gli Scrittori delle cose mediche viene usata questa latina voce *Macula*, macchia, per esprimere qualsivoglia specie di macchie, tacche, efflorescenze, e simiglianti sopra la cute, e

Suppl. Tomo III

questa con i epiteti, od aggiunti differenzi. Così *Macula pestilentialis*, a cagion di esempio, intendonsi quelle macchie, od efflorescenze, le quali compariscono, e fioriscono sopra la pelle nei morbi pestilenziali. *Macula hepatica*, macchie fegatoe, sono certe macchie di un color rosso brunnico, appunto come il fegato, comparenti sopra la cute in moltissimi luoghi, e ciò a motivo di una efflorescenza del sangue accompagnata da una specie di coagulo. *Macula volatica*, macchie erranti, o dir le vogliamo macchie dileguantisi per se stesse, e queste sono comunissime nei bambolini di fresco nati, che sannosi vedere, e fioriscono in molte parti dei loro corpicciuoli, e con grandissima prontezza scompaiono, e dileguansi di bel nuovo. *Macula matris*, sono quelle macchie, o nei, che veggionsi nei bambini, appellate dai medici *Nevi*, che i Toscani dicono voglie, e che nascono nei figlioli da alcun desiderio di tale, e tal cosa avuto dalla madre nel tempo di sua gravidanza: e finalmente *Macula alba*, macchie bianche, e queste sono alcune macchie bianche, che appariscono nella Cornea dell'occhio, appellate dai Medici in altre guise parecchie, come *Albugo*, *Leucoma*, *Nebula*, & *Nubecula*, Cataratte. Quindi è, che assai siate d'incontriamo nell'espressione *macula oculi*, e per questa segnatamente debbi intedere la cataratta, o sia suffusione.

MACULA. Macchia nell'Ornitologia è il nome di una specie particolare di piccione appellato dal Moore *columba maculata*. E' questo uccello della grossezza di un comune piccione terraiolo, e veone introdotto in Inghilterra dalle parti dell'Olanda. I piccioni di questa specie hanno sempre, e costantemente una picciola macchia sopra la loro testa appunto sopra il loro becco, e quindi sonosi acquilati questa particolare denominazione. Le penne della loro coda son sempre, e costantemente del color medesimo di questa macchia, ed il rimanente del corpo loro è tutto bianco. Questa macchia della testa, e la coda loro alcuna volta son nere in alcuni, in altri son rosse, ed in alcuni son gialle. Fanno una bellissima figura allorchè spandono, ed allargano la loro coda,

M m da,

da, e quando volano, e fanno una specie distinta, come quei, che producono i loro piccioncini sempre, e costantemente macchiati della loro propria macchia. Veggasi Moore, Columb. pag. 44.

MAGIA. Le persone più ignoranti, e più barbare, che dar mai si possono, sono state sempre grandemente sospette di Magia; e questo generalmente parlando. Presso di noi medesimi le persone più ignoranti e miserabili sono state accusate di Magia: e presso le estere Nazioni massime fra i Lapponesi, e fra le altre popolazioni gelate, e boreali, è presso che appurata fama, che la Magia v'abbia sempre avuto gran piede, e che di presente vi domini assai. Quelle medesime sciocche popolazioni pongono fede grandissima in certe ridicolissime voci, ed azioni, vale a dire negli effetti di quelle, e nella maniera medesima rimane ingannato il rimanente del Mondo. Il famosissimo Tamburo magico dei Lapponesi seguita tuttora ad avere il suo uolo fra quella barbara gente, e lo Scheffero nella sua storia della Lapponia ci ha somministrato il racconto della sua struttura.

Questo istrumento è fatto di faggio, di pino, oppure anche d'abete, o d'acero spaccato oel mezzo, ed incavato nel sinistro lato, ove dee esser fatto il tamburo. La cavità è di una figura elliptica, od ovale, ed è coperta di una nettissima pelle conciata, ornata tutta, e dipinta con figure di vario genere, come a cagion d'esempio, di Stelle, di Sole, di Lune, di animali, e di piante, come anche di paesi, di laghi, e fiumi, e poichè fra quella barbara gente vi hanno posto piede i Missionarij, e per conseguente vi è stata sparata la Divina parola, e la luce della Fede Cattolica, a tutte le soprammentovate cose hannovi coloro aggiunto le azioni, ed i patimenti del nostro Divino Salvatore, e de' suoi Santi Apostoli. Tutte le divinate figure veggionvisi separate per mezzo di linee in tre spartimenti, regioni, o mucchi.

Oltre le sinor descritte parti del Tamburo vi ha un indice, ed un martello. L'indice è un mazzeretto d'anelli di rame, o di ferro, il più grosso dei quali ha nel suo mezzo un foro, e gli anelli più pic-

cioli rimangonsi appesi sopra il medesimo. Il martello, o baechetta da tamburo, è fatta di un corno di cervo, e con esso battono il tamburo in modo, ch'ei faccia muovere quei anelli, trovantisi aggiustati alla cima per tale effetto.

Nel movimento di questi anelli intorno alle pitture figurate, o dipinte sopra il Tamburo vanno coloro infingendosi nell'animo alcune predizioni in rapporto agli anelli, che vanno intorno intorno elaminando.

Cò che questi matti da catena vanno investigando sopra questo tamburo, sono massimamente tre cose cioè 1. Quali faranno quei sacrifici, che saran per essere più accettati alle loro false, e bugiarde Divinità. 2. Quale riuscita faranno per avere le loro facende non meno che i loro stessi divertimenti, come a cagion d'esempio, il lor curare le malattie, le loro cacce, le loro pelche, e case somiglianti. E 3. Cò che venga fatto in quei luoghi, che da essi trovanti dilungati. In queste varie parecchie occasioni, varie sono altresì le cerimonie, ed i Riti, che coloro usar sogliono, e perciò si piantano in certi atteggiamenti, e posture sconcesissime, e ridicolissime nell'atto, che pongonsi a battere il lor Magico Tamburo, e stannosi ad osservare, quali influenze accennino gli anelli ad uno, o ad altro lato, o del loro approssimarsi più ad uno, o ad altro degli spartimenti, o mucchio delle sopraddescritte figure. E poichè questi matti han ciò fatto, hanno certo metodo di calcolare una scoperta, la quale da essi vien conservata non altrimenti che un segreto di sommo momento, ma che comparisce un mero ed unico lavoro della riscaldata immaginazione dell'Indiano, o del Mago.

MAGICO. Frece magiche, o sieno magate. Sono queste una specie d'arme comunissima presso i barbari abitatori della Lapponia, come altresì presso altre non meno barbare nazioni boreali, e vien supposto, che posseggano queste tali frecce delle grandi, e sommamente strane virtù. Quelle persone, che le posseggono, pretendono d'aver tanto in mano, di potere per mezzo delle medesime cagionare delle malattie in quei popoli stessi, che trovansi ezindio

da esse dilungati grandemente; e non solamente pretendono di poter con esse cagionare delle infermità, ma eziandio qualunque disordine, e disavventura, come è in loro piacimento, e come falsa loro in capo; e pretendono di vantaggio di praticare siffatto incantesimo, e di cagionare questi mali non solo agli stranieri, ma infra essi pure l'un contra l'altro. Havvi una fantasia di cui fa parola lo Scheffero nella sua storia di quella Regione, non altrimenti che una Leggenda fra quei Barbari universalmente perferma creduta, di un certo Mago, il quale per mezzo di sì fatte magate frecce alzò uno rupe e precipitolla in tempo, che fort'essa trovavasi un altro mago ivi addormentato, col quale nudriva odio e inimicizia, e che sotterrollo vivo fort'essa.

MIGNES carnea. Nell'istoria Naturale è questa una denominazione data dal Cardano non meno, che da alcuni altri Scrittori eziandio, a certa Terra bianca, che scavasi nell'Italia, ed in alcuni altri luoghi, che da altri Autori vien caratterizzata coll'appellazione di *Calamita alba*. Ella si è questa una sostanza terrena indurita, della consistenza, e durezza dell'Osteocolla, ed è di un color bianco distinto, e variato da alcune linee nere. Questa sostanza attaccasi tenacissimamente alla lingua, e quindi appunto vien detto, ch'ella attrae la carne in quella guisa medesima, che la calamita attrae il ferro. Viene di vantaggio anche preteso, che se uno sfilletto sia stropicciato con questa specie di terra pietrosa, e poscia immerso nella carne, la virtù di questa terra risanerà, e caratterizzerà la ferita pressochè nell'atto medesimo ch'è stata fatta, e che quando l'arme, o sfilletto è cavato fuori, non rimanga nel membro, che è stato ferito, la medesima apparenza di danno fattovi. Il Cardano afferma d'avere udito, essere stata fatta questa prova, ed essere riuscita maraviglia; ma falsi sospettare, come è già naturalmente evidente, che siasi stato nel citato caso dell'inganno. Veggasi di Boer. de Gem. 474.

MAGNETE. *Mignete nella Medicina.* Alcuni scrittori dell'Era di mezzo da una malintesa traduzione di Teofrasto, furono sì dotti a credere, ed a predicare per ve-

lenosa la calamita, la quale in effetto veramente è tanto lontano, che tale gli Antichi la riputassero, che essi prescrivevan' anzi per esser presa per bocca. Al magnetite viene da Galeno attribuita una facoltà, e Virtù purgativa, e commendata nelle idropiche affezioni; e Dioscoride prescrive il Magnete, o calamita non altrimenti che un ottimo medicamento per evacuare gli umori melancolici grossolani.

Non vi ha, adir vero, il menomissimo dubbio, che ella trovisi impregnata delle facoltà, qualità, e virtù medesime, che le altre miniere del ferro, tantochè da non molto tempo in qua non vi sia più l'uso di prescrivere internamente, avvegnachè di presente il suo uso nella Medicina non oltre passi quello di essere un'ingrediente di alcuni Cerotti, od Impialtri.

MAGNETE Arsenicale. E' questo un Caulico composto di porzioni uguali di antimonio, di zolfo comune, e di arsenico bianco cristallino, che debbon'esser tenuti sopra un calor di arena, fin che tutti questi ingredienti vengano a sfigurarsi, e ridursi in una sola massa. Questo caulico particolare riesce maraviglioso nel divorar le fungosità della carne nelle ferite.

MAGNETICO. *Spillo nella Navigazione.* Veggasi l'Articolo SPILLO &c.

MAGNETICO Meridiano, nella Navigazione. Veggasi l'Articolo MERIDIANO.

MAGNETIS Lapis. *Pietra magnetica.* E' questa nell'istoria Naturale de' buoni Antichi la denominazione data in differenti Etadi a due sostanze, sommarmente in fra sè diverse. I primi, e più antichi Greci per essa venivano ad esprimere il Magnete stesso, o sia la Calamita, che venne poi in progresso ad essere addimandata *Heraclius lapis*, e quindi la voce *Magnetis* venne applicata ad una differentissima pietra condotta dal luogo medesimo, vale a dire, dai contorni di Magnesia nella Lidia.

Era questa una sostanza finissima, sommarmente vaga, e splendente di un purissimo bianco, e così lucida, e lustra, che arrivava ad uguagliare il più fino lustrato argento. Scavavasi in assai grosse masse, ed era di tal tessitura, che con ogni agevolezza maggiore poteva lavorarsi in figure di qualsivoglia generazione: questa qualità faceva avere dagli Antichi in conto gran-

de, ed era presso di loro cosa comunissima il possederla lavorata in vascelli per l'uso delle tavole. Sembra, che di presente sia totalmente ignota a tutte quelle Nazioni, colle quali noi abbiamo commercio.

MAGNITUDINE. Le magnitudini geometriche, o grandezze geometriche esser possono considerate assai utilmente come generate, o prodotte dal moto.

Così le linee possono essere considerate, o concepite come generate dal moto dei punti: le superficie dal moto delle linee: i solidi dal moto delle superficie: gli Angoli poi può esser supposto, che vengano ad esser generati dalla rotazione dei loro lati.

Vien conosciuto, la grandezza, o magnitudine geometrica esser composta sempre di parti; di modo che in questa scienza il non aver parti, od il non aver grandezza sono considerate, ed avute per una cosa medesima, od equivalente. Non havvi però per considerare la magnitudine necessità di considerarla non altramente, che formata, e composta di un numero infinito di piccole parti; e basta soltanto, che esser non possa supposto, che una quantità esser possa così picciola, che non possa essere di vantaggio diminuita; ed è cosa assai ovvia, che noi non dobbiamo stimare il numero delle parti, che può essere concepito in una data grandezza, da quelle, che in circostanze particolari determinate esser possono in essa grandezza percepite dal senso, avvegnachè un numero maggiore di parti diventi sensibile per via di variare le circostanze, nelle quali ci viene ad essere percepito. Veggasi *M. Mac-Laurin*, *Flussioni* Art. 290. 291.

Parecchi in questi ultimi tempi sonosi fatti a supporre, che la grandezza geometrica sia composta di parti infinitamente picciole; e quindi hanno fatto montare in iscena numero granor di puerili, e di mistieri in una Scienza, nella quale esser non dovrebbero neppure un solo. Se vogliamo farci a dire la verità, senza punto perdere il dovuto rispetto a questi Signori Matematici di grido grande, ilate sono da essi senza ombra menomissima di necessità introdotte parti infinitamente picciole, o infinitamente altre picciole parti &c. &c.

ad infinitum. Veggasi l'egregio Trattato delle Flussioni del Sovrano Matematico Monsieur *Mac-Laurin*, nella sua Introduzione, ove ci fa parecchie Osservazioni da suo pari sopra la *Geometria dell' Infinito* di Monsieur Fontenelle. Veggasi di pari l' *Articolo ESTENSTONE*.

MALATTIA. Quanto più fredde sono le regioni, generalmente parlando, tanto minori, e meno impetuose, e violente sono le malattie che ivi regnano. Ci assicura lo Scheffero, come presso i Lapponesi non si fa tampoco cosa siasi la pestilenza non solo, ma nemmeno le febbri d' indole, e natura ardente, e che quelle popolazioni non sono soggette nemmeno alla metà delle malattie, che noi inestano di continuo, e distruggono. Sono coloro sommamente forti, e robusti, e vivono fino agli ottanta, novanta, e parecchi d' essi anche più di cento anni; ed in queste grandi età, e decrepite, non compariscono niente deboli, o calcani, siccome veggiamo tuttora addivenire fra noi. Ma presso di coloro un' uomo di novanta, e più annalavora, ed affaticasi bravamente, non altramente che fra di noi si farebbe un robusto uomo di sessant'anni. Sono però coloro sottoposti ad alcune particolari malattie più delle altre Nazioni. Così essi sono assai frequentemente infestati da mali d'occhi, la qual cosa dee onninamente attribuirsi al vivere, che essi fanno in mezzo al fumo, oppure dall' essere per ogni verso circondati dalla neve. Frequentissime sono di pari in fra essi le Pleuritidi, e similgiatamente le infiammazioni dei polmoni; ed il vajolo assai frequentemente fa stragi amplissime, e sommamente violente. Hanno quei Barbari popoli un rimedio generale contro queste non meno, che contro le altre interne malattie tutte. E' questo la radice di quella Spezie di muschio, siccome esprime lo Scheffero, cui essi addimandano *Ierib*. Fanno coloro un decotto di siffatta radice entro il latte di daina, e fanno bevute veramente sfermiate di questo decotto ben caldo, per mantenere in moto un moderato sudore. In evento, che aver non possano a talento queste radici, servono in luogo di quelle di alcuni gambi d' Angelica fatti bollire nella guisa medesima. Non è già però, che

che quei Barbari abbiano in conto grande il remedio divisato, o che lo considerino id proficuo, e migliore degli altri Medicamenti; avegnachè per lo contrario non sogliano prezzarne alcuno; ma il mantenerli in un moderato sudore, ed il fare delle abbondevolissime bevute di liquori diluenti, portano opinione, ed in ciò per avventura non la fallano, che questo metodo conduca grandemente alla guarigione, sia si uno, ed altro il semplice, o drogga, di cui si servono, abbia questa, o non abbia, alcuna virtù medicinale. Curano coloro le Pleuritidi con metodo similgiante in pochissime giornate, e l'indovinano col medesimo così bene nella cura del vajolo, che pochissimi quelli sono, che muojansi di tal Malattia.

Egli è stato osservato, come le persone di luoghi particolari sono anche soggette a malattie particolari, e queste sono massimamente dovute alla maniera loro di vivere, oppure all'aria, ed agli effluvi della Terra, e delle acque. Il grande Osmanno ha fatto delle Osservazioni somamente curiose intorno ad infermità di questo genere. Falsi questo Valentuomo ad osservare, come le enfazioni della gola sono state mai sempre comunissime agli abitatori delle regioni montuose: e gli Autori Romani antichi ei dicono: Che maraviglia è mai il veder delle gole rigonfie sull'Alpi! I popoli degli Svizzeri, della Carintia, della Stiria, delle Foreste di Hartz, della Transilvania, e gli abitatori di Constradt, egli osserva, esser tutti soggetti a similgiante infermità, e questa originata da una cagione medesima; e sembra, che queste enfazioni stumose riconoscano l'origine dall'acqua, che bevono questi Popoli, avegnachè questa nei paesi montuosi sia comunemente in grado sommo impregnata di particelle di spalto, o pietrose.

I Franzesi sono in guisa assai particolare molestati, ed afflitti da febbri, da vermi, da Sarcoceli, e da Idroceli; e l'origine di tutti questi sconcerti di sanità, sembra, che sia onninamente, e singolarmente un' effetto del soverchio mangiar, che fanno le castagne in copia abbondevolissima.

Le popolazioni della nostra stessa nazio-

ne vengono in guisa assai particolare afflitti da fiocchezze, o raupedini, da catarrri, da tossi, da dissenterie, da tibi, e le nostre donne dal fluor bianco; ed i nostri figliuoli da una infermità appena altrove conosciuta, cui noi addimandiamo *Rickets*, e sono questi una specie di nodi, che vengono alle gambe, ed alle braccia dei bambini, che rendono queste membra storre, e difformi, e ne impediscono la crescita lor naturale.

In parti diverse dell'Italia, regnano, e dominano varie malattie. In Napoli il tristo malore venereo è più comune, che in qualunque altra parte del Mondo. In Venezia le persone sono grandemente soggette alle morici sanguigne. In Roma son comunissime le febbri terzane non meno, che le malattie leargiche. In Toscana domina molto l'Epilessia. Nella Puglia poi il popolo è assaiissimo sottoposto ad essere assalito da febbri ardenti, da pleuritidi, e da quella sorte di pazzia, che viene volgarmente attribuita al morbo della Tarantola, e che viene asserito, che trovi unicamente il suo sollievo, e la sua cura nella Musica.

In Ispagna comunissime sono le apopleisie, come altresì le affezioni melanoliche, gli sconcerti ipocondriaci, e le morici sanguigne. Gli Olandesi sono assai frequentemente sottoposti allo scorbuto, ed al tremendissimo male della pietra nei reni. La Danimarca, la Norvegia, la Svezia, la Pomerania, e la Livonia sono tutte in guisa assai vermente, e tremendamente infestate dallo scorbuto; ed è cosa somamente osservabile, come nella Danimarca, nella Svezia, e nella Norvegia sono le febbri somamente comuni; ma nella Islanda, nella Lapponia, e nella Finlanda, a grandissimo stento uno incontrasi in similgiante malattie; tuttochè però frequentissime vi sono le Peripneumonie in queste medesime Regioni, come altresì vi sono assai comuni le malattie d'occhi, ed i sferisimi, e violentissimi dolori di testa. I Russi, ed i Tartari sono afflitti e malmenati grandemente dalle ulcere cagionate loro dal freddo grande, e queste sono della natura di quelli, che noi diciamo pedignoni, o gelloni, ma di un' indole infinitamente peggiore, e più rea. Nella Polonia poi, e nella

nella Lituania altresì regna una particolarissima malattia appellata *Plica Polonica*; e questa è così terribilmente penosa, ed offensiva, che a grandissimo stento uno può immaginarsi alcuna cosa di questa peggiorre, più afflittiva, e più trista.

La Nazione Ungarica poi è in grado sommo soggetta alla gotta, ed al reumatismo: questa Nazione medesima più che qualsivoglia altra popolazione del Mondo trovasi infestata dai pidocchi, e dalle pulci; ed oltre a ciò patiscono certa infermità tutta particolare di coloro, cui essi denominano *Cremor*.

I Tedeschi in parti diverse dell' Imperio vengono particolarmente afflitti da singolari malattie ivi dominanti, e quelle di specie differenti. Nella Weisalia è la gente massimamente afflitta dalle Peripneumonie, e dalla scabbia, o rogna. La Slesia, la Franconia, l'Austria, e tutti quei contorni, trovansi grandemente soggetti alle febbri della specie ardente, alle emorragie del naso, e ad altri sbocchi sanguigni, come altresì alla gotta, alle infiammazioni, ed alle tubi, o confusioni. La gente della Misnia è battuta assai fieramente dalle febbri scarlatine; ed i fanciulli sono in guisa assai barbara infestati dai vermi. In Grecia, nella Macedonia, e nella Tracia regnauvi pochissime malattie; ma ciò che grandemente sconvolge quelle Nazioni, sono principalmente le febbri ardenti, e le frenitidi, o frenesie. In Costantinopoli fa stragi continue la Pestilenza: e nelle Isole delle Indie Occidentali regnar sogliono le febbri maligne, e le coliche le più vecementi e terribili.

MALATTIE false. L'inganno di fingere le malattie, o per infigurarle, o per amor di guadagno, o per altri motivi occasionali, in tutte le età è stato pur troppo comune; ed è soverchio difficoltoso e malagevole lo scoprirlo in tutti i casi; tuttocchè in parecchi abbianvi dei modi di poter giugnere a rintracciare la verità. Sono pochissimi anni, che ci si è offerto sotto gli occhi un esempio di una Geotildonna, la quale imbarazzata parecchi dei più dotti, e dei più sperimentati dei nostri valentissimi Medici per s'appunto alla natura di certa tal malattia, che andavasi stendendo in una singolarissima specie d'ecoriazio-

ni; ed il costei segreto non farebbesi scoperto per avventura giammai, se a caso non fosse stata trovata entro la sua camera con una caraffina d'acqua forte toccarsi le braccia, ed altre parti del suo corpo, colla quale cagionato aveva tutte quelle apparenze, ch'erano state per innanzi dai Medici attribuite ad alcuna stranissima pecca dei fughi di lei.

Il dissimulare rispetto alle malattie può bellamente esser ridotto sotto tre capi. Nel primo caso la malattia vien pretesa soltanto a parole, ed in realtà non è tale: di similgiante natura sono i dolori di capo, i colici, ed altri tali: i quali, siccome conosciuti, e provati esser possono soltanto dal paziente, così può sempre il Medico più valente rimanere dalle parole, ed asserzioni di quello ingannato. Nel secondo caso le parole, e le asserzioni non sono il solo testimonio, che si adduca per la pretesa malattia, ma compariscono altresì de' contrassegni della medesima nel corpo dell' infinto ammalato, tuttocchè questi sieno pur anche contraffatti per i fini, che avrà quel tale. Le scabbiosità, la lebbra, e per fino le ulcere de' polmoni esser possono di pari nella divisata guisa contraffatte; e quest' ultime per via di iputo sanguigno. Sono impo-
sture talvolta similgiamente le gravidanze.

I nostri accattoni bene spesso servono di fittate finzioni per muovere a compassione di sé le persone. Nella terza specie di dissimulazione d'infermità noi dobbiamo a buona eguità racchiudere il tenere alcuna, che altri faccia, un' infermità, che realmente esista, in vece d'attribuirne una, che non sia tale.

Grandissima occasione a fittata dissimulazione porge a moltissimi il mal franze-
se; ed il tener celata sì brutta infermità assai sovente va a riuscire nella rovina totale o del suo temperamento, o della sua ragione, o buon tenno; conciosiacchè le conseguenze legittime di sì sciocco timore d'appalesarsi sieno od una morte miserabile, o la pazzia.

Nella scoperta dei divisati inganni, dal che bene spesso la buona fama, ed il credito de' Medici dipende, ella non è già la sola prodezza, o valentigia Medica quella che vi rielca; ma fa onninamente di me-

dicri,

stieri, che ad essa vengavi aggiunta una scaltrezza, e sagacità grandissima nell'investigare le circostanze tutte, e gli esleriori accidenti, e massimamente quelle tali cose, che rapporto hanno al genio, al temperamento, ed allo stato della persona sospetta. Gli indemoniati delle prime eradi, o molti per lo meno, che venivano elorcizzati da gente, che propagar voleva il credito, e somiglianti, bene spesso sono stati scoperti per inganni di quella specie, e che poscia stati sono scviati da quei tali scaltieri uomini, a i quali sonosi offerte le opportunità di far con agio le loro giuste, e disappassionate dilamine.

Dal Silvatico, Autore Italiano, cui noi grandemente riputiamo, ci è stato somministrato un egregio ed eccellente piano di Regole pel rintracciamento di similianti frodi, e di tutte le altre risguardanti le affettate, ed infinite malattie, alla qual Opera noi rimettiamo i nostri curiosi Leggitori.

MALATTIE de' bambini. Veggasi l'Articolo INFANTI.

MALATTIE pestilenziali. Veggasi l'Articolo PESTILENZIALE.

MALATTIE supposte. Veggasi l'Articolo SOPORE.

MALFRANZESE. Per la cura, eg. a rigione della lue venerea il valente Medico Dottor de Sault nel suo Trattato sopra questa infermità, raccomanda le frequenti fregagioni con abbonevoli quantità d'unguento, o manteca mercuriale fatta con una terza parte d'argento vivo, vale a dire, da due, o tre dramme a un'oncia, oppure un'oncia e mezzo ogni sera, oppure una sera sì, ed una serano, prendendosi cura di conservare il ventre in metod di purga, a forza di clisteri, di lassativi, od anche de' più energici Catartici, in evento, che il mercurio principale ad infestare la bocca. Dice questo Medico, come un similgiante metodo è sanissimo, e sommamente sicuro perogni vero, e riferisce buon numero di guarigioni condotte a termine felicissimo del medesimo, non solamente nella lue venerea, ma eziandio in molte altre malattie, e massimamente nelle ostruzioni indurite delle glandule del fegato, dei testicoli, e somiglianti. Veggansi Saggi di Medicina Edimburgo.

Da Monsieur Douglas vien grandemente commendato il metodo del Dottor De Sault, ed asserisce costantemente, come è stato praticato con riuscita maravigliosa negli spedali medesimi di Londra. Veggasi una Lettera sopra la Cura del *Malfranzese*.

Dal Dottor Werlhoff per lo contrario vengono preferite le piccole assai sovente ripetute doscelle di mercurio per salivazione per la guarigione della lue venerea. Veggasi *Commerc. Norimberg.* an. 1777. Hebdom. XIII. §. 4.

Monsieur Macky dottissimo Professore d'Istoria nella famosa Università d'Edimburgo, spedito alla Società Reale una Scrittura per la lue venerea (*grandier*) che faceva il 1781 in Edimburgo l'anno 1777. Egli si è quello un Proclama Reale, ordinante ad ogni, e qualunque persona, che trovisi attaccata da similgiante infermità, o che trovisi aver presso di sé gente da essa attaccata, di trasferirla incontaneamente ad un'Isola dello Stretto Marino di Fouth. Veggansi le *Trasfazioni Filosof.* n. 469. §. 5.

MALIGNA. Le Febbri maligne non meno, che i maligni flussi esser sogliono frequentissimi nelle regioni umide e paludose non solo dopo le stagioni calde, ma eziandio nelle assai popolate Città. Veggasi l'Articolo CITTA' (*Appendice*.)

Piena pienissima si è l'Istoria Medica di esempi di febbri maligne, o pestilenziali, aggiunte alle altre calamitati, e malori, che seco porta un epidio; ed a vero dire trovasi a stento grande alcun' esempio di una Piazza, la quale stata sia per tratto lungo di tempo assediata, che non abbia dovuto soccombere ad alcuna fatale infermità di questa spezie; questo esser può in gran parte attribuito alle schiistità, e mondiglie del luogo medesimo calcato, e premito per ogni dove di gente, e di bestiame. I grani corrotti, e le vivande da grandissimo tempo salate, pel loro essersi putrefatte, hanno similgiante ingenerato delle maligne, e pestifere infermitadi.

Ella si è cosa degna di essere osservata, quanto dentro il corso di quest'ultimo secolo abbiano abbassato la testa, e sienosi diminuite in Europa la pestilenza, e le altre

altre febbri pestilenziali, gli scorbuti dell' indole calda, e le dissenterie: una buona ventura, la quale ad altra cagione noi non possiamo attribuire, salvo che al miglioramento di ciascuna cosa che ha rapporto alla pulizia, e nettezza, ed all'uso assai più generale degli Antiseptici. Veggasi *Pringle*, Osservazioni sopra le infermità delle Armate, pag. 284. Veggasi di pari l'Articolo ANTISEPTICI (Appendice.).

Similantemente per rapporto alla dieta, può essere a buona equità osservato, come la birra bene stagionata, il vino, e gli altri liquori spiritosi, sendosi renduti più comuni, ed usuali, sono stati un potentissimo mezzo per far piegare la testa alle malattie putride, e maligne. Gli erbaggi, ed i frutti di presente mangiansi più generalmente, e le carni salate fanno ora una parte minore dei viveri, di quello la facessero per innanzi. A questo aggiungasi il consumo, che ai dì nostri vien fatto in copia senza paragone maggiore di prima, del Tè, e dello Zucchero, che è oggimai universale. Tutte le divise cose sono Antiseptici di non mezzana considerazione, e momento. Veggasi *Pringle*, Osserv. sopra le Infermità delle Armate, pag. 284. pag. 288. e pag. 293.

Quanto all'indole contagiosa di tutte le indisposizioni di natura putrida, il valentissimo Medico Monsieur *Pringle* fatti ad opinare, che tutti i putridi effluvi introdotti nel sangue, abbiano forza di corrompere: tutta la massa; del che ei congetturava esser prove più che sufficienti lo scioglimento del sangue medesimo, ed alcune volte eziandio il suo odore nello stato avanzato di una febbre maligna, il novero dei sudori, e di altre evacuazioni, le macchie livide, e le pustole, e le mortificazioni delle membra, che accadono in simile infermità. A motivo dell'acrimonia di tali effluvi, vengono i nervi ad essere investiti, ed a patirne spasmi, e convulsioni di genere vario, il polso trovasi sempremai accelerato, alla bella prima assai alzato, ma ben presto abbassato, e depresso. Idem, ibidem, pag. 298.

Ove la putrefazione fosse il solo cambiamento prodotto nel corpo dal contagio,

cosa agevole sarebbe il curare da febbri fomigianti, in ogni, e qualunque periodo di esse coll'uso degli Acidi, od altri Antiseptici. Ma siccome ciò esser non può in conto veruno effettuato, se non se nello stabilito tempo di loro declinazione, sembra grandemente probabile, che mentre l'azione secca procede, la febbre è principalmente fiancheggiata da una infiammazione nel cervello; di maniera tale che altri non può prometterci una cura, fino a tanto che la materia ostruente non venga ad essere sciolta, o suppurata. Idem, ibidem.

Che così vada la faccenda, e non altrimenti, egli apparisce dal metodo stesso della Cura. Così, innanzichè l'infiammazione sia fissata, le particelle seccatrici possono esser dilungate, e fatte uscir fuori per sudore; dopo di questo periodo, il metodo di sommo effetto si è il fiancheggiare, e sostenere le forze; ma non già per sì fatto modo, che venga ad aumentarsi l'infiammazione; ed in vicinanza del termine dell'ultimo periodo della malattia gli umori essendo sciolti, e disgregati dalla putrefazione, quindi ne viene ad esser dilungata, e rimossa l'ostruzione: e quivi è appunto il caso, il luogo, ed il tempo, in cui debbonsi prescrivere gli antiseptici più gagliardi, ed i medicamenti cordiali, per correggere non meno, che per espellere, e dilungare ciò, che è così grandemente viziato. In questo basso stato rendono assai sovente per rialzare il polso eccellenti i volatili. Il vino è un cordiale constantissimo; e non il vino solo, ma eziandio la canfora, la radice di bistorta, e la china, sono di pari tutti dotati di gagliardissime qualità antiseptiche. Veggasi *Pringle*, Osserv. sopra le malattie delle Armate pagg. 299. 300. Veggansi di pari gli Articoli BILTOSA febbre, SPEDALINGA febbre, DISSENTERIA, ec. (Appendice.).

MALTO. *Malto di pesci.* Nel malto di un pesce merluzzo vivente trovanfi congerie senza numero di quegli estremamente piccioli animalucci, che veggonsi stanziare nel seme malficio, o sperma degli animali; e questi, io ripeto, sono così incredibilmente numerosi, che in una sola gocciola di questo sugo, non maggiore, rispet-

rispetto alla sua mole, di un granello di arena, stanzianvene oltre dieci mila; e facendosi noi a considerare quante di altrettali quantità trovinsi in un'intero malto di un tal pesce, noi non dovremo temere di trascendere i limiti del vero, se ci faremo ad affermare, avervi numero maggiore di animali cotro on sol malto di tali pesci, di quello trovinsi in un tempo medesimo uomini viventi sopra la faccia della Terra. Per quanto strana, e veramente romanzesca apparir possa a prima fronte una fomigliante congettura, verà fatta toccar con mano, e dimostrata verace, allorchè alti faciavi sopra una seria considerazione, ed un' adeguato calcolo. Uo centinaio di tali granelli di arena, simiglianti a quello da noi pur ora accennato, verrà a formare a un di presso la lunghezza di un dito: adunque in uo dito cubico avravi un milione di siffatti granelletti di arena.

Il malto di uno questi pesci merluzzi forma ad un bel circa assai sovente la quantità di quindici disa cubiche: adunque forz' è che contenga quindici milioni di quantità di la grossezza medesima di una delle divise arene; e se in cadauna di siffatte quantità contenganvisi diecimila dei deserti animalucci, forz' è di necessità, che oel tutto contengaoviscento cioquantamila milioni dei medesimi: che è un numero soverchiante di lunga mano, ed in guisa eccedente quello degl' individui dell'uman genere, tuttochè noi ci volessimo fare a supporre, che la Terra tutta fosse niente meno popolata di quello sialo l'Olanda. Veggansi Collezioni Filosofiche, pag. 4.

MANDORLO. Mandorlo albero, *Amygdalus*, nella Botanica il nome di un genere d'alberi, i caratteri de' quali sono i seguenti:

Il fiore è della spezie rosacea, sendo composto di parecchi petali disposti, e distribuiti in una forma circolare: il pistillo sorge dal calice, ed alla perfine diviene uo frutto legnoso bislungo, coperto d'una custodia, o carnica callosa contenente dentro di sé uo seme bislungo.

Le ipzie di Mandorlo noverate dal Tournefort, sono le appresso:

1. Mandorlo coltivato di frutto grosso.

Suppl. Tomo III.

2. Maodorlo coltivato di frutto picciolo.
3. Maodorlo dolce di teorza tenera.
4. Mandorlo amaro. E 5. Mandorlo nano d'Iodia. Veggasi *Tournefort*, Instit. pagina 626.

Il mandorlo vien propagato per via d' inoculare una gemma, od occhio di alcuna delle pur or additate spezie in un fusino, in uo pesce, oppure, in un Mandorlo stesso d'altra spezie; e questo inestto a occhio dee farsi nel mese di Luglio. Veggasi l'Articolo INOCULAZIONE.

Il second' aooo, che faranno stati inoculati, o che avranno i mandorli germogliato, dovrannoosi trapiantare in quei dati luoghi ove destinali che debbanvrimanere.

La stagione migliore, e più dicevole per trapiantargli, se sieno destinati per un terreno asciutto, si è il mese d'Ottobre; ma se vogliansi porre in un suolo umido, è stato sperimentato, il mese di Febbrajo far riuscire siffatta piantaggioe egregiamente booe. Veggasi *Miller*, *Dizion. del Giardiniere*.

Il Maodorlo appellavasi io antico *Nux Graeca*, e questa denominazione gli fu dapprima attribuita per esser la prima volta stato coodotto in Italia dalla Grecia. Veggasi *Macrobius Saturnalium* l. 2. c. 4. *Burger*, *Lexicon Medicum*. Tom. 1. pagg. 618. 619. in Voco *Amygdalus*.

Quest' albero gitta fuori i suoi germogli assai per tempo. La verga d'Aronne, pel cui germogliare venne al medesimo conservato il Sacerdozio (a), era di quest' albero. (b).

(a) *Numeror. c. XVII. ver. 8.* (b) *Lamy Introduct. Script. lib. 3. cap. 3. pagg. 420. 421.*

Avvi due spezie di mandorli dalla mandorla dolce, vale a dire, 1. La Giordana: e queste tali mandorle sono più grosse, e più lunghe, e loro della spezie più cara, e che compransi per mangiarsi massimamente insieme coll' uvepasse. 2. Mandorle di Valenza, e di Barberia, che sono appunto quelle, dalle quali cavasi comunemente l'olio di mandorle dolci. Veggasi *Hogbort*, *Collect. Num.* 434. tom. 2. pag. 76.

Conta *Dioscoride* (c) che le mandorle amare uccidono le volpi, la qual cosa, è Nn stato

stato asserito, più e più siate essere stata abbondantemente dall' Esperienza verificata.

Cosa somigliante viene osservata dei gatti, dei galli, delle galline, e di altri tali animali. Può essere nulladimeno osservato, come fanno certi a sospettare, se questa sia la vera, e genuina lezione; conciossiachè in un antico Manoscritto l' Osmano ebbe a trovare scritto *lumbicus*, in vece di *vulpibus*, e questo verrebbe a trasferire la mortifera forza delle mandorle amare dalle volpi ai vermi.

Alcuni poi si son fatti ad immaginare, che questa virtù velenosa rispegga principalmente nella buccia, e non già nella sostanza di queste mandorle amare; conciossiachè quando queste sono sbucciate, non riescono così mortali. (d)

(e) Veggasi Dioscor. Lib. 1. cap. 176. (d) Wepl. de Cicuta aquatica, pag. 248. De Med. Offic. Lib. 1. c. 162. §. 42. Veggasi l' Articolo LAURO-CERASO.

Bene spesso vengon portate a vendere pe' mercati le mandorle amare in vece delle mandorle di noccioli di pesca. Le mandorle amare nella distillazione somministrano un sapore grandemente assomigliante a quello, che danno le anime dei noccioli di ciliegia; e perciò praticano ben sovente certuni di contraffare colle medesime l'acquavite, o sia rosolio di ciliegia. Queste vengono somigliantemente messe in opera con frequenza nel fare la ratafia in vece delle mandole dei noccioli di albicocca. Veggasi Quincy, Dispens. P. II. Sect. IV. §. 19. pag. 106.

Mandorle bianche, o fatte bianche, intendonsi quelle mandorle, le quali sendo state tenute per un poco nell'acqua calda, vengonsi a sbucciare agevolissimamente. Di queste vien fatto uso insieme con i semi rinfrescativi nelle orzate, nelle pitiane, nelle emulsioni, e somiglianti. Veggasi Hought loco citato.

Latte di mandorle. E' questa una preparazione fatta di mandorle dolci sbucciate, e di acqua, che è talvolta di alcun uso nella Medicina, come un emolliente, un refrigerante, e cosa somigliante. Hought, dove sopra.

Burro di mandorle. E' questa somigliantemente una particolare preparazione com-

posta di fior di latte, e di chiare di uovo fatte bollire insieme; alle quali dopoi vienvi aggiunta una quantità adeguata di mandorle dolci sbucciate; ed il tutto accomodato ad un fuoco lento fino a che si fissa. Veggasi Hought, Tom. 1. num. 168. pag. 438.

Parecchi Autori hanno pubblicato de' trattatelli, o dire le vogliamo Osservazioni particolari fatte sopra le mandorle: a cagion di esempio, lo Schelammer (e) sopra il germogliar delle mandorle, il Breynius sopra le mandorle del Capo di buona Speranza (f).

(e) Gunth. Christ. Schelammer. *Amygdalarum germinatio in Ephem. Acad. Naturae Curiosorum*, Dec. II. ann. 8. Obs. 32. (f) Jacobi Breynii *Observ. de Amygdalo Holoferico Capitis Bona Spei*, Ephem. Acad. Natur. Curios. Dec. I. ann. 3. Observ. 292.

Il Durrio (g), e gli Accademici Curiosi della Natura (h) hanno scritto intorno alle facoltà velenose delle mandorle, e de' loro effetti sopra gli animali bruti. Molte particolarità riguardanti le mandorle son state del pari opportunamente somministrate da i Botanici, da i Medici, e da altri eziandio (i).

(g) Veggasi Durrus *Observationes de morte subitanea in volucribus Canariensis ex usu Amygdalarum amararum*, in *Ephemerid. Acad. Natur. Curiosorum*, Dec. 3. ann. 1. Observat. 156. *Observat. de Amygdala amara quibusdam animalibus nociva, ac lethali*, in *Ephemer. Dec. 1. ann. 8. Observat. 99.* (h) Veggasi Particolarità riguardanti l' albero del Mandorlo: (i) Tournefort *Institut. 150. 21. sect. 7. gen. 5. pag. 627.* Burger. *Lexicon Medic.* Tom. 1. pag. 618. & seq. in voce *Amygdale*. Zwing. *Dissert. 4. de Amygdalis*, p. 12. Ruel. de Nat. Stirp. lib. 1. cap. 51. Ray, *Historia Plantar. lib. 2. cap. 7.* Anatomia del frutto del mandorlo. *Maipighi, Anatom. Plantar. de Uteror. Augment. pag. 69.* Burger. loco cit. sua introduzione nell' Inghilterra. Hought, libro sopra citato pag. 73. Mandorle dolci, loro qualità, ed uso contro la costipazione, contro l'asma, contro la pietra, &c. &c. Burger. dove sopra: loro olio se sia giovevole, o dannoso nelle febbri, Giornale de' Letterati d' Italia, Tom. 14. pagg. 213. 217. 229. 230. Item Tom.

Tom. 15. pag. 410. Buono contro i vermi, *Atla Eruditor. Lipsiens. ann. 1730. p. 409.* contro la colica, *ibid. Supplem. Tom. 2. pag. 14.* Mandorle amare, le sieno dotate di qualità aperiente, oppure astringente, *Ephemerid. Acad. Natural. Curios. Dec. 1. ann. 8. pag. 185. 186.* Se quelle sieno un preservativo contro l'ubriachezza, *Brown, Errori vulgari lib. 2. cap. 45. pag. 80. Camerac. Memor. Cent. 3. Par. 1. pag. 88.* Quindi la loro forza, ed efficacia contro gli avvelenamenti, *Ephem. Acad. Nat. Curios. loc. cit.* Quindi la loro facilità d'uccidere le galline, e simiglianti, *ibid. Dec. 1. ann. 8. pag. 184. 185.* loro qualità diuretica, e vermifuga, *ibid. Dec. 2. ann. 1. p. 184. & seq.* loro uso Cosmetico, *Hoghs, Collect. Tom. III. n. 434. pag. 75.*

MANDRAGORA. E' questo il nome di un genere di piante, i cui caratteri sono i seguenti:

Il fiore è composto di una foglia, formato a foggia di campana, o campaniforme, e nella sua estremità diviso in parecchi segmenti. Trovasi questo racchiuso entro un calice, dal fondo del quale sorge un pistillo, che fora la base del fiore, e che nella piena sua crescita formasi alla perfine in un frutto morbido tondeggiato, entro il quale contienfi un dato numero di semi, i quali sono di ordinario della figura di un'arnione.

Le specie della mandragora sono le seguenti, cioè

1. Mandragora dal frutto rotondo, appellata mandragora maschio. 2. Mandragora dal fiore paonazzetto, o porporino, denominata mandragora femmina.

3. Mandragora dal fiore azzurro, di foglia picciola, e di frutto rotondo. Molte delle mandragore esser possono simigliantemente conosciute, anche non essendo in fiore, ma dal loro avere delle grosse foglie tondeggianti di un reo odore, e grossissime radici. Veggasi *Tournefort, Institutionum pag. 76.*

La mandragora venne già da certuni commendata nel caso di sterilità, ma però senza ombra menoma di fondamento. La sua radice fresca è un veementissimo, e gagliardissimo Catartico, la cui dose si è dai dieci ai venti grani in sostanza, e da una mezza dramma, ad una

dramma in infusione. Ella è stata sperimentata proficua nelle affezioni isteriche; ma fa onninamente di mestieri l'usarla con somma cautela; altramente ella verrebbe a cagionare delle orribili convulsioni, ed altri sintomi molli perniciosissimi. E' simigliantemente dotata la mandragora di una qualità narcotica. Di presente presio di noi non fa sene altro uso, salvochè delle sue foglie fresche nei cataplasmi, e nelle fomenta anodine, ed emollienti, bandito essendone dalla nostra medicina ogni, e qualunque altro uso.

MANIA. E' questa una violentissima, e sommamente acuta specie di un delirio, originante da uno sconvolgimento, e sovversione dell'immaginazione, e del giudizio.

Segni della mania. Sono questi un aspetto risoluto, coraggioso, e minacciovole, e gli occhi aspersi di sangue: soltanto esser dee osservato, rispetto al sintoma accennato in primo luogo, che quelle persone, le quali son divenute maniche per una qualche paura, portano sempremai nell'aspetto loro una mescolanza di quel terrore, in che posele dapprima quel tale oggetto, e di quella naturale animosità, che nasce immediatamente dalla mania. Il paziente stassi collantemente assaccendato in tender trappole, ed insidie, per far cader l'altra gente in suo potere, con animo di far loro del male, tuttochè quelle persone medesime non gli abbiano fatto mai il menomo torto. E' stato veduto alcuna fiata, come le persone maniche hanno ucciso, e fatto in brani delle altre innocenti persone; ed, a vero dire, hanno sempre colloro una forza sì fiera da soverchiare qualsivoglia uomo il più robusto, e nerboruto; e tuttochè non abbiano indosso attualmente la febbre, nulladimeno non sono punto sensibili del freddo esterno, nè generalmente parlando, di qualsivoglia altro incomodo, o dolore. Sono, oltre a ciò, questi miserabili sceuri a segno di speculazione, che bene spesso stentano perfino grandemente a sentire le battonate, e le battiture, che ricevono nel corso della cura, che loro vien fatta. Assaiissime fiata non odono tampoco le persone, che loro favellano, o sgridano, e naturalmente hanno l'immaginazione in estro-

mo gioconda, e paga, immaginandosi di essere Re, Principi, e Signori grandi, e prendono gran diletto della musica. Sono colloro in estremo portati all'atto venero, e sono così lontani dal vergognarsi di cheechessia, che son capacissimi di far qualunque cosa la più infame, e la più vergognosa sulla faccia di qualsivoglia persona. Tutto ciò avviene nel colmo di questo tremendo fconcerto: nel declinare poi di quello divengono alcuni meleni, e stupidi, altri in estremo attristati, adolorati, e maninconosi, e grandemente sensibili del presente stato loro veramente infelice. Veggasi *Juskeer*, *Conpectus medie*. 689.

Persono sottoposte alla mania. Sono queste principalmente uomini di un'abito di corpo collerico, e di disposizioni vemente, e trasmodatamente appassionate. Colloro sonovi similgiamente soggetti, che hanno dei litigi, delle brighe, e dei disturbi continui domestici; e le donne precipitano non di rado in sì fatte manie che affezioni a motivo di un lungo troncamento, o soppressione dei corsi loro usali mestruali, e di un'abito di esser perdute continuo dietro a fozzì pensieri lascivi. Alcune fiata sono divenuti maniaci alcuni uomini a motivo di un troncamento di un'abituale scarica sanguigna moroidale non meno, che per mancanza di evacuazione spermatica. Finalmente è infallibile, come ha cagionato questo brutto disordine, un'afezione verminosa, e talvolta eziandio la stessa ubriachezza.

Prognostici. La mania originante da cagioni immateriali è assai più malagevole a curarsi, che quando ella nasce da peche, e disordini degli organi del corpo: quindi, allorchè ella riconosce sua origine da violenti sconvolgimenti di animo ed alterazioni vementi della mente, oppure da uno studio, ed applicazione soverchio intensa, ella si è presso che incurabile. Qualora ella dipenda da ritenzione di seme, oppure da troncamento di spurghi uterini, oppure dalle moriei, qualora da valente medico venga diretta per dicevol modo la cura, havvi speranza grandissima di guarigione. Ma generalmente parlando le persone pazze, e maniache fanno i loro sonoi, e che continuamente

te fanno altrui degli oleraggi, debbon'essere riputate incurabili, o per lo meno la lor cura essere più difficultosa, e più malagevole in esse, che in qualsivoglia altro dal medesimo tremendo disordine fconcertato.

Metodo della cura. Alla bella prima dovrassi far prendere al Maniaco un gagliardo Catartico; immediatamente dopo dovrassigli francamente aprir la vena, e fargli una cavata di quelle buone dieci once di sangue per lo meno: ciò fatto dovrassi tentare di risvegliare in esso, e richiamare i sensi a forza di energici vomitori. Presso gli Antichi famoso era in casi similgianti l'Elleboro bianco; e sonovi alcuni casi, nei quali, a vero dire, può preservervi con sicurezza, e con effetti veramente maravigliosi. Quindi dovranno esser ammansati, ed attutati i vementi moti del sangue per via di medicine nitrose, ed assorbenti; e poichè sarà fatto tutto il divisato finora, dovrassì passare a quei tali specifici, che vengono riputati acconci comunemente in tali casi. Di siffatto numero sono i decocti dell'anagallide rosso, o della pimpinella, della ruta muraria, oppure del capelvenero bianco, le parecchie preparazioni di argento, le coecole dell'erba paride, il sangue di asino, e similgianti; e dovrassi tentare ogni via di procurare nei pazienti un corso il più regolato, che mai sia possibile, delle scariche moroidali, e mestruali. Nei casi di ritenzione spermatica, dovrassi prescrivere in dosi abbondevolissime il nitro purificato, il quale potrassi di pari usare esternamente applicandolo ai testicoli a foglia di cataplasma. L'uso delle oppiate può a stento grande permettersi in qualsivoglia delirio; ma soprattutto non dee in verun conto essere praticato nella Mania, conciossiachè non concilia giammai ombra di sonno in quei miserabili; che anzi per lo contrario elacerba il loro male, e gli fa divenir peggiori, producendo in essi gli effetti a capello i medesimi, che produrrebbono i gagliardi, ed energici liquori. L'uso poi dell'Elleboro bianco, come un vomitorio in alcuni casi far può del gran bene; ma in tutti gli fconcerti ipocondriaci, e per conseguente nella Mania, nelle cagioni della quale si fatti

fatti disordini hanno parte, ella si è così indubitata, che l'elieboro accrescerà di lunga mano la malattia. Idem, ibid. p. 698.

Trovafi l'istoria di una mania originata da un'incallimento della pia madre. Veggansi Saggi medici di Edimburgo, Vol. IV. Art. 26. Veggasi di pari l'Articolo PAZZIA.

MANNA. E' questa una sostanza in parecchi riguardi affomigliantesi grandemente allo Zucchero, ed al miele; ella è nella guisa medesima infiammabile, e squagliasi nell'acqua colla stessa facilità, che lo Zucchero, e nella guisa medesima è indissolubile nello spirito di vino, se si eccettuino soltanto pochissime particelle di un indole, e natura apparentemente erogenea. E' questa una prova sufficientissima, che in questa sostanza abbondano più i sali, che gli zolfi. Il valente Monsieur Lemery nell'Analisi da sé fatta, cavò dalla Manna un liquore vinoso della specie a capello la stessa di quello, che si estrae dal miele. Quella bevanda composta di miele, e di acqua, e perciò appellata Idomele, può farsi colla manna appunto come farsi col miele stesso; ma non è nè tanto potente, nè sì gustoso al palato, come riesce quello fatto col miele. Da una quantità di Idomele, quanta ne poteva riuscire da due libbre di Manna, Monsieur Lemery per via di distillazione estrasse otto once di una specie particolare di rosolio, od acquavita, ed in rettificandola, venne a procurare una buona oncia, e mezzo di un puro spirito abbruggiante, fomigiantissimo per ogni rapporto allo spirito di vino rettificato. Questo spirito di manna viene da certuni spacciato per un sudorifico, e vien'presentato alla dose di una mezza dramma, ad una dramma, e mezzo. Avendo lasciato Monsieur Lemery il liquore rimanente, dopo la distillazione della parte spiritosa dell'Idomele di manna pel lungo tratto di due anni in un luogo caldo, in capo a questo termine ebbe a trovare, come aveavi deposto nei fondi delle caraffe sette dramme di un sale essenziale di manna, il quale era bianco, duro, friabile, e formatosi in finissimi aghi, ed era, assaggiandolo, di un sapore acido, con una

vena, o mescolanza di dolceigno. Questo sale è catartico, e la sua dose è una dramma. Essendo poscia stato distillato tutto il liquore acido rimanente, rimasevi nel fondo della storta una quantità di materia della consistenza stessa del miele, che venne a pesare venti once: di maniera tale che fuori di due libbre di Manna, vennervi consumate dodici once per fare lo spirito, e per somministrare la qualità acida al liquore rimanente. Questo residuo affomigliantesi al miele sendo stato ultimamente a forza di affai energico fuoco distillato, nell'operazione videvsi ascendere un liquore rossiccio di un sapore acre, e d'un fortissimo odore empireumatico, e di conserva con esso alcune poche goccioline di un olio nericio; fatta l'operazione divisata, cioè, che rimase nella storta chimica, si furono quatter'once di un leggerissimo carbone negro. Dee essere osservato, come ivi il carbone venne ad essere soltanto un'ottava parte del peso della Manna, che è alcuna cosa di singolare; conciossiachè nel miele purissimo, manipolato, e sottoposto all'operazione medesima, vien questo sempre, e costantemente a pesare la quarta parte di tutta la quantità originale. Quindi è piano, ed evidente, che la Manna è una sostanza grandemente più pura del miele stesso. E' similmente osservabile, come in ulteriori manipolamenti del divisato carbone, viensti a scoprirvi sempre una picciola porzioncella di ferro. La Manna, il miele, e le altre sostanze dolci tutte, noi veggiamo altresì, come vengono a perdere tutta la loro dolcezza tosto che l'acido loro viene ad esser disgiunto dal loro olio. Veggasi Histoire de l'Academ. des Sciences de Paris. ann. 1708. pag. 36.

Ella si è una fandonia il credere, che molti fanno, esser la Manna un prodotto particolare dei frassini della Calabria, sopra i quali vien comunemente trovata. Altro ella non è in sostanza la manna, se non se la materia della sensibile traspirazione degli alberi, e delle piante in generale, e di fatto ella vien trovata sopra parecchie differenti specie di alberi, ed in quantitati varie. Il Tiglio, ed il Sico-

Sicomoro hanno comunemente una buona porzione di manna sopra le foglie loro nei caldi grandi dell'Estate, e se questa venga messa in molle nell'acqua, rendela dolce non meno, che purgativa. Quella materia dolce, che vien trovata nel fondo dei fiori del trifoglio, oppure anche in quei del genfumino incerto tale stato ella si è similantemente manna. Conoscono, e fanno bene le api l'identità di questo dolce sugo stravalato in differenti piante, e così se lo raccolgono pel loro miele, non meno dalle foglie del Tiglio, e del Sicomoro, che di altri alberi moltissimi, non altramente che elle si facciano dai fiori delle piante. Quel manipolamento, che questa materia vien poi a soffrire sotto i lavori di questo amabilissimo insetto, si è quello, che forma tutta la differenza, che passa fra questo, e fra ciò, che gli uomini raccolgono dai loro frassini nella Calabria, e sul Monte dell'Angiolo di Puglia nel Regno di Napoli; e così in un certo tale stato il miele è la manna medesima.

In Briançon nella Francia la gente di quel paese raccoglie la manna da ogni, e qualunque specie d'albero, che colla alligna, e gurgli abitanti fannosi ad osservare, che quelle tali Estate, che producono quantità abbondevolissima di questa manna, riescono sommamente fatali agli alberi loro. I loro noci producono quasi continuamente una quantità grandissima di questa manna, cadaun'annata; ma s'egli avvega, che un qualche anno ne producano più dell'ordinario, nella veggente Invernata ne muojono moltissimi.

Da tutto il divisato finora sembra chiaro, e manifesto, altro non essere la manna, se non se il sugo stravalato dell'albero, il quale venendo a fare una perdita così trasmodante di esso sugo, non può sopravvivere. E ciò, che non poco ci conferma questa verità, si è, che le Estate sommamente calde son sempre quelle, nelle quali viene a prodursi copia abbondevolissima di questa Manna.

Erano i buoni Antichi sommamente sensibili di questo spontaneo prodimento della manna di parecchie specie di alberi, cotanto l'uno dall'altro differenti per ogni rispetto, e quindi ebbero a ca-

der nell'errore, di supporla una sostanza all'albero stesso intieramente eterogenea: errore, a dir vero, ad essi naturalissimo, i quali non conoscevano, che i sughi nutritivi di moltissimi alberi sono a un di presso, se non in tutto, e per tutto, medesimi. Da questa loro prava opinione dell'origine di questo prodotto appunto avvenne, ch'ei chiamassero questa manna miele aereo. Ci dice Monsieure Boyle, che nella Puglia, ed in Calabria, fra i mesi di Marzo, e di Novembre vengono quei popoli ad ottenere a forza di incisioni negli alberi dei frassini volgari un sugo dolcissimo sommamente somigliante a quello, che nell'Estate raccogliessi dalle foglie degli alberi della specie medesima; e che questo addimandando coloro, siccome è in fatti, Manna del corpo, Manna del tronco dell'albero, e che servonsene, e spacciano ne' paesi forestieri con somma riuscita. Veggasi Boyle, Opere Filosof. Compend. Vol. 1. pag. 51.

MANNA *albagina*. E' questa un'espessione usata da alcuni Autori per significare quella specie di Manna da altri Scrittori appellata *Manna mastichina* dalle sue goccioline rassomiglianti alle picciole lagrime del Mastice. Vien questa pertanto detta *albagina* dalla Pianta, che la produce, venendo raccolta dall'*Albagi Maurorum* nella maniera medesima, colla quale si raccolgono in Puglia, e nella Calabria la Manna comune dal Frassino. Veggasi l'appendice Articolo MANNA *Perficum*.

MANNA *Libanotis*. Nella materia Medica è un nome dato dagli Antichi Greci Scrittori ai piccioli fiocchi, e frammenti dell'Incenso, che staccansi dai più grossi pezzi nel raccogliergli, e nello staccargli, e nel trasportargli.

MANNA *Mastichina*. Nella Materia Medica dassi questa denominazione da alcuni Scrittori ad una specie di manna, cui essi ci descrivono come assomigliante al Mastice nel suo colore, e nella grossezza delle masse, o fiocchi nei quali vien raccolta. Questo è appunto ciò, che noi di presente conosciamo sotto l'appellazione di Manna *Perficum*, o sia Manna di Persia, che a di nostri è in uso nella medicina di tutto l'Oriente, non altramente, che un catartico comune. Veggasi il seguente Articolo.

MAN-

Manna Persicum. Manna di Persia. Non apparisce nelle Opere degli Antichi Medici Greci, che essi possedessero la cognizione d'alcuna specie di Manna, tutto che di presente non abbiasi nelle Botteghe degli Speciali Medicina più comune, e più nota di questa. Avevano essi, è vero, la voce, ma applicavanla ad un senso totalmente diverso, e tutt'altro dal nostro: conciossiachè ciò, che da essi addimandavasi Manna, si fosse quella sostanza medesima, che anche a' nostri seguitano certuni a denominare Manna d'Incenso, che è quanto dire, quei tali pezzi del comune Olibano, i quali vengono a staccare, in conducendolo, a pezzi più prossi.

Veggansi le Trans. Filosof. n. 472. p. 86. Vi ha chi siasi a supporre, gli Arabi essere stati i primi ad introdurre nella Medicina la Manna. Ma se essi non furono gl'inventori assoluti dell'uso di quella, egli si è però fuor d'ogni dubbio, essi essere stati i primi, che la rendettero generale, e comune, come un Medicamento Catartico. La loro Regione somministrava parecchie specie distinte di Manna, le quali tutte sembra, che fossero presso di loro così comuni, che essi riputassero del tutto inutile il farne le adeguate descrizioni; ed appunto per tal ragione non ci lasciarono istorie sufficienti d'esse specie, dalle quali noi non potremmo determinare, quali si fossero i caratteri, e le differenze di quelle. Distinsero gli Arabi tre specie di questo Medicamento Catartico sotto tre assoluti nomi differenti, e questi erano, *Manna*, *Terenjabin*, e *Firacosi*; ma non è agevole il provare, se queste sieno di presente tutte conosciute, oppure sotto quali appellazioni vengano ai dì nostri ad esser distinte.

Monsieur Raw-wolf nel suo Itinerario pubblicato da Monsieur Ray, ed il Tournefort nel suo Viaggio del Levante, ci hanno dato delle tracce chiarissime in rapporto a questo Soggetto, di qualsivoglia degli Scrittori noti; e se a questi noi aggiungeremo il Clusio, fra questi tre Scrittori noi avremo tutta quella certezza, che altri può prometterci di questa materia. Malgrado però le scolorite descrizioni, quantunque d'uomini accuratissimi, e largo veggenti, un sovrano Scrittore, e di conto

sommo, quale appunto si fu il moderno Monsieur Geoffroy ebbe a cadere in grosso errore rispetto alla Manna degli Arabi.

Egli si è pertanto indubitato, ed evidentissimo, che noi seguitiamo ad avere una specie della *Manna Arabum*, vale a dire il *Terenjabin*, prodotto in alcune parti del Mondo, sendoci state spedite mostre di questa specie particolare in Inghilterra da Pietroburgo, in vicinanza del qual luogo vien raccolta da una Pianta conosciuta fra gli Scrittori di Botanica sotto la denominazione di *Albazi Maurorum*.

E' questa comunemente appellata *Manna Persicum*, *Manna Persiana*, *Manna di Persia*. Questa a prima fronte comparisce una massa mescolata di un colore rossiccio scuro fuscio, ma in osservandola con maggiore attenzione, si tocca con mano esser questa massa medesima composta di parecchie forti di particelle. Prima veggionvisi corpiccioli in grandissimo numero globulari cristallini di varie grossezze, e di un color bianco pendente al giallo, oggialognolo.

I corpiccioli fra essi i più grandi non passano la grossezza di un seme di curiandolo; ed hanno una qualche apparenza di piccole masse, o fiocchi di mastice, ma hanno un fondo alcun poco rossiccio. Secondariamente sonovi fra essi quantità abbondevoli di piccole spine, o punte, ed altri piccioli corpi legnosi, che sembra essere stati già gambi, o picciuoli di foglie. In terzo luogo veggionvisi alcune poche foglioline, che sono di una tessitura assai fissa, consistente, e vanno a terminare in assai aguzzo punte. In quarto luogo havvi abbondevol numero di piccole loppe lunghe di un colore rossiccio, di un sapore gelatinoso dolcigno, e queste loppe, o foglie, o dir le vogliamo custodie, contengono da uno fino in sei, ed anche sette semi duri assai, e di una figura di arnioni, ed irregolare, i quali, assaporandogli, riescono al palato ascerbissimi. E finalmente in quinto luogo trovansi d'ordinario infra le descritte sostanze de' granelli d'arena, ed alcune porzioncelle di terra. Quattr'oncie di questa Manna sciolta nell'acqua nel filtrarla lascia indietro d'ordinario intorno ad un'oncia delle divise sostanze,

I glo-

I globuletti da noi deferiti in primo luogo, sono alquanto duri, fra i denti si frangono, non altramente che lo zucchero candito, e sono di un sapore piacevolmente, e gustosamente dolce; ma hanno molto minor sapor di Manna, di quello possedgalo la Calabrese; ma possiedono nulladimeno quel sapore, che basta per rintracciare a qual Famiglia queste date sostanze si appartengano. I semi, i fuscellini, le foglie, e le loppe sopradefesritte, sembra, esser tutte parti della Pianta, che produce questa Manna; ed in fatti sendo stati seminati i da noi deferitti semi, ne sono spuntate fuori vere, e genuine Pianteg dell' *Albahi Maurorum*.

Intorno all'anno 1537. allora appunto, che il soprammentovato Autore Raw wolf disse il suo Itinerario, egli apparisce, essere state trasportate dalla Persia in Aleppo quantità abbondevoli di questa specie di Manna, ove era in quei tempi conosciuta sotto la particolare appellazione di *Trunfchibil*, ovvero *Trunfchibin*, che senz'ombra di dubbio è una voce corrotta della genuina *Terenjabin*, oppure siccome andrebbe scritto secondo il sentimento del Denslingio, *Tereng jabin*.

Simigliantemente lo stesso antico Itinerarista Raw wolf ci dice espressamente, e c'informa, come questa specie di Manna veniva raccolta da una Pianta appellata *Albahi*. Questa Pianta vien descritta per minuto dal Tournesfort, il quale conferma il racconto della Manna, che venga cioè raccolta da quell'albero, che lascioci scritto tanto tempo innanzi il più siate citato Raw-wolf.

Afferisce il Tournesfort, che questa Manna viene principalmente raccolta intorno a Tauris Città della Persia sotto il nome di *Trunjabin*, ovvero *Terenjabin*, di cui fa parola Avicenna, e Serapione; ed egli aggiunge, come questi Autori si facevano a pensare, che s'ingenerasse sopra certi dati arboscelli spinosi, ovve per lo contrario ella si è realmente il sugo nutritivo della Pianta, e che duranti i calori grandi in quella parte del Mondo, veggionsi certe picciole goccioline rotonde, non altramente che altrettante goccioline di miele aderenti alle foglie di questa Pianta medesima; e che queste induriscionsi in globuletti della

grossazza a un di presso dei semi di curiandoli, ed allora appunto dalla gente del paese sono raccolti insieme colle foglie, coi gambi, col fango, o con similante eterogenea materia, le quale viene a diminuire d'assai la loro genuina natia virtù. Osserva Monsieur Tournesfort, che rispetto alla virtù medicinale questa Manna è grandemente inferiore a quella della Calabria, e che di quella dannosi venti, e trenta dramme per cadauna dose. Veggasi le Traduzioni Filosof. num. 472. pag. 90.

Ci dice il Clusio, come il *Terenjabin* degli Arabi vien raccolto da un'arboscello spinoso, quale appunto vien descritto essere l'accennato Albahi; ed Avicenna dichiara, che si trovava sopra una Pianta spinosa; tuttochè i suoi Traduttori l'abbian preso per altra cosa, e questo a motivo della somma somiglianza di due voci Arabe facendo, che il corpo, onde veniva raccolta, fossero pietre, e non già una Pianta.

Da tutto questo egli apparisce evidentemente, come questa sostanza di presente conosciuta nella Russia, ed in alcune altre parti del Mondo sotto la denominazione di *Manna Persicum* Manna Persiana, Manna della Persia, è veramente il *Terenjabin* degli Arabi, e del Clusio, del Raw-wolf, e del Tournesfort; e che soltanto la voce viene scritta, ed ortografata diversamente dagli Scrittori più recenti; ed è grandemente probabile similantemente, che la Manna sia appellata dal Bauhin, e da alcuni altri Scrittori *Manna Majuscula Orientalis*, dai rotondi globuletti, onde ella è composta, assomiglianti alle goccioline del Miele. Veggasi l'Articolo *TERENJABIN*.

MANNA THUIS, Manna dell'Incenso. E' questa una espressione usata già dagli antichi Medici per dinotare cotali piccioli pezzetti d'incenso, oppure di Olibano, i quali romponsi, e staccansi da' pezzi più grossi nel trasportargli da un luogo all'altro. Veggasi l'articolo *MANNA PERSICUM* qui sopra.

MANO. *Cartilagini della mano*. Le ossa tutte del corpo, del metacarpo, e delle dita sono tutte vestite, ed incamiciate al di sopra di cartilagini, in quei dati luoghi appel-

appellati superficie cartilaginose, nelle descrizioni di queste medesime ossa: nelle ossa fresche però sono queste cartilagini più sfilate, più morbide, e più bianche di quello esse lo sieno nello scheletro. Nei Soggetti adulti, vero si è, che la loro figura si rimane la medesima in ambedue i divisi stati, ma nelle ossa seccate, ed aride de' soggetti più teneri, e di minore età, questa figura stessa viene a cangiarsi, e massimamente nei bambini. Veggasi *Winslow*, Anatomia, pag. 143.

Ligamenti della mano. I ligamenti del carpo sono numerosissimi. Alcuni di essi servono a connettere e legare cadaun'osso del carpo medesimo alle ossa adiacenti nel medesimo ordine, o filare, e questi sono sì fattamente corti, che vengono a somministrare a queste ossa soltanto un picciolissimo grado di moto. Alcuni di essi legano, e connettono le ossa di un filare a quelle di un'altro: sono questi similmente composti di dati numeri di filamenti, ma non sono così corti, come i primi, e compongono a queste ossa un movimento più manifesto; ed ultimamente vi sono altri ligamenti del polso, dai quali le tre prime ossa del primo ordine, o filare, vengono ad esser connesse con quelle del braccio, ed a questi ligamenti esser possono aggiunti quelli del secondo filare, dai quali le sue ossa vengono ad essere attaccate, e congiunte a quelle del metacarpo, ed alla prima falange del dito grosso, o pollice.

Oltre ai corti ligamenti finora additati appartenenti tutti a cadaun'osso in tutt'e due gli ordini, o filari, le ruvide superficie di tutte le ossa, massimamente di quelle, dalle quali viene ad esser formata la convessità del carpo, danno l'incello, od intersezione a numero grandissimo di fascetti, o mazzetti ligamentari: i quali sono distesi al di sopra, e trovansi strettissimamente uniti ai primi piccioli ligamenti, e probabilmente servono a fortificarli e fiancheggiarli. Vi ha di pari un ligamento assai considerabile, denominato l'interior ligamento trasversale del Carpo. Chiamavasi questo dapprima un ligamento anulare, e potrebbe anche a' di nostri a buona equità legittimo a ritenere quello suo pri-

Suppl. Tom. III.

mo nome, che lo caratterizza sufficientemente bene.

Le ossa del metacarpo, oltre quei ligamenti, dai quali vengono ad essere unite, e connesse al secondo filare delle ossa del Carpo, ne hanno altri parecchi, dai quali non meno le loro basi, che le loro intesature vengono ad essere congiunte, e legate insieme. Le basi del terzo, e del quarto osso non sono connesse tanto strettamente, e strettamente, come le altre, e perciò hanno un moto sensibilissimo. Le intesature di queste ossa sono tenacemente, e stabilmente unite, e combagate l'una all'altra per mezzo di un fortissimo, e gagliardissimo ligamento situato a traverso nella palma della mano, e fissato per via di distinti allungamenti nelle parti adiacenti delle medesime intesature. La prima falange del dito grosso è fissata all'osso trapezio da corti ligamenti, i quali passano obliquamente sopra l'Articolazione. Le prime falangi delle quattro dita vengono ad esser congiunte alle intesature delle ossa del Metacarpo da ligamenti similantissimi ai primi, e ad un di presso nella maniera medesima. La terza falange del dito grosso è congiunta alla seconda, e le seconde falangi delle altre dita alle prime, e le terze alle seconde, per mezzo di ligamenti laterali, a un di presso nella maniera medesima nella quale le ossa della parte anteriore del braccio son congiunte all'osso dell'omero, che è quanto dire che questi ligamenti s'aprono da un punto fissato nei tubercoli laterali delle intesature delle falangi, e vengono ad essere inseriti nell'altra loro estremità non altrimenti che raggi nelle basi delle falangi adiacenti. Le due prime falangi di cadaun dito hanno una gagliarda, e ben consistente vagina, o fodero ligamentoso inserito nelle ruvide linee, o dir le vogliamo scanellature, nei loro lati piatti. Questi foderi, o vagine vengono ad essere ammorbidite, e vestite da una membrana mucilaginosa, la quale non altrimenti che un tubo scorre, e portasi da una falange all'altra, sopra l'Articolazione. Servono queste di freni ai muscoli flessori delle dita, i tendini delle quali passano per esse. *Winslow*, Anatomia, pag. 143.

O o

Lesf.

Lussazione della mano. Non ostante che la mano trovisi con infinita accuratezza congiunta all'ulna, ed al raggio, per mezzo del Carpo, e dei validissimi ligamenti, ella è nulladimeno sottoposta alle lussazioni, ed alcuna fiata le soffre in tutte in qualsivoglia direzione, all'insuori, all'indietro, e verso uno, od altro lato; ma non è così facile, che la mano venga a slogarsi in banda, od ai lati, e questo generalmente parlando, come lo si è nelle altre direzioni, avvegnachè la fianscheggia grandemente, e diffendanda da siffatto sconcerto i due allungamenti del raggio, cioè, e dell'ulna.

Allora vien detto, che la mano è lussata, o slogata per innanzi, od all'indietro, quando ella scottasi dai muscoli, che fasciano le dita; e che viene ad essere slogata all'indietro, allorchè si scolla, e dilongasi dai muscoli, che estendono, ed allungano le dita medesime. Simigliantemente in assai ugual modo vien detto, la mano essersi slogata all'insuori, allora quando il carpo viene a formare un tumore in vicinanza del pollice, ed una cavità per lo contrario in vicinanza del dito mignolo; e finalmente essere slogata all'indietro, quando avviene tutto il contrario di ciò.

Per riattare, e riallogare gli slogamenti, o lussazione della mano, fa di mestieri, che la mano medesima venga sufficientemente stesa, ed allungata da due chirurgi aiutanti, stantesi uno di essi sopra la mano, e l'altro dalla parte della spalla, facendo entrambi la loro azione, o stiramento in direzioni l'una all'altra opposta; e fa di mestieri altresì, che la parte della mano estesa, ove trovasi il seno, venga piantata sopra una tavola ben piana, ed uguale, affinchè qualsivoglia stecca soprapposta possa essere depressa al suo rispettivo luogo; pel qual metodo la mano in qualsivoglia parte slogata, esser possa perfettamente restituita alla sua naturale adeguata sede. Egli accade similmente alcuna fiata, che una o due delle piccole otto ossa del Carpo vengano ad esser lussate, slogate, e storte dalla sede loro naturale per alcuna esterna violenza. Allorchè ciò avvenga vi verrà conosciuto, e veduta in una patte una gonfiatura,

ed una cavità in un'altra, che sarà distinta non meno dal seno, che dalla inspezione, ed il paziente sentiravvi, e proveravvi dei violentissimi dolori. E' questa una lussazione da riattarsi interierissimamente, e con estrema agevolezza, collo stendere, ed allungar la mano nella guisa poc'anzi descritta, e col riallogare l'osso. Veggasi *Eislero*, Chirurg. pag. 165.

MARCHESSITA. E' questo un nome nell'istoria Naturale usato da Scrittori moltissimi in un senso sommamente vago, in rapporto ai Fosfili, ma dal dottissimo Dottor Hill ristretto ad essere il nome proprio di un genere particolare di Fosfili, i Caratteristi de' quali sono:

Che son certi dati corpi composti, metallici, infiammabili, naturalmente costituenti intieri strati di una sostanza fissa, solida e consistente di una struttura oscuramente, ed irregolarmente sfogliata, e di un'apparenza lucida brillante, con grande speditezza, ed interamente facente fuoco coll'acciaio, niente fermentante con i menstrui acidi, ed allorchè venga posta nel fuoco, mandante fuori una fiamma azzurrata carica, ed alla per fine calcinantesi in una polvere porporina.

Quantunque la disposizione naturale di questi corpi sia il formare intieri e perfetti strati; e tuttocchè trovinsi assai comunemente, e per lo più in questo stato, nulladimeno di tratto in tratto vengono di pari trovati in isciolte, e disgiunte masse, non altramente, che talvolta trovar fogliosi le pietre medesime di strati, separate, e disperse. Sono questi similmente soggetti, a motivo dell'assai frequente mescolanza di materia eterogenea, ed avventizia, di miniere di metalli, ed altri corpi fossili eziandio, a siffatte varie esterne apparenze, che le loro varietà vengono ad essere pressochè innumerevoli, e moltissimi d'essi sono sommamente belli ed appariscenti. Ma quantunque le divise differenze accidentali sieno in numero così eccedentemente grande, nulladimeno pochissime sono le specie genuine, avvegnachè i Naturalisti non ne sogliano ammettere, che sole tre: vale a dire: 1. *Marchesita* color d'argento lucida brillante. 2. *Marchesita* color d'oro lucida brillante. 3. *Marchesita* pesante pallida bianca smorta.

La

La prima di queste tre specie forma d'ordinario, e costituisce strati di grandissima estensione, e della grossezza a un di presso d'un piede; spessissimo assai meno, ma rarissime volte molto più. Ella è composta d'un dato numero di fiocchi sfogliati, non disposti regolarmente, ma confusamente, e strapazzatamente discenti, storti, ed ondanti, e bene spesso ripiegantisi l'un sopra l'altro: quantunque si fatta struttura alcune volte ella siasi meno distinta, e sembri, che tutto il corpo vada a rifondersi in una solida massa. Il suo colore è in estremo brillante, somigliantissimo all'argento, ma assai più lucido e sfavillante. E' questo il suo più comune, ed il suo più puro, e perfetto stato; ma ella si è soggetta a numero grande di varietà. Alcune fiata ella contiene un'abbondantissima quantità della miniera del piombo, o dello stagno, ed assai volte siate trovatisi intimamente con esso frammeschiata una materia secca ferrigna assai cupa: alcuna fiata trovatisi immerse ed incorporate in essa parecchie stogonie angolari, e regolarmente figurate, e sembra che facciano una parte della sua stessa struttura. Alcune volte poi, ove abbia spazio sufficiente, le sue sfogliature costituenti alzansi sopra la sua stessa superficie in parecchie serie congiunte, ed accoppiantisi, e vengono a formare in essa una sommità estremamente vaga, ed appariscente. Nè è questa tutta la differenza dell'apparenza, che veggasi in questa specie di marchesita; conciossiachè assai volte, ove non siavi stata una quantità sufficiente di essa, onde ella siasi potuta formare in una sola, qualunque siasi, figura, ella vien trovata depolizzata in ispechi, ed in piatte focacce, d'una grossezza ora maggiore, ora minore, ma sempre, e costantemente d'una struttura fioccata come di pezzi di ghiaccio nelle pietre, o nelle miniere di specie diverse; ed assai frequentemente, oltre il suo nativo color bianco argenteo nelle sue varie parti ella ha i colori tutti dell'Arcobaleno, secondo che ella venga diversamente voltata di contro la luce. Veggasi Hill, *Istoria dei Fossili*, pag. 609.

La Marchesita color di oro è una sostanza assai più vaga della testè descrit-

ta. Ella è di una struttura meno fissa, e meno consistente, o compatta delle altre Marchesite; e vien trovata comunemente in lunghissimi, ma sommamente sottili strati, ed è di un'apparenza in estremo risplendente, e scintillante, e vien talvolta trovata in assai grossi, e mal formati noduli, oppure in isciolte masse. Ella è somigliantemente sottoposta a tutte le accidentali varietà della prima, ed in parecchie di queste stesse varietà, ella forma delle formamente vaghe apparenze.

La terza specie di Marchesita, o sia la Marchesita pallida, bianca smorta, è la più dura, e la più pesante di tutte le Marchesite. Ella è nella sua più comune, e più naturale apparenza di una bellezza molto minore delle prime specie, ma è, non altramente che le medesime, soggetta ad accidenti varj, sotto alcuni dei quali ella viene a fare un'assai briosa, appariscente, e splendida mostra. Ella forma, non altramente che le altre, alcune volte degl'intieri, e compiuti strati, ed alcune altre degl'iaccati noduli, e sciolte masse; ma la sua apparenza comunissima si è nelle cavità orizzontali di altri strati. In questi ella forma bene spesso una specie di strato bastardo pel tratto di parecchie pertiche continuato, e con assai frequenza di una grossezza molto considerabile, avvegnachè ella venga a riempire soventi volte tutta l'intera cavità, e questo sì serratamente, e strettamente, che rarissime volte ella lascia luogo per alcun risalto di fogliami nella sua superficie, o rilievi, e protuberanze nelle sue orlature, o contorni; ma viene a formare una massa piana somigliantissima a quella del metallo squagliato, e come versato in quel dato luogo. Ella è di una liscissima, e sommamente levigata superficie, assai più di tutte le altre Marchesite, ed al tatto riesce alquanto morbida, e quanto al suo colore assomigliasi grandemente allo stagno tornito.

E' questa la sua mostra, ed apparenza comune; ma alcune volte ella compare non altramente, che le altre marchesite, in picciole zollette, o pezzetti sopra le superficie delle pietre, e quivi ella si è

bene spesso vaghissima foggia sfogliata, ed è similgiamente soggetta agli accidenti tutti delle altre spezie.

Tutte le Marchesite, niuna eccettuata, vengon trovate in copia abbondevolissima nelle miniere dell' Inghilterra, e della Germania. La Provincia di Devon, e la Cornovaglia ne somministrano quantità prodigiose, e delle eccedentemente belle trovansene nella Provincia di Berby. Contengono esse assai frequentemente parecchi metalli: ma la copia grande dello zolfo ha sempre deluse, e rendute vane le arti, ed i tentativi tutti, fatti per lavorarle con vantaggio, estraendone l'oro, l'argento, e somiglianti. Veggasi *Hill*, *Historia dei Fossili*, pag. 610.

Nomina Avicenna quattro spezie di Marchesite, vale a dire Marchesita aurea, argentina, bronzina, e ferrea. Non prescende egli già quindi, che le prime due Marchesite contengano realmente quei metalli, i nomi dei quali elleno portano; ma dice, essere così denominate dalla rassomiglianza, che queste hanno con i colori di tali metalli, a che oltre a ciò, alcuni immaginaronsi, che esse possedessero in parte le virtù, e facoltà di quelli. Parla Dioscoride di una spezie sola, vale a dire, della pirite bronzina, o di rame, o sia Marchesita. E' questa la marchesita più comune delle altre tutte; ed intanto questo Scrittore la preferisce alle altre marchesite tutte, per essere di un color di rame risplendentissimo, e tale, che quando vien colpita coll' acciaio, manda fuori grossissime scintille di fuoco. E' questa appunto quella spezie di marchesita da Avicenna, e da Serapione appellata *Marchesita Nubasi*, e dai Persiani denominata *Hogiar Alruxenani*, che è quanto dire pietra di luce, o di lucentezza, avvegnachè quando questa pietra è rotta di fresco possiede una lucentezza beilantissima, e sorprendente. Usavano gli Antichi di calcinarla; e così ne facevano un ingrediente delle loro note preparazioni per le indisposizioni negl' occhi. Il calcinare siffatta marchesita, rendela una sorte di Coleothar di vetriolo, avvegnachè nell' abbruciamento dileguansi, e si consumano le parti sulfuree, e lasciano indietro soltanto il *espum mortuum* del vetriolo. Sonosi certuni fat-

ti a supporre essere questa marchesita stata denominata *lapis lucis*, dalla sua efficacia di ricovrare agli occhi la vista, ma questo è un'arzigogolo etimologico ridicolissimo, ed affatto lontano dalla verità della cosa.

La prima opinione del Mondo in rapporto a questa risplendente, e sfolgorante sostanza si fu, che ella fosse presso che tutta oro, od'argento, secondo il suo colore: ma l'errore di sì fatta opinione sendo stato ben presto svelato per via di esperienze, ne nacque altra opinione alla prima diametralmente opposta, vale a dire, che la marchesita non contenesse parte menoma di alcun metallo. Questo avverarsi generalmente delle nostre Brittaniche Marchesite; ma non dee per questo stendersi come regola, e canone generale per tutte le Marchesite delle altre parti del Mondo. I minatori delle miniere Reali non debbono gittar via, come inutili, tutte quelle sostanze, quali esse sieno, che in esse miniere si trovino: conciossiachè Alfonso Barba Sovrano intendente, e giudice di tali cose, ed esso stesso veratissimo di persona nelle miniere medesime, ci assicura, come le marchesite delle miniere di *Monferrat en los chiesas*, contengono comunissimamente la metà della loro massa di argento. Nelle miniere poi del Potosì havvi quantità prodigiose di una marchesita, entro la quale trovasi incorporata copia abbondevolissima di miniera di argento, ivi molto ben conosciuta, e, se si eccettui il solo argento nativo, ella è riputata una delle più ricche miniere mescolate di argento. Allorchè quei popoli trovano, e s'imbattano in questa vena di marchesita, far sogliono sempre gran festa, riputandola prova infallibile, che la vena negra è costantemente ricchissima, e pienissima di argento. Far sogliono coloro la spezie medesima di osservazione, rispetto all'orpimento, ed all'oro medesimo, cui essi fanno in rapporto alla marchesita, ed all'argento; avvegnachè contenga l'orpimento comunemente alcuna porzione di oro, ad è ad essi un segno evidente, che in quei contorni vi ha dell'oro; e di fatto coloro non s'ingannano, poichè qualunque fiata hanno una traccia similgiante, arri-

arrivano di pari a scuoprirvi l'oro eziandio. Veggasi *Alonso Barba*, de metal.

MARCIA. Nelle faccende militari è la marcia quel passaggio, o quei passi, che fanno in procedendo innanzi, o nel muoversi di un corpo di uomini da un luogo ad un altro.

Ma il batterli del tamburo, allorché i soldati marciano, e procedono innanzi, od allorché principiano la marcia, similmente addimandasi marcia. Ella si è quella di pari una voce di comando, allorché un battaglione dee alterare la propria sua disposizione.

Il marciare si è il muoversi da uno ad altro luogo. Essendo dati gli ordini, la sera innanzi ad una marcia, che i Tamburi battono ad una certa ora assegnata, allora i Soldati debbono intieramente schierare sotto i loro stendardi, e colori, in isquadroni separati, od in battaglioni, per principiare ordinariamente la loro marcia.

A norma, e secondo i varj accidenti, che accader possono nella marcia di un'Esercito, come a cagion di esempio, angusti sentieri, paludi, boschaglie, o cose similgianti, dee il prudente Generale, ad esso solo cidaspettandosi, ordinare coerentemente la sua marcia, e prender cura attentissima, che le colonne della sua armata abbiano a vicenda una liberissima comunicazione l'una coll'altra. La marcia di un'Esercito in ordinanza di marciare è composta di una Vanguardia, di un corpo di mezzo, o sia centro, e di una Retroguardia, e questa è alcuna fiata in due, in quattro, in sei, oppure anche in otto colonne, secondo che permettono la natura del terreno.

MARE. Differisce il mare in rapporto alla sua saldezza in parti differenti: viene osservato in generale, come nei Climi sommamente caldi l'acqua è di pari sommamente salata.

Allorché l'acqua salsa si congela, o si ghiaccia, egli è stato immaginato, che ella deponga tutto il suo sale: il ghiaccio dell'acqua marina, e l'acqua dal medesimo liquefatta, e sciolta, riescono dolci, bevendole, e sono buone, ed acconce per cuocerli la carne, ed i piselli. Il famoso nostro Capitano Middleton trovandosi nel mese di Luglio dell'anno 1738.

negli stretti di Hadson cavò di sotto alla superficie del mare del ghiaccio, cui egli sguagliò fino a procurarne quaranta bocce di acqua. Quest'acqua ei la fece tutta svaporare fino all'estremo, e fuori della divisata quantità di acqua ne ottenne sole sei once di sale, oppure intorno ad $\frac{1}{17}$. Veggansi *Le Transazioni Filos.* n. 461. Sezione XIII.

La montata dell'acqua marina per la formazione delle sorgenti, o fontane da una circolazione sotterranea delle sue acque alle loro sorgenti, è stata una fortissima obiezione, che hanno fatto molti contro il sistema della loro origine dal mare: ma il valentissimo Dottor Plot si è fatto ad osservare, come vi ha moltissime strade, per le quali può benissimo l'acqua ascendere sopra il proprio livello.

1. Per via di calori sotterranei. 2. Per una specie di filtrazione. 3. Per un'altezza disuguale di parecchi mari. 4. Per la distanza del centro di grandezza dal centro di gravità nel globo terrestre. Viene asserito, che la superficie del mar pacifico inoltrisi dal centro di gravità più della verta delle altissime colline sopra la parte opposta del globo. E finalmente 5. Per l'aiuto delle tempeste, e maree.

L'acqua marina ascende attualmente sopra il suo livello in venendo entro i pozzi, i fondi dei quali trovansi, e disclinano più alti della superficie del mare nei segni dell'acqua altissima. Veggasi *Plot*, de origine Font.

Movimento generale del mare. Monsieur Dastie di Parigi, in certa opera fatta pubblica per le stampe sessanta anni sono, od intorno a tal tempo, si è trovato in brighe, e stenti grandissimi per provare, che il mare ha un moto generale, indipendente dai venti, e dal flusso, e riflusso, e che è per la navigazione di un movimento, e di una conseguenza assai più rilevante di quello venga comunemente supposto. Afferma questo Franzese, che moto similgiente segue dall'Oriente all'Occidente, inclinandosi alla volta del Norte, allorché il Sole ha passato il Boreale Equinozio, e che durante il tempo attivo il Sole trovansi nei segni Settentrionali; ma che segue tutto il contrario, poichè il Sole ha passato l'Equinoziale verso mezzodì; ed

un tratto lunghissimo dal lido, che in luoghi differenti è di diverse profondità, ed altezze; ma di ordinario fra i sessanta ed i settanta Fadomi Inglesi, vale a dire fra l'altezza di 360. e di 420. piedi. Veggasi l'Articolo LIDO.

Ella si è presso i Marinaj una regola generale, e vien trovato averarsi in un prodigioso numero di Esperienze, od esempi, che quanto più i lidi di qualsivoglia luogo sono dirupati, ed alti, formanti dei burroni, o rupi perpendicolari, tanto più profondo si è il mare sott' essi; e che per lo contrario i lidi livellati dinotano dei mari di picciol fondo. Così la parte profondissima del Mediterraneo viene universalmente accordato trovarsi sotto l'altezza dell'Isola di Malta. L'osservazione degli strati di terra, e di altri Fossili, sopra, ed in vicinanza dei lidi, può servire a formare un' ottimo giudizio rispetto ai materiali, che trovansi nel suo fondo. Le vene di sale, e di bitume scorronvi le medesime, e collo stesissimo ordine, in cui noi le veggiamo nella terra; e gli strati di scogli, che servono a sostenere il terreno delle colline, e de' luoghi rilevati, ed alti sul lido, servono similmente nella catena medesima continuata per sostenere l'immensa quantità di acqua all'alveo, o fondo del mare medesimo. Egli è di pari probabile, che le vene dei metalli, e di altre sostanze minerali eziandio, le quali si trovano nelle terre adiacenti, e circonvicine, vengano ad essere nella maniera medesima continuate per entro le altissime profondità del mare. Le particelle dei metalli in questo caso vengono condotte via probabilmente nel profondo dell'acqua, ed affondansi fra la materia più molle, e più soffice dell'alveo; ma sembra, che alcuni dei più leggieri minerali dato abbiano il colore a quelle bellissime, e vaghissime incrostature, le quali trovansi sopra moltissime piante marine, e le quali perdono in seccandosi il lustro loro. I fiumi sotterranei, e le correnti dell'acqua, producono cambiamenti grandissimi in ciò, che formerrebbe, o farebbe la superficie naturale del fondo del mare, ove queste sorgono, avendo cadaun di questi fiumi, e

correnti sotterranei un letto fondo proprio. Noi venghiamo ad essere informati d' esempi numerosissimi di correnti, e fiumi sotterranei; e siccome noi gli veggiamo rompere, e sboccar fuori in alcune parti in fiumi sopra la superficie della Terra, così in altri noi esser possiamo benissimo assicurati, che esse correnti medesime rompono, e sboccan fuori sopra il fondo, od alveo del mare, e che vanno vuotando le loro acque dolci per entro la massa dell'acque salate.

In questo caso il lanciarsi continuamente all'insù di un sì fatto corpo di acqua viene a formare una cavità tondeggiante, ed il suo scorrere per alcuna direzione va allungando, e dilatando questa medesima cavità, fino a tanto che grado per grado ella viene ad esser perduta, via via che l'acqua dolce viene ad essere incorporata gradatamente, ed immediatamente nell'acqua salata. Così ciaschedun Fiume, il quale forge nel fondo del Mare, va alterando la forma della superficie di quello, e viene a formare un alveo, o fondo per se medesimo, in cui egli scorre per un tratto di via grandemente considerabile. Parecchi mari in vicinanza del lido, e quando l'acqua trovasi tollerabilmente chiara, fanno vedere le tracce di queste correnti allo stesso occhio nudo riguardante dalla superficie, e l'acqua attirata da esse, è sempre più, o meno dolce. Veggasi *Marigli*, Hist. de la Mer, pag. 13.

Le pescagioni del corallo ci hanno somministrato l'occasione di osservare, come hannovi moltissime caverne, e concavità, e queste grandissime nel fondo del Mare, massimamente allorchè è pieno di scogli; e che caverne similanti sono alcune volte di pari trovate negli scogli perpendicolari, che formano appunto i lari, o fiancate dirupate di quelle pescagioni. Similanti caverne sono bene spesso di una grandissima profondità non meno, che di una vasta estensione, ed hanno talvolta delle ampie, e dilatate bocche, uguali al massimo loro diametro in alcuna parte, ma alcuna fiata per lo contrario non hanno che angustissime foci, od imboccature entro ampissime, e spaziosissime concavità. Ella si è opinione comune della gente,

te, che abita intorno al luogo, che queste caverne sieno dalla natura preparate per la circolazione dell'acqua del mare; ma questa operazione, per altro necessarissima, può essere benissimo effettuata, e senza queste caverne, e coll'esistenza delle medesime; e se vogliamo dire la cosa, come sembra, che realmente sia, queste caverne non sono, che meramente accidentali.

Noi c'incontriamo tutto di in concavità, e caverne di tratto immenso, fatte naturalmente nei dirupati monti; e siccome questa parte del fondo del mare è pressochè tutta di scogli, e di dirupi, e le sue fiancate, o lati sono di una medesima natura, così ella non è maraviglia, che avvengano gli accidenti medesimi, e che trovinsi simiglianti concavità, tuttechè nell'uso loro non abbiavi la Natura intenzione alcuna di particolare provvidenza. E di vero non vi ha ragione maggiore per prometterli queste caverne, e concavità negli scogli sepolti sotto il mare, di quello siavi in quelle, che trovansi nelle montagne, e nelle colline; e se non che quelle, che trovansi in uno stato quieto, e tranquillo, dove per lo contrario le prime trovansi in un continuo accesso, e recesso d'acqua, la quale andrà introducendosi, ed insinuandosi in ciascuno scerpolo, o spaccatura, che in esse lasciato abbia la Natura; ed esser può facilmente supposto, che abbia dato principio al suo dilatamento per via di un picciolissimo foro fatto ivi dalla Natura medesima, fino a tanto che grado per grado sieno andate dilatando, e prendendo luogo, sicchè alla perfine sieno divenute di tal ampiezza.

Da tutto ciò sembra piano, ed evidente, come l'alveo, o fondo del mare, trovavasi nella creazione, oppure nella seconda sua formazione, vale a dire, dopo il Diluvio Universale, coperto, o composto delle sostanze medesime, delle quali è coperta, o composta la superficie del rimanente della Terra, che è quanto dire, di rupi, o scogli, di argilla, di arena, e di altre simiglianti sostanze. Le comuni Osservazioni della gente della marina sembra, a dir vero, che oppongansi diametralmente ad una siffatta opinione;

ma queste possono essere con somma agevolezza dillegate, e sciolte in modo, che non la possano per modo alcuno rovesciare. Il piombino, cui essi calano nel misurare il fondo marino, porta seco ordinariamente sopra l'acque una materia composta di mola, o fango, d'incrostamenti tartarosi, oppure di erbacce morte, e di frammenti di conchiglie, oppure congerie di varj corpi di spezie somigliante, insieme cementati ed uniti in assai fissa, e consistente massa, da alcuna materia spaltica, o tartarosa, depositata ivi fra l'acqua, ed agglutinante questi corpi medesimi insieme: queste sostanze formano un fondo artificiale, il quale cuopre, e sotterra il fondo, od alveo naturale; ma ella si è cosa agevole il vedere, che una tale incrostatura, od intonacatura, o coperta della natura da noi divisa finora, è giuoco forza che sia stata formata sopra il verace, e genuino fondo in luoghi, ove prodotti vengono in numero prodigiosissimo animali, e vegetabili, e che di bel nuovo disfiannosi, e vanno male, ed ove l'acque trovandosi in quiete, hanno tutto l'agio di deporre la loro materia pietrosa in quella stessa stessissima guisa, che le acque delle nostre fontane, o sorgenti si facciano, massimamente quelle d'indole petrificante, siccome a chichessa è notissimo. Ed è simigliantemente piano, che queste sostanze scadute e andate male, come anche questa pietrosa materia, venendo a precipitare insieme al fondo medesimo, ed ivi non essendo sfiorata, e sconvolta, ma rimanentesi, e diacentesi in quiete, forz'è di necessità, che venga a formarsi appunto in quella tal data crosta, nella quale vien trovata collaggi; ed il fondo naturale del Mare, siasi di fango, di arena, o di argilla, o creta, forz'è che rimanga sotterrato, e coperto da siffatte concrezioni accidentali; e quello assai probabilmente ad una tale profondità, che di presente non è agevole il rompere, ed il farsi strada per penetrare al medesimo.

Hannovi però dei luoghi, ove per alcuni particolari accidenti siffatta spezie d'incrostatura avvenizia, o non si è formata, od eziandio ne è stata rimossa, e dilungata. In quelli dati luoghi pertan-

to noi troviamo il natural fondo, od alveo del mare, non altrimenti che l'abbiamo descritto, vale a dire, della natura a capello la stessa degli istrati, che trovansi nelle viscere, o nel corpo della Terra. La comparazione, o similitudine, che il prode Conte Marsigli fece fra l'alveo del mare, ed una botte di vino, è sommaramente espressiva, ed in estremo adeguata. Allorchè il vino è stato conservato per lungo tratto di tempo in una botte, tutta la superficie interna di quella botte medesima è per sì fatto modo intorno intorno coperta, ed incrostata di tartaro, che nella sua parte interna sembra composta interamente, ed unicamente d'esso solo tartaro; tuttavia, siccome noi sappiamo, e conosciamo benissimo, che la botte è composta di legno, noi siamo certissimi, che la verace interior superficie della medesima si è della stessa tessitura, e natura di quell'albero, dal quale quel legno fu tagliato, e compostane essa botte; tuttochè noi non possiamo staccare, e levar via la superficie accidentale formata dal liquore entro essa conservato, e che intieramente la cuopre, e l'occulca.

Affaiissime siate noi c'imbattiamo a trovare nel fondo del mare della finissima, e purissima arena; ed in questi dati luoghi noi siamo disposissimi a credere d'avervi trovato il vero, genuino, e natural fondo, o dir lo vogliamo fondo originale; tuttochè questo fatto debba esser considerato piuttosto non altrimenti che una buona probabilità, che come un'indubitata certezza; ed ove l'arena trovasi assai più dell'ordinario, vi ha sempre ragione di sospettare, che ivi stata siavi trasportata dal corso di un qualche fiume sotterraneo, coll'aprire, e farsi strada in quella data parte perentrio il mare; e questo sia uno di quei particolarissimi alvei, che simiglianti fiumi vanno a se stessi formando dentro l'alveo, o fondo del mare; e che essi sono soltanto ad una picciola data distanza dalla loro sorgente. Veggasi *Marsigli*, *Histoire de la Mer*, p. 15.

E' il fondo del mare coperto di una varietà di materie così grande, che non può essere immaginata se non se da coloro, che sonosi presi la briga di esaminar-

Suppl. Tomo III.

le, e d'investigarvi dentro, e massimamente ove l'acqua è assai profonda, ove la superficie da altro non viene ad essere disturbata, che dal flusso, e refluxo, e dalle tempeste, ed ove la parte più bassa, ed affondata, e per conseguente il suo letto nel fondo rimansi per tratto peravventura di etadi ed etadi in calma, e quiete perfettissima. I toccafondi, allorchè il piombino viene per la prima volta, in quei dati luoghi, a toccare la terra in avvicinandosi ai lidi, dannoci alcune idee di questo. Il fondo o base del piombino è concava, e dentro di questa cavità vienvi piantata una massa di lego; questa trovandosi nel fondo del piombo, si è appunto ciò, che prima viene a toccar terra; e la soffice, e morbida natura di questo grasso viene a ricevere dentro di sé alcuna parte di quelle sostanze, colle quali nel fondo medesimo s'imbatta. Questa materia nella divilata guisa tirata su, è alcune volte pura arena, alcune altre una spezie particolare di arena composta di frantumi di nicchi, e conchiglie ridotti ad una spezie di polvere; alcuna fiata ella è composta di una polvere somigliante delle varie sorti di coralli; ed alcun'altra ella è composta di frammenti di scogli; ma, oltre a simiglianti apparenze, che sono naturali quanto basta, e sono appunto tali che altri potrebbe a buona equità promettervisi, tira su eziandio delle sostanze, le quali hanno colori eccedentemente belli, ed appariscenti. Sostanze, a cagion d'esempio, di un finissimo colore carlantino, di un color vermiglio, porporino, e simiglianti, non altrimenti che far si possano i colori per la più fina pittura, come anche delle sostanze gialle niente inferiori alla soluzione di gambogio; e queste sono comunissime. Alcune volte poi, sebbene non con tanta frequenza, la materia, che vien tirata su col piombino infegato, è paonazza, verde, oppure di un purissimo, e nitidissimo bianco nevato. Queste materie colorite sembra talvolta, che compongano tutto il fondo, o massa della superficie, ma con più frequenza, e d'ordinario queste sonosi formate sopra altre cose, come, a cagion d'esempio, sopra la melma, oppure sopra i più grossi, ed ampi pezzi di conchiglie, di coralli, e di cor-

Pp

pi,

pi, e sostanze simiglianti, alla foggia appunto delle incrostature tartarose, e queste in alcun grado assomigliantisi alle incrostature, od incamiciature crostacee d'alcune delle piante marine. I colori di siffatte sostanze non sono già meramente superficiali, e passeggeri, ma parecchi di essi sono per sì fatto modo reali, e permanenti, che possono essere ricevuti nella cera bianca sguagliata, e versati sovra' esse sostanze, oppure conservati in fusione intorno ad esse; e quando vengono per sì fatta maniera esaminati, sembrano tali, che in essi siavi stata impiegata una somma cura, e che andara siavi della specie ben grande, avvegnachè non può darsi color più fino, e più delicato.

Le materie medesime colorite, che nella guisa divisa incominciano, e vestono le sostanze trovate in questi dati luoghi nel fondo del mare, trovansi di pari alcuna fiata distese sopra la superficie delle piante marine della specie più dura, le quali vegetano, e vengono su nelle acque assai profonde. Trovansi le medesime sempremai in questo caso in una sorte di forma liquida, essendo piantate, e stanziate dentro, od incorporate, ed immedesimate con una specie di gelatina, o dir la vogliamo colla di una tal sostanza trasparente, la quale in casi somiglianti fascia, e veste perfettissimamente al di sopra tutta la pianta medesima. Somministra essa in tale stato al Naturalista, il quale trovasi presente alla pescagione de' suoi tesori un prospetto, o mostra passeggeria di una vaghissima, ed elegantissima specie; ma quella sparisce, e dileguasi, mentre il medesimo stassi ammirandola. Un pezzo di corallo, o d'altra pianta marina della specie dura nella divisa maniera incamiciato, e vestito comparisce, allorchè alzasi alla superficie dell'acqua di un verde sommamente delicato, oppure azzurro, o porporino; ma allorchè questo dato pezzo vien tratto fuori dell'acqua medesima, viene a toccarsi con mano, come questo finissimo colore trovasi soltanto nell'incamiciature della divisa colla, o gelatina, che cuopre, e fascia la pianta; subito che questa colla, o gelatina viene asciugata, e tolta via dalla pianta, il color diviso vassene con essa, ed il coral-

lo, od altra marina pianta comparisce allora della sua tinta, e color genuino nativo originale: nè vi è già calo di tentare, che il color diviso rimangasi sul corallo, col lasciare che questa colla, o gelatina s'asciughi, e si secchi sopra' esso; avvegnachè intensibilmente il color medesimo se ne voli, e dileguisi per gradi, via via che l'umido va svaporandosi, ed il corallo, od altra pianta dura, qualunque ella siasi, altro non acquista, se non se ella comparisce meno vaga, ed appariscente di quello ella sarebbe comparita nel suo stato, e nel suo colore nativo, avvegnachè ella rimangasi tutta coperta di una materia giallognola cupa, e comparisce non altrimenti risguardandola che un pezzo di corno scuro. Queste bellezze pertanto delle piante stanzianti perentro il mare possono essere e vedute, e godute da quelle sole persone che hanno il vantaggio di pescarle, e cavarle fuori di quegli acquosi fondi marini.

Le piccole quantitati di questi vaghissimi, e bellissimi colori, che noi troviamo nella maniera divisa sparsi, e distesi sopra le superficie delle piante, ed altri corpi nell'approssimarci, che facciamo alle acque di gran fondo, ci possono somministrare un'assai ragionevole idea di ciò, che noi faremmo per trovare, allorchè avessimo agio di farci ad esaminare i fondi, od alvei dei mari nei suoi più profondi, e non misurabili abissi. Ella si è cosa agevolissima il concepire, che in questi dati luoghi noi faremmo per trovare quantitati abbondevolissime di sostanze d'una vaghezza, ed appariscenza sorprendentissima. Veggasi *Marsigli*, *Histoire Physique de la Mer*, pag. 16. 17. & seq.

MARE morto. Il valentissimo Dottor Perry fece parecchie esperienze sopra l'acqua del mar morto, a fine di trovare quali particelle vi si contenessero. Coll'infondere in quell'acqua una porzioncella di raschiature di gallozole ella divenne di un lucidissimo, e brillantissimo color porporino, ma questo non vi si trattene per tratto di tempo considerabile. In aggiungendo alla medesima l'Olio di Tartaro *per deliquium*, quell'acqua intorbidossi, e comparvervi perentro alla medesima come

come dei globuletti di grasso qua è la Autuanti: quella untuosa materia col suo stare buon tratto di tempo in riposo, andò ad unirsi tutta insieme in forma di una posatura nel fondo del vaso. In versandovi sopra lo spirito di vetriolo, ella venne a deporre una posatura bianco lattata untuosa, e lorda, la quale dopo essere stata in quiete pel tratto di dodici ore, venne ad ingombrare, ed occupare intorno ad una quinta parte del liquore. In ponendovi allora una picciolissima porzioncella di Zucchero di Sarutno, ella venne a deporre una picciola quantità di una polvere scuriccia, o bigiognola. Essendo stata parecchie volte, e disgiuntamente mescolata con una soluzione di sublimato, collo spirito di sale ammoniac, e collo zucchero di viole mammoie, quest'acqua nè scuriscia, nè depose la menomissima posatura, nè venne a mutar colore, salvo collo Zucchero di viole mammoie, col quale ella divenne verde. Ella si è quest'acqua in grado sommo fattolata di sale, di modo che ella si è all'acqua comune, in gravità specifica, come cinque a quattro, ed il suo sapore è per sì fatto modo acre, e stiptico, che se altri la si tenga ferma in bocca, ella viene a stringerla non altramente che facciasì l'allume medesimo.

Da tutte le quì descritte Esperienze egli apparisce, come quest'acqua trovasi impregnata di una spezie di una natura acre, ed alcalica, e di una materia in parte di un'indole, e natura sulfurea, ed in parte di un'indole, e natura bituminosa. Veggansi le Traduzioni Filosof. n. 462. pag. 50.

MARITAGGIO. In Java le persone d'ambi i sessi s'accasano, e congiungonsi in matrimonio non solo, ma hanno eziandio prole, e figliolanza in età di soli nove, in dieci anni: e le donne lasciano d'ingravidarsi, vale a dire, non son più capaci di far figlioli prima d'esser giunte alla freschissima età di trent'anni: Nel Tanquin poi hannovi delle donne, o ragazzette, le quali fanno copia di sè a chicchessia, che ne abbia voglia, sull'età loro tenerissima d'otto in nove anni.

Ci somministra Monsieur Potter una

copiosissima istoria delle parecchie ceremonie, e riti osservati nei loro matitaggi dai Greci. Gli Spartani non permettevano alle persone il congiugnersi in matrimonio, fino a tanto che quelle non fossero giunte alla loro piena creseita, e robustezza. La ragione da Licurgo per sì fatta Costumanza, o legge, assegnata, si era, che così adoperando i fanciulli Spartani sarebbero stati forti, vegeti, e pieni di vigore. Le Leggi Ateniesi poi viene asserito, aver' un tempo ordinato, e prescritto, che gli uomini non potessero in conto veruno ammogliarsi, se prima giunti non fossero al trentacinquesimo anno di loro età. Veggasi Potter, Archæol. Græc. Lib. 4. cap. 11. Tom. 2. pag. 263. & seq.

Molti degli Stati della Grecia, e quelli massimamente, i quali facevano alcuna figura nel Mondo, elegivano, che niuno Cittadino loro potesse ammogliarsi, se non se con sole Cittadine. I riti e ceremonie usuali nel promettere la fedeltà, consistevano nel baciarsi l'un l'altro a vicenda i Conjugandi, oppure nel porgerli a vicenda la loro destra mano, e quella era una forma generale di ratificare ogni accordo. Prima che il maritaggio venisse solennizzato, esser dovevano consultati i bugiardi loro Numi, ed esser doveva implorata la loro assistenza ed ajuto con precj, e con sacrificj, i quali venivano offerti ad alcuna di quelle false divinità, la quale a simiglianti faccende soprintendesse, e questo dovea esser fatto dai Genitori, oppure dai parenti più stretti di coloro, che dovevano accasarsi. Allorchè veniva aperta la vittima, venivano strappato fuori il fiele, e gettato dietro all'altare, come essendo quasi la sede della collera, e della malizia, e per conseguente l'avversione, ed abominio di tutte le Deitadi, alle quali era a tuore l'amore non meno, che di quell'eziandio, che divenivano loro Protettrici, ed alle quali si erano gli Sposi votati. Rispetto poi alle ceremonie pertinenti alla Sposa, ed allo Sposo, veggansi i rispettivi Articoli SPOSA e SPOSO.

Le ceremonie e riti de' matitaggi Spartani, come son differentissimi da gli altri tutti, meritano, che ne sia fatto parola

P p 2 disse

distefamente, e noi gli esporremo quì tali quali appunto ci vengono descritti, e distefi da Plutarco.

„ Allora quando, dice egli, gli Spar-
 „ tani avevano in animo d'accalarfi, la
 „ loro galanteria, od amoreggiamento si
 „ era una spezie di ratto delle persone,
 „ che loro andavano per tal fantasia, e
 „ che bramavano compagne del letto lo-
 „ ro: e queste tali non sceglievano es-
 „ sè già fra le ragazzette di tenera età, e
 „ mezzobambine, ma fra quelle, che tro-
 „ vavansi nel vero fiore dell'età loro, e
 „ veracemente buone da marito. Venen-
 „ do accordate le faccende infra essi la
 „ Νυμφίον, o dir la vogliamo colei,
 „ che manipolato aveva tutta la mine-
 „ stra, radeva i capelli della Spofa rasen-
 „ te alla pelle di lei, vestivala da uomo,
 „ e lasciava tutta sola sopra ona mate-
 „ rassa. Ciò fatto, il galante, o sia no-
 „ vello Sposo, entrava colà abbigliato
 „ alla foggia sua usata, tutto compolto,
 „ e sobrio, e moderato, ed avendo cena-
 „ to secondo il suo solito nella Sala co-
 „ mune, ed essendosi scaricato del ventre,
 „ e fatti i suoi agi non altrimenti che
 „ trovato si fosse in casa propria, entra-
 „ vasi tutto solo, nella camera, ove giace-
 „ vasi la Signora, slacciavale il vergi-
 „ nal cinto, e ponevasela fra le sue braccia.
 „ Dopo d'esserli trattenuto con esso lei
 „ per brevissim'ora, tornavase colui ai
 „ suoi Camerati, coi quali egli continua-
 „ va a spendere la sua vita, rimanendosi
 „ con esso loro non meno il giorno, che
 „ la notte, se non in quel brevissimo
 „ tratto di tempo, ch'ei rubava, come
 „ per andar a fare i suoi agi, nel quale
 „ faceva la cortissima sua visita alla Spo-
 „ sa; e tutto questo non dovea egli già fa-
 „ re senza cautela grandissima, e circon-

„ spezione, e senza timore di non veni-
 „ re scoperto. Nè la Spofa simigliante-
 „ mente dovea mancare (siccome può
 „ altri naturalmente immaginarsi) per la
 „ parte sua, d'usare tutta la sua scaltrez-
 „ za per cogliere le opportunità più fa-
 „ vorevoli per trovarsi insieme, e per fis-
 „ fare collo Sposo i loro appuntamenti,
 „ allorchè i Compagni di lui trovavansi
 „ fuori di casa, e dilungati altrove. In
 „ maniera simigliante quelli novelli Sposi
 „ vivevansi per lungo tratto di tempo,
 „ di modo che avevano ben spesso colo-
 „ ro dalle loro mogli dei figliuoli, prima
 „ che esse comparisser tali alla pubblica
 „ luce. Il costoro trovarsi insieme essen-
 „ do così difficultoso, e raro, non sola-
 „ mente serviva per un' esercizio conti-
 „ nuo di loro temperanza, ed addicevasi,
 „ e promuoveva grandemente i fini, e le
 „ intenzioni del matrimonio; ma era simi-
 „ gliantemente un' efficace mezzo per man-
 „ tener vivo, e nel suo fiore l'amore, il
 „ quale scema, illanguidisce, e viene al-
 „ la per fine a mancar totalmente, ed a
 „ morire col soverchio agevole accesso,
 „ e collo starli continuo, e lungamente
 „ in compagnia dell' oggetto amato. Veg-
 „ gasi Potter, Archeol. Græc. loco citato,
 „ pag. 295. 296.

Secondo le Osservazioni di Monsieur Kerserboom da cento Matrimonj ne vengono a nascere ad un di presso trecento venticinque figliuoli. Veggansi le Transaz. Filosof. num. 468. Sezione 3.

Monsieur Kerserboom dalle sue osservazioni medesime stima la durazione de' Matrimaggi, l'uno coll'altro, come apparisce dall'appresso Tavola.

Coloro, le età dei quali, prese insieme, fanno

40.	vivono insieme fra i	24.	ed i	25.	anni
50.		22.		23.	
60.		23.		24.	
70.		19.		20.	
80.		17.		18.	
90.		14.		15.	
100.		12.		13.	

Veggasi le Trans. Filosof. num. 468. Sezione III. pag. 319.

MARLO. Quelle terre appellate con propria particular voce *Marli* nelle parti Sett.

Settentrionali dell' Inghilterra, contengono del sabbione, e precipitano in una specie di terra grigia, o sia terra da innetti. I marli di Suffex s'accolano di vantaggio all'indole del letame, o concime, e perciò sono estremamente grassi e ricchissimi terreni.

Il marlo, generalmente parlando, accostasi grandemente all' indole, e natura del gesso, ed i pentolaj sperimentano, che allora quando od il marlo, od il gesso medesimo avvenga, che trovinsi mescolato colla loro creta, quella abbruggiassi insieme con tutta l'altra sostanza, tutto che i vasi compariscano sommamente sani, ed intatti; ma subito che vengavi posta denir' essi dell' acqua, quelli vasi disfarannosi, avvegnachè il marlo, od il gesso siasi nella fornace incotto, e formatosi in una specie di calcina, di modo che coll' acqua si smorza, e s'ammorbidisce non altrimenti che facciassi la calcina comune.

I marli, che sono a segno arenosi, che a steno possono far presa, ed impastarsi insieme, sono un egregio governo, o concimatura per i terreni di natura fredda argillosa, e fanno un'eccezione di quella notissima regola generale, che il marlo non dee mettersi in opera colla creta. Il marlo però, generalmente parlando, fa riuscita migliore nei terreni d'indole calda, come quello ch'è acconciissimo a legare, ed intristire i terreni argillosi; ma siccome non havvi regola alcuna, la quale soggetta non sia ad eccezione, ove il marlo non diacesi soverchio fiso, e ch'è non è d'una specie soverchio legante, verrà bene spesso a migliorare in guisa non esprimibile i terreni da pascolo, tuttochè trovansi questi in un suolo sommamente cretoso od argilloso.

Affaiissime fiata la pietra marlo, o marlo indurito in parecchi paesi vien trovato sotto la creta, oppure sotto i terreni bassi negri, alla profondità d'otto, di nove, ed anche di dieci piedi: alcune fiata la creta, ed il marlo acciaja sotto i terreni arenosi. Nei terreni cretosi poi, od argillosi, non istanzia più profondamente dell'altezza di circa tre piedi; ma nei terreni sabbionosi trovasi soventi volte molto più approfondato. Il marlo di Suffex fassi comunemente vedere bassissimo infra gli strati rotti delle terre solpese.

Per iscavare il marlo servono comunissimamente quei nostri operaj di vange, di marre o zappe, di pale, e di carriole; ed ove la cava è ampia e dilatata, sicchè con agevolezza possano coloro ascendere, servono per levarlo di colà entro, e trasportarlo in piccioli carretti fatti a cassettoni lunghi quattro piedi e dieci dita, due piedi e tre dita larghi, e della profondità a un di presso di quelle quattordici dita fatti in guisa che buona soma di marlo vien quinci con estrema agevolezza trasportata.

Vien supposto, che il marlo sia amico ai terreni, e fruttifero per le qualità sue saline, ed oleose. Vien supposto, ch'ei contragga il sale dall'aria; e perciò molti portano opinione, che il marlo sia tanto più perfetto e migliore quanto più lungamente rimangasi esposto all'aria. Sogliono pertanto i nostri villani distenderlo sopra i terreni erbosi in alcuni luoghi tre, o quattro anni prima, che ponganvi dentro l'arato; ed allora quando cuoprono coloro le terre arative col marlo, non v'approfondano in alcuni luoghi l'arato, le non se superficialissimamente, e, come acconciamente direbbesi, a fior di terra, ed alla sola profondità di un dito, e ciò affinchè non vengano a sotterrarlo. Il Markaam, a vero dire, è di sentimento a questo contrario; avvegnachè ei piuttosto vorrebbe, che fosse internato, e sepolto entro la terra ad una assai maggiore profondità, e questo perchè il Sole colla sua forza non venisse a spogliarlo della sua virtù.

I marli di luoghi diversi sono per se stessi differenti infra loro a segno, che in parte sembrerebbero giuste, e diritte tutt' e due quelle opposte opinioni. I marli di Suffex viene sperimentato tuttodì, come fanno riuscita infinitamente migliore, se vengano sepolti a qualche buona profondità nel terreno, subito che sieno stati zappati, od estratti dalla loro cava; e quelli per lo contrario delle parti settentrionali di Inghilterra appena fanno il menomo beneficio ai terreni, nei quali vengon posti, qualora non sieno stati prima per lunghissimo tratto di tempo esposti all'aria.

L'esperienza dei nostri fattori Campagnoli, e degli Assituarj ha similmente-

mente

mente fatto vedere in differenti luoghi, come debbon'essere osservati tempi differenti per istenderlo, e sparpararlo sopra il terreno, a norma, e secondo l'indole, e natura del marlo medesimo non meno, che di quella del terreno, che dovrà essere per mezzo di esso marlo migliorato. I campagnoli di Suffex stendono sempremai il marlo loro sopra le Terre nel principio dell'Invernata: e nella Provincia di Stafford fanno questo medesimo lavoro nei Mesi di Maggio, e di Giugno. Il marlo di buona qualità si smorza, e stemprasi non altramente che facciali la calcina comune col calor del Sole in una giornata, che corra calda, massimamente se sia caduta alcuna pioggia. Alcuni Fattori campagnoli fanno lavorar coll'erpice la terra, ed appianarla sopra il marlo appunto prima di arare i terreni medesimi, e questo metodo è, a vero dire, sommamente dicevole, ed acconcio per mescolarlo perfettamente. I semi di cavolo, gli agli, e le specie tutte di erbe da metitura, fanno egregia riuscita nei terreni governati, e preparati col marlo. I terreni stabiliti ed aggiustati sul marlo sogliono comunemente essere ricchissimi, ed ubertosi tutto che nella lor propria natura il marlo si è freddo, e pesantissimo. Questi terreni così governati quanto più sprofondi faranno, e quanto più rivoltati coll'aratolo, tanto più abbondevoli, e copiose faranno le raccolte, che si faranno. Veggasi *Morsimer*, della coltivazione, pag. 95.

Ella si è una circostanza sommamente materiale nell'affare di dare il marlo ai terreni, il vedere qual copia di somigliante concimatura quel dato terreno richiegga; e poichè l'esperienza ci avrà in tutto, e per tutto fatto veder questo, sarà sempre cosa migliore lo sgarrare in gittarvene, e distendervene troppo poco, che in copia soverchia; avvegnachè questo secondo errore sia tale, che non ammetta rimedio. Dee essere similgiatamente osservato, come il marlo non produce il primo anno quel sommo miglioramento nei terreni, che produce poi gli anni susseguenti.

Nella Provincia di Stafford in un' jugero di terreno della specie comune so-

gliono gittarvi, e stendervi duecentaja di sode di marlo; ma ove il suolo è nero, sciolto, e sabbioso, oppure ove è pieno di lombrichi, e di altri vermi, ve ne sparpancranno benissimo tre, ed anche quattrocento sode per cadauno jugero; sendo presso di quella gente una Regola, che questa data specie di terreno non può esser giammai sopracaricata di marlo. Se la terra, o terriccio sia fottile, dovravvisi spendere minor copia di marlo: se per lo contrario sia profonda, sarà di mestieri il gittarvene molto più.

Egli si è partito sempre migliore quello di seminare i terreni preparati, e governati col marlo sotto il solco; avvegnachè se questi dati terreni sieno bene, ed a dovere coltivati, riusciranno sommamente teneri, concavi, e soffici, lo che verrà a cagionare, che la terra s'affonderà, e lascerà le radici del grano, qualora rimangasi soverchio alzata, e sollevata. Se il marlo intristisce il terreno, oppure se viene a renderlo fisso, o legato, fa onninamente di mestieri, che sia ben bene concimato con del lerame, e lasciato per erba, o fieno. Nella Provincia di Stafford, dopo che quella gente ha governato, e preparato i propri terreni col marlo, il loro metodo si è di fare le seguenti raccolte. Dopo che è venuta a capo la prima raccolta di frumento, essi arano il terreno medesimo sopra la stoppia nel mese vengente di Dicembre; e se la stagione corre gelata, sicchè non sia morbido, e maneggevole, non pongonvi l'aratolo se non se nel futuro mese di Aprile. Allora vi seminano l'orzo, assegnando tre staja di sementa a ciascheduno jugero. Il prodotto comunissimo di queste tre staja si è trenta staja di buona misura. Dopo di quello vi seminano i piselli, per la qual semina arano una sola volta il loro terreno messo a marlo nel seguente mese di Febbrajo, non assegnando a ciascheduno jugero più di tre staja di sementa, appunto come si fanno rispetto all'orzo. Quindi dopo questa raccolta, se essi abbiano l'intenzione per sei raccolte, seminano di bel nuovo sopra la raccolta dei piselli il frumento: la quinta semina, o raccolta è di bel nuovo similgiatamente di orzo; e finalmente la

TAC-

raccolta del sesto anno si è di vena rossa. Alcuni seminano i terreni medesimi talvolta due, o tre volte di più, o fanno due, o tre altre raccolte, vale a dire, otto, o nove, allorquando il terreno è stato ben caricato di marlo; ma farà sempre miglior consiglio il non passare le sei raccolte, e lasciar così il terreno.

«Nello scavar che fanno in Irlanda il marlo pel governo delle campagne, imbattonsi coloro in corna fossili od in altri fossili curiosissimi. Il marlo sempre, e costantemente stanzia nel fondo dei pantani, o terre paludose assai basse. Non si dà mai il caso, che trovinsi altrove, e vien trovato per via di forare a forza di succhielloni fatti apposta per somigliante effetto. Stanzia nei divisati luoghi comunemente profondo sotterra all'altezza di cinque, di sette, ed anche di nove piedi. In certi dati luoghi non può ottenersi il marlo, senza soccombere a spese assai considerabili, e questo massimamente per l'opera, che vi vuole per dilungarne da quei dati pantani l'acqua. La maniera di scavarlo è la seguente:

«Impieganvi i proprietari, o coloro, che lo fanno cavare, (sei ben capaci operai), ed un'altra persona, cui essi addimandano il soprannumerario: e costoro tagliano, e fanno una fossa, o foro di dodici piedi quadrati, e questa vien supposta una fossa, o cava, che possa esser ridotta a termine, e fatta da un tal numero di uomini in una sola giornata. Due uomini zappano, o vangano, due altri l'ammucchiano da un lato, e due altri lo scaglian sopra; ed il soprannumerario supplisce a tutte quelle mancanze, che avvenir possano nel divisato lavoro. Per i primi tre piedi della fossa vanno coloro zappando, o vangando per una terra, che si sbrava, e si stritola, e che è acconciissima per pietre combustibili, o materiale da fuoco. Sotto questa specie di pietra combustibile stanzia uno strato di ghiaja della grossezza a un di presso di mezzo piede. Sotto di questo assai sovente pel tratto di tre buoni piedi, e talvolta di vantaggio, trovavisi una specie di muschio acceodibile, che sarebbe ottimo per materiale da fuoco. Questo più basso strato di zolle arisce è sempre, e

costantemente pieno tutto di legno fossile, il quale è di ordinario così morbido, e soffice, che la vanga, o la zappa agevolissimamente lo tronca in toccandolo, non altramente che ella facciafi della terra medesima, nella quale quello legno si trova. Sotto di questo poi nel breve tratto di circa tre dita, trovavisi comunemente una serie, o congerie di foglie, e massimamente di quelle della quercia. Quelle compariscono all'occhio bellissime, e saldistime; ma se vengano semplicemente toccate, si stritolano, e vanoo in minuzoli; e siffatto strato viene talvolta ad essere interrotto da vastissimi mucchi di femi, che sembrano di ginestre, e di scope di bosco. In alcuni luoghi compariscono delle coccole di spezie differenti; ed in altri parecchie spezie di pisote marine, tutte diacentisi nella medesima maniera confusa, non altramente che le foglie di quercia. Sotto questo strato vegetabile stanzianne altro di una creta paonazza della grossezza di un buon mezzo piede, e piena comunemente di nicchi, e conchiglie marine. Questa creta, od argilla paonazza non è così sissa, ed attaccaticcia, come l'argilla comune, ma vien portata fuori, e diligentemente ammonciata a parte, ed è messa in opera non altramente che il marlo medesimo in alcuni luoghi. Ultimamente sotto di questa sempre e costantemente si fa vedere il verace, e genuino marlo. Lo strato di questo suole comunemente essere della grossezza dei due sino ai quattro piedi, e talvolta ancora assai di vantaggio. Veggansi le *Trans. Filosof.* n. 394. pag. 122.

Questo marlo comparisce all'occhio somigliantissimo alla calcina sepolta, ed è pieno zeppo di nicchi, e conchiglie, che sono di ordinario di una picciola grossezza, e della specie delle lumache, o chiocciolate; ma di tratto in tratto altre forti parecchie ve ne vengono trovate di quelle conchiglie infra esse. Fra questo marlo, e con assai frequenza nell'effettivo fondo del medesimo trovansi congerie in onmero strabocchevole di corna grossissime della specie delle corna di Cervo, che dal volgo vengono appellate coroa della gran bestia. Queste in quella parte, ove appunto si uniscono alla testa, sono assai

affai faticce, spesse e rotonde; ed in questa giuntura forgevi fuori una ramificazione, che è della lunghezza a un di presso di un piede, e sembra, che sia stata appunto sospesa sopra gli occhi dell' animale: seguita a crescere, e venir su rotondo presso che un buon piede sopra quella attaccatura, o giuntura, e poteva va dilatandosi, e spandendosi, e va finalmente a terminare in lunghi, e rotondi rami voltantisi con una picciola piegatura. Gli operaj vengono obbligati a lavorare in tutte queste fosse, o cave, con della confusione, e scompiglio, di modo che rade volte vien loro fatto di cavar fuori queste corna belle, ed intiere. Simigliantemente alcune volte trovansi colà entro sotterrate delle ossa, delle zampe, o di altre parti del corpo o scheletro della medesima bestia, ma queste affai più di rado, e pochissime volte insieme, ed in pochissimi luoghi soltanto si trovano.

Il Marlo nella medicina vien riputato un medicamento astringente, come tale prescritto dai medici nelle diarree, nelle dissenterie, e nelle emorragie, per la quale ultima intenzione certuni preferiscono quello della spezie russa, tuttochè la differenza non è gran fatto meritevole di riflessione. I Tedeschi lo somministrano similmente nelle febbri, nelle convulsioni, e massimamente nei casi epilettici; e di pari danno nelle interne ammaccature, o contusioni.

MARLO a dadi. E' questa un' espressione, colla quale dinotano i Contadini della Provincia di Stafford una spezie di marlo rossiccio, il quale va rompendosi in pezzetti quadrati, o cubi somigliantissimi ai dadi, oppure anche in sottili fiocchetti, non altramente che facciano le miniere del piombo, e comparisce morbidamente, e liscio nella sua superficie. Fa questo un'ottima concimatura, o governo dei terreni: la via di giudicare quale di esso sia migliore, si è quella o di esporlo all'aria in una stagione piovosa, o di metterlo nell'acqua stessa. Quello, che ammorbidece più presto nell'aria umida, e che nell'acqua si rompe e si disfa incontanente, è indubitato, che è dell'ottima qualità; e messo in opera nei ter-

reni, gli migliora con sicurezza, e gli rende sommaramente ubertosi.

MARMO. Il marmo, *marmor*, nell'istoria naturale.

Compongono i marmi un genere particolare di fossili, i caratteri dei quali sono i seguenti:

Sono questi lustre, e bellissime pietre, composte di picciole disgiunte concrezioni, mezzanamente dure, non facenti fuoco coll'acciajo, e fermentanti con i mestruai acidi, ed essendo scioglibili entro i medesimi; e finalmente calcinantisi in un fuoco leggiero.

Per mezzo di simiglianti caratteri i marmi, propriamente così appellati, vengono ad essere distinti dai porfidi, dai graniti, e somiglianti, i quali sono propriamente, e veracemente pietre di una spezie differentissima e tutt'altra, come quelli, che son composti di partielle differentissime, e che mostrano realmente proprietà contrarie. Veggasi l'Articolo PORFIDO, ec.

Sono i marmi un genere di corpi, che vien supposto essere interamente, e perfettamente conosciuti, perchè veduti tutto giorno, e messi continuamente, e comunemente in opera; ma, se vogliamo dire la cosa come realmente ella si è, malgrado questo, fanno questi un punto peravventura il più confuso, e meno inteso, e conosciuto di quello sieno i corpi tutti di spezie somigliante. Coloro, che lavorano nei marmi, nulla fanno più rispetto ai medesimi; salvo che questi o sieno per ricevere, o per non ricevere una pulitura, e lustro in un grado perfettissimo; e che quel tal dato marmo può essere lavorato, e quell'altro per lo contrario ricusa i ferri; e per quello appartien si ai dotti, e scienziati uomini, si sono peravventura finora fatti a considerare i marmi niente meno superficialmente, che i grossolani artefici, e ne fanno forse meno di loro.

Erano i marmi una di quelle serie di corpi, che dai buoni Antichi erano ottimamente ben conosciuti, e ciò può darci lume non picciolo per investigare la verace loro istoria, qualora ci potremo a fare una esatta e seria attenzione a ciò, che dai medesimi ci è stato lasciato ris-
guar-

guardo ai marmi stessi, e se ci porremo ad investigare quali fra essi marmi a noi noti quelli si fossero, che presso di loro erano in uso, e quali noi di presente non conosciamo, e finalmente con quali nomi noi di presente appelliamo il loro *Augustum*, a cagion di esempio, il loro *Tiberianum*, il loro *Lucullum*, e gli altri tutti. Questo può benissimo servire a somministrare un piano certo, ed un istoria di ciò, che essi conoscevano, e può similmente procurare peravventura ai Muratori, agli Scultori, ed agli studiosi delle cose naturali, e della Fisica, alcuni nuovi usi, se non nuovi in origine, certamente nuovi nuovissimi a noi, di parecchi di essi marmi. Veggasi *Hill*, Istoria dei Fossili, pag. 461. Veggasi di pari gli Articoli LUCULLO, AUGUSTO, ec.

MARMO EGIZIANO. E' questo un nome assegnato dai nostri Artefici ad un vaghissimo, e bellissimo marmo verde, e bianco, che è in grandissimo uso presso di noi, e che viene condotto in copia grande dall'Egitto, non meno, che da altri luoghi. Egli era di parti frequentissimamente in uso non meno, che in ultima grandissima presso i Romani Antichi, i quali ricevevano similmente dall'Egitto, e ne distinguevano, a vero dire, troppo superficialmente, due specie dalla differente disposizione, ed ordine delle sue varie vene, e perciò onoravano con i nomi di due loro Imperadori, nel Regno de' quali questi due marmi vennero per la prima fiata messi in opera. Si furono questi il marmo Augusteo, ed il marmo Tiberiano, *marmor Augustum*, & *Tiberianum*. Quei dati pezzi, nei quali le varie appariscenze erano ondiate, e come tirate in archi, ed in figure circolari, dicevano marmo Augustano, *marmor Augustum*, e quei poi, che erano distinti, e segnati con vene più sparse, e distese qua, ed là, appellavano marmo Tiberiano, *marmor Tiberianum*. Erano queste tutte le differenze, che i Romani ponevano, e riconoscevano fra questi due marmi: se noi dovessimo arrivare a conoscere le specie differenti da differenze tali, quali queste sono, ci sarebbe giuoco forza il concedere, avervi presso che altrettante specie, quanti sono i pezzi di marmo, che cadono sotto.

Supp. Tom. III.

to gli occhi. Veggasi *Hill*, Istoria de' Fossili, pag. 482.

Similante specie di marmo in tutte le sue mostre, ed apparenze, è una massa, la quale, tuttochè sia bellissima, ella si è però sommaramente rozza, irregolare, e variata. E' questo marmo di una tessitura compatta, e mezzanamente pesante, e con somma proprietà esser può denominato un marmo verde sparsa variamente di vene bianche, e ciò appunto perchè quelli due sono i suoi colori più risaltanti, e più appariscenti: Ma questi stessi due colori trovansi in esso marmo mescolati con una varietà così grande di altri colori, che viene a somministrarci lameggiature, ed ombre senza numero di gradi di colori diversi. Oltre a questi ha di pari questo marmo parecchie altre vene varie di un colore oscuro approssimantesi al nero. E' questo marmo assai lustro, e rilucente, allorchè sia rotto di fresco, ed anche tal mostra di sé apparisce varia in parti varie del medesimo. Nelle parti bianche è più risplendente, e lucido, che in qualsivoglia altra parte; e gli altri colori sono via via rispettivamente più lucidi, quanto sono più pallidi, o che vanno vicinaggionemente approssimandosi al bianco. Ha però questo marmo fra le altre sue particelle alcuni pezzi di un talco sfogliato di un verde estremamente bello. Tutta la sua massa è capace, e suscettibile di ottimo pulimento, ed è comunissimo nelle tavole, ed in fornigianti comodità nelle Case della civile, e colta gente del mondo. Veggasi *Hill*, Istoria de' Fossili, pag. 481.

MARMO CORALIDE. Così vengono denominati nell'Istoria Naturale dagli Autori quei tali dati marmi, i quali trovansi avere incorporati, immersi, ed immescolati per tutto la lor massa dei pezzi di coralli, o mostre dei medesimi, o di corpi di questa specie: come anche trovansi perentro ai medesimi sepolci dei nicchi, e conchiglie marine, e che vengono a formare una parte del corpo di altri marmi.

Hannovi parecchie specie di marmo soggette a sostenere questi corpi; ma noi ne abbiamo in Inghilterra principalmente in uso due, uno, cioè, di un nero bigio-
Qq
lo,

lo, e l'altro di un finissimo color nero di getto assai garico.

La prima di quelle due spezie di marmo trovasi nella Provincia di Derby, ed i coralli, che in questo marmo si contengono, sono della spezie porosa, e di una delle più vaghe, ed appariscenti spezie del Mondo: trovansi questi coralli stanziati in esso marmo in qualsivoglia angolo, ed in tutte le direzioni, e sono generalmente della lunghezza ad un dipresso di un dito, e mezzo, e larghi intorno a tre quarti di un dito, sebbene alcuni di essi coralli son più grossi, ed altri più piccioli. Sono questi marmi composti di lastre longitudinali, finissime, e sottilissime, e di un color bianco nevato, disposto, e piantato in ordini distinti, e finissimamente intersecate a certe date picciole distanze con delle sottilissime lastre trasversali: tutta la parte interna del corallo venendo ad essere così divisa in una spezie di cellette quadrate. Questa divisione somigliantissima ad una rete, scorre, e si distende per circa tre quarti del corpo; ma la sommità ha soltanto le lastre longitudinali, senza le cellette divise lastre trasversali. Egli è piano, ed evidente, che queste, innanzi che fossero ricevute entro il letto del marmo, erano mantenute in un fluido contenente uno spalto verde-bianco bellissimo; perchè l'annodatura del letto composta a foggia di rete, trovasi piena di questa materia; ma la parte aperta nella sommità non avendo lastre per contenere questa materia medesima, è rimasta vuota fino a tanto che non è stata ricevuta nel marmo, e vienvi trovata ripiena di una materia sericea comune del rimanente dello strato. Questa sostanza, allorchè sia stata ridotta a pulimento, ella è veramente in estremo bella, e vien messa in opera in lavori, ed ornati di genere vario di una mostra vaghissima. Trovasi questa in moltissime parti non meno della Provincia di Derby, che di quella di Wales.

L'altro marmo Coralloide, o sia marmo coralloide nero, è smigliantemente una spezie bellissima di marmo. E' questa una sostanza in guisa sommamente unita, e ferrata, compatta, e di una tessitura finissima, e sommamente uguale,

durissima, e di un color nero di getto estremamente fino, e garico, e suscettibile di perfettissimo pulimento. E' questo marmo assai graziosamente, e vagamente variato con bellissime, e perfettissime mostre di una coralloide porosa, approssimantesi di assai alla natura della prima, ma più picciola, e di una tessitura meno elegante, e meno vaga: fra queste Coralloidi poi havvi d'ordinario numero grandissimo di nicchi o conchiglie marine, non meno della spezie dei turbini, che di quella dei bivalvi. Trovansi questi nicchi stanziati in direzioni varie, e tutte queste sostanze, vale a dire, non meno le divise conchiglie, che i coralli, sono di un purissimo color bianco nevato; e siccome la materia, e la tessitura degli altri evidentemente fece vedere, che questi rimasti erano ripieni di spalto, prima che venissero ad essere immersi entro il letto del marmo: questi corpi, per altra parte, non conservando al presente parte menoma di loro tessitura originale, quantunque ritengano perfettissimamente la loro figura esterna, ma essendo tutti ugualmente composti del medesimo evidentissimo spalto bianco, mostrano chiarissimamente, di essere stati stanziati nel marmo vuoto, e nel loro proprio stato nativo originale; avvegnachè le cavitadi, non meno dei coralli, che delle conchiglie, o nicchi, trovatisi tutte esattamente ripiene della materia stessa del marmo; ma nello stato presente non hanno intorno a sè nè materia corallina, nè materia testacea, ma col tratto del tempo sono evidentemente periti, e le cavitadi, cui essi lasciarono nella liscia, e dura massa del marmo, vennero ad essere esattamente, e con somma finezza ripiene dello spalto diviso, che perciò vengono di presente a rappresentarsi le loro figure, non altrimenti, che essi corpi realmente ivi si trovassero. Veggasi *HHH*, Istoria dei Fossili, pag. 473.

Questo marmo vien trovato in copia abbondevolissima in parecchie parti dell'Irlanda, massimamente nelle vicinanze, e contorni di Kilkenny, e ne vengono condotte grandissime masse in Londra, ove mettesi in opera per farne dei cammini, ed altri lavori di uso, e di ornamento, e vien conosciuto comunemente dai

dai nostri Artefici sotto il nome di marmo di Kilkenny.

MARMO Alabandio. Così veniva denominato dai buoni Antichi una specie veramente assai rozza, e ruvida di marmo nero, che scavavasi nelle vicinanze della Città di questo nome nella Caria, ed era assai messo in opera da gli Antichi Romani nelle loro fabbriche.

MARMO Cnidio. Davano gli Antichi tal denominazione ad una specie di marmo, che scavavasi nell'Isola di questo nome, e veniva grandemente usato negli ornati delle fabbriche pubbliche. Era questo marmo di un bellissimo color verde, assai più eupio, e più carico di quello si fossero i Marmi di Tiberio, e di Augusto, e non svente l'interfusione di bianco. Noi c'imbarbiamo alcuna fiera a vederne nei frammenti delle fabbriche antiche; e gli Antiquari Italiani singolarmente lo caratterizzano con una denominazione, che anche presso di noi è stata ricevuta, ed adottata, e che esclude altra specie di marmo verde, vale a dire, di *Verde Antico*.

MARMO di Scio. Veggasi l'Articolo *Scio marmo*.

MARMO fondibile. Veggasi l'Articolo *FONDIBILE*.

MARMO d'Imetto. *Marmor Hyettium.* Veggasi l'Articolo *HYMETTIUM marmor*.

Imitazione del marmo nello Zolfo. Veggasi l'Articolo *ZOLFO*.

MARMO Giassese. Vegg. l'Art. *GIASSESE marmo*.

MARMO Lignite. Vegg. l'Art. *LIGNITE marmo*.

MARMO Lidio. *Lydiun marmor.* Veggasi l'Articolo *LIDIO marmo*.

MARMO Ligidino. *Lygidium marmor.* Vegg. l'Art. *LIGIDINO marmo*.

MARMO Lunese. *Lunense marmor.* Veggasi l'Art. *LUNESE marmo*.

MARMO Melio. *Melium marmor.* Veggasi l'Art. *MELIO marmo*.

MARMO Numidico. *Numidicum marmor.* Veggasi l'Art. *NUMIDICO marmo*.

MARMO Paris. *Parium marmor.* Veggasi l'Art. *PARIO marmo*.

MARMO Tasio. *Thasium marmor.* Veggasi l'Art. *TASIO marmo*.

MARMO Tiberiano. Vegg. *TIBERIANO marmo*.

MARMO Derby. Presso i nostri artefici, e lavoratori di marmi, è questa una denominazione attribuita ad una specie bellissima di marmo, il quale trovavasi in moltissimi luoghi della nostra Provincia di Derby, e che con assai frequenza vien messo in opera in Londra nelle fabbriche di Cammini da camera, ed in altri lavori di comodo, e di ornamento.

Ella si è questa una specie formamente singolare, e bellissima: la sua materia costituente, o componente si è un marmo bianchiccio scuro, pallido, finissimo, di un'assai fina serrata tessitura, e di un fondo, o tinta lucidissima, e risplendentissima. E' questo così pieno di entrochi, che questi vengono a fare più della metà della sostanza della massa; e questi tagliandosi in direzioni differenti, e prendendo un finissimo, e perfettissimo pulimento, vengono ad aggiungere un grado sommo di bellezza a tutto il marmo, allorchè è lavorato. Veggasi *Hill*, *Istoria de' Fossili*, pag. 479.

Le varie forme, nelle quali questi entrochi compariscono nella pietra, allorchè vien tagliata, potrebbero a buona equità far sospettare, che parecchi d'essi fossero alcuni altri Fossili: ma per lo contrario questo ad altro realmente non è dovuto, che al loro diacersi in qualsivoglia direzione perentoria la massa: ma allora quando questa sostanza viene accuratamente esaminata, i più grossolani di questi verranno trovati altro in sostanza non essere, se non le eid, che viene a formare un semplice Entroco ivi entro tagliato. Son questi di ogni, e qualunque grossezza, facendosi dalla grossezza di un grosso spillo, fino alla metà di un dito, ed anche di vantaggio.

MARMO Italiano. Veggasi l'Artic. *ITALIANO marmo*.

MARMO Kilkenny. Veggasi l'Articolo *MARMO Carolloide* qui sopra.

MARMO di Namur. Vegg. l'Articolo *NAMUR*.

MARMO Colorito. oppure il *Colorire dei marmi*. Il colorire i marmi è un'Arte assai delicata; ed assai di riuscire nella medesima, forse è che i pezzi del marmo,

colori, una volta, che sieno stati dati, rimangonsi perpetui, ed immutabili; altri poi vengono agevolmente a cangiarsi, a dileguarsi, a ivanire, a distruggerli. Così il color rosso dato col sangue di Drago, o con un decotto di legno Indico, verrà a totalmente esser dileguato dall'olio di Tartaro, nè il pulimento del marmo patirà quindi ombra menoma di danno.

Viene a darsi un finissimo color d'oro nella maniera, che segue:

Prenderai del sal ammoniaco erudo, del vetriolo, e del verderame, di cadauna di queste sostanze porzioni uguali: il vetriolo bianco farà sempre riuscita migliore: e poscia ne farai di tutto una polvere finissima perfettissimamente incorporata, e mescolata insieme.

Il macchiare il marmo ad ogni, e qualsivoglia grado di rosso, o di giallo, per mezzo di soluzioni di sangue di Drago, o di gambogio, può essere effettuato col ridurre queste gomme in polvere, e macinarle, e pestarle collo spirito di vino entro un mortajo di vetro; ma per i elementi più piccioli non vi ha metodo alcuno migliore del mescolare una porzioncella di cadauna di queste polveri collo spirito di vino entro un cucchiajo d'argento, e tenere il cucchiajo medesimo sospeso sopra i carboni accesi. Per mezzo similgiante verrà ad essere estratta una finissima Tintura, e con un pennellino intinto nella medesima potranno tirare belle sottilissime, e finissime tracce sul marmo, mentre è freddo, le quali, nel riscaldar dopo il marmo medesimo, od in un fuoco di arena, od in un forno da pane, quelle tracce approfonderannovisi grandemente, e rimarranno nella pietra perfettissimamente distinte. Ella si è cosa agevolissima il rendere il color terrigno del marmo rosso, o giallo, col metodo pur ora accennato, ed insieme lasciare in essa pietra le vene bianche. Questa faccenda dovrà esser fatta col cuoprire tutti quei dati luoghi, ove dee rimaner la bianchezza con alcuni spruzzi bianchi, od eziandio con della sola carta messavi a due, ed a tre doppj, o con altra cosa, che venga ad impedire, che il colore, che si vuol dare al marmo non penetri in quel-

le date parti. Tutti i gradi del rosso dovranno darsi al marmo per mezzo di questa gomma sola: una Tintura assai leggiera della medesima, senza dare il calore al marmo, darà al medesimo soltanto uno slavo color carnicio; ma le tinte più cariche e più forti glielo somministreranno assai più carico: a questo grado, se vengavi aggiunto l'ajuto del calore verrà a darlene uno vie più carico anco: ultimamente l'aggiunta di una porzioncella alla Tintura divisa, verrà a dargli una tendenza al nericcio, od a quel grado di rosso carico, che altri voglia procurare al marmo stesso.

Un color paonazzo, od azzurro può essere similgiante dato al marmo per via di sciogliere il girasole in una liscia di calcina viva, ed di orina; oppure anche nello spirito volatile d'orina; ma questo porta sempre, e costantemente una tal qual tendenza al porporino; siasi procurato, o colla liscia di calcina, e d'orina, oppure col sal volatile dell'orina medesima. Un paonazzo, od azzurro assai migliore, e messo in opera in una maniera assai più agevole, e piana, vien somministrato dal Girasole delle Canarie, che è una sostanza molto ben conosciuta dai Tintori. Fa di mestieri soltanto, che questo Girasole delle Canarie venga sciolto nell'acqua, e disteso poscia sul marmo con un pennellino. Questo penetrerà ad una considerabile altezza il marmo medesimo, ed il colore potrà benissimo esser accresciuto, col ritornare più fiate sul marmo col pennello di nuovo intinto nella soluzione sopra le tracce una volta tirate, o sopra le medesime linee. Questo colore è soggetto ad allargarsi, ed a spandersi irregolarmente; ma può benissimo esser contenuto entro regolari confini, col circoscrivere i suoi confini medesimi o le sue linee con dei letti di cera, o di altra qualunque siasi somigliante sostanza. Dee essere osservato, come questo colore dovrebbe sempre mai stender freddo sul marmo, che non dovrebbe da poi riscaldar tampoco il marmo stesso, come accennammo, doverli fare negli altri colori distesivi freddi, ed asciutti: ed un vantaggio grandissimo di sì fatto colore si è, ch'è vicino perciò ad essere agevolmente agiun-

giun-

giunto a quei marmi, che sono stati già per innanzi macchiati con altri colori, e questi sfenosi di qualunque sorta esser si vogliono, ed è una tinta bellissima, e che mantienfi nel suo fiore per tratto lunghissimo di tempo. Veggansi *Memoires Acad. Roy. Paris*, ann. 1732.

MARMORATO. *Vasellame cinese marmorato.* E' questa una denominazione data da moltissimi Scrittori ad una particolare spezie di porcellana, o vassellamenti di terra della China, che sembrano esser pieni di maglie, o tacche cementate. Questi vassellamenti dai Chinesi, i quali ne sono in estremo vaghi, e veracemente appassionati, vengono denominati *T'ou tchi*.

Questa Porcellana marmorata ell'è generalmente affatto bianca, alcuna finta paonazza, e rappresenta a capello un pezzo di porcellana della China, che si sia fatta prima spezzata, e rotta, e che i pezzi rotti sieno stati dopoi attaccati, o cementati insieme di bel nuovo ai loro rispettivi luoghi, e coperti con una vernice originale. La maniera di prepararla è in estremo agevole, e potrebbe esser da noi pare benissimo imitata. In vece della vernice comune della porcellana, o terra della China, la quale è composta di ciò, che da essi addimandasi olio di fasso, ed olio di selce mescolati, ed incorporati insieme, coloro la euoprano con una sostanza semplicissima, composta soltanto di una spezie di agate grossolane, calcinate, e ridotte ad una polvere bianca, e disgiunta, purgata, e separata dalle parti più ruvide, e grossolane a forza di acqua, dopo averla per lungo tratto di tempo macinata e pestata in un mortajo. Poichè la polvere statta sia nella divisata guisa preparata, vienvi lasciata umida, od in una spezie di crema con quell'acqua, che vienvi in ultimo luogo lasciata colla polvere, e questa pasta, o spezie di crema, o di farina, vien messa in opera non altrimenti che una vernice. I nostri cristalli servirebbono intieramente, e perfettissimamente per questa faccenda, e lavorio medesimo di pari, che le agate grossolane sopradescritte, ed il metodo di preparargli è la cosa più agevole del Mondo. Veggansi *Observations sur les Coutumes de l'Afrique*.

L'occasione della mostra, od apparenza singolare di questa sorte di Porcellana si è, che la vernice non intesefi, nè si spande ugualmente, ma vassì diffondendo in rivoli, ed in vene. Queste bene spesso vanno formandosi in una spezie di lavoro a mosaico, che a grandissimo stento esser può da altri preso per un effetto del caso. Se la China marmorata venga desiderata azzurra, coloro le danno prima una incamicatura generale di questo colore, coll'infondere il vassellame entro una vernice azzurra; e quando questa è intieramente asciutta, e seccata, viaggiano una seconda inverniciatura del divolato olio di agate.

MARTELLO. Il martello dell'orecchia, *malleus auricularis*, è un'osso lungo con grossa intestatura, con un picciolo collo, con un manico, e con due apofisi, una nel collo, cioè, e l'altra nel manico. La cima dell'intestatura è considerabilmente rotonda, o tondeggiata, e quindi si contrae per ogni, e qualunque verso al collo: non meno l'intestatura, che il collo trovansi in una situazione inclinata, e le prominente, e le cavità ivi trovantisi, corrispondono a capello a quelle, che si trovano nel corpo dell'Inco. Il manico vien ivi considerato da alcuni, come una delle apofisi del martello, ed in questo caso delle tre apofisi, egli viene ad essere la massima. Vien questo a formare un'angolo col collo, e coll'intestatura, in vicinanza della quale è alcun poco dilatato, e piatto, e va scemando grado per grado via via, che accostasi alla sua estremità. L'apofisi del manico denominata da altri la picciola, o la corta apofisi del martello, termina l'angolo già mentovato, essendo estesa, ed allungata alla volta del collo, e diacendo in una linea retta con quel lato, o contorno, od assilatura del manico, che è situata vicino ad essa. L'apofisi del collo, che vien detta cianziand apofisi gracile, in uno stato naturale ella è lunghissima, ma dentro così dilege, e sottile, che frangesi agevolissimamente, massimamente quando è asciutta; e questa è appunto la ragione, onde per lunghissimo tratto di tempo rimasero gli Anatomici all'oscuro della sua verae lunghezza. Ella
for-

forge dal collo, ed alcuna fiata ella comparisce molto più lunga di quello ella si è realmente, e ciò a motivo della giunta d'un piccolo asciutto tendine attaccato alla medesima. Allora quando il martello dell'orecchia trovasi nella sua vera situazione, l'intestatura, ed il collo del medesimo sono rivolti all'insù, ed all'indietro, il manico poi all'ingù parallelo alla lunga gamba dell'Inco, ma più all'infuori: l'apofisi del manico all'insù, ed esteriormente vicino alla porzione superiore dell'ortatura del timpano, in vicinanza del centro del quale trovasi l'estremità del manico: e l'apofisi gracile all'innanzi, raggiungente per ogni, e qualunque verso la fessura articolare nell'osso della tempia. Dalla cognizione di questo il martello dell'orecchia destra può esser conosciuto, e distinto da quello dell'orecchia sinistra, allorchè trovansi fuori dei loro rispettivi luoghi. Veggasi Winslow, Anatomia, pag. 49.

MASCELLA, *Mascella slogata*. La mascella inferiore rade volte viene a rimaner lussata, o slogata, come quella, che è assai stabilmente, e tenacemente sostenuta da validissimi, e gagliardissimi ligamenti, e muscoli in due seni nella base del cranio: ma allora quando da alcuno accidente ella vien forzata ad uscir quindi, e dilungarsi, se ciò avvenga da un lato solo, oppure da ambi i lati, ella viene in quello caso ad essere spinta direttamente all'infuori. Questo accidente viene accagionato alcuna fiata da un colpo, o percossa, oppure da una caduta, ma alcuna fiata egli avviene similmente dall'aprire, e spalancar soverchio la bocca in isbadigliando. Se la mascella sia slogata da ambi i lati, il mento rimarrà inclinato all'ingù, e la mascella verrà a sporgere grandemente innanzi: ma se ella sia slogata soltanto da un lato, il mento verrà ad essere inclinato verso il lato opposto; avvegnachè la picciola intestatura caduta della mascella non sia capace di slogarsi altramente, che all'innanzi, ed all'indietro. Quando la mascella trovasi fuori soltanto da un lato, la cura non è di ordinario gran fatto difficoltosa, e malagevole; ma allorchè trovansi slogate ambedue

l'intestature, e che non sono state sul fatto rimpiazzate ai rispettivi loro luoghi, vengono sempremai a produrre dei pessimi sintomi, come, a cagion d'esempio, dolori, infiammazioni, convulsioni, febbri, vomiti, e per fino la stessa morte; e questi sintomi vengono ad essere più violenti, quanto maggiore si è la distensione, ed allungamento, che soffrono i nervi, i tendini, ed i ligamenti adiacenti. Ma se un valente, e sperimentato Cerusico pongavi in tempo la mano, tutti questi orribili sintomi divisiati, coll'esser la mascella adeguatamente, ed opportunamente riallogata, vengono ad essere impediti.

Il paziente dovràssi adagiare in una seggiola bassa, di modo che un'ajutante chirurgico possa tener la testa di quello indietro di contro il suo petto ben fissa e stabile; quindi il Cerusico dee cacciare i suoi pollici dentro la bocca del paziente più indietro, che può mai, ma dovràssegli prima ben ben fasciare e rivoltare in un fazzoletto, e ciò non meno perchè non possano sdrucciolare, che perchè non possano essere danneggiati; le altre dita poi del Cerusico dovranno nel tempo medesimo essere applicate esternamente alla stessa mascella. Allorchè egli è giunto a tenere nella divisa guisa ben ferma la gengiva, e ad essersene renduto padrone, dovrà far forza validissima prima all'ingù, e poi premere validamente all'indietro, ed ultimamente all'insù. Queste differenti direzioni di forza debbono però esser date tutte in un istante medesimo; e per simiglianti mezzi, le cadute intestature della mascella vengono ad essere tutte in un tempo ricondotte entro le rispettive loro naturali cavità primiere; ma fa similmente di mestieri, che il Cerusico usi ogni maggior diligenza nell'esser sempre sommamente lesto nel tirar fuori della bocca del paziente i suoi diti pollici, avvegnachè altramente adoperando potrebbero rimanere schiacciati, rotti, o dimezzati nel riallogar la mascella.

In evento, che la mascella trovisi fuori di luogo in un lato solo, fa di mestieri, che in riallogandola si tenga il metodo a capello il medesimo, e basterà soltanto, che il lato slogato venga spinto e forzato più validamente, e con maggior forza all'insù.

ingid, ed all'indietro, che il lato sano. Quanto alle fasciature, in questo caso non vi abbisognano; qualora però la lussazione, o slogamento della mascella, non fosse rimasto così buon tratto di tempo, senz'essere riaggiustato: ciocciòsiachè in siffatto caso, non farà se non cosa ottimamente fatta l'applicarvi per parecchie giornate una fascia da quattro capi inzuppata in alcuno spirito corroborante, la quale potrássi levar via, allorchè il paziente pongasi a mangiare. Veggasi *Eislero*, Chirurgia, pag. 152.

Ci ha il dottissimo Monsieur Monrò somministrato un metodo di ridurre e riallogare l'osso della mascella, quando sia slogato. Ci asserisce questo valentuomo, com'egli ha sperimentato più di una fiera non efficace, e senza effetto il metodo proposto da Monsieur Petit di riallogare l'osso lussato della mascella, dopo che i muscoli son rimasti gonfiati da un imperito tentativo di riallogarlo; ma, che questo metodo riuscirà a maraviglia bene con un leggerissimo miglioramento, per le particolarità del quale noi ci riportiamo di buona voglia ai *Saggi Medici d'Edimburgo*, Volume 1. Art. 2.

Questo dottissimo Professore immagina, che l'opinione universale, che la mascella venga abbassata dalla sola forza dei muscoli digastrici, non sia sufficientemente fondata.

Fratture della mascella. La mascella, o sia ganascia inferiore, non è così soggetta alle fratture, come lo è il rimanente dell'ossa; ma allora quando ella è rotta quasi od in un lato, od in tutt'e due i suoi lati, le parti divise non disgiungonsi, nè allontanansi ad alcuna distanza l'una dall'altra.

Per riattare le ossa in una frattura della mascella alla loro propria, ed adeguata situazione primiera, fa di mestieri, che il paziente venga aggiustato di contro alla luce, e che la sua testa venga tenuta ben ferma, e fissata da un chirurgo ajutante. Allora il Cerusico dovrà introdurre il suo dito grosso, oppure il dito indice di una mano entro la bocca di lui, applicando l'altro esternamente; e per simigliante guisa dec comprimere i frammenti della ganascia sopra

cadaun lato, fino a tanto che quelli sieno giunti a riguadagnare la loro situazione primiera: la qual cosa può essere sempre conosciuta, e distinta dalla disposizione regolare dei denti. In evento poi, che alcuno dei denti sia trovato sciolto, o sdruciolato fuori, non farà mai cosa disacconcia, nè impropria, qualora cosa non abbiavi, che ciò impedisca, il riattare dopo, e rinfondere questi denti ai loro luoghi, e guaine rispettive, legandogli, e raccomandandogli con un filo di argento a quei tali denti, che trovansi prossimi, e contigui agli slegati. Poichè le ossa per simigliante modo saranno state acconciamente, ed adeguatamente riaggiustate, sarà di mestieri, che vengano prima coperte con un impiastro, e poscia con un buon piumacciolo ben inzuppato nello spirito di vino, ed applicato internamente: quello impiastro, e quello piumacciolo dovranno tener fermi, e ben raccomandati con una fasciatura a quattro capi forata nel suo mezzo per lasciar libero il mento. Ma allorchè vien trovato, che la mascella sia rotta da ambedue i suoi lati, ella è cosa usata assai l'introdurre, e l'applicare internamente, dopo il piumacciolo inzuppato nello spirito di vino, un altro fatto di tavola sottilissima, forato, ed aggiustato secondo la figura del mento nella seguente maniera: Il suo mezzo, che è forato due essere applicato, ed accomodato al mento, e le sue due estremità verso le orecchie.

Ma le fratture, o rotture di questa parte possonsi bene spesso curare sufficientemente bene senza impiastri, e senza tavolette, ove noi possiamo applicare comodamente un'acconcia, e conveniente fasciatura. Fa però di mestieri, che il paziente per alquante giornate vivasi di sostanze liquide, per ischifare il moto del masticare, e del muovere le parti, ed eziandio di favellare; e la frattura arriva ad essere perfettamente curata in simigliante guisa nel breve tratto generalmente di venti, oppure al più al più di trenta giorni. Veggasi *Eislero*, Chirurgia, pag. 119.

MASCELLE. Ossa delle mascelle, *Ossa maxillaria*. Le Ossa delle mascelle o seno le

le grandi ossa della gannascia, o mascella superiore, sono due di numero, a situare una sopra cialchedun lato, nella parte anteriore, e di mezzo della faccia. La loro conformazione è irregolarissima, e sono queste ossa di un' estensione formamente considerabile. Gli Anatomici dividono questa ossa generalmente in lato esterno, ed in lato interno. Per lato esterno essi intendono tutto ciò, che apparisce in un' intiero tefchio senza prendervi l'arco del palato; e per lato interno ciò, che fa parte del palato, e tutto ciò, che è rivolto, e piegato all' *septum narium*. La separazione di quest'osso per una picciola cucitura, o sutura trasversale dietro al foro incisivo, a stento grande si trova in altri soggetti, talvolta nei giovanetti, prima che l'ossificazione sia perfettamente compiuta. L'osso mascillare è pressochè tutto compatto, e senza diploe, salvo che nell'arco alveolare, e nel punto dell'apofisi orbitale.

Le Ossa delle mascelle trovansi attaccate, e connesse all'osso della fronte, all'Osso Etmoide, all'Osso Sferoide, alle ossa dell'ungue, alle ossa delle guance, alle ossa del naso, alle ossa del palato, al bombere, alle conche inferiori delle narici, e l'uno coll'altro. Queste ossa danno dell'ajuto, e prestano l'assistenza loro nel formar l'organo del masticamento, l'arco del palato, delle gote, delle orbite, del naso, e di fomiglianti. Veggasi Winslow, Anatomia, pag. 33. 34.

MASSA d'oro, d'argento. Questa massa d'oro, d'argento, e simiglianti, detta anche con tecnica voce stranota Bullion dagl'Inglese. Questa voce è apparentemente formata dalla consimilissima voce Francese *billon*, ed importa una massa d'oro, d'argento, e simigliante sotto prova, che il Du Cange ama meglio di far venire anzi dalla voce latina *billu*, non altrimenti che sia, *aurum*, aut *argentum in massam*, seu *billam*, idest, *baculum confectum*. Veggasi Trev. Dict. Univ. Tom. 1. 1044. 1045. in voce *Billon*.

La massa, o bullion d'argento viene simigliantemente denominata piastra. Veggasi l'Articolo PRASTRA. *Ciclopedia*, e Supplemento.

Per le Leggi della Scozia i Doganieri Supp. Tom. III.

nei trasporti degli ori dovevano esser pagati in bullion, od in massa, o piastra d'oro.

Da Monsieur Skene viene somministrato un'A, B, C, del Bullion, o massa d'oro &c. esprimente le quantitati di ciò, che i Mercadanti dovevano pagare per i trasporti degli ori fuori del Regno. Veggasi Skene, de Verborum significatione, pag. 32.

MASTICE. Gli Scrittori Arabi Avicenna, e Serapione, nei loro Capitoli dell'albero della trementina, fanno bene spesso parola del lenticchio, e della sua resina, cui essi affermano come era fomigliantissima alla resina dell'albero comune della trementina. Ma oltre a questo in Avicenna trovasi un Capitolo particolare sopra il Mastice. Quindi sembrerebbe, che pel termine Lenticchio essi non intendessero l'albero, che produce il mastice, siccome noi l'intendiamo, ma bensì alcuna specie particolare di albero della trementina.

Distingue Avicenna due specie di mastice, una cioè appellata *Rumi*, e l'altra *Cupri*. Il mastice *Rumi* veniva dall'Isola di Scio, ed era bianco: Il mastice *Cupri* poi era nericcio, e veniva condotto dall'Egitto. Veggasi l'Articolo LENTISCHIO.

La voce Mastice è simigliantemente usata, come di un'erba altramente appellata *Maro*. Vegg. l'Articolo MARO.

Terra Mastice, *Mastice terra*. E' questa una denominazione data dagli antichi Scrittori della Materia Medica ad una terra dell'Isola di Scio, detta anche perciò *Terra Chia*. La ragione di questa stranissima appellazione sembra essere stata, che venendo dall'Isola di Scio il mastice finissimo, e purissimo, avesse ottenuto il nome di *Kie*, o *Chie*, e così Mastice, e Chie, essendo per fissato modo divenute come due voci sinonime, l'uso di queste in fissata maniera venne ad essere vicinaggiamente dilatato, e la terra di quella Isola appellata così pel nome di questa gomma.

Sembra, che gli Arabi appianino, e spieghino questo maraviglia bene nel nome, che essi danno a questa terra, non appellandola essi già terra mastice, ma bensì *Thin beled Almastichi*, che è quanto

R r di-

dire, *Terra regionis Masfchis*, Terra di quel paese, ove è prodotto il Masfice.

MATER, *Mater metallorum*. E' questa una denominazione nell'Istoria Naturale data dai Mineralisti Sassoni non meno, che da quelli di alcune altre Regioni, ad una specie particolare di Marchesita, o Mondieo, cui essi suppongono, secondo l'espressione, esser la Madre, o la produttrice dei metalli.

Quella Marchesita, cui essi esprimono con questa denominazione, è la specie gialla comune, ma in uno stato pien di mondiglie, e lordo, trovandosi comunemente mescolata con essa una poverissima miniera di ferro, oppure alcuna materia di indole pietrosa, la quale vi ha fatto la sua concrezione sciolta, ed irregolare, e vieni talvolta trovata formata in sottilissime lastre ondeggiate, ed altre volte in masse complesse; ma ella si è sempre, e costantemente cavernosa, e spungosa, oppure tutta piena gremita di piccioli, o di grossi fori. Sono questi fori bene spesso vuoti; ma in alcuni pezzi stanziano entro questi fori, o porzioncelle di metalli puri nativi, oppure porzioncelle di ricchissime miniere di metalli. In alcuni pezzi perciò trovansi delle porzioni di rame nativo, ed in altri miniere di ferro, e di stagno. E viene asserito dai Sassoni, che in alcuni pochi pezzi vieni trovato il purissimo argento nativo in sottilissime lamelle.

MATERIA. *Materia Chemica*, materia chimica.

E' questa un'espressione usata dagli Autori per dinotare, e significare quei tali corpi, e sostanze, che sono, e fanno gli oggetti particolari delle Chimiche Esperienze.

La materia chimica in un senso più ampio ha luogo in tutti i corpi, e sostanze del globo, avvegnachè tutt'esse sieno soggetti della Chimica in un senso esteso; ma i curiosi nell'investigamenti, ed inchieste chimiche possono essere desiderosi di conoscere in generale, quali sieno quei corpi, cui essi debbano procurarsi, e per i quali debbano impiegare le loro sollecitudini. Il valentissimo e sommamente dotto Dottor Shaw ci ha dato una lista di quelli pel suo Laboratorio portatile, la qua-

le potrà servire universalmente di pari in ogni occasione particolare.

Questa raccolta essendo distribuita sotto proprie ed adeguate classi, verrà ad esser conosciuta in picciolissimo tratto, e perciò potrà esser comodissimamente trasportata o per terra, o per mare unitamente col suo utilissimo forno, da noi con estrema elasticità descritto (veggasi l'Articolo FORNO (*Supplemento*) e col suo necessario apparato Chimico.

La disposizione naturale della materia Chimica consiste in una divisione generale di sostanze animali, vegetabili, e minerali. Ma coloro, i quali sieno bramosi d'una raccolta più ampia, possono dilatare, ed allargare il numero delle divisioni generali, secondo il metodo del Becherò, per cui tutti i Soggetti Chimici vengono ad esser disposti, e collocati in otto Classi generali, vale a dire, metalli, minerali, decomposti, sali, gomme, terre, pietre, spiriti, ed oli.

La Classe dei metalli abbraccia l'oro, l'argento, il rame, il ferro, lo stagno, ed il piombo; e tutti questi debbon'essere conservati non meno nello stato loro naturale, che nel loro stato artificiale; ch'è quanto dire, nelle loro miniere, e come separati dalle medesime per gli usi degli uomini. A questi metalli naturali debbono essere aggiunti i metalli artefatti, o composti, vale a dire il peltro, il metallo da campana, il bronzo, il metallo da arme da fuoco, il metallo da spilli, il metallo da bagno, il metallo principe, il metallo di Londra, il rame bianco, l'oro bianco, e l'argento giallo. Sotto la categoria de' minerali son racchiusi l'antimonio, il bismuth, il peltro, la marchesita, il cobalto, lo zaffarro, lo smalto, l'arsenico, il manganese, l'orpimento, il mercurio, il cinabro nativo, e lo zolfo. Tutte queste sostanze debbon'essere conservate non meno nello stato loro naturale appunto come vengono scavate, e tolte via dalla terra, che nello stato loro purificato. Veggasi *Becher*, Fisica lotterranca, pag. 187.

Le sostanze decomposte de' minerali abbracciano l'oro fulminante, *aureum fulminans*, la Luna cornea, le calcine d'oro, e d'argento, l'oltremarino, il verdegeme di stillo.

stillato, il rame abbruggiato, lo stagno calcinato, lo zucchero di piombo, la cadmia, la tertzia, il piombo nero, il piombo rosso, il litargirio, il piombo bianco, il cristallo di piombo, il regolo semplice, ed il regolo marziale d'antimonio, il cristallo, ed il cinabro d'antimonio, le preparazioni d'argento vivo, come il sublimato, il precipitato, e gli altri simiglianti. La forte medesima di disposizione può simigliantemente aver luogo in moltissime specie di decomposti di sostanze animali, e vegetabili. Veggasi *Shew*, Laboratorio portatile.

La Classe dei sali abbraccia il sale marino, il nitro, l'allume, il vetriolo, il borace, il tartaro, lo zucchero, le ceneri da sapone, ed i flussi salini composti per le miniere durissime, e di malagevolissimo stemperamento. A questi sali poi esser dee aggiunta la Tribù tutta dei sali artefatti, del numero dei quali sono il tartaro vetriolato, il nitro filato, il tartaro solubile, la terra di tartaro sfogliata, il nitro nitrato, il sale ammoniac, i sali di Epsom, i sali volatili, e parecchi altri di un' indole, e natura a questi analoga.

Sotto la serie delle gomme noveransi la pece, la resina, la trementina, la cera, la canfora, l'ambra, il carbon fossile, il geatto spezie di pietra nera resinosa, e tutti i bitumi, i balsami, ed i sughi rapresi, o condensati.

Fra le terre hanno luogo le Miniere, le Miniere lavate, le calcine dei metalli, la calcina, lo stucco, il gesso, l'argilla, i boli, le conchiglie, l'arena, ed i fossili comunemente, a propriamente appellati terre, sianzi queste della spezie gessosa, sianzi della spezie vetrofa; che è quanto dire, le perentori il fuoco queste convertansi in una spezie di calcina, oppure se precipitino in un cristallo.

Le pietre racchiudono le focaje, le pietre vive, le pietre quadrate, il cristallo, il talco, le pietre volgari, e tutte le gemme cominciando dal Diamante fino agli spalti.

Ultimamente entro la serie degli Spiriti, e degli oli, comprendonsi l'acqua Regia, l'Acqua forte, l'olio di vetriolo, lo spirito di sale, lo spirito di nitro, lo spi-

rito di Zolfo, lo spirito d'allume, lo spirito d'aceto, lo spirito di vino, lo spirito d'orina, lo spirito di tartaro, lo spirito di trementina, l'olio di tartaro per deliquium, gli oli essenziali delle noci moscade, dei garofani, e simiglianti; gli oli spremuti di olive, di mandorle, di semenze di lino, e simiglianti; e finalmente gli oli composti, come il burro d'antimonio, i Balsami artefatti, e parecchi altri di tal fatta.

Egli si è facile, e piano il vedere, come questa maniera di ridurre sotto Classi, e serie non è acconcia, e propria per un Naturalista, il quale falsi a studiare, e ad esaminare i corpi tutti, e sostanze per le loro qualità naturali, nè tampoco, a vero dire, ella s'addice una tal foggia ad un esatto conoscitore, ed investigatore di qualsivoglia spezie: ma il Becchero in sì fatta maniera falsi ad addestrare i giovani operatori nella Chimica, affinché questi possano procurarsi una spezie di artificiale alfabeto della Natura, e questo, a vero dire, riuscirà egregiamente bene per l'intento, ove nulla più si ricerchi; e si voglia, che una mera e semplice materia Chimica, da essere posta, e piantata in un ordine tale, che il giovane possa ricorrere alla medesima interamente in ogni, e qualunque delle sue parti. Con questa dee il giovane, e non peranche bene sperimentato Operatore procedere regolarmente, che non altramente uno si faccia, il quale falsi ad imparare una lingua, ch'ei non sa. Formando le prime sillabe dal congiungimento di due, o di più lettere di questo alfabeto, e dopo le voci, ed i termini per mezzo di combinare questi congiungimenti primi insieme, ed ultimamente tutto, e l'intero discorso; che è quanto dire, formando questi varj semplici corpi, in misti, in composti, ed in decomposti, o sieno doppiamente composti. Veggasi *Becher*, Fisica sotterranea, pag. 179.

Per ischifare delle sconciature, per impedire di essere ingannati in questa faccenda, sarà cosa in estremo dicevole, e propriissima il coltivare una cognizione dei prodotti della Natura nello stato loro crudo, e dei luoghi rispettivi particolari di loro crescita, ove essendo prima di esse-

re raccolti o scavati, osservati, esaminati, e ponderati, potrà altri procurarsi, ed ottenere una cognizione esatissima di essi, come ce gli somministra la natura. Appunto per la mancanza di questa previa qualificazione, uomini, per altro di somma sagacità, son caduti in errori massicci nelle loro operazioni, e sonosi peravventura quindi dati a vituperare l'autore originale di un chimico ordinamento, o ricetta, a torto grandissimo, per essersi essi imbattuti in meri aborti non per altro, che per la divisa ragione; avvegnachè anzichè sienosi polti ad operare sopra un vero, e genuino soggetto, hanno impiegato, o gittato il loro tempo, operando sopra un cattivo, falso, adulterato, ed imperfetto. Da questo solo granchio preso, o, come noi anche diciamo, dal prendere una cosa per un'altra, son nati lamenti, e querele senza numero della insufficienza, falsità, ed incerto evento negli ordinamenti, e nelle esperienze proposte, e manifestate da Autori persino di conto grande.

Colui, il quale vorrà operare nei chimici lavori con soddisfazione non meno, che con ottima riuscita, dovrà procurare per ogni modo una raccolta sufficientemente abbondevole di una materia chimica di specie somigliante, di tutte le particolarità della quale dovrà esser con sicurezza, ed evidenza accertare, come anche di loro essere genuino, e di loro perfezione nelle rispettive loro specie. Questo essendo intieramente posseduto, toglierà la necessità fastidiosissima di spedire per ogni menomo incontro al Droghiere, ove altri siali in forse, se ciò, che ha avuto, sia genuino, od in uno stato adulterato, come pur troppo sovente avvenir suole. Allorchè questo Alfabeto di natura composto dei parecchi materiali delle chimiche ricerche si è somigliantissimo ad una cassetta da stampa, distribuito, e stanziato entro le adeguate rispettive celle, potrà perfettamente esser cavato fuori per uso, qualora lo richieda l'occasione. Egli si è impossibile l'esprimere con quanto picciola spesa, e con quanto lieve briga, e disturbo, ed insieme con quanto gran vantaggio, e compiacimento, possono essere fatte espe-

rienze numerosissime, e quelle eziandio di un genere sommarmente malagevole, e difficoltoso, allorchè l'operatore trovisi nella maniera divisa intorno a sé pronti, ed allestiti tutti i suoi necessaryi rispettivi materiali.

Ci assicura il valente Bocherò, come in somigliante guisa egli è giunto a fare con tutta la maggior perfezione fino a cinquanta esperienze in una sola giornata; e mentre egli scriveva sopra chimici soggetti, se mai gli fosse occorsa alcuna difficoltà, od incertezza, incontanente alzavasi dal suo tavolino, davasi a fare la necessaria esperienza, e quindi ponevasi tosto a seguitare la sua scrittura colla certezza del fatto alla mano; di maniera tale che egli afferma, che gli costava assai meno, ed aveva briga infinitamente minore nel porsi a fare la sua esperienza nel fuoco, di quello gli costasse in distenderne l'ordinamento colla penna.

MATRACCIO. Così addimandasi un vaso di purissimo, e sommarmente trasparente cristallo messo in opera nell'Arte del Saggiare, non soverchio fisso, e fatticio nel suo fondo, il quale renderebbero acconcio ad abbrugiarsi nel fuoco. Per uso somigliante esser dee perciò questo vaso di cristallo dell'altezza a un di presso di quelle otto, o dieci dita, e dee avere un foro, od orifizio appena della larghezza di un mezzo dito, e ciò affinchè le materie in esso contenute trovandosi in uno stato di bollimento violentissimo, e non s'alzino, e trascendano sopra la bocca del vaso medesimo, o perchè per lo meno non vengano feagliate fuori in forma di picciole goccioline, non alarmente che una sottilissima pioggia, le quali goccioline tiran via sempre, e costantemente seco, e trasportano alcuna porzione del metallo liquefatto. Il fondo è bastantemente capace, allorchè sia tale da contenere un'oncia, o due di acqua forte, e l'altezza del vaso è di un'uso ulteriore, vale a dire, serve egregiamente bene a produrre un maggiore ricadimento, o rimando, o ripercussione dei fumi. La bocca di questo vaso medesimo dovrà somigliantemente essere rivolta all'indietro, in forma di ampio, e dilatato labbro, affinchè le soluzioni,

zioni, allorchè ne vengono verlate fuori; non abbian luogo di scorrere all'ingidèi lati, o fiancate del vafomedefimo. Veggafi *Cramer*, arte del faggiare, pag. 68.

MATRICE. Ella fi è un'opinione del Boyle, che ficcome nella Terra, la quale è l'ubertofa fruttifera Matrice dei femi tutti delle piante, così nelle matrici degli animali tutti, mentre trovansi in proprio, acconcio, ed adeguato ftato di concepimento, fia onninamente neceffario, che vi concorrano tre cofe; vale a dire, un benigno calore, che rifealdi; una adeguata fermentazione, che ponga in moto, agiti, e dilati; ed una acconcia adeguata proporzione di umido difpofa a penetrare fenza contralto i pori aperti, e dilatati dalla fermentazione.

A qualità fimiglianti, e a null'altro, è dovuta, con tutta la maggiore probabilità, la fcarica, o corfo melfruale delle donne, venendo il fangue ad effer agitato, pofto in moto, e rarefatto in una parte deftinata a quefti ufizi per l'ufò di un feto racchinfovi; e quando quello feto ivi non infanzia, quello fluido gonfia, e dilata, ed apre i vafi in guifa, che viene a fgorgar fuori, e rompere in un profluvio. Ella è cofa offervabiliffima, che la matrice non meno nell'uomana, che in un'altra fpezie di animali di vantaggio, vale a dire, nelle Monne, o Bertucce, fcarica, e manda fuori quello fangue a tempi affegnati, e regolari; e gli altri animali tutti nel tempo dell'effervescenza in quefta parte, che è ad intervalli di periodi più lunghi, fcaricano foltanto una piccioliffima quantità di una materia acquofa, come appunto ravvifafi patentemente nelle cagne, nelle vacche, ed in fomiglianti. Viene offervato dagli fcriftori delle cofe mediche, avervi un' evidentiſſimo confenfo di parecchie parti del corpo colla matrice, vale a dire, parecchie parti del corpo, le quali fon fempres, e coftantemente affette con effa matrice, e che riconofcono il loro effer feconcerate ed affette da alcun difordine, e feoncerto di quella parte, che viene a propagarfi da quella, e ftenderfi alle parti medefime.

I buoni antichi portavano un' opinione di ſimpatria in fimigliante occeſione;

male ofcure, ed inintelligibili ſpiegazioni, e ſcioglimenti di una tal fatta, fono ai di noſtri, e con ragione grandiffima avvertiti in non cale, e poſti da un lato; e noi tocchiamo con mano, come queſta congiunta affezione di parecchie parti del corpo alla matrice è unicamente, e foltanto dovuta alla vicinanza delle parti medefime, oppure alla comunicazione, ed alla ſtruzione dei vafi, dai quali i liquori viziati del corpo eſſendo condotti da una parte all'altra, poſſonvi beſiſſimo riſvegliare, e produrre o le medefime affezioni, o differenti. Ma perchè queſta via di ſimpaticismo dai vafi contiene moltiffime varietà ſommamente conſiderabili, e nulla affatto ovvie, forſ'è che queſte vengano diſteſamente, e con ordine acconcio eſaminate, e ponderate, a fine di giugnere ad avere una perfetta cognizione, ed intelligenza degli effetti, che da eſſe vengono ad eſſer prodotti. La diverſità, e gli uſi varj dei vafi nei corpi degli animali più perfetti fa di meſtieri, che ſia conoſciuta, e bene inteſa; e la neceſſità del moto, e del ſenſo dipendenti dal cervello, dagli ſpiriti animali, e dal ſiſtema nervolo, debbe fimigliantemente eſſere conſiderata, e ponderata. Eſſendo bene, e perfettamente compreſi la natura, e l'ufizio delle diviſe cofe, egli apparirà evidentiſſimamente, come eſſe trovandoſi così diſperſe per tutto il corpo, non poſſono, ſe non produrre un conſenſo di parti per quello tutto; ma che queſto conſenſo verrà ad eſſere grandemente ſenſibile, ove le conneſſioni faranno grandiffime, e meno ſenſibile, ove queſte faranno minori. Veggafi Boyle, *Diſſertationes medicæ*.

E' ſtato ſuppoſto univerſalmente, la matrice eſſere una parte in grado coſt'eſtremo tenera, e delicata, che il menomo urto, od intacco, che in eſſa venga fatto, forſ'è, che venga di neceſſità a cagionarvi un'inflammazione, la cui conſequentia debba eſſerne una certa morte. Ma la Reale Accademia di Parigi ſomminiſtraci nelle ſue memorie un' eſempio che è qualche bagattella differentiſſimo e tutt'altro da queſto. Una certa Lavandaja di un'abito di corpo affai robuſto, ed avente circa trent'anni, che trovavaſi

vavasi nel feto, o settimo mese di sua gravidanza, essendo accidentalmente caduta sopra la punta di un palo, o stanga vecchia, rimase ferita per due o tre buone dita di ampiezza, e ad una assai considerevole profondità un poco sotto il bellico. Da questo dato tempo ella non sentì più muoversi la creatura stanziante nel suo corpo; ma in capo a otto giorni ella ebbe a mandar fuori per la vagina copia abbondevolissima di sangue putrefatto, e questa scarica continuò in essa pel tratto di otto, o di dieci giornate.

L'esterna ferita venne faldata, e rammarginata secondo il metodo, e cura comune, e la donna tornossi alle usate sue faccende, e fatiche, e continuò a star bene fino al termine dei nove mesi di sua gravidanza. Aspettava ella allora di sgravarsi del feto, ma non le vennero le doglie usate del parto altramente, e continuò in quella guisa fino al decimoquinto mese senza grave inquietudine o disturbo; ma in capo a questo tempo ella vide alzare un tumore in quella parte del ventre, nella quale aveva già ricevuta la percossa, e la deserita ferita. Questo tumore in capo a un dato tempo scoppiò e s'aperse dappersè stesso, e dopo aver mandato fuori una materia lodevole pel tratto di interi quaranta giorni, in capo a questo termine si ferrò, e rammarginossi.

Nel venticellesimo mese, questo tumore comparve di bel nuovo in iscena, ed allora crebbe ad una mole assai maggiore di quello fosse ingrossato la prima volta, in tre sole giornate crebbe a dismisura dando alla paziente dolori, che facevanla effettivamente rabbiosa, e nell'aprirlo venne a scaricar un quartuccio di materia fetentissima, e che diede del sollievo notabilissimo a quell'infelice: dopo le medicature di tre altre giornate cominciarono a comparire nell'apertura del tumore delle ossa, e finalmente ogni giorno ne andavano uscendo, e scaricandosi fino a tanto che in tutto venne ad essere evacuato per l'apertura del tumore medesimo un'intero, e compiuto scheletro di un feto dell'età dei sei in sette mesi.

In questo caso per tanto non havvi ombra menoma di dubbio, che la matrice

fosse non solo inaccata, ma eziandio rotta, e forata intieramente dalla punta del palo rotto, nel tempo della caduta della donna, e che il feto rimanesse ucciso dalla ferita medesima, e che dopoi marcendosi, e putrefacendosi entro la matrice medesima, le parti di esso feto ad una ad una venissero a scaricarsi ed uscir fuori della matrice medesima non per altro varco, se non per il taglio fatto in essa matrice dal palo scheggiato, e rotto.

Questo fatto sembra pienamente, ed intieramente contraddittorio a quella grandissima tenerezza, e delicatezza supposta da moltissimi nell'utero; e fa vedere, e toccar con mano, che siccome non havvi parte del corpo umano, che dagli Anatomici sia voluta tanto delicata quanto questa, così havvi a stento grande alcun caso, in cui la natura, ed il buon temperamento, e costituzione far non possa una cura.

Dee essere similmente osservato, per rapporto a questa donna, come nel decimoquarto mese dopo la sua caduta, ella trovossi di bel nuovo incinta; ma questa sua gravidanza andò a finire in una leonciatura.

Nella struttura della Matrice hanno luogo parecchi fascetti di fibre muscolari. Fa parola il gran Ruisebio di un muscolo orbicolare nel suo fondo, il qual muscolo lo stesso Monsieur Monro afferma d'aver similmente veduto. Veggansi Saggi Medici d'Edimburgo. vol. 2. pag. 127. e *Ruysschii Epistolæ de Muscul. in fundo Uteri.*

L'Utero umano ha numero grande di orifizii divasi, che mettono foce entro le cavità di quello per versarvi i liquori.

Verso il fondo della matrice massimamente, vien trovato, essere le estremità di canali, che vengon fuori da cavità più ampie, stanziante entro la sostanza della Matrice. Simiglianti cavità vengon comunemente appellate seni. Veggasi l'Articolo *SENI della Matrice.*

Ella si è una quistione fra gli Anatomici, ed i Fisiologi, onde sia formata la cavità dell'Utero, la quale negli ultimi mesi contiene l'Infante, la parte massima delle acque, e tutte le lecondine, a riserva della sola placenta? Rispetto a ciò

potranno i curiosi consultare il dottissimo Medico Tommaso Simpson nella sua Dissertazione, che leggesi nei Saggi Medici d'Edimburgo, Vol. 4. Art. 13.

MATTONE. La voce Inglese *Brick* corrisponde all'Italiana *matton*, viene dalla Francese *Brigue*, che il Menagio deriva dal nome Latino *Brica* usato dagli Scrittori dell'Età di mezzo per dinotare la cosa medesima, e che alcuni suppongono esser stata formata dal verbo *Imbricare*, coprire con embriici, con mattoni; alcuni per lo contrario dalla voce *fabrica*, come una specie di pietra tagliata, e così formata, o figurata. Veggasi *Menage*, Origine. pag. 133. Trev. Dict. Univer. Tom. 7. pag. 1247. in voce *Brique*.

I muri, o fabbriche di mattoni vengono sperimentate assai più forti, e di durata, e resistenza maggiore, che i muri, e le fabbriche di pietra viva; e massimamente assai più atti a far testa alla forza dei Cannoni, e d'altre macchine da guerra. (a) Viene asserito, che i Greci conducevano i fornaci di mattoni nelle loro Armate, affinché potessero avergli in pronto per i lavori de' loro Campi, Accampamenti, e Fortificazioni. (b) I Romani co' loro quadretti di pietra viva, o pietre quadrate, mescolavano i mattoni cotti, e questo coll'intenzione, e fine di render più forti le fabbriche loro. (c) Realmente le fabbriche di matton cotto venivano universalmente considerate dai buoni Antichi non altramente che perpetue; di modo che in Roma il diroccamento veniva sempre fatto per l'età delle fabbriche di sasso, o pietra viva, e non mai per quella di matton cotto. (d) Le muraglie, o muri di matton cotto sono sperimentate sempre più calde, e più sane di quelle di pietra fresca, o di marmo, come quelle, che non sono soggette a sudare, ad a raccogliere le umidità nella loro superficie, che piuttosto imbevono. (e) A questo noi possiamo aggiungere, come i mattoni cotti vengono sperimentati i migliori materiali, che dar si possono al Mondo per le volte, e per gli Edifizj sotterranei, non meno per la loro durata, e che per la loro mezzana spesa, e per la sicurezza dal fuoco. (f)

(a) Veggasi Aquin. *Lessico Militare*, Tom. 1. pag. 535. in voce *Laticinium*. (b) Plut. in *Agessil.* (c) Vitruv. *Lib. 2. cap. 8.* (d) *Trasfazioni Filosofi.* n. 149. pagg. 238. 239. (e) *Item* n. 43. p. 6011. *Item* n. 149. pag. 239. (f) Davil. *Corso d'Architettura*, Tom. 1. pag. 251.

Servono i mattoni, o per le parti interne, o lati interiori delle muraglie, le quali hanno la lor facciata esteriore, o sono incrostate di pietra viva, oppure per i lati esteriori degli Edifizj, i quali nelle lor parti interne essendo di legname, hanno similantemente l'esterna loro parte, o facciata di matton cotto. (g) In Roma moderna, o del dì d'oggi le muraglie delle Case sono d'ordinario di mattoni, ai quali sono da poi aggiunti diversi ornamenti, e sporgimenti a foggia d'incrostate, e raccomandati alle muraglie medesime, ed attaccate per mezzo di cani, e stasse di ferro. (h)

(g) Vegg. Davil. *Explic. Term. Archit.* pag. 435. (h) Davil. *Corso d'Archit.* P. 1. pag. 130.

Il matton cotto usato massimamente presso i Romani antichi era il *Didoron*, oppure, come leggesi in altri esemplari, *Lydion*, il quale secondo la dimensione datacene da Plinio, era un piede, e mezzo lungo, ed un piede largo. (i) Questa misura accordasi, e conviene a esatto con quelle di parecchi mattoni Romani, che trovansi in Inghilterra, i quali sono lunghi a un di presso diciassette dita della nostra misura, ed undici dita larghi. (k)

(i) Veggasi Plin. *Hist. Natur. Lib. 35. cap. 14.* Harduin. *Not. ad loc.* (k) Vegg. le *Trasfazioni Filosofi.* n. 149. pag. 240.

Parla il Signor Henrico Wotton di una particolare specie di mattoni di Venezia, dei quali furono fabbricate massiosissime colonne: furono questi mattoni prima formati in una forma circolare, e polcia tagliati prima d'esser posti nella fornace a cuocerli in quattro, od in più quarti, o lassi; dopoi nel disporli, ed accomodarli vennero questi così tagliati mattoni uniti tanto ferratamente, e le loro punte congeguate e concentrate con sì perfetta ciatezza, che le divise colonne appariscono tutte d'un pezzo. Veggasi Wotton, *Elementa-*

menti d' Architettura, Lib. 2. Neve, Dizionario delle Fabbriche in voce *Briek, matrone*.

Il matton cotto ordinario di Parigi è lungo quelle otto dita, quattro dita largo, e due dita grosso, di misura Franzele, che viene a crescere d'alcun poco, rispetto alle misure degli altri paesi. Ma questa picciolezza è un vantaggio ad una fabbrica, la fortezza, e validità della quale dipende grandemente dalla moltitudine degli angoli, e delle connessioni, e giunture, (f) qualora però questi mattoni sieno ben disposti, e combagiati, e di buona pasta, e cottura. I Romani peccarono in questo rispetto nella soverchia grossezza del mattone; avvegnachè i mattoni loro fossero più del doppio dei mattoni Franzesi; tuttochè ne possedessero anche una specie migliore, che appellavano *Lateres Beffales*, i quali non erano più lunghi di otto dita: (m) ma questi dati mattoni erano soltanto propriamente i loro mezzi mattoni. In Inghilterra fanno similmente alcuna fiata dei mattoni di una lunghezza non comune, e che arrivano ad esser lunghi ventidue dita, e sole sei dita larghi; e questi servono per cantoni, o stipiti nelle fornaci del malto &c. (n)

(1) Veggesi Lister, nelle *Transf. Philosoph.* n. 249. pag. 239. (m) Pittsc. *Lexicon Antiq.* Tom. 1. pag. 272. in voce *Beffales*. (n) Plott. *Istoria Naturale d' Oxford*, cap. 9. §. 90.

I mattoni possono esser fatti di qualsivoglia terra, la quale sia netta, e purgata di pietre, e di sassi, eziandio di concia marina; ma tutte le terre, quando son cotte, non burtan rosso, (s) proprietà particolare di tutte quelle terre, le quali contengono delle particelle ferrugineose. (p)

In Inghilterra fanno principalmente i mattoni di una terra grasia di un color giallognolo imitante quello della nocciuola alcun poco rossiccia, ed appellata volgarmente terra grasia. La terra, secondo Monf. Leibourn, dovreb' essere scavata prima dell' Invernata, ma non impastata, nè ridotta in mattoni, se non se in tempo di Primavera. (q)

(o) *Dict. Russ.* in voce. (p) Wood-

ward. *Istor. Natur. d' Inghilterra*. Foss. Tom. 1. pag. 1. Mortimer, *Arte della Coltivazione*, Lib. 3. cap. 3. Tom. 1. pag. 72. Moxon *Effr. Meccanic.* pagg. 238. 239. (q) Neve, *Dizionario delle Fabbriche in voce Crick, matrone*.

I mattoni soglion comunemente distinguere in mattoni crudi, ed in mattoni cotti.

MATTONI crudi, *Lateres crudi*, sono quelli, che sono stati soltanto seccati al sole, senza incuocerli: questa razza di mattoni vien grandemente usata, e messa in opera nelle Regioni assai calde, ove piove radissime volte, e massimamente per tutto l'ampio tratto dell' Egitto. (r) Avevano similantemente gli Antichi Romani i loro mattoni crudi, o non incotti, nè messi in fornace, fatti di una terra bianchiccia, grandemente allomigliantesi al gesso, i quali, prima di metterli in opera, lasciavano a seccarsi, ed asciugarsi pel tratto di cinque anni. Mattoni similianti venivano di pari composti di una specie di terra grasia, mescolata, ed incotta, o messa in forno con del fieno, o strame sminuzzato, la qual composizione, o composizione della qual terra era detta *Torchis* (s).

(r) Vegg. Savary, *Dizionar. del Commercio*. Tom. 1. pag. 481. (s) Vitruv. *Architet.* Lib. 2. cap. 3. Petrarca. *Not. sopra Vittuvio*, pag. 124.

Mattoni cotti, *Lateres Testacei*, sive *cocti*, son quei mattoni, che dopo essere impastati, e dopo essere stata loro data la propria forma, vengono posti a cuocerli, od in una fornace, od in un fuococircolare aperto. Veggesi Sturm. *Math. Juv.* Tom. 2. cap. 3.

Nel cuocere i mattoni è di somma importanza e momento il vicendevole alzare, ed abbassare il fuoco. Quei formaciai, i quali hanno in costume di continuare il calore senza dar sosta, fanno comunemente la loro parte più bassa estremamente dura, ed ottima, ma la parte di loro cottura superiore va tutta a male; e quello che di tutto è peggiore, alcuna fiata i mattoni più bassi vengono così a squagliarsi coll' eccessivo calore, ed eziandio ad unirsi ed ammassarsi tutti in un corpo solo. Di più, per raffreddare le for-

fornaci piane di mattoni , alcuni imprudenti , ed inepti fornacijs , tosto che i mattoni son cotti , immediatamente chiudono , e ferrano il rimanente della bocca della fornace , che era lasciata aperta sullo spiraglio , per lo che sendo l'aria ferrata fuori , sta lungchissimo tratto di tempo a raffreddarsi , di maniera tale che questi dati fornacijs spendono comunemente quindici giorni , ed anche tre settimane nell'informare , nel cuocere , e nel cavar fuori un'informata di mattoni , di embrici , e somiglianti , quando tutto questo lavoro largo , e lungo , com'egli si è , potrebbe essere ottimamente spedito , e condotto a termine perfettissimo in sole otto giornate .

In tutte le fornaci , o suochi chiusi di questo genere vi sono comunemente tre forti , o gradi di mattoni cotti , in rapporto alla bontà , vale a dire , 1. Mattoni fuocanti , aventi tintinno , e questi sono i primi , ed i migliori per la durata , e questi son quelli , che trovansi nella fornace in vicinanza maggiore , o contigui al fuoco ; possedendo , come in fatti si tocca con mano , un buon lustro , il quale è unicamente dovuto al salpetra ad essi aderente , il quale per la violenza del fuoco scorre , egl' invetria . 2. Mattoni cotti comuni , e questi son quelli , che diaciono nella fornace immediatamente sotto di questi . E 3. Mattoni loschi , o scurotti , e questi fanno la terza e la più inferiore specie , essendo quelli , che erano aggiustati entro la fornace dalle bande , o fiancate della medesima , e che facevano come gli esterni ripari di quella , ove appunto il salpetra a motivo dello scarlo calore non viene ad essere adeguatamente digerito . Questi allorchè vengano a stare esposti per alcun tratto di tempo all'aria aperta , s'ammorbidiscono , e divengon pastosi , non altrimenti che il fango . Ella si è un'osservazione fatta , che mentre i mattoni stanno euocendosi , quelli , che trovansi da un lato vntoso della fornace , sono i peggiori di tutti . Veggasi *New* , Dizionario delle Fabbriche in voce *Brick* , *Mattoni* .

I Mattoni Olandesi , oppure i Fiamminghi , sono di un color giallognolo , e vengon massimamente messi in opera per lastricarne

Suppl. Tomo III.

cortili , scuderie , e similianti , ed usansi eziandio per incrostare le saponaje , e le cisterne . Formano , a vero dire , questi mattoni un pavimento di grandissima durata , ed allora quando son messi giù , e disposti ad orlature , fanno un pavimento di una mostra , ed appariscenza sommarmente vaga , massimamente se la forma assomiglia alla spina , od osso dell'aringa . Veggasi *Moxon* , *Exercit. Mechanic* . pag. 238 .

Brigue de Chantignole , oppure *Demibrique* , *Mattoni di cantinella* , o *Mezzo-mattoni* .

Con siffatta Franzese espressione viene a dinotarsi quel mattoni che non è più grosso di un solo dito , ma però delle dimensioni medesime di tutti gli altri mattoni , e che con proprio vocabolo diecisi dagli Italiani assolutamente *Cantinella* . Viene questa specie di mattoni particolarmente messa in opera nel lastricare i pavimenti fra i contorni , od orlature delle pietre , e per fare similantemente i cuori , e parti interiori dei forni , e dei cammini . Veggasi *Felsh* . *Principi d'Architettura* , Lib. 1. c. 17. pag. 124 . *Davil* . Spiegazione dei termini dell'Architet.

Monf. Worlidge , ed altri eziandio dopo di lui sonosi grandemente affaticati , per eccitare i fornacijs , o lavoratori di mattoni , e per promuovere la lor valentigia e maestria nel fare una nuova specie di mattoni , oppure un composto particolare di creta , e di sabbione , per formar del medesimo delle foglie da finestra , degli stipiti , ed altre parti da cammino , dell'incassature di porte , e similianti manifatture . Questi dovrebbero essere fatti in pezzi impallati per entro adeguate forme , i quali , quando sieno cotti , possansi combaciare ed unire insieme con un finissimo cemento rosso , di modo che vengano a sembrare una massa tutta di un pezzo solo , dalla quale esser possa bellamente imitato qualsivoglia lavoro , od opera di pietra .

La cosa sembrerebbe fattibile per fare de' condotti di terra cotta fatti in guisa , che fossero fini , sottili , e durevoli , per condurre l'acqua sotterra in Portsmouth , ed per via di mattoni di terra cotta , e di gratecole per i cammini , cosa formalmente fatta , ed eleguita dal valente Signor Gio-

SS van-

vanni Winter, di una ampiezza, grossezza, e spessezza grandissima.

Realmente molto guadagnerebbesi, e riuscirebbe di un vantaggio sommo il ciò eseguire, facendone pezzi da cammini, forme, o formelle di pietra, architavi, falce per frontoni di fabbriche, e cose, e lavori fomiglianti, qualora gli uomini di sì fatta professione avessero una superficialissima infarinatura di Chimica, la quale verrebbe ad abilitargli a fabbricare, ed impastare una buona composizione di terra, ed una propria maniera e metodo di operare, e manipolare, e di portarsi, nel dar le forme, nel far le cotte, ed in simiglianti circostanze tanto rilevanti nel divisato lavoro. Non riuscirebbe peravventura ugualmente bene una composizione, alcun poco fomigliante alla terra da pentolaj, od anche da Vasa? Non corrisponderebbe ella forse bene all'intento? E perchè non farne queste zucche caparie una qualche esperienza? Sembra pressochè evidente, che in qualsivoglia forma i pentolaj, ed i Vasa! riducessero la loro terra, quella dopo essersi seccata, ed essere stata il tempo adeguato nella fornace, riterrebbe egregiamente bene la medesima consistenza, tuttochè essi pentolaj l'impastino, e la riducano così sottile, come sono le usuali pentole da fuoco. Se i pezzi da formare i Cammini così lavorati in forma, e lasciati seccare, e ben cotti nella fornace non riuscissero bastantemente lisci, e levigati, potrebbero dopoi con somma agevolezza render tali a forza di arena, e d'acqua; oppure basterebbe, che altri si prendesse la briga, ed il pensiero, allorchè sono stati asciutti all'aria aperta, di lustrargli, e di uguagliargli con un pezzo di rame, o di ferro adeguato, la qual cosa potrebbe farsi prima d'infornaciargli, e di cuocerli; e qualora vi rimanesse ancora alcun poco di ruvido, dopo che fossero stati cotti non farebbe mica gran fatto malagevole il ridurli a quel pulimento maggiore, che altri mai bramar si sapesse. Questi medesimi pezzi, e lavori potrebbero avere eziandio invetriati, come appunto fanno i pentolaj delle lor pentole, ed altri vascellamenti, o di una invetriatura bianca, e di qualsivoglia altro colore. Simigliantemente potrebbero que-

sti pezzi medesimi lavorare in guisa, che fossero venati, imitando, a cagion d'esempio, il marmo, come benissimo far si potrebbe, od eziandio dipingerli con figure di vari colori, e che far potrebbero con somma agevolezza, e per conseguente potrebbero procurare con pochissima spesa, e che riuscirebbero peravventura di pari durevoli, e belli, ed appariscenti, che il marmo medesimo. Veggasi *Nerve*, Dizionario delle Fabbriche in voce *Brick*, *Mattone*.

Lavori di Mattoni. In rapporto alla maniera di lavorare i mattoni noi abbiamo dei luoghi, o fabbriche, o fornaci da mattoni, erette massimamente nella Parte Orientale di Suffex, così appellai questi tali luoghi per trovarli adeguatamente livellati, e pianissimi, e sommamente uguali, sopra i quali dati luoghi dopo d'essere stati impastati, vengono fatti in pezzi, e posti nelle rispettive forme. In questo luogo il trasportatore disende, e colloca i mattoni ad uno ad uno in biche, o filari, subito che sono stati cavati dalla forma, ed in queste biche, filari, o muriccioli questi mattoni vengono lasciati fino a tantochè si fassino bene insieme, e che vengano ad essere duranti tanto che basti per poter essere raffinati nei loro contorni, ed uguagliati, val a dire affinchè possan'essere coll'istumento a questo lavoro acconcio tagliate via tutte le loro disuguaglianze: quando questi mattoni son bene asciutti, gli conducono in altro luogo per accatastargli, o si fassi quel dato luogo, ove gli animontano insieme, formandone una specie di muriccioli, o filari della grossezza di due mattoni, lasciando infra essi muriccioli alcuni piccioli intervalli, affinchè possavi aolari perenere l'aria, ed il vento, e così possano vie maggiormente asciugarsi, e seccarsi realmente. Quando quest'aja da mattoni è tutta piena, coloro cuopronla nella sua cima con dello strame, e lascianvegli fino a tanto che sieno a tiro per esser condotti alla fornace per cuocerli. Veggasi *Nerve*, Dizionario, *ibidem*.

Mattoni di Ceppo. Sono questi della forma medesima de' mattoni piatti poc'anzi descritti, tuttochè differenti non meno per la qualità della terra, onde sono composti, e per

e per rapporto alla maniera di fargli. Questi son fatti sopra un ceppo, vale a dire, la forma è piantata sopra un ceppo, non altrimenti che facciasi, allorchè si dà la forma alle tegole, od embrici; e quando uno di questi mattoni è stato in forma, coloro stendonlo sopra un pezzo di tavola alcuna poco più ingna del mattone medesimo, e sopra quello mattone pongono un'altro pezzo somigliante di tavola e sopra questa un'altro mattone, e continuano fino a tanto che hanno agguistato tre mattoni l'uno sopra l'altro; e così seguivano a fare questo lavoro, ed a collocargli sopra la loro aja da mattoni, siccome fanno delle tegole, od embrici, fino a tanto che l'aja medesima è affatto piena, ed allora prendono coloro i mattoni a tre a tre, siccome avevagli aggiustati colle loro tavolette, e conducongli sopra le loro capre, ove uguagliangli, assilangli, e gli contornano in guisa, che rimangavi fra cadaun mattone la grossezza di una sottile tavoletta. Quando la cascata è piena di una data altezza di mattoni da una estremità all'altra, allora cominciano ad aggiustare, e porre quelli sul primo piano, o filate della cascata, aspettando a far ciò alcuno spazio di tempo, affinchè i primi mattoni sieno asciugati tanto, che vagliano a sostenere senza guastarsi, gli altri, che debbono porre sopra essi; avvegnachè questi particolari mattoni sieno formati di una terra veramente sissa, e tenace. Quando vengono sovrapposti nella divisa guisa a due, a tre, e più ordini, o filari, od altezze, vanno a' dati luoghi imbiettrandogli, per impedire, come essi dicono, il loro barcollamento, e per conseguente, che non vengano ad imbarcare. Quando questo accatastamento è alto a segno, eh' essi credano appropriato, cuopronlo ben bene con dello strame, siccome fanno negli altri mattoni sopra deferiti, affinchè ivi vengano ad asciugarsi, e seccarsi tanto che bati per esser polli nella fornace a cuocerli. Questo metodo è alquanto più tedioso di quello ordinario dei mattoni usuali; ma in parecchi luoghi sono i fornaciari, e lavoratori di mattoni obbligati di necessità a ricorrere a questo metodo; perchè se si servissero dell'altro metodo

sopraddefinito, l'indole, e natura di quelle date terre è tale, che i mattoni andrebbero in pezzi. Veggasi *Neve*, *Dizionario*, dove sopra.

Gli andamenti varj del procedimento nel fare i mattoni dei nostri Inglesi fornaciari, sono, l'impastare la creta, o terra; il temprare, e manipolare la medesima coll'acqua; l'infabbionare, od impolverare il mattone, e questo fabbione dee esser vagliato ed asciutto allorchè possa sul terreno il mattone umido: il sollevare, od alzare i mattoni in fiancata, affinchè possano asciugare, e seccar meglio, e più prestamente: l'ordinare a foglia di muricciolo i mattoni, e questo si è il collocargli e piantargli l'uno sopra l'altro, come se far si volesse un muro per tenergli a coperto dell'ingiurie della stagione, e perchè possano asciugare e seccare perfettamente: piovare i mattoni; e questo s'intende il coprire i mattoni con delle piote, o zolle arse: aggiustare, ed allogare i mattoni nella fornace, e per questo intendesi il piantare, o fraporre delle braci, o carbone minuto fra cadaun ordine, o filare di mattoni; cuoprire la fornace; e per questa espressione intendesi il cuoprirli nella sommità per ogni parte di creta, per conservarvi entro il fuoco, e per assicurar la fornace medesima dalle ingiurie della stagione; far fuoco, e vuol dire l'aggiustare i materiali da fuoco, o legna in archi sopra il fuoco; l'interriere, vale a dire, porre della terra intorno intorno a questi medesimi materiali da fuoco, per chiudere così le arcate del legname medesimo, affinchè il fuoco possa tendere all'insù, verso la sommità, o vertice della fornace medesima: contare i mattoni, trasportare i mattoni, importa il condurre i medesimi a quel dato luogo, ove debbono essere messi in opera, od a schiena di cavallo, od in altra forma più agevole di trasporto, come colle carrette, e somiglianti. Veggasi *Dizion. Rull.* in voce.

Gli archi, od arcate in una fornace di mattoni, sono i luoghi vuoti, o concavi nel fondo, ove trovasi il fuoco; i fori da piccionaja sono aperture negli archi infuocati: la corsia a scacchiera dinota l'ordine, o filare più basso di mattoni nell'ar-

cata; la corsia legante, sono quei mattoni, che cuoprono la sommità dell'arcata; la corsia fasciante s'intendono quei mattoni, che si collocano e spianano sopra le unioni, o giunture della corsia sottoposta: corsia dividente, per questa intendonsi le divisioni, o dire le vogliamo le parti della fornace: corsia appianante, è quella la vetta, o sommità di tutta la fornace: il carriolante è colui, il quale dalla cava trasporta la creta alle forme, ed ove debbesi impastare, e che versala sopra il tavolato: spaltatore si è colui, che colla pala leva di terra la creta, e la getta sopra il tavolato: il formeggiatore si è colui, che aggiusta la creta entro le forme per i mattoni, e che rade via la creta superchiosa di sopra le forme medesime; il rompitori s'intende quell'operaio, che prende la forma colla creta dentrossa aggiustata di mano del formeggiatore, e collocala sul terreno ad asciugarsi, e così per non finire d'infastidirci, che oggimai lo siamo a bizzeffe, vadasi discorrendo di tutta quella ciurmaglia di gente, che è impiegata in questo lavoro. Veggasi perciò il Dizionario Rust. sotto il Capitolo *Brick making, il lavorare i mattoni*.

Dopo d'aver gettata, o ridotta in getto la creta, l'operazione, che ne vien dopo, si è il dimenarla, pestarla, e temperarla, le quali cose dovrebbero esser fatte il doppio meglio di quello facciansi comunemente i fornaciai: conciossiachè la bontà dei mattoni dipenda massimamente, e principalmente da questa prima sopra descritta preparazione. La terra stessa, innanzi ch'ella sia lavorata, è generalmente sritolabile e polverosa, ma coll'aggiungere tratto tratto, e gradatamente alla medesima dell'acqua, e lavorandola, maneggiandola insieme, ed impastandola, sicchè ella venga ad incorporarsi, ella viene a dilatare ed aprire il suo corpo, e viene a dare al tutto una piegatura, o sostanza fissa e pastosa, e maneggevole. In evento che in temperandola, voi vi facciate a darle dell'acqua soverchia, siccome suolsi fare comunemente, verrà a diventare, poichè sarà asciutta e seccata, sritolabile come appunto lo era innanzi che fosse lavorata nella divisata maniera, e manipolata; dove per lo contrario, se ella verrà tempra-

ta mezzanamente, ed a dovere, la pasta diverrà liscia, solida, durevole, piena di corpo, dura, e resistente. Un mattone fatto della terra lavorata, e temperata col metodo ultimamente descritto, si prenderà più della metà il doppio d'un matrone fatto colla terra teneramente lavorata, ed impastata, come nel divisato primo ordinario metodo; colqual metodo i mattoni riescono spumosi, leggerissimi, e pieni di screpoli e spaccature; e ciò in parte avviene per mancanza di proprio adeguato lavoro, e manipolamento, ed in parte a motivo della mescolanza delle ceneri, e della terra arenosa leggeria, della quale servono per fare un lavoro più agevole, e di minor fatica, e con ispeditezza maggiore; come anche per risparmiare le legne, od il carbone nel cuocerli, andandovene con questo cattivo metodo molto minor quantità. Noi possiamo anche aggiungere, come per i mattoni composti di buona terra, e bene, ed a dovere manipolata, e temperata, siccome questi riescono solidi, consistenti, ed assai pesanti, così richieggiono, e vogliono un tratto di tempo assai più lungo non meno per asciugarsi, che per cuocerli, di quello vogliono i mattoni fatti alla prava foggia comune; ed oltre a ciò non senza gran proposito aggiungeremo, come il lasciare, che i mattoni si asciughino, e seccinli bene ed adeguatamente, viene ad impedire, che si screpolino, e che s'imbarchino entro la fornace per cuocerli, come pur troppo segue, altramente adoperando. Veggasi Neue, Dizionario, dove sopra.

Il lavoro, o manifattura dei mattoni presso gli antichi Romani veniva diretta, e governata con una somma cura, scelta, ed attenzione: e da ciò appunto avveniva, che i mattoni loro riuscivano di una durata infinitamente maggiore di quella dei nostri, e pressochè eterni. (a) In simile faccenda però i nostri Confinanti ci soverchiano anche a' di nostri di lunga mano; conciossiachè quei mattoni, che ci facciamo venire dall'Olanda, dalla Danimarca, e da altre Regioni eziandio, riescono assai migliori dei nostri calalinghi. (b)

(a) Veggansi però le Transazioni Filosofiche sotto il num. 331. pag. 563. (b) Vegg.

Vegg. *Hought*, Raccolt. Tom. 2. num. 168. pag. 26.

Per fare i mattoni, le paghe usuali e comuni presso di noi, escludendone però la terra, montano a cinque o sei sellini, o scalini Ioglesi, cioè a dire, dai sessanta ai settantadue soldi Inglese per migliajo; e questa moneta va via via proporzionalmente dividendosi fra i vari operai, de' quali chi ha più, chi meno, secondo la qualità di lor parte di lavoro. Veggasi *Diction. Rusl.* in voce.

MAXIMUM. Essendo data la Flussione della base di una curva, oppure della sua abscissa, allorchè la flussione dell' Ordinata s'vanisce, e dileguasi, la tangente viene a diventar parallela alla base, e l'ordinata vien perciò assai comunemente ad essere un *Maximum*, oppure un *Minimum*, secondo la Regola data dagli Autori intorno a similgiante soggetto, e di cui fassi parola nella *Ciclopedia* sotto questo Articolo. Ma dee onninamente essere osservato, che se la seconda flussione dell'ordinata s'vanisce, e dileguasi nel tempo medesimo, e che la terza flussione sia reale, quella medesima Regola non ha luogo, e non regge; avvegnachè in siffatto caso l'ordinata non sia nè un *Maximum*, nè un *Minimum*. Se s'vaniscano, e si dileguino la prima, la seconda, e la terza flussione, e che sia reale la quarta flussione, l'ordinata viene ad essere in tal caso, od un *Maximum*, od un *Minimum*.

La regola generale somministrata dal sovrano Mattematico Monsieur Mac-Laurin si è, che quando la prima flussione dell'ordinata insieme colle sue flussioni, sieno queste di qualunque ordine susseguente successivo essere si vogliano, s'vanisce e dileguasi; e che s'vanisce e dileguasi quel numero di tutte queste flussioni, che è casso, o dispari, allora l'ordinata viene ad essere od un *Maximum*, od un *Minimum*, secondo che la flussione dell'ordine prossimo o contiguo ad esse flussioni è negativo, od è positivo. Ma se il numero di tutte le flussioni dell'ordinata dell'ordine primo, e dell'ordine susseguente che s'vanisce, sia un numero pari, allora l'ordinata non è nè un *Maximum*, nè un *Minimum*. Veggasi *Mac-Laurin*, Trattato delle Flussioni, B. I. Cap. 9. e

B. II. cap. 5. art. 859. 860. & seq.

Le massime, e le minime Ordinate vengono ad essere similgiatamente scoperte, e rintracciate in alcuni casi col supporre, che y sia infinita in rapporto ad x . Questa regola però patisce parecchie eccezioni. Vegg. *Mac-Laurin*, loco citato art. 262. & seq. & art. 865.

Un Autore modernissimo ha messo in campo alcune obiezioni all'universalità della Regola di Monsieur Mac-Laurin. Veggasi il Trattato intitolato *The Harmony of Ancient, And Modern Geometry* by Mr. Paman London. 1745. in 4. cioè, l'Armonia della Geometria antica, e moderna, per Monsieur Paman, Londra, &c. nella Prefazione.

MECCANICHE. Questo termine meccaniche non meno nei tempi antichi, che di presente eziandio è stato usato in un doppio senso in Scienze, e Facoltà sommaramente diverse, non meno per rapporto agli oggetti, che ai Principi di quelle. Conciosiachè il termine meccaniche venga ad essere applicato di pari a quella scienza, la quale tratta dell'equilibrio e del confronto, o comparazione delle forze; ed a quella scienza, o facoltà altresì, in cui veogono spiegate la natura, la generazione, e l'alterazione del moto. Per schiarire pertanto ogni, e qualunque ambiguità, sarebbe cosa dicevolissima il dare la denominazione di Statiche alla scienza dell'equilibrio, e della comparazione, o confronto delle forze, e restringere il termine, e nominazione meccaniche alla sola scienza del moto.

Queste due scienze non solamente differiscono infra esse rispetto ai loro oggetti, ed ai loro principj, ma eziandio per rapporto ai tempi, in cui esse sono state coltivate. Alcuni dei principj delle Statiche furono stabilirsi da Archimede: ma il sempre grande, ed immortale Galileo fu il primo a dare il fondamento delle meccaniche, allorchè diedsi ad investigare la calata dei corpi gravi; e dal tempo suo in qua, coll'ajuto dei nuovi metodi di calcolare, sonosi fatti dei prodigiosi avanzamenti, massimamente per via dei principj dell'immortale Isacco Newton. Questa opera ammirabile, vale a dire i principj Newtoniani, sono di presente renduti più intel-

intelligibili ai principianti a motivo del dritto, ed accuratissimo commento, ed illustrazione dei famosi Religiosi Padri le Sueur, e Jacquier, stampato insieme col reitto Neutoniano in Ginevra 1739. 4°. 1742. in 4. Volumi in 4°.

Noi abbiamo similantemente le scienze delle Statiche, e delle Meccaniche trattate sotto il nome di *Phoronomia* ultimamente dal Dottissimo Professore Monsieur Herman. Amsterdam 1716. in 4°. Di Monsieur Euler poi *Mechanica, sive, de Motus Scientia*, è un Trattato, che è quanto basta raccomandando ai dotti dal nome del suo Autore medesimo ben conosciuto per ogni dove per uno de' più sovrani Matematici d'Europa. Nulladimeno questa sua Opera non è rimasta al coperto della Censura di un modernissimo affai ingegnoso Autore; ma concedendo la giustizia, e dirittura delle sue osservazioni eziandio, può essere asserito, che un picciol numero di non totalmente accurate espressioni, dovute alle analogie portate soverchio lontano, ed allo stile, che a molti non garba, degl' Infinitesimi, questi tali accagionamenti altro non sono, che piccioli nei in quella grande, e prodigiosa Opera. Per quello poi, che riguarda le Statiche, il soggetto è stato presso che esaurito dal celebre Monsieur Varignon nella sua *Meccanica*, Parigi 1725. in due volumi in 4°.

La Dottrina delle Macchine è un ramo principalissimo delle Meccaniche; ma questo finora non è stato trattato in quella maniera, che meriterebbesi a buona equità un tal soggetto. Noi pertanto porremo qui picciol numero d'Osservazioni riguardanti questo utilissimo Soggetto medesimo, le quali abbiamo tolte di peso da un'affai egregio Autore modernissimo.

In trattando delle Macchine noi dovremmo farci a considerare il peso, che dee essere alzato, la forza dalla quale dee essere alzato, e l'istrumento, od ordigno, dal quale essere dee prodotto effetto similgiante. Havvi due principali Problemi, che in trattando delle esposte cose, vale a dire di cadauna di esse, dovrebbero essere sciolti.

Il primo si è il determinare la proporzione, che la forza, ed il peso dovranno avere l'una all'altro rispettivamente,

affinchè possano giustamente, ed a capello sostentarsi l'un all'altro, o rimanere in equilibrio, che è lo stesso.

Il secondo si è il determinare, quale esser dovrebbe la proporzione della forza e del peso, dell'una all'altro in una data Meccanica, affinchè possano produrre possibilmente il massimo effetto in un tempo dato.

Gli Scrittori tutti delle Meccaniche trattano, e fanno parola del primo di questi Problemi, ma pochi quelli stati sono, i quali sieno fatti a considerare il secondo, tutto che sia niente affatto meno utile dell'altro.

Rispetto al primo Problema l'appresso Regola generale ha luogo, e regge in ogni, e qualunque Forza.


Supponghasi, che la Macchina si muova, e riduca le velocità della forza, e del peso alle direzioni rispettive, nelle quali agiscono: trovinsi le proporzioni di quelle velocità: allora se la forza sia al peso come la velocità del peso è alla velocità della forza, oppure, che viene ad importare la cosa medesima, se la forza moltiplicata per la sua velocità dà il prodotto medesimo, che il peso moltiplicato per la sua velocità, questo è appunto il caso, in cui la forza, ed il peso sostengono l'uno l'altro, e rimangono in equilibrio: di maniera tale che in questo caso l'una non prevarrebbe sopra l'altro, se la macchina si trovasse in quiete; e se ella trovisi in moto, ella continuerebbe a procedere uniformemente, se non vi fossero la frizione delle sue parti, ed altre resistenze.

Il Secondo Problema generale nelle Meccaniche si è il determinare la proporzione, che la forza, ed il peso dovrebbero portare l'una all'altro, affinchè, allora quando la forza prevale, e che la macchina trovasi in moto, il massimo effetto possibile esser possa prodotto dalla medesima in un tempo dato. Ella si è cosa potentissima, ed affatto manifesta, questa essere un'inchiesta di grandissima importanza, e momento, tuttochè pochissimi Matematici abbiano di ciò trattato. Quando la forza è soltanto alcun poco migliore di quella, che è sufficiente a sostenere il peso, il moto viene ad essere lo-

verchio lento; e quantunque in questo caso venga ad essere alzato un maggior peso, tuttavia non è sufficiente per compensare la perdita del tempo. Quando il peso è molto minore di quello, che la forza valevole a sostenere, viene questo ad essere alzato in tempo minore; e può avvenire, che questo non sia sufficiente a compensare la perdita originante dalla picciolezza del carico. Dovrebbe pertanto a buona equità essere determinato, quando il prodotto del peso moltiplicato per la sua velocità è il massimo possibile; avvegna- ché questo prodotto venga a misurare l'effetto della macchina in un tempo dato che è sempre, e costantemente il maggiore in proporzione, quanto il peso che è alzato, è maggiore, e quanto è maggiore la velocità, colla quale viene ad essere alzato. Noi foggiungeremo pertanto alcuni esempi di spezie somiglianti, i quali esser possono dimostrati dalla Geometria comune elementare; conoscendo noi benissimo, come possono esser fatti ulteriori miglioramenti in questa sommanente utile parte delle Meccaniche.

Allorché la forza prevale, e che la Macchina comincia a muoversi, il moto del peso viene ad essere dapprima accelerato gradatamente. L'azione della forza essendo supposta invariabile, la sua influenza nell'accelerare il moto del peso sicma, e diminuisce, mentre per lo contrario la velocità del peso cresce, ed aumenta. Così l'azione d'una corrente d'acqua, o d'aria, sopra una ruota, dee essere stimata soltanto dall'acceso, o trasmodamento della velocità del fluido sopra la velocità già acquistata dalla parte della Macchina, cui ella urta, oppure dalla loro relativa velocità. Per l'altra parte il peso del carico, che dee essere alzato, e la frizione, tendono a ritardare il moto della Macchina; e quando queste forze, vale a dire, quelle, che tendono ad accelerarlo, e quelle, che tendono a ritardarlo, divengono uguali, allora la macchina procede col moto uniforme, che ha acquistato.


Poni che AB (Figura I.) rappresenti la velocità della corrente, AC la velocità della parte della macchina, che ella urta, quando il moto della macchina



diventa uniforme; e CB rappresenterà la loro velocità relativa dalla quale dipende l'effetto della macchina. Ella si è cosa ben conosciuta, che l'azione di un fluido sopra un dato piano è come il quadrato di quella velocità relativa: per conseguente il peso alzato dalla macchina, quando il suo moto diventa uniforme, essendo uguale a quella azione, viene ad essere similmente come il Quadrato di CB. Poni, che questo venga moltiplicato per AC, velocità della parte della macchina spinta, ed urtata dal fluido; e l'effetto della macchina in un dato tempo sarà proporzionato ad $AC \times CB^2$ (supponendo che CB sia segnato in due in D) $AC \times 2 CD \times 2 DB = 4 AC \times CD \times DB$; e per conseguente l'effetto della macchina è massimo, quando il prodotto di AC, CD, e DB è massimo. Ma ella si è cosa agevole il vedere, che questo prodotto è massimo, quando le parti AC, CD, e DB sono uguali; conciossiaché se noi ci facciamo a descrivere un semicircolo sopra AD, e che la perpendicolare CE incontrisi col circolo in E, allora $AC \times CD = CE^2$; ed è massimo, quando C è il centro del circolo; di maniera tale che, affinché $AC \times CD \times DB$ possa essere il massimo possibile, che fa di mestieri, che AD sia segnata, o tagliata in due in C; e CD essendo stato segnato in due in D, ne seguita, che AC, CD, DB for'è, che sieno uguali; oppure, che AC, velocità della parte della macchina spinta, ed urtata dalla corrente, non debba essere che una sola terza parte di AB, velocità della corrente medesima. In siffatto caso, quando (astruendo dalla frizione) la macchina agisce col massimo vantaggio, il peso alzato dalla medesima è al peso, che appunto sosterrrebbe a capello la forza della corrente, come

me il Quadrato di CB, velocità relativa della macchina, e della corrente è al quadrato di AB, che verrebbe ad essere la velocità relativa, se la macchina si trovasse in quiete; che è quanto dire, come $2 \times 2 \times 3 \times 3$, oppure 4 a 9. Pertanto, affinché la macchina possa avere il possibile massimo effetto, ella non dovrà essere caricata con niente più di $\frac{2}{3}$ del peso, che è appunto ed esattamente valevole a sostenere gli sforzi della corrente. Veggasi Monsieur *Mac-Laurin*, Istoria delle scoperte di Isacco Newton pag. 171. 172. & seq. come di pari il suo trattato delle flussioni all' articolo 908.

Fatti di bel nuovo a supporre, che un peso dato P, (Figura II.) discendendo per la sua gravità nella linea verticale alzi un peso maggiore W, similgiatamente dato dalla corda PMW, (la quale



passi sopra la fissata carrucola M) lungo il piano inclinato BD, la cui altezza B A è data; e poni, che venga ricercato di trovare la posizione di questo piano, lungo il quale W farà alzato nell'ultimo tempo, dalla linea orizzontale AD a B. Poni, che BC sia il piano, sopra del quale se venisse piantato W, vi verrebbe ad essere esattamente sostenuto da P; nel qual caso P è ad W, come AB a BC. Ma W è alla forza, colla quale ci tende a discendere lungo il piano BD, come BD è ad AB; per conseguente il peso P è a questa forza, come BD è a BC. Pertanto l' eccello o trascendimento di P opra questa forza (il quale eccello, o trascendimento è la forza, che accelera i

moti di P, e di W) è a P, come BD — BC a BD; oppure prendendo BH sopra BC uguale a BD, come CH è a BD. Ma ella è cosa certa, e ben conosciuta, che gli spazj deferiti da moti uniformemente accelerati sono in ragione composta delle forze, che producono essi, ed i quadrati dei tempi; oppure, che il quadrato del tempo è direttamente come lo spazio deferito in questo tempo, ed ordine *inverso*, come la forza; per conseguente il quadrato del tempo, in cui BD è descritto da W verrà ad essere direttamente come BD, ed ordine *inverso*, come $\frac{CH}{BD}$

e farà l'ultimo, quando $\frac{BD^2}{CH}$ è un *Minimum*; che è quanto dire, quando $\frac{BC^2}{CH}$

+ CH + 2BC; oppure (perchè 2BC è invariabile) quando $\frac{BC^2}{CH} + CH$ è un *Minimum*. Ora siccome, quando la somma di

due quantità è data, così il loro prodotto è un *Maximum*, quando queste sono uguali l'una all'altra; così egli si è manifestato, che, quando il loro prodotto è dato, forza è, che la loro somma sia un *Minimum*, quando queste sono uguali. Così egli è piano, ed evidente, che (come nella Figura I.) il Rettangolo, o sia prodotto delle parti uguali AC, e CD era uguale a CE², così il Rettangolo di, quali esse sieno, due parti disuguali nelle quali AD possa esser divisa, è minore di CE²; ed AD è l'ultima somma di, quali esse sieno, due Quantitati, il prodotto delle quali è uguale a CE².

Ma il prodotto di $\frac{BC^2}{CH}$, e di CH è BC²,

e per conseguente dato; perciò la somma di $\frac{BC^2}{CH}$, e di CH è l'ultima,

quando queste parti sono uguali, che è quanto dire, quando CH è uguale a BC, oppure BD è uguale a 2BC. Egli apparisce pertanto, che quando la forza P, ed il peso W, sono dati, e che W dee essere alzato da un piano inclinato, dal livello di un dato punto A, al punto dato B nell'ultimo tempo possibile; noi dobbiamo primieramente trovare il

pia-

to lo sforzo del fluido sopra CE essendo come la forza di ciascheduna particella, ed il numero delle particelle insieme, egli verrà ad essere come $AK \times EM$; oppure, perchè AK è ad $AP (= EM)$,
 $EM^2 \times EN$;

come EN a CE come CE .

di modo che CE essendo data, il Problema è ridotto a questo, per trovare quando $EM^2 \times EN$ sia il massimo possibile, o, per parlare colla voce dell' arte, un *Maximum*. Ma perchè la somma di EM^2 , e di $EN^2 (= CM^2)$ è data, essendo sempre e costantemente uguale a CE^2 ; ne seguita perciò, che $EN^2 \times EM^4$, sia il *Maximum*, quando $EN^2 = \frac{1}{2} CE^2$; nella medesima guisa, siccome poc' anzi venne dimostrato, che quando la somma di AC , e CB (Figura I.) era data, $AC \times CB^2$ era il *Maximum*, quando $AC = \frac{1}{2} AB$. Ma quando $EN + EM^4$ è il *Maximum*, la sua radice quadra $EN + EM^2$ è di necessità nel tempo medesimo un *Maximum*. Adunque l'azione del fluido sopra il piano CE nella direzione CB è massimo, quando $EN^2 = \frac{1}{2} CE^2$; che è quanto dire quando EM , che è il seno dell'angolo ACE, in cui la corrente spigne, od urta il piano, è al raggio come il $\sqrt{2}$ ad $\sqrt{3}$; nel qual caso egli apparisce agevolmente dalla Tavole Trigonometriche, che quest'angolo è di $54^\circ. 44'$.

Parecchi Problemi utilissimi nelle Meccaniche possono risolversi da ciò, o per mezzo di ciò, che si è veduto, e mostrato nel Paragrafo precedente. Se noi facciammo rappresentare la velocità del vento da AC, una sezione della vela di un mulino a vento perpendicolare alla sua lunghezza per CE, siccome ne seguita dalla natura della macchina, che il suo asse dovrebbe esser voltato direttamente verso il vento, e la vela può soltanto muoversi in una direzione perpendicolare all' asse, egli apparisce, che, quando il moto comincia, il vento avrà il massimo effetto per produrre siffatto moto, quando l'angolo ACE, in cui il vento urta, o spigne la vela, è di $54^\circ. 44'$.

Nella maniera medesima, se CB ven-

ga a rappresentare la direzione del moto di una Nave, oppure la posizione della Carena di quella, allraendo dalla sua parte, ove batte il vento, e che AC sia la direzione del vento medesimo perpendicolare alla parte medesima, allora la posizione massimamente vantaggiosa della vela CE, per promuovere il suo moto nella direzione CB, è quando l'angolo ACE, in cui il vento urta, o spigne la vela, è di $54^\circ. 44'$.

La posizione migliore del Timone, ove egli possa avere il massimo effetto nel voltarli intorno la nave, viene ad essere determinata in simigliante maniera. E l'angolo medesimo entra simigliantemente nella determinazione della figura dei Rombi, i quali formano le basi delle celle, in cui le api depongono il loro miele, in una guisa di estremo risparmio, e frugalità. Veggasi l' Articolo APE. Supplemento.

Ma dee essere con estrema accuratezza osservato, che quando il seno dell'angolo ACE è al raggio, come $\sqrt{2}$ a $\sqrt{3}$; oppure che si riduce alla cosa medesima, quando la sua Tangente è al Raggio, come la diagonale di un quadrato è al suo lato; quello è l'angolo massimamente vantaggioso soltanto nel principio del moto della macchina; di maniera tale che le vele di un mulino comune a vento, dovrebbero essere per siffatto modo situate, che il vento potesse veracemente urtarle, e spingerle in un'angolo maggiore di quello di $54^\circ. 44'$. Considerasiachè egli sia dimostrabile, che quando qualsivoglia parte della macchina è arrivata ad acquistare la velocità c , lo sforzo del vento sopra questa parte verrà ad esser massimo, quando la tangente dell'angolo, in cui il vento la urta, o spigne, è al raggio, non come $\sqrt{2}$ ad 1, ma $\sqrt{2 \times \frac{9cc}{4aa}} \times \frac{3c}{2a}$ ad 1, la velocità del vento

essendo rappresentata da a . Se, a egion di esempio, $c = \frac{1}{2} a$; allora la tangente dell'angolo ACE, dovrebbe esser doppia del raggio, che è quanto dire, l'angolo ACE dovrebbe essere di $63^\circ. 26'$. Se $c = a$; allora ACE dovrebbe essere di $74^\circ. 19'$.

Offer-

Offervazione fimigliante è di molto maggior momento, conciofiachè in quella macchina, la velocità delle parti della vela rimota dall'asse porta una proporzione considerabile alla velocità del vento, e peravventura viene alcuna fiata ad esserle uguale; e perchè un dottissimo autore, quale si è Daniello Bernoulli, ha cavato una conclusione opposta dal suo calcolo nella sua Idrodinamica, a motivo di aver preso un granchio a secco, vale a dire, un Minimum per un Maximum; ove egli inferisce, che l'angolo, in cui il vento urta, o spigne la vela, dovrebbe scemare, e diminuirsi come va crescendo, ed aumentandosi la distanza dall'asse del moto: che se $\alpha = a$, il vento dovrebbe spingere in un angolo di 45° ; e che se la vela sia in un piano, ella dovrebbe essere inclinata al vento in un medium in un'angolo di 50° . Come quel valentuomo venisse accadere in i fatti equivoci, con preta evidenza vien fatto conoscere dall'insigne mattematico Monsieur Mac-Laurin nel suo trattato delle flussioni, §. 914.

In guisa fomigliante, quantunque l'angolo ACE di $54^\circ. 44'$ sia il massimamente vantaggioso nel principate del moto, quando una nave varca con un vento in fianco; nulladimeno dovrebbe questo essere allargato doppoi, via via che il moto cresce ed aumenta. In generale poni, che AA' (Figura III.) parallela a CB, sia ad AC, come la velocità, che la macchina ha già ricevuta, od acquistata nella direzione CB, a quella della corrente; sopra AC prodotta prendi AD ad AC, come 4. a 3., tira DG parallela a CB, e poni che un circolo deferito dal centro e col raggio Ca, incontri DG in g; ed il piano CE si troverà nella situazione massimamente vantaggiosa per promuovere il moto della macchina, quando taglia in due l'angolo α E g.

Viene ad essere universalmente supposto, che un vento diretto sempre, e costantemente promuova il moto di un bastimento, essendo la vela perpendicolare al vento, più di qualsivoglia vento di fianco; e questo è stato affermato in parecchi trattati di moderni ingegnossimi autori; ma per ischifare, che altri non

venga a prendere una per altra cosa, noi siamo obbligati ad osservare, che il gran mattematico Monsieur Mac-Laurin ha effettivamente dimostrato il contrario nell'egregio suo trattato delle flussioni sotto il Paragrafo 919. ove vengono esposti altri esempi di questo secondo Problema generale nelle Meccaniche, al quale noi rimettiamo di buon grado i nostri leggitori. Veggasi Mac-Laurin, Istoria dell' scoperte Filosofiche di Isaac Newton libro II. c. 3. pag. 173. 174. & seq.

MEDAGLIA, *Impressioni delle Medaglie*. Una sommamente agevole, e ad un tempo stesso vaghissima, e appariscente foggia di prendere le impressioni delle medaglie, delle monete, e fomiglianti, che non è generalmente nota, si è la seguente:

Squaglierai una porzioncella di colla di limbellucci, fatta coll'acquavite, e la verferai sottilissimamente sopra la medaglia in guisa, che ella veoga a cuoprire tutta la superficie: lasciarla, che quella colla rimangasi così per un di, o due, sino a tanto che ella venga ad essere interamente asciutta, e perfettamente indurita; allora staccandola verrà ad essere non altrimenti che un finissimo, chiarissimo, e duro pezzo di Cristallo di Moscovia, e rappresenterà una vaghissima, e perfettissima impressione della medaglia, od impronto. Veggasi *Show* Sezioni, pag. 430.

Alcuna fiata vien messo in opera lo zolfo, per levare gl'impronti delle monete, delle medaglie, e fomiglianti. Il metodo di effettuar ciò, si è l'appresso. Avendo fatto un'orlatura, o contorno di creta intorno al lavoro, od opera, l'impressione della quale vien bramata, ed avendo diligentissimamente unto il tutto con olio, gentilissimamente verferai lo zolfo squagliato in un vaso coperto, assine di impedire il suo infiammarsi sopra il metallo. Intorno intorno l'orlatura, od affiatatura di questa forma, farai un'orlatura di creta impastata, o sia terra da modellare, come prima, ed ungerai con olio legentissimamente le superficie interne di ambedue: quindi grado per grado vi andrai ponendo dentro una mistura di circa la grossezza di un quarto di un dito, composta di alabastro calcinato, e di acqua, della consistenza del miele ben rap-

T: 2. pro-

preso. Quella divenendo incontanente dura, può esser cavata fuori della forma, e dà le figure di quel dato impronto, medaglia, moneta, o fommigliante. Veggasi *Boyle, Opere, Compend. Vol. I. pag. 151.*

Un metodo alcun poco da quello diverso vien descritto esattamente, sotto l'articolo *Zolfo*.

Noi abbiamo altresì un pianissimo, e facilissimo metodo di procurare la verace impressione, o figura di qualsivoglia medaglia, o moneta, immaginato, e descritto da Monsieur Baker nelle nostre *Trasazioni Filosofiche* sotto il n. 473. Sezione XIII.

Prenderai una perfettissima, e fommamente acura impressione nella finissima cera da sigilli nera, o cera lacca oera, della Moneta, o Medaglia, che brami. Taglierai la cera intorno intorno l'orlatura, od affilature e contorni dell'impressione; quindi con una preparazione di acqua di gomma, del colore, del quale brami la pittura, distenderai la pittura medesima sopra l'impressione di cera con un sottilissimo pennellino di peli, osservando, che questo penetri in tutti gli incavi, seni, ed andirivieni del lavoro, essendo appunto queste le parti, che danno il risalto alla medaglia; e ti farà poi giuoco forza, che da tutte le altre parti della medaglia medesima con un dito bagnato tu vada levando, e tirando via diligentissimamente il colorito medesimo. Quindi prenderai un sottilissimo pezzo di cartoncino, alcun poco più grande della medaglia, e lo inumidirai ben bene per ogni verso. Eo affletterai sopra l'impressione di cera, e sopra il di dietro della carta vi aggiusterai ben ben distesi tre o quattro pezzetti di panno lano ben fiso, o di fenella a un di presso della grossezza medesima. L'impressione colle sue coperte, dovrai accomodare fra due ben uguali, e liscissime piastre di ferro di circa due dita quadrate, e della grossezza di circa una decima parte di un dito. Fa di mestieri, che queste sieno diligentemente, e per acconito modo corabagate entro un piccolo strettoio fatto di due lame, o piastre di ferro lunghe a un di presso quelle cinque dita, e mezzo, un dito e mezzo larghe, ed un mezzo dito grosse, a-

venti un paio di viti malehite, che lavorino per entro le medesime con una vite femmina corrispondente a cadauna di esse voltantesi, per forzare le piastre ad unirsi, e combagiarle insieme. Queste lastre venendo condotte ugualmente insieme per mezzo delle divisare viti saranno, che la materia sott'esse soprappona alla medaglia porti via, e prendasi una bella, vera, ed appariscente pittura della medaglia medesima; la quale se per avventura in alcuna picciolissima traocia manchi, potrà ripararsi agevolissimamente coll'ajuto di un picciolissimo pennellino di peli, o con uno spillo intinto nel colore, del quale altri sarassi servito, ec.

Se venga bramato semplicemente un basso rilievo, niuna cosa affatto è necessaria, salvo che il prendere un pezzo di cartone, o di carta masticata, ben ben ammorbidita nell'acqua, quindi collocandovi sopra la forma di cera senza il menomo colorito, e lasciandovi rimanere il tutto sotto lo strettoio pel brevissimo tratto di pochi minuti, verrà ad ottenersi un ottimo basso rilievo.

Simigliante metodo di rilevare, e portar via le medaglie, le monete, o fommiglianti è assai comodo, e sembra molto più tale di tutte le parecchie intenzioni, e trovati, praticati collo zolfo, collo stucco di Parigi, colla carta, ed altri tali, per i quali metodi fa di mestieri, che venga formata, e composta una forma, o di creta, o di corno, o di stucco, o finalmente di altri simiglianti materiali, che addimandano, e vogliono una buona porzione di tempo, e molta briga.

Alcuni sogliono prendere le impressioni sopra la carta dalle medaglie medesime col farla passare per mezzo di uno strettoio spianante, e dopoi dando ad esse carte il colore: questo però non solamente è più malagevole, e difficultoso, ma intacca, e danneggia grandemente le medaglie, e gli impronti, coll'appianare l'acutezza dei loro delicatissimi, e fommamente espressivi, ed appariscenti risalti. Per lo contrario la cera non viene a recare il menomissimo pregiudizio alla più fina, e delicata medaglia, e tuttochè ella sia una fragilissima sostanza, nulladimeno ella resiste, e fa benissimo testa.

ad una compressione a linea retta all'ingù.

Il rosso sembra il colorito migliore; e perciò vien messa in opera la cera negra come la più acconcia ad ottenere l'intento; ma se le pitture sono scelte nel bianco, e nel nero, perchè prendano la somiglianza di piastre, o lastre di rame, allora la cera dovrebbe esser rossa, avvegnachè la cera, e la pittura dovrebbero essere di differenti colori, e ciò per distinguere quando il colore vi è propriamente disceso, oppure tolto via, ove ciò dee farsi, a dovere.

La sostanza delle medaglie, essendo metalliche, e perciò soggetta ad esser corrosa, e le figure trovandosi rilevate, vengono similmente ad esser soggette a diminuirsi, e cancellarsi per via di fregamento, e stropicciamento. Quindi è cosa assai rara il trovare alcuna medaglia antica interamente conservata, e perfettamente mantenuta. Le gemme non sono sottoposte a simili disordini. Veggasi l'Articolo GEMMA.

MEDICAMENTI. Per questo termine medicamenti viene ad intendersi qualsivoglia sostanza, che corregga un'abito, o costituzione di corpo depravata, e viziata, e la ricovri allo stato sano. Di maniera tale che i medicamenti differiscono dagli alimenti, i quali conservano, e mantengono il corpo in uno stato sano, dove per lo contrario i medicamenti risoltano, allorchè trovasi sconcertato, e peggiorato; e differiscono similmente dai veleni, i quali tendono a distruggere il corpo.

Le parti tutte della dieta possono a buona equità appellare medicamenti alimentari, se non più, perchè possono servire a fiancheggiare la sanità, e rinforzarla contro le prime mosse di una malattia; non altramente che i veleni medesimi sono stati denominati medicamenti deleteri.

Sono i medicamenti o semplici, o composti. I medicamenti semplici son quelli, che sono formati spontaneamente, o per esprimerci più adeguatamente, coll'assistenza della sola provida natura: Quegli poi addimandansi medicamenti composti, i quali sono unicamente dovuti all'

arte, ed all'industria degli uomini non meno, che alle mescolanze di semplici differenti accomodati, e manipolati insieme.

Le differenze principali dei medicamenti semplici vengono prese, o dalla loro forma, e tessitura, o dalle loro virtù, e qualità. Quanto alla loro tessitura, questi son divisi in minerali, in vegetabili, ed in animali. Ciascuna di similianti divisioni addimandasi Classe, Regno, o Famiglia.

In ciò, che i buoni antichi ci hanno lasciato riguardante i medicamenti, cui essi mettevano in opera, havvi una confusione, ed un'oscurità grandissima, ed incredibile. La medesima sostanza assai frequentemente vien da parecchi di loro caratterizzata, e dinotata con nomi ed appellazioni differenti. Alcuni medicamenti vengono dagli antichi audacemente, e semplicemente nominati, senza alcun racconto, od istoria della loro natura, o descrizione; e per rapporto a parecchi altri, le facoltà, e virtù da essi ad un tal dato semplice attribuite, sono state dagli Scrittori moderni attribuite ad altri. Lo scharire ed appurare la faccenda, e l'appianare tutte queste difficoltà, nel tempo in cui ci troviamo, farebbe un peno di pari in estremo dispendioso, che di infinito vantaggio. Così grandi, ed in numero così eccedente sono le virtù, e facoltà, che vengono attribuite da Autori diversi a medicamenti particolari, che se dovessero esser tutte ammesse, e credute, cadauno di quelli medicamenti non altramente esser dovrebbe considerato, che uno specifico universale; ma siccome moltissime di queste virtù sono meramente immaginarie, e sognate, vuolvi di pari studio, cautela, scaltrezza, ed intelligenza somma per distinguere le facoltà, e virtù finite, da quelle, che realmente, e veramente questi dati medicamenti posseggono: e quantunque la cognizione delle facoltà, e virtù dei medicamenti trovinsi ai nostri giorni ridotte ad una grandissima lunghezza, nulladimeno molte, e poi molte sono quelle cose, che rimangono tuttora da essere scoperte, e che giacciono fra le tenebre, e rimanvi grandissimo spazio.

zio, onde continuare ad arricchire la scienza medica, di cui non havvi la più necessaria al mondo, di nuove specifiche medicine. Nè il saggio, e giudizioso medico troverà impiego meno degno per i suoi pensamenti, ed applicazioni, in istudiarlosi, ed in procurando di determinare la maniera, nella quale operano quei medicamenti, gli effetti dei quali sono già conosciuti, e di accertarsi dei più sicuri, e de' migliori metodi di prescrivergli, e di amministrarli. Veggasi *Geoffroy*, Tract. Par. 2.

Quei tali Medicamenti, che sono di un' indole, e natura terrea, od altri fomiglianti, e che non iscioglierannosi nell'acqua, la nuova Fonderia del Collegio Medico ha ordinato, che vengano preparati nella seguente maniera.

Debbonsi questi innanzi a tutto ben pestare in un mortajo, e quindi ponendovi una adeguata porzioncella d'acqua, si dovranno macinare, ed ammorbidire sopra il porfido, o sopra un durissimo marmo liscio, e sommamente piano, ed uguale, finchè vengano ridotti in una polvere impalpabile, e dopoi dovranno esser seccare sopra una pietra di gesso, e quindi levargli, e porgli in un luogo caldo, o per lo meno sommamente asciutto, ove lascerannosi per alcuni pochi giorni. In questa maniera appunto esser debbono preparati l'*Ambra*, l'*Antimonio*, il *Bezoar*, il quale dovrebb'esser levigato, invece d'acqua, collo spirito di vino, la pietra sanguigna, la calamita prima calcinata per uso dei *Ramaj*, o *Calderaj*, il gesso, il corallo, gli occhi di granchio, zampe di granchio, (così appellati) i gusci d'uova, ben nettati della membrana aderente ad essi col fargli bollire nell'acqua; le conchiglie, o nicchie d'Ostrie prima ben nettate, le perle, il verdicame, la tuzia.

Nell'*Antimonio*, e nella *Tuzia* dovrà esser avere a cura singolarissima di ridurgli in una polvere la più minuta, e sottile, che possa esser mai. Vegg. *Pemberton*, Fonderia del Collegio, pag. 145.

Operazione Meccanica dei medicamenti.
Il trattare delle Operazioni dei medicamenti meccanicamente, sembra, che sia stato il sistema favorito dei Medici, e dei Fi-

siologi dell'ultimo secolo non meno, che del nostro stesso. Il famoso *Sthal*, ed i suoi scolari tutti rigettano assolutamente questi piani, e pensano, che vengano ad essere più, che a sufficienza rigettati dall'operazione dell'*Oppio*, e dei medicamenti di natura, ed indole astringente. Un grano di oppio propriamente preso, per un dato tempo ammanterà, ed attuterà qualsivoglia dolore sopra il corpo umano. Pochissimi grani di croco di marte astringente fermano, e troncano alcune fiati un' Emoptisis prima, che possa esser supposto, che ell'abbia invaso, e penetrato gli umori del corpo medesimo. Non passa egli ogni credenza, dicon'essi, che così pochi grani mescolati con altrettante libbre di fluidi, ritenessero qualsivoglia forza meccanica, massimamente essendo cosa notissima, che gli Astringenti perdono la loro forza per via della diluizione? Essi insistono di vantaggio, che i vari effetti del medicamento medesimo sono una manifesta confutazione dell'*Ipotesi Meccanica*; così gli Emetici alcuna fiata purgano, e fanno l'effetto di Catartico, e *verseris*; gli Astringenti accrescono le Emorragie, l'*Oppio* in alcune persone eccita alacrità, anzi che stupirle. Di vantaggio, il vedere, od eziandio il puro immaginarsi alcuni Medicamenti, produrrà nel corpo un'effetto sensibilissimo, senza ombra menoma di contatto. Il famoso *Sthal* però, ed i seguaci di lui sostengono, che i Medicamenti operano massimamente per mezzo di risvegliare, ed eccitare il senso vitale; e che questo sì è l'effetto principalissimo dei medicamenti, eziandio allora quando sembra presso che evidente, che essi operino meccanicamente. Veggasi *Junker*, *Conceptus Therap.* pagg. 3. 4. & seq.

L'*Olmanno*, l'*Estero*, ed altri hanno investito di fronte l'*Ipotesi* del nostro *Sthal*. Noi noi pretendiamo già di dare alcuna più ampia od ulteriore istoria della Controverfia; e per avventura in questa medesima lite, non altramente che nelle altre, può avervi una buona parte di Logomachia. Strettamente parlando, sia di mestieri, che i principi Meccanici sieno sufficienti per applicarli all'operazione dei Medicamenti, siccome questo indubitabilmente dipende (per lo meno nel-

le prime vie) dai Principj Chimici ; nè vi ha testa d'uomo, il quale finora sia stato valevole a descriverci meccanicamente i Fenomeni della Chimica. Le Leggi dei *Minima Natura* non sono state sino adesso ridotte a quelle della pressione, e dell'impulso delle grosse masse sensibili. E per avventura quando sono state trovate le Leggi, che hanno luogo in particelle minute di materia, noi continueremo a non saperne cica rispetto al dichiarare, e mostrare tutti i fenomeni dei corpi animati, e massimamente del corpo umano.

Dice l'Esistero, pretendersi dallo Stahl, che Anima Razionale, e Natura sieno termini Siacnimi; e che è l'anima razionale quella, che formò il feto nella matrice, e che dirige, e regola le azioni tutte vitali, animali, e naturali, al preservamento del corpo; e che quindi per liberarsi dai disordini venga ad eccitare, e promuovere talvolta delle evacuazioni, talora degli sfasimi, e fomiiglianti. Veggasi l'Esistero, Dissertat. de Medicin. Mechanic. præstantia in Compend. Medic. Pract. ove ci s'insegna. e s'arrabatta per confutare i fautori e seguaci del sistema dello Stahl.

L'Junckerò, il quale scrisse secondo i Principj del nostro famoso Stahl, non nega, avervi alcuna cosa di meccanico nella Operazione dei Medicamenti indipendentemente dalla volontà, o spontaneità della Natura; ma asserisce costantemente, che la loro principale operazione è unicamente dovuta alla Natura, la quale fa uso del rimedio per arrivare ad ottenere il suo fine. Sono quell'esse le sue chiarissime Espressioni. " Operatio eorum, Medicamentorum ab ipsa Natura gubernari, innumera confirmant observationes. Licet enim non negamus subesse interdum actiones eorum aliquid Mechanicæ, a Naturæ arbitrio non pendentes; tamen hoc non est habendum, ut operandi modus illi maxime adscribi mereatur. A potiori enim si de nominatio, & Natura utitur remedio ad finem suum. " Veggasi onninamente Juncker, Conspect. Therap. pagg. 1. 2.

Osserva un moderno Scrittore, rispetto ai Medicamenti, come basi qualunque

esser si voglia la malattia, ed in qualsivoglia modo nominata, e qualsivoglia medicamento riesca universalmente utile, e proficuo nella medesima, tuttavia egli può mostrare delle circostanze dei Pazienti, o della Malattia, in cui questo medicamento medesimo riuscirà inutile non solo, ed improprio, ma pernicioso anzichè, e contrario. Questo valentuomo espone parecchi, e parecchissimi, ed esempi di questa specie. Veggasi per ciò Saggi Medici d'Edimburgo. Vol. 1. pag. 26. 27. & seg.

MEDICAMENTI dai metalli, Veggasi l'Articolo METALLI.

MEDICAMENTI da tasca. Nella Chirurgia hannovi certi dotti necessari rimedj, senza de' quali il Cerusico non dovrebbe stare un sol momento; ma che sempre, e costantemente dovrebbe portarseli indosso in una dievole borsa, od in un'accocchia scatola. Sono questi i comuni unguenti digestivi, e l'unguento scuro, od Egiziao per nettare, e per digerire le ulcere fecciose, ed alcuni balsami da ferite similgentemente, come, a cagion d'esempio, il Linimento dell'Arceo; *Linimentum Arcei*, oppure il Balsamo del Perù, del Gilead, oppure i Balsami di Copaida, od il Sammaritano. A questi rimedj fa di pari onninamente di mestieri, che sia ageunto un'Impiastro, o due, o sieno Cerotti, come il Diaquilon, oppure lo stitico del Crollio, *Syrpium Crollii*, conciossiachè, o l'uno, o l'altro di questi abbisogna presso che costantemente. Nè dovrebbe il Cerusico star mai senza un pezzo di vetriolo azzurro, per tirar via le cariosità soverchio rigogliose, od escrescenze, che dirle vogliamo, e per troncare, e fermare gli sgorgi sanguigni, od emorragie; ma in evento, che il vetriolo non provisi in pronto, supplir potranno egregiamente bene le veci di quello l'allume abbrugiato, il precipitato rosso, la pietra infernale, o qualsivoglia altro medicamento corrosivo, appuato nelle intenzioni corrosive, e similgentemente servirà se non più ad aprire gli ascessi, a fare delle fontanelle, ed a condurre a termine qualunque altra operazione di specie fomigliante. Di conserva con tutto questo divariato apparato chirurgico dovrebbe similgentemente il diti.

diligente Cerusico tenerli sempre in pronto, ed allestite delle faldelle di fila, colle quali esso può essere valevole a porgere immediato ajuto alle persone ferite: imperciocchè se trovissi per mala ventura sprovveduto di queste faldelle di fila, la persona può essere con somma agevolezza uccisa, e portata via da un gagliardissimo sgorgamento di sangue; circostanza, la quale dovrebbe similgiatamente far sì, che il Cerusico non ponesse mai piede fuori di sua abitazione, senz'esserne ben provveduto, e molto più dovrebbe averne sempramai presso di sé in casa propria in pronto una buona provvisione. Lo stesso intendasi finalmente d'ogni e qualunque generazione di fasciature. Veggasi onninamente l'*Eislero*, pag. 11.

MELA. Dinota quella voce un frutto ben conosciuto di una figura tondeggiante di un ufo grandemente considerabile non meno per cibo, che per medicamento, e somministrante eziando una specie di liquore cedronè appellato.

Non sono le mele un frutto Naturale, ma bensì meri prodotti, e creature dell'arte. Il metodo di propagarle si è per via di seminare i semi nella terra, e questi semi producono piantoni di meli salvatici, o specie di sterpi, i quali producono un frutto differentissimo dal frutto padre non meno nella figura, che nella bontà, e nel sapore. Il far sì che questi diventino meli, ella è una faccenda appartenente al giardiniere, od Ortolano per via dell'innesto. Un'occhio di un'albero melo incastrato entro il tronco, e corpo di un piantone di melo salvatico, dà motivo al pianton salvatico medesimo di produrre a tempo suo delle mele dell'indole, qualità e natura del melo, dal quale l'occhio è stato tagliato. Il valente Monsieur Ray scrive, e pone non altramente che una Regola, che il frutto sempre seguita l'occhio. Veggansi Lettere Filologiche, pag. 348. Veggasi di pari *Boyle*, Opere Filolof. Compendi. Tom. 1. pag. 250.

Quelle mele son denominate Mele d'Orto, Mele Ortenis, *mala hortensis*, appunto per contraddistinguerle da quei frutti, che producono i meli salvatici, che diconsi mele salvatiche, *mala sylvestris*. Veggasi *Quincy Pharmacop.* Par. 2. n. 451.

pag. 202. Idem num. 452. pag. 452.

La mela è composta di quattro parti, o porzioni distinte, vale a dire di buccia, di parenchyma, o polpa, di ramificazione, e di torfolo.

La buccia, o pelle della mela altro non è in fatti, salvo che una dilatazione dell'esteriore corteccia, o scorza di quel ramo dell'albero, sopra del quale il frutto, o la mela è venuta su, e cresciuta.

Il parenchyma, o polpa, così tenera, delicata, saporosa, com'ella sperimentasi, ed è, altro non è, che una dilatazione, oppure come s'esprime il valentissimo Dottor Grew (a), un trascendimento, trasmodamento, o rigoglio della parte interiore della corteccia del ramo dell'albero. Questo apparisce non solamente dalla visibile continuazione della corteccia dall'una pel gambo, all'altra; ma eziandio dalla struttura ad ambedue comune, avvegnachè sì l'una che l'altra sieno composte di vescichette: con questa sola differenza, che dove nella scorza, o corteccia le vescichette sono sferiche, e sommamente picciole, come quelle, che appena trascendono $\frac{1}{2}$ parte d'un dito nel loro diametro, nella polpa, o parenchyma elle sono bislunghe, e grossissime, essendo d'ordinario della misura d' $\frac{1}{2}$ di un dito in lunghezza. Tutte però vengono uniformemente tirate fuori dall'archeggiatura dei vasi dal torfolo verso la circonferenza della mela. (b)

(a) Veggasi *Anatomia de Vegetabili* l. 1. cap. 6. pag. 40. (b) Grew. *ibid.* lib. 4. c. 1. §. 3. pag. 279. & seq.

La ramificazione, o dir gli vogliamo assai acconciamente i vasi, altro non sono, che le ramificazioni della parte legnosa del ramo dilatantisi, e dispergentisi per ogni verso, e per ogni e qualunque parte del parenchyma, o polpa, essendo i rami maggiori fatti per comunicare l'uno coll'altro a vicenda per via d'inoculazioni dei rami minori. I rami mezzani sono comunemente venti: dieci d'essi distribuiti pel parenchyma, parecchi dei quali vanno rarcandosi verso il torfolo, o turacciolo del fiore: gli altri dieci scorrendo dal gambo per una linea più diretta, che alla per fine incontransi con i primi nel torfolo, o turacciolo, ed ivi vengono a rimanere ino-

inoculati con essi. A questi rami appunto sono attaccate le custodie dei semi della mela. Parecchi dei rami trovansi originalmente essersi di là dal frutto, ed inseriti per entro il fiore, per la giusta ed adeguata crescita del medesimo; ma poichè il frutto è cresciuto all'intestatura, e che così è venuto ad intercettare l'alimento, che prima era spedito, e mandato al fiore, questo secondo fendosi appassito, e cadendo giù, il servizio dei rami divisi allora diventa, e s'atti appropriato interamente e pienamente al frutto, vale a dire, quindici d'essi alla polpa, o parenchyma, e soli cinque ai semi.

Il torcolo della mela riconosce la sua origine dalla midolla del ramo: il fucchio del quale facendosi bastevol varco nel parenchyma, o polpa, per la quale diffondesi, lascia la midolla, la quale per simigliante mezzo va indurendosi, e cangiandosi in torcolo. Veggasi idem ibid. lib. I. cap. 6. §. 2.

Monsieur Boyle ci ha somministrato varie Esperienze sopra le mele da sè fatte nella macchina pneumatica, e per esse la produzione dell'aria, e somiglianti. Veggasi Boyle, Opere Filosof. Compend. Tom. 2. pag. 567. & seq. & pag. 609. 630. & seq. & pag. 645. & seq.

MELA. E' simigliantemente un nome dato a diversi altri frutti aventi alcuna analogia, o somiglianza nella figura, nella rotondità, ed in tali circostanze alle mele ortensi. Il frutto Ananas viene particolarmente nominato mela pina. Veggasi l'Articolo ANANAS, e l'Artic. PINA mela.

Le mele delle querce, che i Fiorentini dicono galle, o gallozole, sono una specie d'escrescenze, o trasudamenti del fugo nutritizio di quest'albero, congiunto con alcun grado di putrefazione.

Simiglianti galle, o gallozole, o specie di mele trovansi di pari alcune fiata sopra i falci.

Ella si è una specie di prognostico infra i villani, che se le mele, o gallozole quercine, quando vengono rotte, sieno trovate piene di vermi, lo che alcuna fiata succede, coloro ne presagiscono, se non una peccilienza, certamente un'annata infastida, e piena di malattie. Cole, Art. de Pempt. cap. 13. pag. 4. & seq.

Suppl. Tom. III.

MELA amara. Appellazione, colla quale alcuna fiata vien dinotata la Colocintide. Veggasi Quincy, Pharmacop. Part. II. num. 406. pag. 78. Veggasi l'Articolo COLOCINTIDE.

MELA Spinosa. E' questa una mela grandemente osservabile per parecchie ciocche, o gruppi di spine, delle quali ella è armata per ogni, e qualunque verso. Caduna di quelle ciocche è composta di sei, o di otto spine, alcune dritte, alcune un poco inclinate, ed uncinate all'insuori di varie lunghezze, da un dito fino a due dita. Veggasi Ligon. Ist. di Barbado. pag. 70. Grew, museo della Società Reale Part. II. cap. II. pag. 186.

MELA Marchesia, così appellata dal dotto Dottor Grew per rapporto alla sua figura, come quella, che è rotonda da un lato, ove ella si spiana, ed ha un gambo somigliantissimo ad una mela primitiva. Vegg. Grew, Museo della Soc. Reale, Part. III. Sezione II. cap. III. pag. 336.

Fra gli antichi ornamenti delle Chiese noi leggiamo delle mele di oro *poma aurea*; (a) per le quali a noi sembrerebbe, che dovessero essere intese le parti globulari dei candellieri. (b)

(a) Veggasi Du-Cange Gloss. Latin. Tom. 3. pag. 371. Et seq. in voce Malum. Idem Tom. 4. pag. 342. in voce Pomum. (b) Idem, ibidem.

In alcune antiche scritture di costume vien fatto somigliantemente parola delle mele di cera; *poma de cera*.

MELA dell'occhio. E' un'espressione volgare, per cui la gente minuta intende di esprimere la pupilla dell'occhio medesimo.

Monsieur Burthius in una Lettera del Bartolini riporta diversi casi, ne quali egli tagliò di netto la mela dell'occhio in vari animali, e ne schiazzò fuori gli umori, e per fino lo stesso cristallino; e che malgrado ciò restituita poscia agli animali medesimi la facoltà visiva. Egli aggiunge, come gli occhi degli uccelli, nei quali aveva fatta somigliante operazione, comparirono migliori, e più vivaci di quello si fossero prima dell'operazione medesima, e ch'ei fece poscia somigliante esperienza sopra molte, e molte persone

Vu con

non riuscita così mirabile, che negli occhi di esse non comparve tampoco dopo ombra menomissima di cicatrice. Veggansi le Trasfazioni Filosofi. sotto il n. 64. pag. 1355.

MELA amore. Veggasi l'articolo LYCOPERSICON.

MELA pazza. Veggasi l'articolo MELONGENA.

MELA pomum, generalmente è inteso dai Botanici per qualsivoglia frutto potuto vescicolare, che contenga più di un seme. Veggasi *Mars. Lect.* in Bot. pag. 20. Veggasi altresì l'art. POMA.

Moscherino della mela. Così addimandasi dagli Scrittori delle cose naturali una picciola mosca, o moscherino verde, che trovasi talvolta dentro le mele, che è ufcito da un verme, che infesta grandemente questo ottimo frutto.

Gomma delle mele. Veggasi l'articolo GOMMA.

MELANCOLIA. Melancolia, *Melan-colla* è quello nella medicina il nome di una infermità, la quale consiste nella perturbazione, od intacco dell'immaginazione, che impedisce dal formare una regolare, adeguata, e determinata idea delle cose, come negli altri tempi; di maniera tale che vengono ad essere interrotte le sue dovute operazioni, e bene spesso le seconde idee non avendo connessione colle prime, affollansi, e si confondono, e vengono succedute da azioni nè poco, nè punto analoghe a quella prima idea, e perciò comparendo irragionevoli.

Fannosi gli autori a distinguere la melancolia in tre spezie, mesta, vale a dire, allegra, e mista; vale a dire, che partecipa della natura della mesta, e della lieta melancolia: ma in tutte queste tre spezie la cagione è una, e la medesima, e la differenza ad altro non è dovuta, se non le all'abito, ed al temperamento del paziente.

Questa malattia ha però le sue più essenziali differenze per rapporto alle cagioni, dalle quali ella è prodotta. In alcune persone sembra, che pienamente, ed interamente ella dipenda da una falsa prefigurazione, e discernimento, e giudizio delle cose, nella mente; ed in que-

sto caso la melancolia è abituale, ed incurabile. In altre persone ella nasce da intacchi, e magagne del corpo; ed in queste date persone vien sempre e costantemente osservato come ella ha una proporzione, oppure come ella porta una proporzione all'intacco, offesa, o debolezza delle parti medesime. Questa spezie particolare di melancolia viene caratterizzata colla speciale appellazione di melancolia ipocondriaca: e finalmente in altre persone ella sembra di una natura mista; come quando, a cagion di esempio, ella ha avuto, e riconosce la sua origine prima da sconcerti, e disordini del corpo, ma viene poi ad essere per il fatto modo accresciuta da sconvolgimenti, e sconcerti dello spirito, che etzando dopo il totale dileguamento dei disordini, e sconcerti del corpo, ella continua a mantenersi, ed esercitare tutte le forze sue sopra lo spirito medesimo tuttavia. Questo è un caso pur troppo comune, e lommamente infelice.

Segni della melancolia. Sono questi una perpetua ansietà di animo, senza alcuna ragionevole cagione: un disgusto, ed un dispiacere per qualsivoglia cosa, etzando prima che la persona abballa innanzi agli occhi, o bene spesso un carico, e tedio per l'istesso vivere. Un frequentissimo porsi a piagnere per cagioni immaginarie, oppure per niun'ombra di cagione veruna forte. Parecchie persone in caso somigliante sembra, che non abbian luogo, ove stare, che manchi loro il terreno sotto i piedi: dannosi ad aprire tutte quelle finestre, che posson mai, e dannosi come a divagare qua e là per tutte le strade, per le piazze, e per le campagne, immaginandosi come di essere per ogni parte ristretti, ed imprigionati: altri poi abbandonano le case loro, e stannosi tutti intimoriti, e tremanti non altramente che fatto avessero delle reità capitali, e perciò temendo di esser presi, e legati, quantunque fatto non abbiano il menomo male, e sennost innocenti: ed in altre persone somiglianti indisposizioni, e sconvolgimenti dello spirito trovansi congiunti con altri disordini, e malattie del corpo, come, a cagion di esempio, con palpitazioni di cuore, con profon-

fondissimi sospiri, con dolorosa respirazione, con iltiramenti, e strettezze dei moti tonici delle parti, con tremolio, con pallidezza, e con emaciamento considerabilissimo di tutto il corpo. Alcune fiata in vece dei divisati stringimenti, vi sono delle frequentissime remissioni, od abbandonamenti dei medesimi movimenti tonici divisati, quindi ne nascono dei subitanei sollori, od infuocamenti del volto, dei vaghi, ed incerti incalorimenti del corpo, ed un indebolimento universale, e perdita totale di forze. In parecchi casi di specie somigliante havvi una ostinatissima costipazione di ventre, e le prave affezioni dell'animo vengono grandemente accresciute da una terribile vigilìa; ed in evento, che la persona veli alquanto l'occhio prendendo alcun momento di sonno, vengono tutto quel brevissimo tratto di tempo orribilmente inquietati da terrori, e paure. Se la persona da siffatta malattia posseduta sia di abito languino, trovasi mai sempre sbiottita da effusioni di sangue, spaventata da battaglie, e da fuochi; e se per lo contrario ella sia di costituzione, e temperamento flemmatico, da paure di acqua, e di precipizj, e fomiglianti. Le timorose apprensioni avvengono in questa povera, ed infelice generazione di gente somigliantemente fra la vigilìa, ed il sonno, e svegliansi di ordinario come in mezzo ad agone, con violentissimi tremori, e con grave difficoltà di respiro. Nella melancolia allega le alienazioni della mente del paziente trovansi perpetuamente impiegate, ed occupate intorno ad idee liete, e piacevoli, e con assai frequenza anche forze, ed oscene; ed alcuna fiata la loro stravolta fantasia fa, che s'innalzino ai sommi Ordini, ed al positivo stato e condizione di Re, e di Principi, e Signori grandi.

Persone sottoposte alla melancolia. Sono quelle massimamente uomini di gran sapere, e di profonda dottrina, e di una vita sedentaria, persone ipocondriache, e quelle tali, che hanno delle peche, e disordini nella milza: ed a questi tali uomini esser debbono aggiunte quelle donne, che sono soggette a sconcerti, ed affezioni isteriche.

Cagioni della melancolia. Sono queste principalmente una spessezza del sangue, ed un rattenimento del sangue medesimo intorno alla vena porta: una rea disposizione delle parti interne, come, a cagioni di esempio, una collutazione scirofa, od ulcerosa nelle medesime, oppure uno stato realmente, ed attualmente ulcerato. Quelle persone, le quali trovansi afflitte, e battute dalla melancolia, che riconosca la sua origine da quelle divisate cagioni, sono di ordinario sottoposte a fregolantissime passioni, e queste di varia generazione: amore, timore, abbandono di spiriti, disperazione, ed ira, sono bene spesso le passioni inossoro grandemente predominanti. Una soppressione delle scariche moroidali negli uomini, e degli usati corsi mestri alle femmine, farà precipitare di pari le persone in sì tremendo disordine di sanità; siccome ve le precipiterà estinguendo una trasmodante, ed eccessiva applicazione agli studi, massimamente sopra altrui, e profondi soggetti: un timore orribile di sinderesi per i commessi falli, e reità; un continuo andar fallita ogni concepita speranza; ed alcune volte una pavidità e timorosa disposizione fatta acquistare, e contrarre nell'infanzia dalla rea, e veramente punibile sciocchezza, anzi follia delle nutrici, o delle stoltissime madri.

Prognostici nella melancolia. Quella particolare specie di melancolia, che viene ad esser contratta da sole cagioni immateriali, quale si è quella, a cagioni di esempio, che riconosce la sua origine da soverchio intento, e trasmodato studio, oppure da altre immaginazioni, od effetti dello spirito, è sempre, e costantemente più ostinata, e malagevole, e difficoltosa ad esser curata, di quella melancolia, che dipende da cagioni materiali, e che ha la sua vera origine da un depravato, e disordinato stato del corpo. La melancolia ipocondriaca è di tutte la più agevole ad esser curata, massimamente se venga fatto di richiamare di bel nuovo regolarmente le troncate scariche sanguigne delle morici; febbene anche in questi casi medesimi fa onninamente di mestieri, che la cura venga procurata,

e fatta in tempo; conciossiachè, allora quando la melancolla eziandio da tali cagioni originata, si è fatta, ed è divenuta abituale, rimarrà b. nissimo nel paziente, anche dopo, che ne sarà stata dal medesimo tolta, e dilungata la cagione, che le dà l'origine.

Metodo del trattamento nella melancolia.

La Melancolia, allora quando riconosce la rea origine sua da cagioni immateriali, abbisogna di chi medichi anzi lo spirito, e la mente del paziente, cui ella assalisce, che il corpo di quello; ed il frequente conversare con amichevole ingegnosa brigata, di una disposizione placida, quieta, e tranquilla, condurrà, e spianerà la via verso la guarigione assai più, che far si potessero mille medicamenti, i quali piuttosto recherebbero danno. Fa onninamente di mestieri, che le persone in questo stato vengano poco o nulla mai fatte inquietare, nè giammai contraddette, o contrariate per quanto mai sia possibile, e debben'essere per ogni conto tenuti lontani i lacci, e le catene da queste tali persone, qualora non richiegga un tal forzato compenso una indispensabile necessità estrema. E' questo similientemente un metodo, che rendesi di pari necessario in quei casi, ove sopra la mente sia stato dall'abito uno sconcerto tale confermato, il quale sconcerto nato sia dapprima da mere cagioni materiali. Ma allorchè questa terribile infermità non solo nasce, ma eziandio interamente dipende da cagioni materiali, la cura è veramente agevole, e dee essere condotta al suo felice termine nell'appresso maniera.

Debbono primieramente nettarsi a forza d'adequate purghe le prime vie, e massimamente da quelle purghe preparate coll'elieboro nero, e dopo di ciò ocesi cavar sangue al paziente dal picde, levandone ad un di presso sei once. Dopo il sangue del paziente medesimo dovrà essere temperato con fargli prendere tre, o quattro volte il giorno delle polveri composte di nitro purificato, e degli assorbenti comuni; e dopo aver fatto un proprio, ed adeguato uso delle medesime polveri, le parti dovranno esser ricovrate al primiero loro tono, e vigore per mezzo dei calibeati d'indole più mite, e benigna. Fa

similientemente di mestieri, che ogni sua maggior cura ponga il savio, e dotto Medico nel procurare di promuovere negli uomini le scarie sanguigne delle morici, ed i regolati corsi menitrali nelle donne, ad uno stato assai naturale e conveniente; e possa far loro bere a pasto una sufficiente copia di liquori deboli, e far loro usare un moderato, e mezzano esercizio: e di vero cole tali, pel diviso acconcio modo messe in opera, sogliono d'ordinario, e pressochè con certezza ridurre il paziente ad un' assoluto stato di sanità.

La melancolia ipocondriaca è sempre, e costantemente più ristorata dalle cavate di sangue, che da qualsivoglia altra pratica Medica; e per vero dire, ogni, e qualunque altro tentativo riuscireà perpetuamente vano, ed inutile, se prima non verrà effettuato questo primo. Il nitro purificato sciolto in picciole quantitati in tutte le bevande del paziente, e cominciato a praticarsi a tempo, verrà sperimentato operare esso solo grandi effetti, e condurre esso solo a felicissimo termine la cura. Certuni sogliono avere in costume il dare in questi casi dei vomitori; ma con somma improprietà, ed imprudenza; avvegnachè questi tali medicamenti altro servizio non facciano, che il far degenerare soventi volte una semplice melancolia, in una vera, ed assoluta Mania. Veggasi l'Articolo MANIA.

MEMBRANA. Il prode, e dotto Monsieur Lewenhoeck è stato in grandissime brighe, e stenti per esaminare, e ponderare con estrema diligenza, ed intensione d'animo, le finissime membrane, che inchiodano i fascetti, o piccioli mazzetti delle fibre, delle quali è composto un muscolo. Fra questi fascetti è la membrana di una grossezza considerabile, ma ella divideasi per ogni, e qualunque verso in finissime, e sommamente picciole ramificazioni. E' questa membrana evidentissimamente composta di un dato numero di piccioli vasi, e questi esser possono distinti non solamente nelle lor parti grosse, e faticce, ma eziandio ove ella trovasi così picciola, fina, e minuta, che possa esser veduta col solo microscopio; ma questo tuttavia non può essere come abbisognerebbe veduto, ed osservato; avvegnachè

la

la membrana continui a dividersi fu suo progresso in più, e più altre ramificazioni, ed ove ella inviluppa soltanto una semplice fibra, non può essere distinta con alcun grado di precisione eziandio se vengansi adoprati i migliori microscopi. I piccioli vasi estesi per questa membrana, sono senz'ombra menoma di dubbio destinati a condurre alla medesima il suo nutrimento; ma egli è certissimo, che i globuletti del sangue non possono per conto veruno penetrare canali di tal picciolezza. Veggansi le *Trans. Filosof. num. 122. pag. 140.*

Membrana adiposa. Ella si fu opinione del gran Boerhaave, che la sede della lue venerea, o mal franzele si fosse la membrana adiposa. Hannovi moltissime apparenze difficoltà, che hanno ritenuto l'universalità del detto Mondo dal sottoscrivervi a questo sentimento; ma vi sono stati però simigliantemente casi moltissimi particolari, i sintomi dei quali sembra, che provino ad evidenza, che questa sia realmente la sede del malfranzele.

Di questi uno ci vien somministrato dal dottissimo Medico Huxam, il qual solo sembra bastevolissimo a provare la realtà dell'asserzione, e del fatto. E' questo di un Gentiluomo dell'età di circa venzett'anni, e di una costituzione, od abito di corpo caldo bilioso, il quale pochi anni innanzi la sua morte aveva contratto una venerea gonorrea, e che innanzi d'esser ben guarito di questa prima, ne aveva presa una seconda, ed ultimamente una terza; e dopo tutti questi divisi malori, tenne per sua disgrazia, e di anima, e di corpo continuato impuro commercio colle donne more nell'Indie Occidentali, le quali probabilmente avevano quella rea e trista specie di Malfranzele appellato cristallino. Provò questo Gentiluomo dopo di ciò un'assai terribile pizzicore sotto la sua pelle, ed un fiato orribilmente fetente, ed uno sputo di materia, corrotta, e marciolo, ma non ebbe giammai nè ulcersi vaganti, nè bubboni, nè nodosità, od alcun' altro di quei brutti appariscenti sintomi comunissimi in un Malfranzele confermato; ma dopo l'imprudenzissima, e pazzia sua condotta tenuta con alcune donne anche in Inghil-

terra, egli ebbe una gonorrea di nuovo, dalla quale esser non potette in modo alcuno curato; ma per lo contrario gli comparve un bubbone, o tincione nell'angina, ed alcune verrucose gonfiezze intorno intorno all'ano.

Una di queste sendo scoppiata ebbe a scaricare copia grandissima di materia, e dopo di questa ne comparvero delle altre; ma il rincone non venne giammai a suppurazione, ed in parecchie parti il corpo suo divenne scabbioso. Prese costui i fumi di cinabro, e gli venne proposta una salivazione. Ma dopo aver preso in più fiate cinque dramme di Camomelano, egli non provò il menomo male dello gomme, quantunque il divisato medicamento non l'avesse fatto nè evacuare di sotto, nè vomitare. Alla perfine i vomitorj di turbith, e le abbondevoli dosi di medicamenti mercuriali, alle quali era egli stato grandemente per innanzi acconsentito, gli cagionarono un male nella bocca; ma lo sputo era fisso, e non arrivava a fare in un'intera giornata una sola pinta. Durante questo corso di medicatura le eruzioni scabbiose eressero grandemente, di modo che venne ad esserne alla perfine tutto gremito, e coperto da capo a piede, le sue membra tutte gonfiaronsi ed in parecchi luoghi eziandio si ruppero, e da questi serropoli, e rotture sgorgavano perpetuamente fuori un sangue marciolo fetentissimo.

Sopra sì fatto male vennero messi in opera i bagni caldi di conserva colle unzioni mercuriali; ma sotto siffatte medicature la malattia continuò a crescere, ed andar sempre di male in peggio: le croste, o scabbie vennero così fitte, e satietie, che l'infelice non poteva più muoverle membra, e comparvero qua e là per molte parti del corpo suo delle ulcersi orribili; e massimamente due grossissimi tumori uno sopra una poppa, e l'altro sull'altra, dai quali venne scaricata più e più fiate copia abbondevolissima di una materia oleosa puzzolentissima. Ella era cosa osservabile, che dove comparvero queste ulcersi, e questi tumori, questi scorrevano soltanto sotto la pelle, essendo soltanto radicati, e stanziati nella membrana adiposa, di modo che i malcoli, ed i ten-

dini

dini per ogni, e qualunque verso compa-
rivano, ed erano vetri, freschi, sani ed
intatti non altrimenti che in un corpo
sanissimo.

Ora egli è piano, ed evidente, che il
Mercurio nulla, e poi nulla potette effe-
tuare rispetto ad una cura in qualsivoglia
forma, e che l'antico metodo di sodare
essendo stato tentato con i bagni caldi per
ammorbidire, e rallentare le scabbie, e
croste, per simili mezzi elle vennero
in brevissimo tratto di tempo a cader
giù nella maniera medesima, che quelle
del vajolo, ma più grosse assai, avvegna-
chè alcune di esse fossero della larghezza,
e grossezza di quattro in cinque dita. Nel
brevissimo tratto di una settimana, le in-
camicciature delle maglie vennero tutte
tolte via, e nettate, ed il collui fiato di-
venne suave, e grato; ma le sue ulcere
continuavano a scaricare ed a mandar fuori
quantità copiosissime di materia, e
malgrado tutti i grandi, e potenti rime-
di, che furono messi in opera, ebbero a
comparire sopra la glande della verga del
paziente due grandissimi taruoli, e due
rinconi nell'anguinaia. Trovavasi di pari
quest'infelice grandemente tormentato dal-
la tosse e da uno sputo, che altro non
era che un miscuglio di marcia, e di
sangue corrotto. Ella era cosa, che pro-
priamente si toccava con mano, come
tutta la membrana adiposa era stata con-
sumata dalla parte esterna del corpo, e
che allora la malattia cominciava ad in-
taccare, ed afferrare la parte del corpo
medesimo, la quale investì le parti più
vitali. Ma la Natura non rese costui
più a lungo, e lo sconsigliato sventuratissi-
mo giovane si morì alla per fine di una
tabe gallica prodotta ad un grado vera-
mente estremo. E' grandemente osserva-
bile, come in quel corrotto corpo
non trovossi un solo e semplice osso di
un menomissimo che pregiudicato, tutto
che costui si morisse con più di quaranta
sterminate ulcere sopra il suo corpo. Veg-
gansi le nostre *Trasazioni Filosof.* sotto
il n. 460. pag. 671.

MEMBRO. *Movimenti delle Membra.*

Non può essere a meno, che non sia
stato osservato da chiunque, come ella
si è cosa assai più naturale, e più agevo-

le il fare certi dati movimenti con am-
bedue le mani, oppure con ambedue i
piedi tutt'in un tempo in due direzioni
contrarie, od opposte, di quello sialo il
fargli nella direzione medesima. Noi pos-
siamo tirare nell'aria, a cagion d'esem-
pio, due linee spirali colle nostre due mani
con molto maggiore agevolezza in dire-
zioni contrarie, di quello noi ci provassimo
a farle nella traccia medesima; e
riuscirà agevolissimo il trovare, che la
sacceda segua a capello nella guisa me-
desima con i piedi, se ci proviamo a far
la cosa medesima con essi, allorchè ci
troviamo a sedere: e la stessa stessissima
difficoltà in una mano, e facilità ed age-
volezza nell'altra verrà similmente
a trovarsi, se noi tenteremo il movimen-
to medesimo con una mano sola, e col
piede ad essa opposto in un tempo me-
desimo: egli si è però in estremo difficul-
toso, e malagevole, e presto che impos-
sibile il fare questi movimenti in una di-
rezione contraria nel tempo medesimo col
braccio, e colla gamba del lato stesso.

Forz'è pertanto, che noi di pari ci ri-
solviemo in questo principio, la Forza,
cui non abbiamo da una specie di Mec-
canismo naturale, e quella senza il me-
nomo abito acquistato, di agevolmente ope-
rare con una mano, ed eziandio con am-
bedue le mani tutt'in un tempo, elatta-
mente la contrazione a questo movimen-
to, cui l'altra mano naturalmente, e con
infinita agevolezza si sperimenta, e che
eleggiamo, ed il contrario di cui ella non può
per se stessa fare senza malagevolezza, e
senza ripetute prove, ed uso dai con-
tinuati atti acquistato. Egli si è appunto a
questo principio dovuto, che noi possiamo
colla mano manca fare agevolissimamen-
te tratti lottamente contrari colla pen-
na a quella cui noi siamo usati a fare
colla mano destra. Se noi lasceremo, che
la sinistra nostra mano si muova, senza
avere una particolarissima attenzione a ciò,
che ella si sta eseguendo, come nel suonare
alcuni strumenti di Musica, le dita
essendo abbandonate alla pratica, per con-
seguente, in balia di se stesse, riusciranno
con assai maggiore felicità, che allora quan-
do la nostra attenzione è impegnata in os-
servando ciò, che stanno esse dita ope-
rando.

rando. Le lettere, o le figure fatte per simigliante guisa pertratti contrarij di penna dalla non forzata azione della sinistra mano, tuttocchè a prima vista compariscano stravaganti, e confuse; nulladimeno se verranno sostenute di contro ad uno specchio da rimirarvisi, troverannosi determinate quanto basta, e sufficientemente espresse.

Nella maniera medesima, che le azioni a queste contrarie, le quali sembrano in alcun grado naturali alle nostre rispettive membra particolari, vengono effettuate con malagevolezza, havvi un numero grandissimo di vari movimenti, i quali da noi vengono continuamente eseguiti per mezzo d'una mera disposizione naturale delle nostre membra liberamente, senz'arte, e senza esercizio alcuno: ed a vero dire, eziandio senza esservi assuefatti, e l'uno, e l'altre di queste, o colla mano o col piede ci sono egualmente agevoli, eppure noi non siamo senza una somma difficoltà, e malagevolezza valevoli a far l'uno, e l'altro di questi movimenti, allorchè sono in direzioni contrarie l'uno all'altro. Di questa natura si è il fare il tentativo d'effettuare due movimenti diversi colle mani in linee rette, l'una delle quali farà perpendicolare all'altra: il muovere una mano, od un piede perpendicolarmente sopra, oppure perpendicolarmente sotto, nell'istante medesimo che l'altra mano, o piede trovasi in moto, direttamente dalla destra alla sinistra, oppure dalla sinistra alla destra, riesce, secondo siffatto principio, sommamente difficultoso, e malagevole, massimamente a fargli tutt'e due perfettamente regolarmente e tollerabilmente svelti, e vivaci, siccome viene ad essere agevolmente sperimentato da chiunque, nel provarsi a stropicciarli il corpo all'insù, ed all'ingiù con una mano, e trasversalmente, oppure da un lato all'altro lato coll'altra in un tempo medesimo, molto più evidentemente s'è venga tentato di fare simiglianti movimenti nell'aria, senza toccare alcun corpo, o toccando soltanto leggermente, e superficialissimamente, ed effettuando il movimento con brio, e vivacità. Questo non può esser più ovvio, e chiaro quanto in co-

loro, che sono addestrati nel suonare la tromba marina, che è un'istrumento a corda con un collo grandemente lungo, ove il fare scorrere in su, ed in giù la mano per effettuare le note viene sperimentato in estremo disaccordo, mentre l'altra mano trovasi impiegata in un movimento esattamente contrario per fianco nel dirigere, cioè, l'arco.

Simigliantemente malagevolezza del fare, ed effettuare i movimenti nel tempo ed instante medesimo, l'uno all'altro contrario con due membra, l'uno, o l'altro dei quali movimenti da se solo non farebbe di malagavole esecuzione, non è cosa particolare alle braccia: se noi ci porremo a sedere, e teneremo l'esperienza coi piedi, l'evento farà da noi sperimentato a capello il medesimo; ed eziandio il muovere in guisa differente dita simiglianti, od i diti grossi delle mani, o dei piedi, viene sperimentato di una proporzionata malagevolezza. Nè la difficoltà di simiglianti movimenti è già soltanto particolare ai movimenti perpendicolari, o trasversali: il fare dei cerchi, o delle linee spirali, o serpentine colle due mani, o co' due piedi nel tempo ed instante medesimo nel medesimo direzioni contrarie, è di fatto ugualmente malagevole, e difficultoso: di vantaggio egli si è ugualmente vero, che quantunque sia estremamente difficile, e presso che impossibile il fare questi movimenti in direzioni contrarie nel tempo ed instante medesimo, tuttavia questi sono tutti movimenti, i quali noi separatamente facciamo con estrema agevolezza, e con grandissima sveltezza, e vivacità. Noi non siamo nella maniera medesima valevoli per verun conto a dirigere i nostri due occhi a due oggetti differenti, piantati e collocati in situazioni contrarie, in un tempo, ed instante medesimo: ma in questo la difficoltà, tuttocchè grandissima nella struttura de' nostri occhi, non è di pari universale però in tutte le creature viventi. Conciòsiachè il Camaleonte sia benissimo valevole ad effettuar questo, ed a riguardare innanzi, ed indietro, od in qualunque altra direzione che mai esser si possa a un tempo stesso, ed instante. Il prode, e dottissimo Monsieur Winslow si mosse da un numero grandissimo d'osservazioni di

que-

quello genere ad esaminare, e ponderare con estrema diligenza le disposizioni dei nervi, e le loro differenti origini nel cervello, nel cerebello, e nella midolla allungata, e nella midolla spinale. La prima cosa, sopra la quale questo sommaramente accurato anatomico fece la sua osservazione, si fu l'incrocicchiatto dei nervi nella midolla allungata scoperta la prima volta da Monsieur Petit, ed accuratissimamente descritta, e figurata da esso; e le osservazioni dell'autore medesimo, di persone differenti, le quali per propria sua cognizione, e, dirò così nelle sue mani, erano divenute paralitiche nelle membra nel lato del loro corpo contrario alla parte intaccata, ed affetta similmente del cervello. L'esser valevole a far venire sintomi similanti negli animali bruti da ingiurie, ed intacchi ai lati contrari del cervello, ed irregolare incrocicchiatto dei filamenti, che passano trasversalmente nell'arco midollare appellato comunemente il corpo calloso del cervello, e dell'altro delle fibre nervose, sembrava, che promettesse di somministrare alcun lume per la spiegazione, ed appianamento della malagevolezza di questi movimenti contrari nel tempo, ed istante medesimo effettuati. Allorchè questo accuratissimo Osservatore si fu a sufficienza informato dei divisati incrocicchiatto dei nervi, e delle altre comunicazioni reciproche delle varie parti del cervello, oppure delle sue due metà laterali, non meno accuratamente bene per le due grosse corde trasversali, che per le trasversali fibre faticce della picciola superficie inferiore, e della superficie triangolare dell'arco, ci diedi a fare la sua osservazione sopra la struttura della midolla spinale. Feceli ad esaminar questa parte con estrema accuratezza col microscopio, ed oltre alle fibre trasversali che fanno la comunicazione fra le due colonne di quella midolla, e che da Monsieur Petit furono prima diligentissimamente descritte, vi compieva a Monsieur Winslow una grossezza di cadauna di queste colonne un lungo tronco loro comune istinto, e composto di una materia in bianca, e più nuvolosa di tutto il rimanente; oppure una corda mi-

dollare, la quale innanzi a Monsieur Winslow non vedea da alcun'altro osservata, alquanto maggiore delle picciole corde, e delle fibre trasversali della sommità dell'arco del cervello, oppure del incrocicchiatto delle sue fibre trasversali.

Da queste parecchie incrocicchiatte, e dalle reciproche comunicazioni dei filamenti midollari, i quali sono, per così esprimerli, le radici, o barbe de i nervi di cadauna metà, oppure di cadaun varo lato del corpo umano; non sembra impossibile l'appianare, e lo spiegar la ragione della testè divisata malagevolezza di effettuare i movimenti contrari con due membra opposte nel tempo od istante medesimo; massimamente allorchè viene ad essere osservato, che le sue picciole porzioncelle di filamenti midollari, che compongono i tronchi primitivi di ciaschedun paio di nervi, che sono propagati dalla midolla spinale, hanno il varco, e passaggio loro per le aperture laterali delle vertebre, e prima che s'embrì, che procedano in parte dalla colonna adiacente, o sia metà della midolla spinale, ed in parte dall'altra colonna, o metà per mezzo del po' anzi additato incrocicchiatto; e per conseguente, che da questo reciproco incrocicchiatto, od intralciamiento, una delle primitive porzioncelle, o dir gli vogliamo mazzetti, o fascetti di filamenti di cadaun tronco dei nervi di un lato del corpo, for'è di necessità, che si uniscano, o comunichino colla compagna, o corrispondente porzioncella, o mazzetto di filamenti dei nervi dell'altro lato.

Conosce, ed intende quasi chiechessia, che il moto dei muscoli, e la sensazione pel tatto, vengono ad essere effettuati per mezzo dei nervi, e de i loro filamenti; ma niuno finora è giunto però ad scuoprire i veraci mezzi. Questo però è certo, che allora quando noi ponghiamo in movimento in un tempo, ed istante medesimo le nostre due gambe, e le due braccia, oppure le dita, od i polli di cadauna mano, o di cadaun piede, in questo tempo i filamenti incrocicchiatte de i tronchi primitivi dei nervi, che vanno ai loro muscoli corrispondenti sopra cadaun lato, vengono immediatamente in un contatto vicendevole, ed in consenso l'uno coll'

coll' altro; ed il loro così incontrarsi appunto nel tempo, ed istante del loro movimento, viene a comunicare certe date impressioni reciprocamente ai parecchi nervi, le quali impressioni da essi vengono ad essere propagate a i due differenti lati del corpo, e continuano ad operar di conserva sopra i varj muscoli d' ambedue le braccia, o di tutt' e due i piedi nel tempo, ed istante medesimo, e comunicano all' un e l' altro quel principio di movimento, che noi intendiamo di dare ad un solo. Veggasi *Memoires Acad. Roy. Scienc. Paris. ann. 1739.*

MEMBRO di un fiore. Presso i Botanici. Veggasi l' **Artic. PETALE.**

MEMORIA. Parecchi stati sono in tutte le età i tentativi fatti per aiutare, ed assistere la memoria. Alcuni sono ricorsi alla Medicina, come appunto si fecero già Monf. Horstius (a), Marsilio Ficino (b), Monf. Jonhilton (c), ed altri non pochi. La buona sanità, la giusta ed adeguata digestione, e l' animo libero e sceuro dalle cure, è un' osservazione assai antica (d), essere ajuti per simigliante rispetto. Ella si è di pari cosa nota a chicchessia, essere onninamente necessarie l' attenzione, l' applicazione, e la frequente recapitolazione. Ma le oltre la naturale sanità delle parti, ed oltre l' esercizio delle nostre facoltà, non possa l' Arte somministrare un ajuto, od assistenza, o fiancheggiamento alla Memoria, ella è stata una dibattuta questione. Viene asserito, Simonde essere stato il primo, che ponesse in campo l' Arte della Memoria (e). Il suo metodo era per via di luoghi, e d' immagini, non altramente che una dispensa o magazzino d' idee; tale appunto, a cagion d' esempio, come un' ampia casa divisa e compartita in parecchi appartamenti, camere, gabinetti, e somiglianti. Tutte queste cose non meno che l' ordine loro, dovea altri renderli familiari all' immaginazione ed alla Memoria (f). Quindi qualivoglia cosa, che dovette essere ricondotta alla reminiscenza, veniva eccitata da alcuna simbolica rappresentazione, od altro, non altramente che un' ancora per la navigazione, da esser connessa con alcuna parte della Casa, od altro artificiale Magazzin, in una maniera regolare.

Suppl. Tom. III.

Cicerone, e Quintiliano (g) ci somministrano alcun piano di questo metodo, e ragionano del medesimo con istima e rispetto. Da parecchi Autori moderni sono di pari stati tentati dei miglioramenti della memoria artificiale. Aveavi una raccolta di varj Trattati di specie somigliante pubblicata in Lipsia (h). Questa, ed il Simonides Redivivus del Bruffio (i), vengono commendati da Monsieur Morhof (k). Dal Paschio ci vien somministrata somigliantemente l' istoria di parecchi Autori, i quali hanno trattato di quell' Arte (l). Ella si è senza contrasto d' uso non mezzano nell' Istoria, e nella Cronologia. L' artificio principale in simigliante rapporto, consiste nel formare un' artificiale voce, le lettere della quale verranno a significare dei numeri. Quindi con assai maggiore agevolezza e felicità esser può ricapitolata, e ridotta alla memoria una data, od Era, che senza un tale argogoglio. Di siffatta invenzione vien fatto parola dal Paschio, non altramente, che di un segreto a pochissima gente noto (m). Egli è stato dilatato, e coltivato ultimamente in Inghilterra (n) dal Dottor Grey.

(a) *de Sanitate Studiosorum lib. 2. cap. 1.* (b) *de Vita, lib. 1. cap. 25.* (c) Jonhilton, *Idea Medicinae Pract. lib. 8. cap. 4.* Veggasi Paschius *de Nov. Invent. pag. 139.* (d) Quintilian. *Instit. Orat. pag. 992.* (e) Quintilian. *lib. cit. pag. 985.* (f) *ad Herennium lib. 3.* (g) *lib. cit.* (h) *Variorum de Arte Memoriae Tractat. Lipsia 1678. in 8.º* (i) *Poliphistor, lib. 1. pag. 374. 375.* (k) Adam Bruxii, *Simonides Redivivus, seu Ars Memoriae & Oblivionis, Lipsia, 1640. in 4.* (l) *lib. cit. pag. 133. 140.* (m) *lib. citato, pag. 190. Numerus per certas litteras, verba memorialia comprehensus, exprimitur.* (n) Veggasi *Memoria Technica, oppure Nuovo metodo di Memoria Artificiale &c. Londra 1740. in 8.º* e simigliantemente *Lous Mnemonic.*

Il metodo è il seguente:

Per ricordarsi qualivoglia cosa nell' Istoria, nella Cronologia, nella Geografia, e somiglianti, vien formata una voce, il principio della quale essendo la prima sillaba, o sillabe della cosa, che dee altri ricordarsi, per via di frequente ripetizione dee tirarsi dietro le ultime parti,

X x

lo

lo che viene ad esser fabbricato in guisa da dare la risposta. Così nell'Istoria il Diluvio universale avvenne negli anni innanzi alla Natività di Cristo Signore 2348. Quello può essere significato dalla voce *Dil d'rok*: *Dil* stando per l'intera parola Diluvio, ed *rok* per l'anno 2348. Come poi fomiglianti voci vengono a significare siffatte cose, oppure come vengono a far sì, che altri se le rammentino, ora dee essere dimostrato.

La prima cosa, che dee esser fatta si è l'imparare con estrema esattezza la seguente serie di vocali, e di consonanti, che debbono rappresentare le figure numeriche, per sì fatta guisa, che sieno valevoli a formare a piacimento una voce, o termine tecnico, il quale starà per qualsivoglia numero, oppure a risolvere una voce già formata in numeri, che sieno per essa.

a e i o u au oi ei ou y
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
b d f i s p k n z

Quivi *a* e *b* stanno per 1., *e* e *d* per 2., *i* e *s* per 3., e così del rimanente. Queste lettere sono assegnate ad arbitrio alle rispettive figure, e possono con estrema facilità venire in mente. Le prime cinque vocali in serie rappresentano naturalissimamente 1, 2, 3, 4, 5. Il dittongo *au* essendo composto di *a*, 1, ed *u*, 5, sta per 6, *oi* sta per 7, essendo composto di *o*, 4, ed *i*, 3, *ou* per 9, essendo composto di *o*, 4, ed *u*, 5. Il dittongo *ei*, verrà ad essere agevolmente rimembrato per 8, essendo le iniziali della voce. In maniera simigliante per le consonanti, ove le iniziali possono essere comodamente ritenute, se ne dovrà far uso per significare il numero, come *t*, per 3, *f*, per 4, *g*, per 6, ed *n*, per 9. Le altre verranno assegnate, senza alcuna ragione particolare, se non che possibilmente *p* può altri più agevolmente ricordarselo per 7. *sepsem*, *k*, per 8, ed *ixtu*, *d*, per 2, o duo *b*, per 1. come quella, che è la prima consonante, ed *l* per 5 essendo la Lettera Romana per 50., possono essere, io torno a dire, rimembrate più facilmente di tutte le altre, qualunque esser si possano, che s'è detto state poste in luogo loro. Veggasi

memoria Techn. pagg. 2. 3. & seq.

Dee essere inoltre osservato che *x*, ed *y* venendo usati per rappresentare la cifra, ove parecchie cifre incontransi insieme, come 1000, 1000000, ec. ec., in vece di una ripetizione a *x y x y x y*, ec. farai, che *g* stia per 100, *ig* per 300; *aug* per 900, ec. *ath* per 1000, *am* per 1000000, *lum* 59000000, ec. ec. Veggasi memor. Techn. pag. 5.

Le frazioni poi possono esser messe giù nell'appresso guisa:

Poni, che *r* venga a significare la linea separante il numeratore, ed il denominatore, il primo venendo innanzi, l'altro dopo di quella; come a cagion di esempio, *iro* $\frac{1}{2}$, *up* $\frac{1}{3}$, *pourag* $\frac{2}{5}$ ec. Quando il numeratore è 1, oppure l'unità, non abbisogna di essere espresso, ma comincia la frazione con *r*; come, a cagion di esempio, *re* $\frac{1}{2}$, *ri* $\frac{1}{3}$, *ro* $\frac{1}{4}$ ec. Così nei decimali, *rag* $\frac{1}{10}$, *rath* $\frac{1}{100}$ Idem, ibidem.

E' questa la parte principale del metodo, il quale consiste nell'esprimere i numeri per via di voci artificiali. L'applicazione all'Istoria ed alla Cronologia viene ad essere simigliantemente effettuata per i termini, o voci artificiali.

L'arte ivi consiste nel fare un siffatto cambiamento nel compir o terminare il nome di un luogo, di una persona, di una pianeta, di una moneta, o medaglia, e simiglianti, senza alterare il principio della medesima, come suggerirebbe prontamente la cosa pensata, nel tempo medesimo, che il principio della voce, essendo conservato, verrà ad essere un capo voce, od una sillaba in pronto per terminar la medesima per sì fatto modo cangiata. Così, a cagion di esempio, per ricordarsi gli anni, in cui *Ciro*, *Alessandro*, e *Giulio Cesare* fondarono le rispettive loro monarchie, possono esser formate le appresso voci: per *Cyrus*, *Cyrus*: per *Alexander*, *Alevita*: per *Julius Caesar*, *Julos*. *Uis* significa, secondo le forze, o facoltà assegnate alle Lettere pot' anzi mentovate, 536: *ita* è 331, ed *os* è 46. Quindi sarà agevole il ricordarsi, che l'Impero di *Ciro* fu fondato 536. anni prima della venuta di Cristo Signor nostro, quel di *Alessandro* 331., e quello

di Giulio Cesare 46. anni innanzi a Crisostomo. Vegg. *mem. Tech.* introd. p. VIII. e IX.

Per l'ulteriore applicazione di questo metodo, noi ci riportiamo di buona voglia all'ingegnoso Autore del libro ultimamente citato. Noi aggiungeremo soltanto, che in versi tecnici contribuiscono di lunga mano all'aiuto, e fiancheggiamento della memoria, non meno perchè questi contengono generalmente una gran porzione in tratto picciolissimo, come anche, perchè qualora uno siane addottrinato, è presto che impossibile, che arrivi a dimenticarsene. Il poc' anzi allegato Autore ci ha somministrato parecchie prove di simiglianze particolari versi nell'Istoria, nella Cronologia, nella Geografia, e nell'Astronomia, come altresì per le monete, pesi, e misure, Giudaiche, Greche, e Romane, e per cose simiglianti. Egli avverte i suoi leggitori a formare le voci, ed i versi per se medesimi per uso loro proprio; e questo perchè in tal caso ricorderassi uno sempre meglio, e con più agevolezza i versi di sua propria invenzione, che quelli composti da altri. Vegg. *Lib.* citato Introduzione, pag. XI.

Ella si era una pratica in uso presso gli Ebrei quella di non solamente abbreviare, ed accorciar le sentenze, ed i nomi di moltissime voci, coll'accostare insieme le lettere iniziali di quelle voci medesime, e quindi comporre delle lettere iniziali medesime una voce artificiale, per esprimer con essa il tutto, come, a cagion di esempio *Rombam*, per *Rabbi Moses ben Maimon*: massi fecero simigliantemente uso delle voci naturali per rappresentare dei numeri, allorchè incontravansi con tali, che avveniva, che corrispondessero al numero, che loro bisognasse di esprimere (a). Ad osservazioni di genere somigliante appunto sembra, che l'Autore ultimamente allegato debba le prime tracce, onde formò poscia il suo metodo (b).

(a) Vegg. *Mem. Tech.* Introd. pag. XV. XVI. (b) *Lib.* citato pag. XVII.

Rispetto poi al metodo di Simonide, Quintiliano non nega, ch'esser possa d'alcuno uso, a cagion di esempio nel ri-

petere una moltitudine di voci in quell'ordine, che le medesime occorrono, e nelle cose di somigliante natura. Ma lo stesso Autore lo tiene di uso assai minore nell'imparare a mente, e ritenere un'orazione continuata, anzi egli stima, che per siffatto rispetto induca per lo contrario confusione, ed imbarazzo. (a) Egli stesso avverte, che se il ragionamento, di cui altri dee ricordarsi, sia lungo, di porli ad impararlo a pezzi, e quelli non gran fatto piccioli. La prima partizione pertanto dovrebbe essere massimamente fatta secondo i Topici differenti. Egli è d'opinione, che sia miglior partito l'imparar a mente le cose tacitamente, ed alla cheta, ed in evento, che ad alcuna riesca più agevole di fissar l'attenzione in pronunciando, nulladimeno ei vorrebbe, che ciò si facesse come fortivoce. Le dicevoli, ed acconce divisioni aiutano grandemente la memoria. Ma dopo tutto questo, l'Arte grande, e sovrana della memoria si è l'esercizio di imparare a mente moltissime cose, e questo, se sia possibile, ogni giorno. Cosa non avvi in natura, che aumentisi tanto per l'uso, e che per lo contrario intorpidiscasi, e s'irrigidiscasi tanto per la negligenza e trascuratezza, quanto la memoria. In qualsivoglia età, che un'uomo diasi a voler migliorare quella sua facoltà, ei dovrebbe con una santa pazienza sottrahersi alla disagiata fatica di ripetere ciò, che egli ha letto, o scritto. In questo, non altrimenti che negli altri casi, nei quali debbonsi acquistare abiti, l'esercizio dovrebbe essere gradatamente accresciuto.

(a) "Nonne impediri eorum, quae
,, dicunt, decursum necesse est duplici me-
,, moriae cura? Nam quomodo poterunt
,, copulata fluere, si proprii singula ver-
,, ba ad singulas formas respiciendum erit."
Quintilian. loco citato, pag. 993. & seq.

Notava il gran Bacone da Verulamio parecchi ajuti, e fiancheggiamenti della memoria, come, ordine, luogo artificiale, verso, qualsivoglia cosa che induca un'ente intellettuale ad essere afferrato dai sensi, e quelle tali cose, le quali fanno un'impressione per mezzo di una forte passione, come timore, sorpresa, e somiglianti.

ti. Quelle cose somigliantemente approfondansi grandemente nella memoria, e vi rimangono indelebili per tempo lunghissimo, le quali vegono a rimanere impresse in una mente chiara, non pregiudicata, od innanzi, o dopo l'impressione, come le cose, che noi impariamo a scuola da fanciulli, o sopra le quali ci ponghiamo seriamente a riflettere appunto prima di addormentarci; come similmente quelle cose, che sono le prime ad esser da noi imparate.

Similantemente una serie, o moltitudine di circostanze, oppure, per così esprimerci, manichi, e caviglie da esser prese ed afferrate, aiutano la memoria; come il fare parecchie spezzature in iscrivendo, leggendo, o ripetendo ad alta voce. Ma rispetto a quest'ultimo, non si sfugga di mente l'opinione di Quintiliano poc'anzi additata.

Quelle cose, di cui abbiamo molta aspettativa, e che svegliano l'attenzione, rimangono meglio attaccate, che quelle tali, che passano leggermente sopra la mente: quindi è, che le altri facciasi a rileggere senza interrompimento una scrittura venti volte, egli non se ne ricorderà così bene, come se egli la legga sole dieci volte, ma in questo mentre di tratto in tratto provandosi a dirla a mente, ed ove falli, facciasi tratto tratto a dar delle occhiate alla carta, ove la scrittura medesima è distesa. Veggasi *Barone*, Opere Compend. Vol. II. pag. 475. Veggasi di pari Vol. I. pagg. 135. 136. Vol. III. p. 176. Veggasi finalmente l'Articolo TAVOLE MNEMONICHE.

Debolezza della memoria. La debolezza della memoria in parecchi casi esser dee considerata non altrimenti che una malattia; e di fatto vien riguardata in questo aspetto dagli Scrittori medici, i quali sonosi fatti anche a prescrivere per la medesima dei medicamenti di genere vario.

Le cagioni principali di siffatta debolezza sono, un' uolo soverchio frequente, non interrotto, e forzato, oppure, per più dirittamente esprimerci, un vero abuso della medesima, formando per pratica numeri di voci, e di sillabe, massimamente in imparando idiomi differenti:

un' affezione paralitica nella testa; urti esterni violenti nella parte medesima: acuti, e violenti dolori di testa accompagnati da delirio, od accompagnanti una frenitide. Ed a questi dovrannoosi con grandissima ragione aggiugnere l'ubriacchezza, ed il trasmodato uso venereo.

Prognostici. Tutte le debolezze della memoria, da qualunque cagione esse si nascano, a grandissimo stento vengono ad esser curate dai soli medicamenti; ed, a vero dire, seconcerto di tal fatta radissime volte vien riparato, seppure non venga ad esser alterata la fabbrica tutta della mente, ed il corpo, e tenore della vita: debbon'essere schivate tutte le passioni, e posti da un lato gli stravizzi, sieno questi di qualunque specie essere li vogliano. Ma delle altre spezie tutte quella debolezza di memoria, la quale procede da un disordine ed affezione paralitica della testa, massimamente quando questo disordine medesimo attacca, ed investe la lingua, viene sperimentato essere di una guarigione tanto difficoltosa, e malagevole, che il caso è più disperato, che altro. Il molto dormire, oppure la vigilia soverchia ed eccessiva, riescono di pari dannosi, e pregiudiziali alla memoria; e con assai frequenza, (lo che è grandemente più fatale) riducon l'uomo presso che ad una total perdita della medesima.

Metodo di Trattamento. Tutti quei tali medicamenti, i quali sono di un sapore insieme, e di un odor grato, viene generalmente supposto, che vagliano grandemente a fortificare la Memoria; ed il legno aloè, l'ambra, ed alcune altre droghe odorose, e fragranti, è stato sperimentato far bene grande. I medicamenti aromatici, volatili, e spiritosi arrecano di pari tutti di conserva dell'ajuto in questo caso, qualora vengano usati in piccole doserelle, e che sieno continuati per lungo tratto di tempo non interrotto. I medicamenti analetici, e ngrvini vengono eziandio grandemente commendati, ma se vogliamo dir la cosa, com'è in fatto, radissime siate quelli vengono sperimentati di uso, e proficui; conciossiachè fra quelle persone, le quali patiscono di debolezza di memoria, molte quelle sono di una costì-

costruzione robusta, e di un grande appetito, le quali mangiano molto più di quello, che la Natura addimanda, e perciò ritraggono pochissimo vantaggio dall'uso degli analettrici, o delle sostanze nutritive.

Le cavate di sangue in picciolissima quantità ripetute con frequenza, in quei casi, ove non abbiasi indicazione Medica, che voglia il contrario, assai sovente riescono in casi similissimi lottamente benefiche; ma prima d'imbarcarsi in sì fatta medicatura fa onninamente di mestieri, che si nettino, e si rimondino le prime vie. Da parecchi vengono raccomandati, e grandemente esaltati i facchetti, o borse di sostanze aromatiche applicate alla testa, da esser portate perpetuamente per berrette; ma noi ci facciamo a temere, e non poco, che un suggerimento medico di siffatto genere sia per far nulla, od assai poco all'intento. Veggasi onninamente *Juncker*, *Conspect. Medic.* pag. 682.

MEMORIALE. Questa voce viene ad importare a capello il medesimo, che queste altre espressioni, vale a dire. *Adversaria*, *Episthographia*, *ὐπερμνημον*, oppure *memoriale*, *memorie*, *memoriale*, &c. ed opponesi al termine *Codex*, *Codice*; conciossiachè il primo serve, o sia per materie occasionali, che sieno state scritte, e tirate giù in fretta, e che da questo sieno state dopoi trasfatte, e trasportate nel secondo in una miglior soggia regolare, ed ordinata per uso.

Parla Monsieur Morhof assai distesamente dell'uso, e de' vantaggi che questo memoriale, od *Adversaria*, arrecano ai Letterati, comechè possionvi far entrare, e scrivervi tutte quelle cose, che son degne d'esser notate, nelle quali s'imbattono, od in leggendo, od in conversando con altri dotti, in una maniera assai piana, ed agevole, ed in quell'ordine, in cui s'imbattono. Fa vedere questo valentuomo, come questo metodo di far dei repertori, o raccolte, è grandemente superiore a quello di digerir le cose sotto certi capi, ed articoli, o come s'esprime con voci tecniche, Luoghi Comuni; quantunque egli conforti altrui ad imitare i Mercadanti, e servirsi d'ambidue i divinati metodi, vale a dire, di un giornale, e

di un manuale. Veggasi *Morhof*, *Polyhistor*. Lib. 3. cap. 1. pagg. 561. 562. & seq.

Con questo nome *Adversaria* hanno alcuni intitolati diversi libri, contenenti Raccolte di Miscellanee, d'osservazioni, di comenti, note critiche, e che so io? Veggasi *Bibl. Anc. Mod. Tom. 28. p. 233.*

In questo senso la voce *Adversaria*, *Memoriale*, viene a significare a capello lo stesso, che *Varia lectiones*, *variae Observationes*, *Commentarii*, *Lectiones antiquae*, *loci Communes*, *geniales dies*, *Vespera*, *Elesta*, *Miscellanea*, e molti, e molti altri di genere somigliante. Veggasi *Struv.* *Bibliot. Antiq. f. 72. p. 13.*

Le Opere sotto similgiante denominazione sono assai sovente confuse, teorrette, piene di ripetizioni, di contraddizioni, di cranciporti, e di mille, e mille altre pecche, e difetti. Veggasi *Richter*. *Obstet. Anim.* pag. 171.

Servonsi di pari della voce *Adversaria*, *Memoriale*, per dinotare un Comento, o serie di annotazioni sopra alcun testo, o scrittura.

Ma questa appellazione fu veramente adattata, e per avventura non senza proprietà grande, perchè il comento, od annotazioni trovavansi scritte nella pagina di contro, od opposta. Veggasi *Hoffman.* *Lexicon Univer. tom. 1. pag. 67.*

MENSTRUO. Siccome numero assai maggiore di cose porrebbon' esser fatte nella Chimica di quello, che noi troviamo di presente riuscibile in pratica, se noi fussimo provveduti di più menstrui di quelli, che finora sono a nostra conterza, così farebbe senz'ombra di dubbio un soggetto di uso infinito nella Chimica il porsi a rintracciarne de' nuovi. Per similgiante effetto dobbiamo farci a riflettere, come in qualsivoglia guisa i sali vengano ad essere uniti, e combinati con altri sali, da questa mescolanza, ed incorporamento ne vengono prodotti altri Menstrui novelli.

Così se alla soluzione del sal marino venga aggiunto un puro alcali, vien' ad esser precipitata una materia terrea, e polcia il sale ottenuto per via di cristallizzazione dal liquore chiaro, sarà un sal Marino assai più puro di quello si fosse innanzi, e

valc-

valevole ad agire sopra i corpi in una maniera differente.

L'Alcali medesimo fissato essendo aggiunto alla brina di nitro, produce il liquore fisso, e lattato, e precipita una materia terrigna; dopo di che il nitro procurato per via di cristallizzazione, diviene assai più puro di quello si fosse prima.

Allorchè alla brina del sale ammoniacico viene aggiunto l'alcali fissato assera l'acido di questo sale, e pone in total libertà l'Alcali volatile della Composizione, e gli dà agio di tratvolarsene per l'aria, lasciando soltanto nel fondo del vaso un purissimo sal marino fissato. Se venga aggiunto un'Alcali puro volatile alla brina del sale Marino, fissa prima il liquore, poscia lo purifica, e se ne vola via; e la cosa a capello la medesima viene a prodursi, allorchè è aggiunto ad una soluzione di nitro; e quando è aggiunto ad una soluzione di sale ammoniacico, quello nella maniera medesima purifica il sale senza alterare di un menomo che la sua natura, e vola sene nell'atto; che vienvi versato. Gli acidi vegetabili non producono, che picciolissima alterazione, allorchè vengano mescolati col sal marino, col nitro, e col sale ammoniacico. Gli acidi vegetabili fermentati, eziandio dopo essere stati purificati per mezzo della distillazione, non vengono a produrre grande alterazione, allorchè sieno mescolati con i sali medesimi. Se il vetriolo calcinato, oppure l'allume, sieno mescolati col nitro, e distillati, somministrano l'Acqua forte, che non contiene un menomo che dell'acido di vetriolo, o d'allume, ma è un puro, e mero spirito di nitro; e se vengano mescolati col sale marino, e nella maniera medesima manipolati, il prodotto, che quindi ne risulta, è uno spirito di sale; e se vengano mescolati col nitro insieme, e col sal marino, producono un'acqua Regia. Così se il nitro, od il vetriolo calcinato vengano sguagliati insieme in un fuoco aperto, viene ad essere scaricato l'acido del nitro, ed è lasciata in dietro una specie di Tartaro vetriolato. Il sal marino trattato, e manipolato nella maniera medesima, lascia indietro una specie di sale del Glauber; ed in generale qualunque siasi la foggia, o metodo, per cui

i sali vengano ad essere congiunti, mescolati, ed incorporati con altri sali, ne risulteranno, e produrranno sempre, e costantemente dei nuovi sali, e dei nuovi menstrui. Quindi l'arte della Chimica esser può continuamente ampliata, e migliorata, ed i nuovi menstrui verranno sopra a corpi, e sostanze differenti a somministrare nuovi fenomeni. Nuovi menstrui di facilità, e virtù particolari esser possono somigliantemente procurati per via di combinare insieme in varie fogge i menstrui già conosciuti; e questo può realmente essere eseguito con una varietà di metodi pressochè infinita. Molto di più può effettuarsi per mezzo di ridurre ciaschedun menstruo noto al suo massimo grado di purezza. Ed ultimamente per via di ridurre alcuni d'essi in particelle estremamente minute, alle quali esser possono ridotti, siasi per arte, siasi per natura: Avvegna che da queste tre particolarità sembra, che massimamente dipenda la maestria, e valentigia straordinaria dei capi principali della Chimica. Suppongasì, a cagion d'esempio, che ci abbisogni un'acido vegetabile fermentato estremamente puro, sommamente gagliardo, e fortissimo: Prenderai del verderame preparato dal rame corroso da un vapore fortissimo di un'acido fermentante: aggiungerai al medesimo venti volte più del suo peso d'aceto distillato il più forte, ed energico, che possa mai procurarsi: digerirai queste sostanze insieme, fino a tanto che il verderame sia per ogni, e qualunque parte disciolto; ed il tutto si caogherà in un liquore verde carico: lo andrai purificando per via di filtrazione, e procurerai, che sopra un fuoco soave venga a spessirsi finchè divenga una pellicina: collocherai poscia il medesimo in luogo tranquillo, ove s'andrà lanciando in cristalli somigliantissimi agli smeraldi, composti di un'aceto acido, e di rame disciolto: verserai il liquore, raccoglierai i divisati cristalli, e gli farai svaporare, come prima; e per questo mezzo andrai mettendo insieme tutti quei cristalli, che possono essere ottenuti: poscia gli farai seccare, e gli distillerai in una storta, ed il prodotto, che quindi ne risulterà, verrà ad essere un'Acido vegetabile sommamente puro, ed in estremo

gagliardo, ed energico, il quale nemmeno per ombra parteciperà della natura del rame. Questa esperienza però non riuscirà col piombo, collo stagno, nè con qualsivoglia altro di quei metalli, che sono sciogliabili, e squagliabili nell'aceto; conciossiachè il rame attragga l'acido libero, e sicuro della sua acqua, e di bel nuovo lo resuscita senza averlo alterato; dove gli altri divisati metalli per lo contrario, tuttochè l'atraggano di pari, e lo disgiungano, nulladimeno dannocelo dopoi sempre, e costantemente alterato, ed impuro. Si fe ad immaginare M. Zwelfer, che quest'acido fosse l'Alkali, o sia Dissolvente universale; ma ebbe il Tachenio ben presto a provare, che questa sostanza altro in realtà non era, che un'aceto distillato di una purezza grandemente maggiore del comune aceto distillato.

Per far toccar con mano, come per mezzo di comporre un menstruo con un altro, posson' esser prodotti dei nuovi, e bene spesso eccellentissimi sali, fa che venga considerato, come il Tartaro rigenerato, per dicevole, ed acconcio modo preparato, può essere intimamente unito, ed incorporato al purissimo Alcohol, e per simigliante guisa produrre un menstruo vegetabile composto di unione infinitamente serrata delle particelle vegetabili in estremo sottili, vale a dire, Alkali, Acido, e Zolfo. Quindi esser non può a meno, che l'effetto di un siffatto liquore non sia estremamente grande, non meno come un Menstruo, che come un Medicamento.

Così di bel nuovo, se venga unito, ed incorporato con un purissimo Alcohol un puro gagliardo spirito alcalico; questo verrà a produrre un Menstruo ammirabile, appellato comunemente *Offa Helmontii*, il quale scioglie intimamente gli oli vegetabili distillati; e così viene a produrre un menstruo composto dello zolfo vegetabile genuino, e di un'alcali, ed è peravventura uno dei Medicamenti migliori, non meno che uno dei più eccellenti menstrui, che sieno conosciuti fino ai dì nostri.

Nella guisa a capello la stessa il purissimo spirito di nitro satollato collo spirito alcalico di sale ammoniacco, produce una specie di nitro volatile; e così viene

a somministrare un'opportunità d'esaminare, per via d'esperienze, se possiamo prometterci cose grandi da un nitro volatile e se i Chimici possono, o non possono per simigliante modo somministrare. L'esperienza di specie fomigliante meritano infinitamente d'esser fatte continuo, e cimentate. Ella non è esca appurata, se qualsivoglia menstruo sia per sciogliere qualsivoglia sostanza, senza l'aiuto del fuoco; come anche se qualsivoglia esperienza di tal natura possa esser fatta in qualsivoglia luogo privo di fuoco, avvegnachè trovili evidentemente del fuoco nel massimo conosciuto grado del nostro freddo; e tutti noi conosciam egregiamente bene, che il menstruo, siasi di qualunque specie esser si voglia, agisce, ed opera in guisa infinitamente migliore per l'aiuto, ed assistenza del fuoco.

Possono i Menstrui a stento grande a girare, come tali, se non vengano ridotti ad una forma fluida, o che per lo meno vi si accostino ben da vicino: questa qualità, o stato vien loro massimamente somministrato dal fuoco, dall'aria, dall'acqua, e dalla trituratione. Sono queste le quattro cagioni, le quali eccitano, e risvegliano universalmente le forze, e facilità alcose di un menstruo. Certi duri particolari menstrui contengono una cagione entro di se medesimi apparentemente valevole di eccitare il moto, tuttochè questa realmente dipenda dal vicinissimo approssimamento di alcun' altro corpo. Così se, a cagion d'esempio, un pezzo di buona calamita venga sospeso da un filo, e tenuto appeso in perfetta quiete in un grado grande di freddo, sembrerà, che sia affatto privo di virtù, ed efficacia attiva; ma se gli venga approssimato un pezzo di ferro, vedravvisi incontanente in ambi i corpi prodotto, e risvegliato un moto, fino a tanto che verranno a congiungersi ed unirsi insieme, e rimanersi in contatto: e siffatta specie di forza, o scoltà genera il moto disperso, e spontaneamente, senza l'aiuto, od assistenza di alcun fuoco, che a noi sia sensibile, e non è eccitata dal moto. Così nella guisa a capello la medesima lo spirito gagliardo di nitro riferato entro un vaso chiuso, somministra un fumo

acido

acido afolante costantemente intorno la superficie del liquore, e trovandosi l'uscita per qualsivoglia parte del vaso, che sia non perfettamente chiusa. Così similgiatamente lo spirito alcalico del sale ammoniacco somministra un fumo, che non viene osservato, essere in quiete; e lo spirito di questo sale procurato colla calcina, viene a somministrare un fumo grandemente più volatile, e più mobile. Adunque i corpi e sostanze tutte di specie fomigliante ritengono stranamente, e stranamente di pari eccitano il moto. Noi dobbiamo similgiatamente sovvenirci sempre, che l'aria, evandio nei luoghi lommamente freddi, ha sempre, e costantemente un gagliardissimo moto vibratorio, e che perciò può benissimo eccitare similgianti moti in questi corpi: siccome per l'altra parte le soluzioni vengono bene spesso ad essere immediatamente fatte per mezzo del moto particolare al menstruo da essa originante; mentre un altro moto di specie differente, e proveniente da una diversa cagione non produrrebbe in conto veruno l'effetto. Così, a cagion d'esempio, se venga calcinato un finissimo pezzo di gesso inglese in un gagliardissimo fuoco, oppure anche sotto il fuoco d'una grossa lente, o specchio ustorio, a grande stento altererà per via di questo violentissimo moto la sua natura; nè coll'essere novellamente esposto all'aria calda, od all'aria fredda, o trovissi questa tranquilla, o battuta, ed agitata dai venti; e quantunque sia stato per lungo tratto di tempo fatto bollire nell'acqua, od in una brina di sale di Tartaro, non verrà a disciogliersi; tuttochè immediatamente si liquefaccia, e dileguisi allorchè venga posto entro l'aceto freddo. Qui non noi veggiamo, avervi una differenza grandissima fra il moto eccitato dalla forza reciproca del solvente, e della sostanza, o corpo, che dee essere sciolto, ed il moto eccitato dal fuoco, dall'aria, dall'acqua, e dall'impulso. L'acrimonia di un menstruo in rapporto ad un corpo umano, quanto all' eccitar dolore, a corrodere, e consumare le parti di quello, non è in conto veruno un tegno od argomento, che un tal vato menstruo debba di pari sciogliere gli altri corpi e sostanze, siccome apparisce dall'olio

di vetriolo, dallo spirito di nitro, dallo spirito di sale, e dall'acqua Regia, le quali sostanze, quantunque consumino, e divorino intieramente la carne, nulladimeno non sono valevoli a consumare, od a sciogliere la cera e lo zolfo, tuttochè queste due sostanze possan'esser benissimo sciolte nel corpo medesimo. Moltissimi corpi incapaci d'esser sciolti in certi dati menstrui, possono essere renduti capaci d'esser da medesimi sciolti per via d'essere prima sciolti in altri menstrui. Così se lo zolfo comune sia fatto bollire, anche per lunghissimo tratto di tempo nell'alcohol, niente più sciogliersi di quello faccia una pietra entro l'acqua; ma se lo zolfo medesimo venga prima squagliato e sciolto col sale di tartaro in una massa fosca, allora l'alcohol scioglierà; così nella guisa medesima l'antimonio ridotto in polvere rimasti intatto, dopo essere stato fatto bollire nell'alcohol; ma se innanzi sarà stato fatto bollire fino a divenire una massa asciutta in una liscia alcalica, questa massa medesima in un batter d'occhio somministrerà all'alcohol una tintura ariata. Alcuni valenti Chimici hanno fatto conto così grande di similgiante regolare, e successiva applicazione di menstrui differenti, e massimamente Monsieur Boyle, e Monsieur Homberg, che asseriscono, come per siffatto mezzo gli stessi metalli esser possono sciolti nelle loro parti componenti, precipitando il mercurio, e fissando lo zolfo. Così quei valentuomini asseriscono, che se l'argento venga prima sciolto nello spirito di nitro, e poscia per lungo tratto di tempo digerito col purissimo alcali fissato, e dopo più e più fiato sublimato col sale ammoniacco, verrà a somministrare alla per fine per mezzo di questi salti risolucanti un verace precipitante mercurio: nella quale operazione gli acidi procuransi un'entrata per gli alcalici entro la sostanza del metallo; siccome gli alcali fissati procuransi il varco a gli alcali volatili, i quali altramente non potrebbero penetrare. Onoeggia, e sia fra le due il Boerhaave in disputando intorno a questo punto, vale a dire, se i metalli essa possano per similgiante guisa sciolti nei loro mercuri precipitanti e scorrenti; ed asserma soltanto, come, dopo moltissime e

(spe-

sperienze, non gli venne mai fatto d'ottenere l'effetto. Vegg. *Boerhaave*, *Chem. Pars 1.* pag. 562. & seq.

Egli si è un patente errore il farsi ad immaginare, che un menstruo essere non possa soveschio gagliardo. L'olio di vetriolo diluito, più, e più fiato con tanta acqua, che agguagli il suo peso, scioglie meglio il ferro. Così l'acqua forte annacquata o diluita, lavora assai meglio sul piombo. E Monsieur Boyle medesimo fa un' osservazione somigliante rispetto alla soluzione dell'argento. Veggasi *Boyle*, *Oper. Compend.* vol. 1. pag. 165.

MENSTRUO Animale. Hannovi moltissimi menstrui Animal, non meno della specie naturale, che della specie artificata. I naturali sono, il sangue, il siero, l'abile, l'orina, la sciliva, il gaglio, il burro, il latte, e somiglianti; molti dei quali venendo con proprietà messi in opera, e per acconcio modo, verranno od a produrre, od a scacciare i colori e verranno ad esser ridotti d'uso, e servizio grande per i Pittori non meno, che per i Tintori. Così l'orina recente, a cagion d'esempio toglie via l'inchostro comune di sopra le tele, ed i panni, e somiglianti. Il sangue, venendovi usata la dicevole manipolazione, somministra il nobilissimo colore azzurro Prussiano; e la bile è un giallo naturale da far gran servizio, venendo manipolato in questa preparazione non altramente che il sangue.

Della specie artificata poi sono lo spirito d'orina prodotto dalla Chimica che serve a produrre, ad alterare, ed a distruggere immenso numero di colori. I liquori distillati dal fior di latte recente, dal burro, e somiglianti sperimenteranno di pari di valor sommo: e queste varie animali sostanze in diverse maniere composte, eziandio per via d'esperienze correnti, e di cimenti casuali, verranno sicuramente a darci delle nuove scoperte riguardanti l'affare dei colori tuttochè con probabilità molto maggiore, per mezzo d'adeguato raziocinio analogico. Siccome, a cagion d'esempio, le ossa comuni abbrugiate fino a divenir negre, essendosi sperimentato che fanno l'osso nero, così l'esperienza potrebbe somigliantemente esser fatta sull'avorio, e così verrebbe ad essere scoperto

Supp. Tom. III.

l'avorio nero: ed in somigliante guisa intendasi del rimanente. Veggasi *Show*, *Lezioni*, pag. 183.

MENSTRUO peracuto, Peracutum Menstruum. Da Monsieur Boyle la denominazione di menstruo peracuto ad un tal menstruo procurato per via di versar sopra l'olio rettificato di butiro d'antimonio gagliardissimo spirito di nitro quanto fervir possa a precipitar fuori d'esso tutto il minerale benaortico, e quindi con un fuoco vivacissimo distillando il liquore, che ne può venir sopra, e coibandolo sopra la polvere antimoniale. Veggasi *Boyle*, *Oper. Compend.* Vol. 1. pag. 260. & pag. 377.

Pote quello Valentuomo alquanto oro in grado il più eminente purificato, o raffinato entro una abbondevole porzione di questo Menstruo peracuto, ove stando sciogliendo lentissimamente, e tranquillamente: ed egli ebbe a trovare nel fondo del vaso di vetro un'assai considerabile quantità d'una polvere bianca, che il menstruo aveva lasciata affatto intatta, e che era somigliantemente indissolubile nell'Acqua Regia. Essendo atratta la soluzione d'oro, e l'oro medesimo venendo ridotto di bel nuovo in un corpo, ebbe a somministrare in una seconda soluzione copia maggiore della polvere medesima. Egli squagliò questa polvere in un metallo corrispondente in tutto, e per tutto, nel colore, nella malleabilità, nell'essere sciolto entro l'Acqua forte, e nell'amarrezza del sapore di questa soluzione, all'Argento. Quindi Egli ne inferisce, che malgrado la supposta immutabilità dell'oro, l'istata esperienza ebbe a far toccar con mano, essere il medesimo realmente cambiabile in argento, o per lo meno in una nuova specie di metallo differentissimo, e tutt'altro dall'oro. Quindi Monsieur Boyle conchiude, non avervi impossibilità nella natura della cosa, che un metallo possa giugnere ad essere trasmutato in un altro. *Ibid.* pagg. 260, 261. & seq.

Per mezzo di sciogliere l'oro in questo menstruo peracuto, si dice somigliantemente Monsieur Boyle, ch'egli giunse a far altal'oro nella storia chimica, nella sommità, e nel collo della quale storia venne trovato in forma di un sublimato gial-

Y y lo,

lo, e rossiccio. Oper. Compend. Vol. 1. p. 263. & pag. 377.

Noi non troviamo, che Monsieur Boyle desse il nome di Menstruo peracuto al menstruo, cui egli estrasse dal pane, siccome viene affermato nella *Ciclopedia* sotto l' Articolo MENSTRUO, ch' ei si facesse. Veggasi Boyle, Opet. Filosof. Compend. Vol. 1. pagg. 34. e 49.

MENTA. E' questo il nome d' un genere di piante benissimo conosciute, i cui caratteri sono gli appresso.

Il fiore è composto di una sola foglia, ed è della specie labiata; il labbro superiore è archeggiato; ed il labbro inferiore è diviso in tre segmenti; ed il tutto è per al fatta maniera disposto, che a prima vista il fiore comparisce non altramente, che un fiore di quattro foglie, o per lo meno di una foglia regolarmente divisa in quattro segmenti. Il pistillo sorge dal calice, ed è ficato a foglia d' un chiodo entro la parte interiore del fiore, e circondato da quattro embrioni, i quali fanno dopo, e divengono altrettanti semi, e sono contenuti entro il calice del fiore.

Le specie della Menta operate da Monsieur Tournefort sono le seguenti:

1. Menta silvestre comune dalle foglie tondeggianti: 2. Menta silvestre di foglie tondeggianti dal fiore porporino: 3. Menta Ortense acuminata avente odore del Basilico: 4. Menta comune acuminata dalle foglie arricciate: 5. Menta dalle foglie tondeggianti spinose arricciate: 6. Menta bellissima Danese, o Tedesca dalle foglie arricciate: 7. Menta silvestre spinosa arricciata: 8. Menta paludosa massima dalle foglie tondeggianti, o sia Menta Aquatica: 9. Menta palustre dalle foglie grandi rotonde, con foglia variamente picchettata: 10. Menta campestre pelosa acuminata: 11. Menta campestre dalle foglie più rotonde acuminata ipitante odore aromatico. 12. Menta spinosa con foglie variamente picchettate. 13. Menta acuminata dalle foglie strette. 14. Menta silvestre liscia dalle foglie strette, con foglia ruvida d' odore acuto: 15. Menta silvestre meno pelosa dalle foglie lunghe nericee. 16. Menta pepe comune, fissa, spinosa. 17. Menta cavallo dalle lunghe foglie. 18. Menta acquajola dalle più lunghe foglie. 19. Menta

acquajola, appellata comunemente Puleggio. 20. Menta comune dal fior bianco, detta Puleggio. 21. Menta acquajola denominata da parecchi Autori Puleggio maschio. 22. Menta acquajola lanuginosa somamente picciola. 23. Menta Acquajola con foglie di Santotegia. Vegg. Tournefort. Institut. p. 189.

Le forti, o specie tutte della menta, della quale noi ne abbiamo parecchie nei nostri orti, e giardini per uso medicinali, debbon' essere propagate con dividere nella primavera le radici; oppure piantare i talli in ogni e qualunque dei mesi estivi, ma fa onninamente di mestieri, che questi abbiano un suolo umido; ed in evento, che la stagione corta asciutta, converrà, che vengano assai frequentemente annasquati, dopo che sieno stati piantati. Sarebbe dicevole il piantarli in letti di terra dell' ampiezza di quattro piedi; con de' viottoli, o marciapiedi della larghezza di due piedi fra essi, e dovrebbero esser posti l' uno dall' altro alla distanza di qualche cinque dita. Questi poi distendono, e sparpiano sì ampiamente le loro radici, che vengano a sorpassare, e soverchiare i letti tre anni innanzi, che vengano cavati, e trapiantati; conciossiachè in capo a questo tempo s'avvicchieranno, ed incroscicchierannosi insieme, per sì fatto modo, che l' una radice giugne a soffogar l' altra. Veggasi *Milser*, Dizionario del Giardinere.

Vi sono moltissime persone, le quali sono vaghissime della menta nell' insalata in tempo di primavera; il metodo di propagarla, si è col cavare alcune radici di menta poco innanzi Pasqua, e piantarle assai tetramente in un letto caldo, cuoprendole di terra fresca all' altezza di un dito: allora fa di mestieri, che questi letti vengano coperti con delle stoffe, o caffotti colle finestre di vetro, e per sì fatto modo la menta verrà su rigogliosa, e tale da potersene scrivere a talento nell' insalate.

Allorchè la menta dee esser tagliata per esser seccata, ciò dovrebbe appunto esser fatto quando è in fiore, e questo fa onninamente di mestieri il farlo in una giornata asciutta, imperciocchè se ciò si facesse correndo stagione umida, le foglie di-

vet-

verranno nere. Ciò fatto dovranno li legare in piccioli fasciulletti, o manipoli, ed attaccare in luogo asciutto in tante distinte linee, o filati.

Se il suolo sia di natura buona, ogni Primavera la menta somministrerà tre raccolte, o legate, ma passate che sia il mese di Luglio, rade volte la menta riesce così buona; di modo che i talli, e germogli, che ella avrà gettato dopo questo tempo, dovrebbero lasciarsi sulla pianta, o in terra fino alla fine del mese di Settembre, ed allora potrà benissimo tagliarsi per seccare. Fatta che sarà questa tagliata, l'ottimo metodo si è il rincalzare con un buon dito di terra fresca, il che farà, che nella vengente primavera ella germogli assai meglio, e più copiosamente.

Non havvi al mondo pianta, la quale cresca, e venga su tanto rigogliosa e vegeta nell'acqua, quanto la menta; e per conseguente alcuna non ve ne ha, che sia più accomia di questa per fare delle esperienze sopra la vegetazione.

Viene universalmente supposto, che queste piante sieno le medesime medesime rispetto al sapore, ed alle facoltà, e virtù loro in qualsivoglia suolo elleno vegetino, e crescano; e questo è vero in riguardo a tutt'esse, mentre esse vivono, e fioriscono; avvegnachè la massima differenza consista unicamente nel grado.

Ma le piante rimosse in un suolo, in cui esse non possano venire innanzi, ma nel quale elleno verranno ad esservi uccise nel tempo del suo maggior vigore, vengono bene spesso ad essere alterate nella loro natura, prima che periscano. Quello in null'altro vien tanto semplificato, e toccato con mano, quanto nelle esperienze fatte sopra la menta, la quale vien su nelle pozzanghere di acqua. Procurerai, che parecchi talli di questa pianta vengano su, e vegetino nella divisa maniera finchè sieno ben vegeti, rigogliosi, e robusti, e poi ne collocherai uno di essi in vicinanza di una pozzanghera di acqua, entro la quale sia stato sciolto del sale marino: trapianterai uno di questi rampolli dall'acqua dolce in questa di acqua salata, e la pianta verrà in pochissimi giorni a morire; e le sue fo-

glie, i suoi gambi, e calauna parte di essa pianta, affaporandola, avrà un sapore gagliardissimo di sale marino, tutto che ella non ne sia rimasta imbevuta in niun'altra parte, salvo che da questa semplicissima radice. Procura, che un'altra piantarella di menta sia collocata in vicinanza di una Bottiglia di inchiostrò, e che una delle sue radici tocchi l'inchiostrò medesimo, tutta l'intera pianta in pochissime giornate diverrà nera, e dopo diverrà gialla, ed il suo sapore sarà di un vercilissimo genuino vetriolo.

Ella si è minor maraviglia, che questi sali non naturali arrivino ad attaccare, ed investire la menta nella divisa maniera, di quello che si facesse l'infusione di un'altra pianta; eppure la cosa senza ombra menoma di dubbio avviene evidentissimamente così. Fa, che una adeguata porzione di semi di aglio salvatico venga ben pestata, e posta dentro l'acqua, e lascia, che due, o tre radici di una ben vigorosa pianta di menta, che vegeti nell'acqua comune, sieno poste dentro quello liquore, tutta la pianta nel breve tratto di alcuni pochi giorni darà addietro, e perirà, ed essendo tutta la pianta macinata, verrà sperimentato, come ella avrà un'asutissimo, e potentissimo sapore di aglio.

MENTA, nella medicina. E' la menta nella medicina un famoso stomachico, e carminativo medicamento, e viene similmente riputata dai medici di conto grande un'efficacissimo cefalico. Nelle botteghe de' nostri Speciali trovasi un'acqua semplice, ed un'olio essenziale di menta. La pianta medesima vien somministrata, o per via di infusione, o per decocto, ed ha luogo in parecchie composizioni medicinali messe in opera per le pozzanze accennate mediche intenzioni.

MERCURIO. La guida di disgiungere, e separare il mercurio dalla sua miniera, allorchè questa non è sulfurea, si è la seguente:

Prenderai una libbra di questa miniera ben pestata, e ridotta in polvere; questa col Saggiatore fa di melcheri, che sia per un Centinaio: la collocherai in una storta chimica di vetro mezzo inverniciata fino al collo, il quale è necessario omni-

namente, che sia assai lungo, e rivolto-
to all' indietro con un pendio così fatto,
che possa applicarvisi perpendicolare al me-
desimo un recipiente di vetro. Fa di me-
stieri, che la storta sia di una tal confi-
gurazione, e grandezza, che la pancia
della medesima possa a un di presso due
terzi rimaner piena colla divisa quantita-
di miniera di mercurio; e fa onninamen-
te di mestieri, ch' ella sia collocata
in modo, che niuna parte del fluido ade-
rente al collo della medesima, possa ca-
dere entro la cavità della sua pancia, ma
che tutto possa precipitare all' innanzi en-
tro il recipiente, il quale è necessario,
che sia pieno di acqua fresca. Questo poi
vorrà essere aggiustato, e disposto per
il fatto modo, che venga a ricevere il
naso della storta un mezzo dito in circa
sotto l' acqua. Le commettiture, o giun-
ture non vogliono' essere inavardate di lo-
to. Veggasi *Cramer*, arte del Saggiare,
pag. 350.

Farai, che la storta venga per ogni
verso circondata di carboni accesi, collo-
cati in distanza, affinchè non la facciano
scoppiare; a capo a poco, e grada-
tamente andrai avvicinando alla medesi-
ma i carboni, ed ultimamente gli an-
drai unendo alla storta stessa; v' andrai
tratto tratto aggiungendo dei recenti car-
boni accesi per sì fatto modo che la
storta venga leggermente rossa rovente.
Poichè questo fuoco siavi stato continua-
to pel tratto di un' ora, leverai via il re-
cipiente, feucendo prima per acconcio
modo il collo della storta, affinchè cadan
giù quelle goccioline sciolte, che potessero
effervir rimase attaccate, e nel fondo dell'
acqua del recipiente vi troverai il mer-
curio. Tutto il lavoro finora diviso può
essere similgiamente condotto a termi-
ne in un caldo di arena; ma in tal caso
fa di mestieri, che il fondo della storta
venga a toccare il fondo del vaso, che
contiene l' arena, e che sia fatto rosso ro-
vente. Il mercurio poi dovrà separare
dall' acqua per filtrazione.

La supposizione di una simpatia fra il
mercurio e l' oro è stata la massima ba-
se dei tentativi folli degli Alchimisti di
tutte le Età, per vedere di far del mer-
curio l' oro medesimo. Ma se essi inten-

dono, che il mercurio comune abbia una
siffatta simpatia coll' oro, aprano pure una
volta gli occhi, e si facciano a riminare
manifestamente ed evidentemente dimo-
strato il contrario da questo osservabilis-
simo processo chimico, in cui egli appa-
risce che il mercurio incalorasi con que-
sto metallo. Se poi essi intendono, che il
mercurio, cui essi appellano il seme dei
metalli, non soffra, che possa produrre
alcuna cosa in argento contro il me-
desimo, noi risponderemo, questa essere
una specie di sostanza ideale, ed immag-
ginaria, che finora non è stata da testa d'
uomo veduta. Viene grandemente dispu-
tato dagli Alchimisti, se abbiavi, o non
abbiavi alcuna cosa tale, quale il mer-
curio, la quale riscaldisi, od incalorisca
coll' oro, o che produca un colore sen-
sibile nella massa, coll' esser soltanto me-
scolata, ed incorporata con questo metal-
lo ridotto in finissime, e sommamente
minute particelle. Egli è stato asserito da
alcuni, che quei dati *mercurij* particolari,
i quali da essi sono appellati *mercurij sor-
porum*; che è quanto dire, quei dati
mercurij, i quali sono stati estratti per
mezzo di certi dati speciali metodi alchi-
misti, cui essi tengono con infinita scrup-
olosità occulti non altramente che segreti,
ed arcani ipviolabili, dai metalli comp-
iuti, incaloriranno nell' esser mescolati
coll' oro; e sopra di ciò fabbricano costoro
i loro lavori, e processi. Ma si è so-
stenuta assai più universalmente la parte
negativa della questione; avvegnachè i de-
cantatissimi *mercurij* dei metalli vengano
tenuti come non enti, o non esistenti;
ed i medesimi investigatori della meta-
morfosi pretesa dei metalli hanno essi stes-
si senza difficoltà confessato, come non
hanno mai sperimentato il menomissimo
incalorimento preteso del mercurio coll'
oro, tuttochè abbiano da altri udito pa-
rare del medesimo come di cosa da essi
realmente veduta, e toccata con mano.
Venne però anni sono non molti pro-
dotto un mercurio innanzi alla Reale
Società di Londra, il quale nelle mani
del medesimo Presidente, in una chiaris-
sima, e patentissima esperienza riscaldosi
sensibilmente coll' oro. Veggansi perciò
le *Trasfazioni Filosofi*, sotto il n. 122.

Era

Fra i moltissimi metodi vantati, e commendati per fissare questo fluido, e scorrente metallo in un solido consistente argento, non altrimenti che potentissimi infallibili mezzi sono con ogni maggiore asseveranza pretesi, e voluti, l'olio di talco, e l'olio delle fecce umane. Il primo di questi oli, che è stato tanto malinteso, a motivo di sua denominazione, come quello, che è stato investigato entro la pietra Talco, egli si è veramente preparato dai fiori di peltro. Veggasi onninamente l'Articolo *Olto di Talco*.

L'altro, vale a dire, l'olio di sterco umano, vien ricercato così chiaro, nitido, e scolorito, come la stessa acqua, e non gittante il menomissimo odore disagiabile. Queste sono qualità per il fatto modo malagevoli a rinvenirsi in un'olio di materia così pesante, che non meno il primo che il secondo di questi oli vennero dagli uomini di senso filosofico riguardati come enti impossibili da esser procurati per qualsivoglia chimica operazione. Ma poichè il primo di questi divisi oli venne procurato, e fatto da due, o tre famosi Chimici, Monsieur Homberg alla perfine ebbe a riuscire nell'investigamento anche del secondo, ma non gli venne fatto di trovare in quest'olio di sterco umano con infiniti stenti da esso pur finalmente ottenuto, la menomissima tendenza ad un tale preteso effetto, oppure che nel mercurio venisse dall'olio medesimo prodotta ombra di cambiamento, eziandio dopo una lunghissima digestione, e dopo infiniti diversi processi ed operazioni cimentate. Veggansi *Memoires Acad. Roy. Paris. ann. 1711.*

Se il Mercurio venga sciolto nell'Acqua forte per siffatta guisa, che la soluzione riesca chiarissima, e totale, e se mentre trovasi ancora caldo vengansi versate dentro grado per grado alcune raschiature di piombo, il piombo medesimo verrà ad esservi precipitato in una polvere bianca, ed il Mercurio verrà ad essere ridotto in una massa d'argento vivo scorrente. Veggasi *Boyle, Oper. Compend. Vol. 1. pag. 318.*

Pud il Mercurio esser benissimo disciolto negli acidi de' Vegetabili. Questo viene effettuato col ridurlo ad una calcina

per mezzo d'una lunghissima digestione. Uno scrupolo della divisa calcina può essere sciolto in un'oncia di aceto distillato in un calore, che faccia bollire. La soluzione essendo filtrata, ed esposta all'aria fredda, verrà in parte a trasformarsi in finissimi cristalli. Questa calcina medesima sciogliesi di pari nel sugo di limone, nel vino del Reno, ed in altri acidi vegetabili eziandio.

Ma un Precipitato di Mercurio procurato dalla sua soluzione nell'acqua forte, per mezzo dell'olio di Tartaro per deliquium, e ben ben raddolcito per via d'acqua bollente, viene ad essere con maggior facilità disciolto nell'aceto distillato. Questo può eziandio essere sciolto freddo senza la menoma digestione. Veggasi *Margrav. nelle Memorie dell'Accademia di Berlino, ann. 1746.*

Ha osservato il Boerhaave 1. che l'argento vivo, peraltro assai bene purificato, somministra sempre, e costantemente una polvere nera morbidissima, di un sapore di rame acutissimo, allorchè sia stata per lungo tratto di tempo esposta ad una violenta agitazione, oppure ad un calore il doppio maggiore di quello degli animali sani. 2. Il calore, che l'avvicina a quel grado d'attività, che è necessario per distillare l'argento vivo, cangia la parte massima del Mercurio, se non tutt'esso, in una polvere pesante, lucida, rossa, friabile, di un sapore acuto nauseosissimo, che per lunghissimo tempo, e con violenza scompagina, e disordina il corpo umano e lo dispone alle efrezioni. 3. L'argento vivo fluido scorrente, che rimane, poichè sia stata separata la divisa polvere rossa, è assai più fluido, e di un peso specificamente minore del Mercurio comune. 4. Tutta la polvere nera, e a un di presso tutta la polvere rossa, può essere restituita al primitivo stato di fluidità, per mezzo di un calore più intenso; e questo Argento vivo ravvivato è dotato di tutte le proprietà del Mercurio comune.

Le esperienze soprammentovate intorno al Mercurio furono spedite dal Boerhaave alla Società Reale di Londra. Un'istoria, o piano d'altre esperienze ci le spedì alla Reale Accademia delle Scienze di Parigi. Le

Le conclusioni pertanto, che vengono da simiglianti esperienze, sono: Che egli non potè mai cambiare, o trasformare l'argentovivo in alcun altro metallo, e che l'argento vivo non poteva ricavarli nè dal piombo, nè dallo stagno. Veggansi *Memoires de l'Academ. Roy. des sciences de Paris*, ann. 1734.

Il Mercurio sciolto per via di stropicciarlo gagliardamente con alcun olio chimico, oppure colla Trementina di Venezia, è stato somministrato alla quantità di uno scrupolo di una mezza dramma, ed anche di due scrupoli al giorno. Si fatte pillolette conservano ad alcune persone sciolto il ventre, altre poi effettivamente le purgano, ed è stato alcuna fiata cagionato eziandio un gentile dialismo, e talvolte è stata dalle medesime perfino prodotta una alitissima, e sommamente copiosa salivazione. Veggansi i Saggi Medici d'Edimburgo.

Il famoso Medico Dover nel suo *Lafetto medico*, che fece al suo paese avendo raccomandato il Mercurio crudo, od argentovivo come un medicamento sommamente benefico, e proficuo per parecchie infermità, per alcun tratto di tempo ebbe, a vero dire, una voga grandissima in Londra, e questo diè motivo a numero grandissimo di scritture più, e contra. Il Dottor Cheyne raccomanda similantemente una siffatta Medicina nel suo Trattato intitolato: *The Rational Method of curing Diseases* cioè, Metodo Razionale di medicare le malattie.

Gli autori de' Saggi medici d'Edimburgo ci assicurano, che quantunque essi conoscano alcune persone, che son giunte a prendere per più settimane ogni mattina, un'oncia, o due di mercurio crudo, nulladimeno non hanno da pubblicare un solo esempio, in cui abbia questo medicamento accresciuta alcuna delle sue usate evacuazioni sensibili; ma è stato loro significato come alcuni, che lo usavano nella maniera divisata, vedevanvene passare buona parte per orina, vale a dire, insieme colla loro orina, e che le mani e l'ore persone, che prendevano similmente l'argomento, macchiavano costantemente le loro tabacchiere, e cose simili.

Noi però abbiamo un'istoria degli effetti del Mercurio crudo sopra una Persona che fu confortata dal suo Medico a prenderlo, in un caso sommamente osservabile e chiaramente descritto nelle nostre Filosofiche Trasfazioni, seguito appunto intorno a quel tempo, in cui il soprammentovato medico Moni, Dover ebbero ridotto in un'uso generale: e siccome gli effetti del mercurio medesimo in questo caso servirono a render caute le Persone rispetto all'uso di esso, così non sarà fuor di proposito l'esporre in questo luogo la sostanza del fatto, che è appunto come segue:

Certa persona era stata per assai lungo tratto di tempo sottoposta ad una somma difficoltà di scaricarsi il ventre, pel quale incomodo prese alla perfine parecchie once di mercurio crudo in tempi differenti, ma senza il menomissimo sollievo. Nell'aprirsi del collui addome uscì fuori una copia grandissima di vento, prima, che fosse serito lo stomaco, o gli intestini. Lo stomaco era vuoto, e la sua incamicatura, o seno le sue tuniche interiori veementemente infiammate. I più minniti intestini trovavansi in più e più luoghi sporcati di non polvere negra somigliantissima al minerale Etiopico, ed in parecchie parti de' medesimi vennero trovati de' globuletti d'effettivo argentovivo. La divisata polvere negra era senz'ombra, menoma di dubbio l'argentovivo alteratosi per entro il corpo in una specie d'Etiopico. L'intestino colon trovavasi infiammato, ed allungato, e conteneva sei quartucci d'efcremento liquido, fra il quale stanzia una buona porzione di mercurio crudo, e buona parte altresì della medesima divisata polvere negra. Quello intestino era di pari infiammato in tutto il suo lato esteriore, ed aveva formato un'abcisso in quella parte, in cui stava attaccato all'omento: le altre budella trovavansi in contatto con quella parte, erano similmente intaccate da siffatto sconcerto. Nella parte inferiore del colon le tuniche, od incamicature divenute erano scirrofe, ed il passaggio era estremamente picciolo. Alcune delle bocche erano di pari divenute scirrofe, e ferravano il varco, e fu trovato un nocciolo di fusina sepolto nella tunica

nica villosa di questo intestino. Questo aveva similantemente formato un piccolo ascesso, il quale venne a scaricarsi entro il pelvi. Qual parte dei sintomi finora divisi sia all'argentovivo, o Mercurio crudo dovuta, è cosa agevolissima a vedersi, ed altri può starli a scoperto da sì strani effetti per l'avvenire, soltanto coll'osservare lo stato del paziente pur ora descritto, Veggansi le Traduzioni Filosof. sotto il n. 442. pag. 295.

Avendo i Chimici osservato, come alcune semplici preparazioni d'antimonio, e di mercurio producevano effetti sorprendentissimi nella guarigione delle malattie ostinate, impiegarono tutta l'arte loro per cangiare quelli erculi medicamenti in varie forme, col separare, e disgiungere le loro nocevoli, ed inutili parti, e per combinare i loro attivi principj. A fatiche somiglianti debbono unicamente a scrivere il buio, ed il cinabro d'antimonio, il Mercurio della vita, il bezoard minerale, i bezoard Solare, Lunare, Gioviale, e parecchie altre preparazioni, sopra le quali sono stati più che a bizzelle sfoderati encomj tremendissimi, e senza fine. Ma con tutta la divisa cura molte delle pur'or descritte preparazioni si rimasero senza effetto menomo, ed altre inaccomodabili, e totalmente disaconce per l'uso. Egli si è nientedimeno certissimo, che quelli due minerali, per dievole, e proprio modo combinati producono degli effetti veramente maravigliosi. Noi abbiamo nei Saggi Medici d'Edimburgo una Preparazione rinvenuta dal Dottor Plummer, la quale viene, a dir vero, altamente raccomandata da' suoi soli effetti. Veggasi l'Articolo PLUMMER *Eriopico*.

Viene bene spesso il mercurio messo in opera nelle preparazioni anatomiche, massimamente per quelle date parti, che non ritengono agevolmente l'aria, come, a cagion d'esempio, i polmoni, o la milza, e la glande del pene. Veggasi *Monrè*, nei Saggi medici d'Edimburgo, vol. 3. Articolo 10. Ma dee essere onninamente osservato, come l'argento vivo danneggia grandemente, ed intacca le picciole cellule dei polmoni, e della glande.

Oltre gli altri numerosi fenomeni que-

sto Minerale sommaramente osservabile accompagnanti, non desci per verun moderate in silenzio la luce, ch'ci dà, allorchè viene agitato entro un tubo di vetro, lo che procede dalla elettricità.

Se il Mercurio venga racchiuso in un tubo di vetro ermeticamente serrato, questo tubo vien trovato nell'essere stropicciato, somministrare in grado infinitamente maggiore la luce, che quando in esso non vi è stato racchiuso il Mercurio. Allorchè questo tubo è stato stropicciato, in alzando successivamente le sue estremità, affinchè il Mercurio strascioli, e se ne corra da un capo, o termine, all'altro, uno vede una luce muoventesi tutto per lo lungo del tubo in una maniera serpentina; che è quanto dire, il mercurio è tutto luminoso. Sendo dopo il Mercurio fatto scorrere lungo il tubo, senza stropicciarlo, venne sperimentato, che mandava fuori alquanto luce, tuttochè in copia assai minore di prima; questo prova, e fa vedere evidentemente, che la frizione del Mercurio contro il vetro, siccome appunto segue in iscorrendo per lo luogo, dee in alcun grado elettrizzare il vetro, siccome in istropicciandolo colla mano ciò effettua, si è soltanto in un grado molto minore. Questo fatto viene ad essere con evidenza maggiore provato col porre la luce stessa in vicinanza del tubo; avvegnachè questa verrà ad essere attratta dall'elettricità alzata dallo scorrere, e precipitare del Mercurio, ed alzerassi a quella parte del vetro, lungo la quale il mercurio scorre, e precipita; ed è da questo estremamente evidente, che ciò, che è stato per sì lungo tratto di tempo conosciuto nel Mondo sotto il nome di Fosforo del Barometro, non è altrimenti un Fosforo, ma meramente una luce alzata dalla Elettricità, avvegnachè il Mercurio elettrizzi il tubo. Veggansi onninamente le *Trans. Filosof.* n. 484.

Se il mercurio venga collocato entro grossi tubi, dai quali siane stata estratta l'aria, e che dopo questi vengano stropicciati, per eccitarne la loro Elettricità, viene osservato, come quelli gittano sopra tutti i lati una brillantissima, ed ugualissima luce.

MERCURIO calcinato, *Mercurius calcinatus*.

natus. E' questa una nuova, e più espres-
siva denominazione per quella Prepara-
zione del Mercurio, comunemente ap-
pellata *Precipitatum per se*. Questa vien
procurata con tenere l'argentovivo pu-
rificato in un calor d'arena per parecchi
mesi, in un vaso di vetro avente un'as-
sai ampio fondo, ed aprendo all'aria
per un picciolissimo foro, fino a tanto
che venga ad esser ridotto ad una polvere
rossa.

Forz'è, che l'argento vivo abbia una
comunicazione coll'aria esterna, sicco-
me ciò è anche necessario, ed indispen-
sabile per la calcinazione di tutti i me-
talli. Questa apertura è fatta in una for-
ma migliore, non già come nei fori co-
muni delle cassette, e fomigianti, ma ben-
sì nell'estremità inferiore di un tronco,
che entri nel corpo di un vaso di vetro:
che se l'argento vivo s'alzi col calore,
ei non può per via di ascendere entro il
tronco od anima divisa, non può, io dico,
essere dilungato dal calore, dal quale esser
deve calcinato. Veggasi *Pemberton*, Fon-
deria di Londra, pag. 225.

MERCURIO corallino, *mercurius cor-
rallinus*. Questa denominazione viene as-
segnata nella Fonderia di Londra ad una
preparazione di mercurio, conosciuta co-
munemente sotto l'appellazione di *Arcu-
num corallinum*. Questa vien preparata
nell'appresso guisa:

Verterai sopra il mercurio rosso corro-
sivo, appellato comunemente *Precipitato
rosso*, tre volte più del suo peso di spiri-
to di vino rettificato: farai digerire in-
sieme queste sostanze ad un gentil calo-
re per due, o tre giorni, agitando di
tratto in tratto l'ampolla: dopo di ciò
darai fuoco allo spirito, e continuerai a
dimenare la polvere fino a tanto che lo
spirito siasi tutto abbruciato. Vegg. *Pem-
berton*, Fond. di Lond. pag. 227.

Una operazione somigliante consiste tut-
ta nel principio dello spirito di vino, il qua-
le dolcifica gli spiriti acidi.

Olio di mercurio. Così vien denomina-
ta dai Chimici una particolare prepara-
zione di mercurio in una forma fluida,
da essi procurata per mezzo di un ga-
gliardissimo acido. La preparazione per-
tanto è la seguente:

Calcinerali il mercurio coll'olio di ve-
triolo, fino a che divenga un'asciutta cal-
cina nevata, lascerai, che si raffreddi,
quindi lo collocherai in un vaso di ve-
tro, e vi verterai sopra una porzione u-
guale di olio di vetriolo: Farai, che que-
sto (vapori bollendo pressochè divenga asciut-
to, con ogni maggior diligenza schivan-
done i fumi venefici: quindi andrai ac-
crescendo il fuoco, e grado per grado l'
andrai riducendo di bel nuovo ad essere
asciutto: la qual cosa in questo stato è
un faldiosissimo, e sommamente tedioso
lavorio. Allorchè la polvere è asciutta,
aggiungerai alla medesima nuovamente la
quantità medesima di olio di vetriolo, e
continuerai la sua operazione, siccome la
prima volta facesti. Alla per fine appen-
na asciugherassi per mezzo di un così lun-
go, oppure di un gagliardissimo fuoco,
ma cesserà soltanto di scorrer via libera-
mente, e diverrà alcun poco rigido, non
altramente che un olio fissato. In questo
stato è questa sostanza in grado estremo acuta,
caustica, e tale da non toccarsi in con-
to veruno, somigliantissima all'*ignis ge-
henne*, o fuoco infernale di Paracello.
Per somigliante mezzo il mercurio viene
ad essere così fissato coll'olio di vetriolo
per sì fatto modo, che non si vaporerà
giammai, nè volerà via per l'azio-
ne del più potente energico, e veemente
fuoco. Veggasi *Boerhaave*, Chem. p. 317.

Per somigliante chimico procedimento
noi abbiamo in mano il metodo di im-
pregnare, di satollare, e di incenerare i me-
talli per mezzo degli acidi, ad ogni, e
qualivoglia grado; e somigliantemente di
fissare per mezzo degli acidi medesimi in
un grado assai grande il mercurio vola-
tile; ma non dee altri quindi prometterli
un metallo; conciossiachè qualunque siasi
la maniera, colla quale il mercurio vien
ad essere fissato con gli acidi, egli è
sempre, e costantemente ricovrabile al
primiero suo stato, per mezzo di maci-
narlo col doppio del suo peso di limatu-
re di ferro, e col distillarlo in una stor-
ta di vetro col grado massimo di un ca-
lore di arena. Veggasi *Boerhaave*, Chem.
pag. 320.

Corrosivo sublimato di mercurio, Descrì-
ve Monsieur Boulduc una maniera fom-
ma-

matamente piana, ed agevole di fare il sublimato corrosivo. Versa egli porzioni uguali di argento vivo, e di olio di vetriolo accuratamente spogliato della sua flemma in una storta, quindi sira via parte dell' acido, che non incorporasi coll' argento vivo; il fuoco vienvi continuato fino a tanto che la massa bianca del mercurio disciolto è asciutta; allora egli la mescola spedatamente con porzioni uguali di sale marino perfettamente asciutto, e la sublima secondo il chimico metodo comune.

MERCURIO dolce, mercurius dulcis. Il mercurio dolce in dosi abbondevoli, col cinabro di Antimonio, viene raccomandato nelle indisposizioni dei nervi, nella paralisi, nell'empiezia, nell'epilessia, e nell'opistessia. Veggasi Saggi medici di Edimburgo.

Da Monsieur Distericus vengonci somministrare le appresso regole per conoscere se il sublimato sia sufficientemente dolcificato nel comporre il mercurio dolce.

Se dopo di avere stropicciato il mercurio sopra l'oro, l'oro medesimo diventa soltanto pallido, e non bianco, il mercurio è dolcificato quanto basta: oppure se il mercurio dolce diventa nero, allorchè venga mescolato coll'acqua di calce viva, egli è acconciissimo per l'uso, ed atto a metterlo in opera; ma se per lo contrario, o l'oro diventa bianco, oppure il mercurio fassi di un color bruncio, o giallo, dopo essere stato mescolato coll'acqua di calce viva, è un segno infallibile, ed univoco, che il mercurio non è sufficientemente dolcificato. Veggasi Commenc. Norimb. ann. 1737. Settimana XXIX. §. 1.

MERCURIO emetico giallo, mercurius emeticus flavus. Simigliante appellazione nell'ultima riformata Farmacopea di Londra viene assegnata ad una preparazione mercuriale, conosciuta comunissimamente sotto la denominazione di *Turbith minerale*. Pemberton, Farmacop. Londin. pag. 228.

MERCURIO della vita, mercurius vite. Il Mercurio della vita, secondo Monsieur Boyle, può benissimo essere moderato rispetto alla sua qualità evacuant, per mezzo di agitarlo continuamente entro un vaso piatto di terra cotta bene invetriato, *Supp. Tom. III.*

posto sopra il fuoco, per sì lungo tempo, ch'è non mandi fuori più fumi, e che diventi di un color grigio: ed è questo Valentuomo di sentimento, questo, e non altro essere il *mercurius vita parans*, il mercurio della vita emetico, tante, e tante fiati commemorato dal Riverio. Veggasi Boyle, Opere, Compend. Vol. 1. pag. 74.

MERCURIO vergine. Il mercurio vergine detto dai minatori, o lavoratori intorno alle miniere, Tedeschi *lung-fran*, è appunto un'espresione usata per significare quel mercurio, il quale manifestasi spontaneamente, e per se stesso, senza l'aiuto del fuoco. Questo è talvolta veduto in goccioline, in piccioli globi, oppure anche in masse più grosse nella miniera, oppure gocciola fuori, e gronda dagli screpoli nella radice, o dir gli vogliamo muri della miniera medesima, o finalmente vien trovato in abbondosissime quantità nelle cavità delle rupi. Queste copiose unioni, e congerie di puro argento vivo vergine assai sovente si manifestano per se stesse, aprendosi il varco, e sgorgando fuori in picciole correnti nelle miniere del Friuli. Quella gente alcuna volta riman sorpresa da una di similgianti correnti, le quali vengon fuori alla bella prima non altrimenti, che un fortissimo filo, il quale va grado per grado accrescendosi, ed ingrossandosi come uno spago, ed in questa grossezza continua il suo corso, o lgorge per tre, o quattro giorni continuati, ed in questo tratto di tempo viene a scaricare una quantità grandissima di argento vivo. In evento che i minatori possano tener dietro a questo filo in guisa, che possa venir loro fatto di raggiungerne, e di asserrarne il capo, ne sogliono generalmente ottenere una copia molto maggiore; e bene spesso fissata forata di sorgente di argento vivo, lascia loro delle ricchissime vene della miniera, cui essi prima per verun conto non conoscevano. Quei Tedeschi danno similgiantemente la denominazione medesima di *lung-fran*, o sia argento vivo vergine, a quel mercurio, il quale non abbisogna di fuoco per esser dilgiunto, e separato dalla sua terra minerale, ma che viene a scappar fuori della medesima intieramente a

Z z forza

forza di un vaglio, e di acqua fattavi passar sopra per acconcio modo, ed in copia grande, procurando, che quest'acqua medesima vengagli addosso con impeto, e con vivacità non interrotta.

Le miniere dell'argento vivo contengono soventi volte una quantità abbondevolissima di questo minerale incorporato entro le medesime nella forma divisa, e bene spesso così mescolato in altre parti con gli zolfi, che può esser preso per cinabro maseherato: in questo caso un' assai buona porzione viene ad esser separata a forza dei mentovati lavamenti, i quali a un tempo medesimo vengano a nettare la miniera dal fango, che la forza, e per conseguente rendono più acconcia per l'operazione del fuoco, e quindi è, che polcia venga ad estrarsi dalla medesima copia maggiore di argento vivo.

L'unione del mercurio coll'Antimonio è sommamente disastrosa, e malagevole, ma è stata bravamente effettuata dal padre M. Malouin. Veggasi l'Istoria della Reale Accademia delle Scienze di Parigi dell'anno 1740.

Questo prode Geniluomo riuscì di pari nell'unire il mercurio collo stagno, e col piombo in guisa da poter migliorare grandemente questi metalli medesimi in alcuni rapporti, avvegnachè vengano ad esser renduti più duri, più bianchi, e più sonori. Veggasi l'Istoria medesima, ibid.

MERCURIO Inglese. E' questo il nome di un genere distinto di piante appellato universalmente dai Botanici *Chenopodium*. Veggasi l'Articolo **CHENOPODIO**.

Osserva il valentissimo Monsieur Godfrey, che ciò, che è appellato Mercurio della vita, preparato di mercurio sublimato, e d'antimonio, non contiene in sé mercurio, ma è soltanto la parte regolina dell'antimonio, coll'acido del sublimato; e ciò che rimane è il mercurio formatosi in cinabro per mezzo dello zolfo dell'antimonio. Veggasi *Miscellanea vere utilia*, pag. 58.

MERIDIONALE. Parti meridionali. Per trovare le parti Meridionali in qualsivoglia sferoide con quella esattezza medesima, che trovansi in una Sfera. Ponni,

che il semidiametro dell'Equatore sia alla distanza del foco dell'Elissi generante, dal centro come m ad 1. Ponni, che A rappresenti la Latitudine, per cui le parti meridionali sono ricercate, f il seno della Latitudine, il raggio trovandosi unità.

Troverai l'arco B , il cui seno sia $\frac{f}{m}$;

prendi la tangente Logaritmica della metà del compimento di B dalle Tavole comuni: sottrarrai questa tangente Logaritmica da 10.000000, oppure la tangente logaritmica di 45° ; moltiplicherai il ri-

manente per $\frac{7915.7044678978}{m}$, &c. ed

il prodotto sottratto dalle parti meridionali nella Sfera, computato alla foggia usuale, e corrente per la Latitudine A , darà le parti meridionali espresse in minuti per la latitudine medesima nella Sferoide, purchè ella sia offerta.

Esempio: Se m è 1 : 1000 : 22, allora la massima differenza delle parti Meridionali nella Sfera, e nella Sferoide è 76.0929 minuti. Negli altri casi ella è trovata per via di moltiplicare il soprammentovato rimanente per 1174.078.

Quando la sferoide è bislunga, la differenza delle parti meridionali nella sfera, e nella sferoide, per la latitudine medesima viene ad essere determinata da un arco circolare. Veggansi le *Transaz. Filosof.* num. 161. Sezione 14. Veggasi di pari *Mae-Laurin*, Trattato delle Flussioni, artic. 895. 899.

Monsieur Mordoe ha scelto questo Problema per serie infinite, ed ha computato una Tavola di parti Meridionali per una Sferoide obliata, tale appunto, quale è stata additata nel par' ora riportato Esempio. Veggasi il Trattato di Mons. Mordoe intitolato: *Mercator's sailing applied to the true Figure of the Earth*. London 1741. in 4°. cioè, Veleggiamento del Mercatore applicato alla vera Figura della Terra &c.

MESE. Presso gli Antichi Greci diviso era l'Anno in dodici Mesi, i quali venivano a contenere alternativamente trenta, e ventinove giorni l'uno; ma per sì fatta guisa ed ordine, che i mesi di trenta giorni venissero sempre e costantemente prima di quegli di ventinove giorni. I primi di que-

questi mesi, vale a dire, quei di trenta di addimandavansi *μεσῆς*, pieni, ed anche *δεκάημεροι*, come terminanti in un decimo giorno: i secondi poi, vale a dire, quei di ventinove giorni, erano denominati *καλλῆς*, concavi, casso, e dal loro terminare nel nono giorno *ἐννεήμεροι*.

Affine d'intendere e comprendere il loro metodo di riconoscere il giorno del mese, fa di mestieri il considerare, come cadaun mese era diviso in *τρεῖς δεκάημεροι*, o sia tre decine di giorni: la prima decina, o decade essi appellavansi *μυριάς ἀρχομένης*, oppure *ὀκτωμήνου*: la seconda *μυριάς μεσούσης*: la terza, *μυριάς ἐπὶκρούσης*, *συνολομένης*, oppure *ἀφ' ἧτης*. Quindi il primo giorno del mese appellavasi *πρωτή*, come cadente sopra la Luna Nuova, e *πρώτη ἀρχομένης*, oppure *ἡμετέρα*, come essendo il primo giorno della prima decina: il secondo giorno era denominato *δεύτερη ἡμετέρα*, e così intendasi degli altri fino al *δέκατη ἡμετέρα* all'ultimo giorno della prima decina.

Il primo giorno della seconda decina, il quale veniva ad essere il giorno undecimo del mese, era denominato *πρῶτη μεσούσης*, oppure *πρῶτη ἐπιδύα*; il secondo giorno di questa decina, *δεύτερη μεσούσης*, oppure *ἐπιδύα* e così andavasi procedendo fino all'*ὅκτωτη*, il giorno ventesimo, che veniva ad esser l'ultimo della seconda decina.

Il primo giorno della terza decade, o decina nominavano *πρῶτη ἐπ' ὀκτώτης*, il secondo *δεύτερη ἐπ' ὀκτώτης*, e così del rimanente. Alcune volte solevano rovesciare i numeri di quest'ultima decina, o considerargli *ordine inverso*, essendo il primo detto *ὀκτώτης* *δέκατη*, il secondo *ὀκτώτης* *ἐπὶ κατ'*, il terzo *ὀκτώτης* *ὀκτώτης*, e così fino all'ultimo giorno del mese, ch'era appellato *Δεκάημερος*, *Demetrias*, da Demetrio Poliorcete. Prima di questo tempo, massimamente nelle Leggi di Solone veniva appellato *ἦμα*, *ἡμέρα*, vale a dire, vecchio, e nuovo; perchè la Nuova Luna veniva a cadere sopra quel giorno, una parte del quale apparteneva alla Luna vecchia, e l'altra parte alla Luna nuova. Egli era similantemente appellato *πρώτη*, trentesimo; e questo non solamente in quei dati mesi, ch'erano composti di trenta gior-

ni, ma eziandio in quelli di ventinove, perchè in questi, secondo alcuni racconti, il ventesimo secondo giorno veniva traisciato: oppure secondo altri Autori, il giorno ventinovesimo: Ma qualunque si fosse quel giorno, il quale venisse tralasciato nella computazione, il giorno trentesimo sempre e costantemente veniva ritenuto. Quindi secondo il primo schema di Talete tutti i mesi erano denominati Mesi di trenta giorni, quantunque pel regolamento di Solone la metà di questi mesi contenessero soltanto ventinove giorni. E l'Anno Lunare degli Ateniesi era denominato un Anno di trecento sessanta giorni, tuttochè realmente dopo il tempo di Solone non fosse composto di nulla più che trecento cinquantatquattro giorni. Veggasi *Potter*, *Archzol.* Græc. lib. 2. cap. 26.

Vari essendo in parti differenti della Grecia i nomi dei Mesi, sarà bastevolissimo il farli a particolarmente considerare quelli degli Ateniesi, contentandoci di nudamente additare quelli degli Greci ad essi corrispondenti.

1. *Hecatembeon*: Era questo il primo mese dell'anno Atteniese cominciando nel primo Novilunio, dopo il Solstizio Estivo, e per conseguente veniva a corrispondere all'ultima parte del nostro mese di Luglio. Era questo mese composto di trenta giorni, e dai Beozj appellavasi *Hippodromum*, dai Macedoni *Leus*; ma il verace suo antico Nome era *Cromius*.

2. *Metagitnion*. Questo era il secondo mese dell'anno degli Ateniesi, corrispondente all'ultima parte del nostro Luglio, ed alla prima d'Agosto. Conteneva questo soli ventinove giorni, e dicevasi dai Beozj *Panemus*, e dal popolo Siracusano *Carnius*.

3. *Boedromion*. Così appellavasi il terzo mese dell'anno d'Atene, che abbracciava trenta giorni, e veniva a corrispondere all'ultima porzione del nostro Agosto, ed alla prima del Settembre.

4. *Mamacterion*. Il Mese quarto dell'anno Atteniese, comprendente soli ventinove giorni. Corrispondeva questo Mese all'ultima parte del nostro Settembre, ed al principio del nostro Ottobre, ed addimandavasi dai Beozj *Alalcomenius*.

5. *Pyanepsion*. Era questo il quinto Me-

fe dell'anno Atrniefe, il quale comprendeva trenta giorni, e veniva a corrispondere all'ultima parte del nostro Ottobre, ed alla prima del Novembre, ed i Beozj appellavano *Damatrius*.

6. *Anthesterion*, il sesto mese dell'anno del papolo d'Atene, corrispondente all'ultima parte del nostro Novembre, ed alla prima del mese di Dicembre. Abbracciava questo soltanto ventinove giorni, e dai Macedoni era denominato *Dafion*, oppure *Desion*.

7. *Pofidion*, il mese settimo dell'anno d'Atene, che veniva a corrispondere all'ultima porzione del nostro mese di Dicembre, ed alla prima del Gennaio, e comprendeva trenta giorni.

8. *Gamelion*, l'ottavo mese dell'anno degli Atrniefi, e quello corrispondeva all'ultima porzione del nostro mese di Gennaio, ed alla prima parte del Febbraio, ed era soltanto di ventinove giorni.

9. *Elaphebolion*, il nono mese dell'anno d'Atene, che veniva a corrispondere all'ultima parte del nostro mese di Febbraio, ed alla prima del Marzo, ed abbracciava trenta giornate.

10. *Munychion*, il decimo mese dell'Anno d'Atene: questo conteneva ventinove giorni, e corrispondeva all'ultima parte del nostro mese di Marzo, ed al principio d'Aprile.

11. *Thargelion*, l'undecimo mese dell'anno degli Atrniefi, che conteneva trenta giornate, e veniva a corrispondere all'ultima porzione del nostro mese d'Aprile, ed al principio del nostro mese di Maggio.

12. *Scirophorion*, era questo il mese duodecimo dell'anno Atrniefe, il quale abbracciava ventinove giorni, e corrispondeva al termine del nostro Maggio, ed al principio di Giugno. Veggasi *Potter*, *Archæol. Græcor.* Lib. II. c. XXVI. Vegg. di pari *Stephan. Thes. Ling. Græc.* Tom. V. pag. 223. & seq.

Siccome i mesi dei Romani erano a capello i medesimi, che quelli, che di presente trovansi in uso presso le Nazioni Europee, così rimettiamo di buona voglia i nostri Leggitori all'Articolo *CALENDÈ*, *Cyclopedia*, e *Supplemento*, ove chiaramente viene appianata la maniera del loro calcolo.

METACARPO. Riconoscevano gli Anatomici antichi nel metacarpo cinque ossa, inchiodandovi quell'osso, il quale di presente vien considerato come la prima falange del dito grosso, il dilungare il quale dalla numerazione degli antichi, ha ridotto il numero di esse ossa a sole quattro. Sono queste ossa tutte lunghe, più faticce nella loro estremità, che nel loro mezzo, e di una lunghezza insieme, e di una grossezza disuguale. Le due prime sono talvolta, sebben assai di rado, uguali, e le altre vanno gradatamente essendo minori di queste. Gli Anatomici, nelle loro descrizioni dividono ciascuna di queste ossa in un mezzo, ed in due estremità, oppure in una base, in un corpo, ed in una testa, od intestatura. Le basi di queste ossa sono tutte angolari, e rivolte verso il Carpo, e la loro intestatura tondeggiana a foglia di Gonnoli, e rivolta verso le dita. Si l'una, che l'altra estremità di queste ossa è fasciata, e coperta di cartilagini, e le intestature per un tratto di tempo ben lungo rimangono distintissime epifisi.

Lunghissimo, e grossissimo si è il primo osso del metacarpo, e sostiene il dito indice; la sua base è alcun poco incavata, corrispondente al lato digitale dell'osso piramidale del Carpo. Nell'orlatura esteriore ha vi una picciola intaccatura angolare, e nel contorno od affilatura cubitale della base ha vi un picciolo laterale fianco, che viene ad essere articolato colla base del secondo osso. L'orlatura, o contorno interiore vien terminata lateralmente da un'angolo obliquo, che viene ad essere articolato coll'angolo adiacente nella base dell'osso grande: intorno intorno alla base hannovi delle disuguaglianze, e delle depressioni per i legamenti delle glandule articolari. Il lato esteriore del corpo dell'osso è più largo, e dilatato verso l'intestatura, di quello sia alla volta della base.

Il secondo osso del metacarpo sostiene il dito medio, ed ha quella singolarissima particolarità in sè, che la sua base è sommarmente obliqua, terminando nell'orlatura, o contorno esteriore per un punto angolare verso il primo osso. Dal lato triangolare della sua base viene ad essere

arte

articolato colla base dell' *os magnum*, e dalle sue fiancate laterali con quelle del primo, e del terzo osso del metacarpo.

Il terzo osso è quello, che sostiene il dito anulare, ed è minore del primo, e del secondo. E' la sua base irregolarmente triangolare, e proporzionatamente minore delle due prime, e dal lato principale di essa viene ad essere articolata colla prima metà del lato dell'osso unciforme: le parti picciole laterali della base, congiungono quelle del secondo, e del quarto osso.

Il quarto osso sostiene il dito auricolare, o sia dito mignolo. Il lato principale della base di quest'osso, in vece d'essere triangolare, come avviene nell'altre ossa, è tutto di un'ampiezza uguale, alquanto obliquo, ed alcune parti del medesimo soavemente convesse, il rimanente è dolcemente concavo, ed articolato colla seconda metà del lato dell'osso unciforme: dalla sua fiancata laterale, congiunge il lato corrispondente della base del terzo osso, ma in una maniera molto più sciolta, che nelle altre articolazioni di spezie somigliante. Nell'opposto lato havvi una picciola prominente. Veggasi *Winslow*, Anatomia pag. 86.

Fratture del metacarpo. Nelle fratture della mano, o del metacarpo, il metodo migliore di riallogare e di rialfettare le ossa, si è quello di stender la mano sopra una ugualissima, e ben levigata tavola, e mentre un Chirurgico Ajutante tien ferma la mano tutta in questa piana, ed uguale positura, il Cerusico dovrà rimpiazzare, e riallogare le ossa; e poichè ciò sarà stato per acconcio modo, e perfettamente effettuato, gli converrà assieuarle con una dicevole fasciatura. Veggasi *Eisler*, Chirurgia, pag. 129.

Lussazione del metacarpo. Le quattro picciole ossicina della palma della mano vengono a rimanere alcuna fiata slogate dal Carpo, al quale sono connesse, e congiunte le loro parti superiori. Questo sconcerto avviene da esterni urti, e violenze, e non di rado; con tutto che forz'è, che queste ossa facciano testa gagliardamente ad una siffatta lussazione, o slogamento; conciossiachè le due ossa del Carpo, le quali sono piantate, e si-

tuatate nel mezzo fra le due ossa esterne, non possono essere slogate dall'uno o dall'altro lato, siccome le due ossa esterne, che sostengono il primo dito, ed il dito mignolo, non possono essere slogate all'iodentro; e cadauna di queste ossa può essere slogata o nell'anteriore, o nella dretana parte della mano, quale di queste cose eziandio avvenga, lo sconcerto, e disordine particolare può essere scoperto, ed esaminato col sentire e coll'ispezione, e la cura può esser condotta a felice termine col distender la mano sopra una piana, e ben levigata tavola, e riallogare col dito grosso qualunque siasi delle ossa, che siasi dilungato dalla rispettiva sua naturale situazione. Veggasi *Eisler*, Chirurgia, pag. 166.

METALLICO. Usarono gli Antichi questa voce con grandissima frequenza non altrimenti che un'epiteto oelle distinzioni di parecchie sostanze, delle quali hanno essi trattato. Dee però essere ogninamente osservato, come diversi Scrittori prefero questa voce medesima in un senso sommamente differente. Gli Scrittori delle cose mediche intesero, generalmente parlando, per essa voce alcuna cosa della spezie minerale, la quale partecipasse più, o meno d'alcuno dei metalli, e che a un tempo medesimo fosse pienamente, ed interamente diversa dalle terre, dalle pietre, e da cose similanti. In questo senso questi scrittori medesimi appellano metallica la pietra Armena, *Lapis Armenus*, la quale, a vero dire, non è propriamente una pietra, tuttochè da noi così caratterizzisi, ma beasi una maniera di rame; e con questo solo termine essi distinguono dal *Lapis lazuli*, cui essi addimandano pietra.

I Naturalisti per altra parte non fanno una tal distinzione, ma addimandano qualunque cosa metallica, che venga procurata, od ottenuta fuori delle viscere della Terra; e così pietre, terre, sali, ed eziandio gli stessi bitumi liquidi, addimandansi da essi sostanze metalliche. Le espressioni olio metallico, e pece metallica, noi gl'incontriamo nei Naturalisti Greci, siccome altresì i nomi del *Petroleum*, e del *Pissasphaltum*. Ma gli Scrittori Medici per lo contrario del tempo,

po, e dell'età medesima distinsero queste colla voce, ed appellazione *Oryste*, che è propriamente fossile; voce, a dir vero di un ampissimo senso, avendo luogo in ogni, e qualunque cosa, che sia prodotta nella Terra; ma quelle date sostanze particolari, le quali contenevano le particelle dei metalli, in una forma, o più, o meno perfetta, essi le separavano da quelle, e disgiuntamente, e sotto differenti capi ne trattavano appellandole Metalli; il gesso, l'arena, la terra, e le pietre d'ogni, e qualunque generazione furono dette dai Greci Naturalisti *Metalla*, Metalli; e gli Autori Latini hanno similmente usata alcuna volta la voce *Metalum*, metallo, per significare una pietra, *Lapidem*.

METALLO. Le Esperienze fatte sopra i Metalli per mezzo del massimo specchio Ustorio in Parigi, hanno fatto toccar con mano, come tutti i metalli imperfetti, il rame, il ferro, lo stagno, il piombo, sono composti di due sole parti, vale a dire, di uno zolfo, o sia una materia oleosa, e di una sostanza più densa, appellata appunto la loro terra, e che è capace di vetrificazione. Che da quest'olio, o dir lo vogliamo zolfo, proceda l'opacità, la lucentezza sfavillante, e la marteillabilità di questi metalli: Che questo zolfo, od olio non sembra in verun caso diverso dagli oli de' vegetabili, e degli Animali, e che trovasi il medesimo altresì in tutt'e quattro i metalli imperfetti, e nello stesso Mercurio: Che questi quattro metalli possiedono una sostanza differente per loro base, la terra di ciascuno de' quali vetrificandosi in una maniera differentissima: e finalmente che questo è unicamente dovuto alla loro differenza vicendevole dall'uno all'altro. Veggansi *Memoires Acad. Roy. Paris*, ann. 1709.

Gravità specifica dei Metalli. La specifica gravità dei Metalli non può essere con estrema elasticità, ed a capello determinata, avvegnachè per molte cagioni ella varia alcun poco; e primieramente secondo il calor differente dell'atmosfera che spande, ed allarga l'acqua, e gli altri fluidi, infinitamente più di quello, che ella faecia dei corpi, e sostanze solide, ed a motivo di questo disuguale smi-

nuimento del peso, ne viene, che rendasi impossibile l'assegnar loro una proporzione costante, seppure il calore non venga ad essere determinato con elasticità veramente estrema.

In secondo luogo, secondo i parecchi gradi di purità nell'acqua, la qual differenza viene in fatti talvolta trovata non mezzana, ma alquanto considerabile.

In terzo luogo, secondo la differente purezza dei metalli medesimi; conciossiachè abbiavi a grandissimo scontro alcun metallo, il quale venga trovato onninamente, e totalmente puro, ma per lo contrario può dimostrarsi con ogni agevolezza maggiore, come troverassi mescolato sempre con alcuni altri.

In quarto luogo finalmente, secondo il peso differente della medesima atmosfera, tuttochè gli effetti delle sue variazioni non riescano tanto considerabili, quanto quelli delle altre divise cagioni. Veggasi onninamente *Cramer*, arte del Saggiare, pag. 4.

Quindi si è, che hannovi in certo modo non altramente che altrettanti piani della gravità specifica dei metalli, quanti sono quelli Autori, i quali ci hanno rappresentata l'istoria delle da sè fatte Esperienze sopra il soggetto medesimo. Del rimanente, a riserva che i metalli seno di una grandissima impurità, la somma di tutte le diversificazioni, da tutte le soprammentovate cagioni risultante, non è sufficiente a farsi, che qualsivoglia metallo esser non possa con certezza distinto da qualunque altro metallo, per mezzo della sua specifica gravità.

Le leggiere, e vaghe variazioni nelle Esperienze idrostatiche non sono, a vero dire, cose non più udite, nè nuove, nè sono tuttavia per modo alcuno schivabili, nè nel far queste stesse Esperienze, od altre, che abbiano con esse dell'affinità. Per provare, che ciò non può esser negato, nè controverito, con dire che costoro non abbiano per se stessi simiglianti Esperienze, noi possiamo produrre due sommamente egregi ed eminenti Testimonj. Che il sommamente industrioso, e diligentissimo Mattematico Merkenno confessa candidamente, che qualunque sia-

va se gli porge l'occasione di far menzione delle Esperienze del dottissimo Ghetaldi, e del sommamente accurato Macchinista Franzese Monsieur Petit colle sue proprie Esperienze, vi si troverà sempre, e costantemente una varietà di pelo d'alcuni pochi grani; ma egli soggiugne, come ella si è soltanto somigliante alla varietà delle osservazioni astronomiche, le quali somigliantemente differiscono pressochè costantemente di pochi minuti, oppure di secondi; ed a questo ci soggiugne dopo, come egli non promettevasi un' esatissima uniformità fra le Osservazioni del Ghetaldi, &c. già fatte, e fra i cimenti di qualsivoglia altro sperimentatore, il quale volesse prendersi la briga di riassumerle tutte queste Esperienze di bel nuovo, e da capo. Ed il famosissimo nostro sperimentatore Signor da Verulamio confessa, come non è da rievocarsi in dubbio, che molti di quei corpi, cui egli ha descritti nelle Tavole, che ci ha date, delle loro dimensioni, e dei loro pesi, differiscono nella specie, o denominazione medesima, avvegnachè alcuni d'essi sieno più pesanti d'altri, e che perciò havvi in questo affare della varietà secondo il caso, di maniera tale che non è necessario, che gl'individui, sopra de' quali egli fece le sue Esperienze, sieno esatissimi modelli, ed esemplari del pelo delle loro rispettive specie, oppure, la qual cosa fa a meraviglia al presente nostro proposito, e che convengano, ed accordinsi a capello colle esperienze fatte da altri sperimentatori. Veggasi Boyle Esperimenta Hydrostatica, nella Prefazione.

Ma questa divisata imperfezione a grandissimo stento evitabile delle Esperienze Idrostatiche non dee essere occultata; ma è di pari vero, che per mezzo dell'ajuto di quelle noi possiamo fare dei buoni giudizi e stime dei pesi, e delle masse di moltissimi corpi; e queste stime, e giudizi non solamente verranno trovati grandemente preferibili a quelli, che possono essere fatti dei corpi medesimi per via d'istumenti geometrici, ma accurati quanto faccia di mestieri perchè rendansi infinitamente utili in un grandissimo numero di varietà d'occasioni.

METALLI per la *specula astronomica*. Nel formare i Telescopi di riflessione l'articolo di tutti il massimo si è l'incontrarsi in un metallo acconcio per gli specchi. La ricerca comune si è per un metallo bianco, e duro, il quale sia per essere lucido, e durevole, ma il Signor Isacco Newton avvisa, che nel tempo medesimo si onninamente di mestieri, che venga presa somma cura, che il metallo non sia pieno di fori, o porosità, le quali tuttocchè sieno così picciole, e minute, che non possono rinvenire, che col microscopio, nulladimeno verranno ad impedir grandemente l'ufizio dello specchio. Può sembrare, che questo metallo arrivi a prendere un grandissimo pulimento, ma realmente i contorni di questi picciolissimi pori diminuirannosi viemaggiormente nel dare al metallo il pulimento, che in qualsivoglia altra parte del metallo, ed allora tuttocchè il metallo possa sembrare ugualissimo, nulladimeno non verrà a riflettere con quella tale accuratezza, e regolarità, che avrebbe dovuto fare. Così il vetro di stagno, mescolato col metallo comune da campana, divien più bianco, e capace di riflettere una quantità maggiore di luce, di quello altramente farebbe; ma allora i fumi di questo mezzo-metallo alzatisi nella liquefazione, somigliantissimi ad altrettante aeree vesichette, empiono il metallo di porosità microscopiche. L'arsenico bianco imbianca il metallo, e rendelo a un tempo medesimo viemaggiormente denso di quello si fosse prima, non fornistrandogli pori microscopici, seppure la liquefazione non sia stata soverchio violenta. Il Regolo stellato di Marte vien raccomandato per ulteriori Esperienze dal Gentiluomo medesimo.

Allorchè uno si è imbattuto in una propria, ed acconcia misura per comporre un metallo somigliante, oltre di ciò richiedevsi tuttavia una somma precauzione nel darle il pulimento. Qualunque siasi il metodo per cui ciò venga eseguito dovrà sempre essere eseguito con una finenza veramente estrema; conciossiachè, se venga ciò altramente effettuato, le sue particelle verranno a graffiare la faccia del metallo, e formeranno tali fori micro-

eroscopici, quali gli produce il vetro di stagno nell'altro sopra esposto esempio. La proporzione dell'arsenico esser dee giudicata per via di cimenti, e di prove, ma alcuna cosa fra la sella, e l'ottava parte del peso del rame, sembra, che sia la proporzione adeguata: allorchè havvi molto meno di un'ottava parte, il metallo è privo della sua bianchezza e della sua lucentezza, e quando haveve soverchio di più, vienvi renduto troppo fragile. Il metodo di fare la misura si è il seguente.

Innanzi a tutto il rame dee essere liquefatto solo, e quando è squagliato dee porvisi dentro l'Arsenico, ma mentre si va dimenando questa mistura, fa di mestieri prenderli cura somma di schifare i venefici fumi. Allorchè il rame, e l'Arsenico sono mescolati insieme, dee porvisi similmente dentro lo stagno, e poscia tutta la massa dee essere ben bene dimenata, e rimescolata insieme, e poscia versata fuori. Certuni aggiungonvi dell'argento; ma vien toccato con mano nel farne dopo il cemento, come quello siccome giova grandemente a render bianco, e luminoso il metallo, così fa al medesimo altrettanto pregiudizio nell'ammorbirlo, e nel renderlo soverchio tenero, e pastoso. Sei once di rame, due once di stagno, ed un'oncia di Arsenico, sembra la proporzione, che alla prova riesca di tutte le altre la migliore, e la più adeguata. Questa dee con estrema diligenza, ed accuratezza esser manipolata nel fuoco, nè dee esser tenuta troppo a lungo sciolta, o in fusione; avvegnachè se facessi il contrario, la massa riuscirebbe porosa, e per conseguente imperfetta. Veggasi le Trans. Filosof. sotto il num. 81.

Colori dai metalli. Siccome i metalli nella loro forma metallica possiedono una forte, e gagliarda tuffitura, così mantengono i loro natli colori durevolissimamente, seppure non vengano ad esser corrosi, e disciolti dai rispettivi menstrei particolari, dopo di che le loro soluzioni distruggono i lor colori durevoli particolari, oppure somministrano macchie, e tinte fortissime.

Il ferro sciolto nelle fecce della birra

picciola somministra il bellissimo, e vivacissimo giallo nel tignere le tele di cotone: allorchè vien sublimato per mezzo, oppure col sale ammoniacato, somministra similmente un color giallo; ed il comune color di ferro da forme procurato per via di inchiostro è dovuto unicamente al ferro sciolto nel vetroio, del quale l'inchiostro medesimo è composto.

Il rame squagliato col petro, comparrice di un color d'oro: sciolto nell'acqua forte, somministra un bellissimo color verde, e se venga disciolto in qualsivoglia alcali, dà un'azzurro sommamente vago. E similanti soluzioni esser possono benissimo ridotte a colori asciutti per mezzo, o di cristallizzazione, o di svaporamento; ed il metallo medesimo precipitato fuori dell'acqua forte con i comuni sali somministra al vetro bianco il colore di turchina.

Lo stagno, che è un metallo bianco, o dir lo vogliamo scolorito, somministra un colore azzurro lucido, allorchè è squagliato, e fatto fluido coll'antimonio, e col nitro. Il metallo medesimo si rende necessario nel cavar fuori la tinta scarlattina, coll'acqua forte, e colla cocciniglia, e la sua calcina per mezzo di una assai potente infusione fa venire un vetro di un colore di quella pietra preziosa detta Opalo.

Il piombo corrosivo dalle fumosità dell'aceto, dà il finissimo bianco di cerusa; abbrugiato in un sommamente energico fuoco nudo, od aperto, diviene il fortissimo rosso piombino, o dir lo vogliamo Minio; e squagliato in un valo di vetro coll'arena, diviene di un vago colore di giacinto. Veggasi Shaw, Lezioni, pag. 171.

L'argento, venendo sciolto nell'acqua forte, se alla soluzione siavi aggiunto il gesso, prende un bellissimo, e lommamente vago color porporino, o di ametisto, e la sua propria soluzione, tuttochè pallida non altramente che l'acqua, macchia, ed anche durevolmente, le ugne, la pelle, od i capelli di scuro, o di nero.

L'argento vivo mescolato collo zolfo produce una massa negra, e quella per
via

via 'di sublimazione somministra la bellissima pasta, o pimento rosso, appellato cinabro, color rosso vermiglio; e la soluzione di argento vivo essendo precipitata col sal comune, viene a somministrare una polvere bianca nevata, la quale similmente cangiata in negra se venga mescolata collo zolfo.

L'oro sciolto nell'acqua Regia dà un finissimo liquore giallo, il quale macchia, o tinge le sostanze animali di un color porporino estremamente bello, ed in evento, che la soluzione venga sufficientemente, ed adeguatamente abbassata, ed indebolita coll'acqua, e mescolata colla soluzione di stagno, può esserne procurata una finissima polvere, rossa, o porporina, sommamente utile per tignere i cristalli, o le paste di un vaghissimo rosso.

Flussi dei metalli. Veggasi l'Articolo FLUSSI.

Granulazione dei metalli. Veggasi l'Articolo GRANULAZIONE.

Medicamenti tratti, o procurati dai metalli. Tutte quelle medicine, nella composizione delle quali ha parte il piombo, a stento grandissimo debbono esser permesse per usi interni; conciossiachè noi abbiamo numero grandissimo di casi, e di esempi della rea venefica natura di questo metallo, negli operai, che lavorano nelle officine del piombo bianco, o sia cerula, e se vogliamo dire la cola, come è in fatto, in tutta quella povera gente, che trovasi impiegata intorno ai lavori del piombo. E per vero dire ciò, che noi leggiamo in quella sommamente utile Opera intitolata "Miscellanea curiosa", "è più che baitevole, perchè venga interamente bandito l'uso interno del *Saccharum Saturni*, zucchero di Saturno, e la *Tintura antipthisica*, e la tintura contro la tifichezza, *canè pejus & angue*. Veggansi *Miscellanea curiosa*, Decad. 3. Observat. 30. Quante e quante persone non rimasero mai avvelenate sul fatto nel bere del vino acido, che era stato dalla rea canaglia del vinaj raddolcito col Litargirio?

I metalli però non fanno la loro operazione nel corpo umano, s'è non sieno fincisioliti; quindi essendo inghiottite, ed avvalate abbondevol quantità di mercurio.

Suppl. Tomo III.

rio crudo, sonosi sperimentate meno dannose, unicamente perchè nello stomaco di chi averalo avvallato non istanzia un menstuo proprio, il quale capace fosse di scioglierlo. Ma allorchè il mercurio crudo è disciolto nel suo proprio menstuo, come appunto nel comporre, e procurare il sublimato corrosivo, noi veggiamo, e tocchiamo con mano, come il mercurio medesimo degenera in uno dei più potenti, e tremendi veleni. Il piombo, il ferro, ed il rame, essendo molto più facilmente disciolti di quello sialo l'argento vivo, radissime volte vengon presi senza un qualche sensibile e considerabile effetto, il quale for'è, che di necessità riesca sempre maggiore quanto maggiore sia la copia di un umore acido, oppure nel caso del rame, di un'umore alcalico, che trovisi stanziato nello stomaco, e negli intestini. L'uso interno dei cristalli di argento, quantunque alcuna fiate siano stati con sommamente prospera riuscita somministrati nei casi, ed affezioni idropiche, nulladimeno con grandissimo stento debboni dal saggio, e eristiano medico permettere, a motivo di loro acrimonia corrosiva, che ha non di rado cagionato dei flussi di escrementi sanguigni, e delle debolezze, e languori estremi. Le tinture comuni del rame, e le soluzioni del vetrnolo possono appena, ed a sommo stento esser prese per bocca, ed amministrate internamente con sicurezza, e senza pericolo. L'istesso oro fulminante eziandio, *Aurum fulminans*, non può esser con sicurezza prescritto prima di esser in tutto, e per tutto stato dilavato, e purificato dei suoi sali, ed eziandio in questo stato reistificato, e sceuro de' divisiati sali, se avvenga, che incontrisi nello stomaco con un'acido solvenete, è valevolissimo a produrvi sconcerti, e mali di momento, e conseguenza grandissima. Il ferro poi, e lo stagno non sono stati sperimentati perniciosi a questo segno nel corpo umano, ma anzi per lo contrario di non mezzano beneficio, e vantaggio, massimamente il ferro, qualora però venga preparato, ed usato con dicevolezza, e proprietà.

I corpi metallici corrosi dagli acidi, allorchè vengono applicati sopra le ulcere, e

A a a fomi-

somiglianti malori, universalmente rodono. Alcuni di quelli, a cagion di esempio, il mercurio sublimato, e massimamente l'arsenico, allorchè sono stati applicati eternamente, hanno scossa, e sconvolta tutta la fabbrica del corpo umano; e le preparazioni mercuriali penetrano alcuna fiata la massa del sangue, e producono una salvezione. Veggansi Saggi di medicina di Edimburgo. Vol. 5. Art. 74.

Sali dei metalli. I Sali di parecchi metalli sono stati medicamenti da tratto di tempo lunghissimo conosciuti nel mondo, e di fatto riescono di egregio uso nella guarigione di moltissime malattie. Ma potrebbero questi essere di un vantaggio infinitamente maggiore all'umana generazione medesima, qualora fosse rinvenuta una più felice maniera di estrarli dai metalli, di quello sia stata, e trovissi quella, che è di presente in uso, vale a dire, di ottenere ciò a forza di acidi, e di sali sommamente energici menstriali corrosivi. Oltre i malanni, che simili menstriali inducono come Corrosivi, lo che è in realtà, e con appurata certezza molto meno di quello venga universalmente supposto, avvegnachè essi vengano a perdere la parte massima di siffatta loro qualità nell'agire, che fanno sopra i metalli, questi producono numero grandissimo di rei, e pessimi effetti, e vengono a un tempo stesso a rendere i sali medesimi affatto impropri, e disaccoppiati per un numero di usi assai considerabile, col ridurgli tutti vetrioli, che è quanto dire, col convertirgli in sali, i quali non altrimenti che i comuni vetrioli nativi, posseggono una qualità septicca, e grandemente, e violentemente acrimoniosa. I cristalli, o sale dell'argento, denominato dai Chimici vetriolo lunare, sono un' esempio evidentissimo di ciò.

Dal Borrichio non meno, che dal Kunkell venne immaginato, e rinvenuto un altro metodo da porsi in opera per ottenere i sali dei metalli. Era questo il servirsene del fuoco in vece degli acidi, come di un menstrial, che si pascesse sopra il metallo, e che effettivamente ricerca, e fa sbucar fuori i sali di tutti i metalli colla pura e mera azione di un

forno, o fornello a riverbero; ma questo metodo, quantunque non possa negarsi, essere stato un cimento lodevolissimo, nulladimeno non dee riputarsi di uso generale, avvegnachè la quantità dei sali per simigliante modo ottenuti è sommamente picciola, e questa oltre a ciò con istanti, e brigue somme non meno, che con assai considerabile spesa. Ha il Kunkell dato al mondo un'istoria, o piano degli effetti di un altro metodo di trattare, e manipolare i metalli, del quale ci conta mirabilia magna; ma il buon galantuomo ci tiene occulto il da sé vantato metodo. La magnifica, e solenne maniera, colla quale costui dichiara il fatto, ci fa aver troppo ragionevole sospetto, che ciò, ch'ei narra sia vero; ed egli in ogni, e qualunque luogo ci parla della cosa, come di sola sua propria cognizione, e come unica, e sola opera delle sue proprie mani. Il menstrial di cui questo impastore servivasi, era da esso stesso, e da moltissimi altri ben conosciuto in Ala nella Sassonia sotto la denominazione di *Essentia dulcis*, Essenza dolce: egli afferma con tremendo giuramento, come quello non era nè acido, nè corrosivo tampoco nel grado il più leggiero; come non lasciava dietro di sé la menomissima porzione di sece, nè materia salina, non parti di terra, sendo evaporato solo; e che andava più approssimandosi all'indole, e natura dello spirito di vino, che a qualsivoglia altro liquido conosciuto. Egli dice di vantaggio, come questo liquore scioglieva per fino l'oro medesimo, e questo con perfezione così grande, che l'oro stesso veniva ad alzarsi tutto nella distillazione insieme, e di conserva col liquore. Venendo in esso disciolto il mercurio, e distillato la soluzione in una storta chimica, afferma costui, come rimaneva nella storta medesima soltanto una picciolissima quantità di materia terrigna, e che questa era bianca, di una tessitura spungosa, e che nel fuoco fissavasi; e che il rimanente del corpo dell'argento vivo erasi metamorfosato in un fortissimo spirito senza colore, e pellucido, entro il recipiente. Di più, che l'oro trattato e manipolato nella maniera medesima, e distillato a forza d' un sommamente soave, e leggerissimo fuoco,

co, veniva lasciato nel fondo della storta in forma d'una resina; e che questa resina era scioglibile nel comune spirito di vino rettificato, siccome lo era similmente la terra del mercurio; e che alquanti giorni dopo la soluzione di questa ultima terra medesima, il sale, del quale questa sostanza grandemente abbondava, andossi separando per se stesso dal menstruo; ed andò formando dei cristalli regolari nelle fiancate del vaso di vetro. Questo, egli dice, si è il verace, e genuino sale del mercurio contenente le facoltà, e virtù tutte di quello metallo, e non viene ad essere trasmutato in un vetriolo, od in una sostanza corrosiva dal menstruo messo in opera per estrarlo.

Allorchè il sale è giunto a formare per simigliante modo quel dato numero di germogliamenti, cui egli è capace di somministrare per via del diviso processo chimico, il liquore, che ne rimane, dee essere soavemente, e per gentil maniera svaporato, e verravvi trovato un sale somigliante nel fondo del vaso di un color bianco, di un odore agreevole, ed insipidissimo, assaporandolo. Questo, egli segue a dire, viene ad essere per sì fatto modo fissato nel fuoco, che non vi ha più nè modo, nè verso, che possa venire altrimenti dal medesimo fuoco distrutto od alterato, in quella maniera appunto, che si è tale il metallo, da cui è stato ricavato. Liquefassi questo interamente nel fuoco in una massa; ma se immediatamente, che si sia squagliato, non viene levato via del fuoco medesimo, precipiterà, e scorterà via pel vaso, in cui era stato squagliato, si sia di qualsivoglia materia questo vaso essere si voglia.

Attribuisce Messer l'Autore tutte le prodigiose, e tremende virtù a questo sale, che è noto, esser possedute dal metallo medesimo, dal quale è stato ottenuto; e ci pone innanzi degli esempi di Cure dal medesimo condotte a termine, le quali, a vero dire, sembrano così bene accertate, che ci lasciano appena luogo di rievocare in dubbio la loro verità. Egli asserisce, che questo sale opera piacevolissimamente per secesso, per ictico di orina, e per sudore. I casi, cui egli espone delle da esso effettuate guarigioni, sono gli appresso:

Due Donne, le quali erano cariche, e piene fino agli occhi di sozzissimo malfranzese, due uomini trovantisi negli ultimi periodi, o stazioni di una febbre Eptica, parecchie persone investite da vajolo dell'indole, e natura peggiore, ed alcune altre afflitte da Peripneumonia. La sostanza somigliante ad una resina, in cui vien trasformato l'oro per la medesima operazione, afferma questo Autore, come può essere similmente convertita, e cangiata in un sale bianchissimo, e fortissimo di un sapore penetrantissimo, e sommamente acuto; ed a quello il nostro Messer l'Autore attribuisce grandissime virtù medicinali nella guarigione delle emorragie, e delle affezioni epilettiche, ed aggiunge, come è un'ingrediente della polvere negra composta, tanto famosa, e celebrata per i casi epilettici, e che vien preparata nel pubblico Spedale degli Ortoni in Ala. Veggasi *Kunkell*, Dissertatio de salibus Metallorum.

Che una scoperta di una maniera d'estrarre i sali dei metalli per simigliante modo, senza l'ajuto degli acidi, verrebbe ad essere di un uso sommo al Mondo, è cosa evidentissima; e la magnifica, e solenne maniera, colla quale questo Autore asserisce di averla fatta, sembrerebbe, che esser potesse con infinita probabilità similmente eseguita da altri. Merita perciò costui di essere altamente vituperato, e sviscerato per non appalesare, e non dichiarare al Mondo questo suo metodo. Ma da quelle poche scintille, e spruzzi, che ne andando costui non volendo qua, e là, non è disprezzabile, che alcun Valentuomo, malgrado la costui iniqua gelosia di appalesarlo, non giunga ad afferarlo, e porlo in pratica con riuscita.

METODO. La Legge suprema del Metodo Filosofico si è il promettere ciò, che è necessario verso la cognizione, o stabilimento, di ciò, che seguita. Veggasi *Wolff* Discorso prelimin. alla Logica e. 4.

Il metodo Mattematico, ed il metodo Filosofico sono una cosa medesima, siccome può esser toccato con mano dalla pratica dei Geometri dell'Antichità, i quali osservano costantemente la legge qui mentovata. Idem, ibid.

Parecchi Autori, come, a cagion di esempio, Moosieur Ramus, ed i Signori di Porto Reale, ed altri non pochi si son fatti ad accagionare Euclide di mancanza di metodo: ma se questi Valentuomini avesser fatto attenzione alla suprema Legge di tutto il vero metodo, farebbero certamente stati assai più cauti nelle loro pur troppo ingiuste, ed incoerenti censure. Il Gesuita Castelli ha fatto risuscitare quella malissimo foodata accusa; e per convincere i suoi Leggitori di quanto ei forpassi gli Antichi, ei dà principio alla sua Geometria a *petitione principii*, da un Postulato. Così, per provare, che gli angoli opposti a, b , come anche gli angoli di pari opposti c, d , sono uguali, egli assume questo principio, che le due linee dall'intersecamento delle quali vengono formati questi angoli, trovansi sopra, e sotto ugualmente inclinate l'una all'altra. Ora essendo ugualmente l'una all'altra inclinata è la cosa medesima, che il formare angoli uguali, che è la cosa appunto che dee essere provata (a). Noi troviamo la confusione medesima di pensare, cui egli introduce, per via d'illustrazione nella sua dottrina delle linee parallele, per non far parola dell'assurdo d'esser parallela per così dire una linea dilatata (b).



(a) Castelli *Mathes. Univ.* pag. 264.

(b) *Idem, ibidem*, pag. 271.

METOPPO, Osserva Monsieur le Clerc, come la bellezza dei metopi consiste nella loro regolarità, oel comparire d'essere perfettissimi quadrati; ma anche allorchè questi trovansi ugualmente riquadrati, compariscono esser minori rispetto all'altezza, che all'ampiezza, o larghezza a cagione della proiezione del picciolo legacciolo; e perciò appunto per sì fatta ragione vorrebbon questi esser composti sempre un minuto, o due più alti, che larghi, affinchè venissero a fare la loro comparsa, od appariscenza uniforme, e perfettamente quadrata.

Egli osserva similantemente, come i trigli, ed i Metopi seguonsi l'uno l'altro regolarmente: fa di mestieri, che le colonne sianfi l'una addossata soltanto all'

altra, e riserva di quelle degli angoli interiori, le quali dovrebbero essere sempre accompagnate da altre due, una in un lato, l'altra nell'altro; e dee esser con ogni giustizia osservato, che quelle due colonne, le quali accompagnano quelle dell'angolo, non sono meno necessarie per rapporto alla fermezza, e solidità della Fabbrica, di quello sialo la regolarità degli Intercolonnii.

MICRANIA. E questo il nome d'una specie di dolor di capo, che attacca soltanto la metà di quello, e che riconosce la sua origine da un ammassamento di sangue formatosi nei vasi di questa metà della testa.

Fannosi i Medici a dividere la Micrania in quattro specie 1. Micraia Idiopatica, e questa è tale, allorchè ella si è realmente, e propriamente una infermità per se stessa. 2. Micrania sintomatica, ove ella si è propriamente noll'altro più, che un sintoma di alcun'altra infermità. 3. Micrania continua, o fissata si è quella, che non ammette intervalli, nè dà mai sosta all'ammalato, ma lo tribola continuo. 4. Micrania periodica, e questa si è, allorchè il paziente venga regolarmente a rimascerne libero in certi dati fissi periodi.

Segni della Micrania. Fra questi si notavano dei dolori vibrativi, ed in estremo acuti: il dolore martirizza soltanto una parte del capo, mentre l'altra trovasi attualmente, ed in tutto, e per tutto libera da ogni incomodo. Ordinariamente, la parte da questo acerbissimo male tormentata, si è la sinistra. In quel lato della testa, ove trovasi il dolore, non vi è ivi fissato in una sola situazione, ma va divagando e sopra, e sotto da una parte all'altra, e talvolta in questa parte stessa tormentata, dal dolore medesimo viene ora infestato l'occhio, ora la ganascia, ed i denti. Allorchè trovasi molestata ed afflitta dal dolore la parte inferiore del capo, la parte superiore di quello trovasi bene spesso libera: nè mancano casi particolari, ne quali è stato cooscivuto, che il dolore venga a calare per sio al braccio corrispondente al lato offeso. A tutto ciò dee aggiogersi, che il paziente in questa oc-

cazione trovai d'ordinario col ventre indurito, e scarica pochissima orina. Le Donne sono assai più sottoposte a questa infermità, che gli uomini, e fra esse massimamente quelle tali, le quali si pascono assai bene, e che fanno pochissimo esercizio di corpo: quelle tali persone altresì, che son soggette a grandi, e violente passioni d'animo: quelle tali donne similantemente, che patiscono troncamento degli usati regolari corsi mensurali; e quelle di pari, che vivono in istato matrimoniale senza far figliuoli.

La cagione principalissima di questa malattia si è una plethora, e agionata d'ordinario da una soppressione, o troncamento delle scariche mensurali, o delle morici, o d'altra naturale scarica, ed evacuazione, o finalmente dall'interalsciar l'uso, che altri prima faceva del cavarli sangue nella Primavera, e nel cadere dell'anno. A siffatte cagioni esser debbono aggiunte, uno stemperamento delle prime vie, una mutazione del corso della vita da un continuato, e copioso esercizio, ad una vita assai quieta, e sedentaria; un soverchio vegliare, ed una trasmodata applicazione allo studio; un soverchio grande incalorimento del corpo, od un subitaneo raffreddamento di quello trovantesi assai riscaldato: il sopprimimento di violenti passioni, come di collera, o somiglianti; e finalmente il fare una vita soverchio lauta, cibandosi di vivande soverchio condite, ed usando senza modo di bere liquori potenti. Veggasi *Junter*, *Concept. Medic.* pag. 188.

Prognostici in questa infermità. Questa specie di dolori di capo induce in chi vi è soggetto non di rado delle suffusioni, ed altri mali, ed indisposizioni degli occhi, e bene spesso suol'essere un foriere infauso della gotta, massimamente se nell'accesso venga trattato, e maneggiato con imprudenza, e fuor di proposito. In evento, che l'ammassamento, o congestione del sangue sia in questo tempo dilungato a forza di medicine repellenti, e richiamato a i piedi, viene a formare la testè divisata penosissima malattia; ma se questo viene a cadere, siccome può benissimo ed agevolmente, sopra le viscere, per lo più divien padre funesto d'una tremenda

febbre infiammatoria. Allorchè s'ellende al braccio, ed al lato della metà della testa attaccata, vi ha sommo pericolo d'una paralisi in tutta questa parte. Questa infermità non è per se stessa di malagevole guarigione nella gioventù; ma nelle donne avanzate oggimai negli anni, dopo, che son loro cessati i corsi mensurali, è pressò che disperabile, ch'ella possa essere per siffatto modo curata, che non torni di bel nuovo in istena.

Metodo della cura. Siccome in similgiante malattia trovansi quasi sempre ostruite le prime vie, il principio regolare d'una savia ed adeguata cura dovrà essere il nettare, aprirle, e rimondarle; e perciò dee essere innanzi a tutto somministrato non solo un piacevole e benigno vomitorio, ma eziandio le dicvoli medicine purganti. Avverte il dotto, ed avvedutissimo Stahl, come il Medico potrà con sicurezza ottenere tutt' in un tempo questi due necessari effetti, se ordinerà al suo malato una adeguata dose di Rabarbaro mescolato col Tartaro Emetico. Dopo di ciò se gli dovranno applicare de'clisteri emollienti; quindi dovranno attutarsi, ed ammansarsi le trasmodate emozioni del sangue colle polveri composte di nitro, d'occhi di granchio, e di cinabro; ed in quel casi, ove il dolore è in estremo violento, ed insopportabile, potrà somministrarsi una gentile, e soave oppiata, quale appunto esser potrebbe una leggerissima dose di pillole di storace, e negli altri tempi, la quantità del cinabro può essere accresciuta da cinque grani, alla dose di dieci, ed anche di venti grani; e questa dose servirà bravamente in luogo dell'oppiata, e verrà a produrre l'effetto medesimo d'ammansare il dolore. Potrà di pari metter' in opera esternamente lo spirito di vino canforato, e grandissimo effetto ha non di rado prodotto in questi casi un pediluvio caldo in decoiti d'erbe di natura emolliente. Fuori dell'acceso, ed in tempo di quiete i merodi, che debbono usarsi per prevenirlo, sono il cavarli sangue nella nuca, o nodo del piede per dilungarne una plethora; ed ove si fatta infermità riconosca per sua cagione, ed origine una soppressione de' corsi mensurali, o di qualsivoglia altra evacuazione, que-

lla,

ste, se mai sia possibile, debbon' essere richiamate ai loro primi periodi: ma soprattutto in ogni uno, ed in qualunque de' divisi casi dee essere costantemente schivata una vita sedentaria. Il cavar sangue nel tempo dell'acceso non è cosa buona, nè dicevole, seppure la plethora non fosse estremamente grande, o che l'ammassamento del sangue nella testa non fosse eccedente a segno, che desse da temere delle conseguente peggiori.

MICROSCOPIO. I microscopi composti mostrano alcune volte, ed esibiscono un'apparenza fallace, con rappresen-
tare gli oggetti convessi, concavi, e viceversa. Veggansi le *Trasfazioni Filosofiche* num. 476. pag. 387. Veggansi di pari alcuni racconti dei famosissimi Microscopi del Levenochio nelle medesime *Trasf. Filosofiche* sotto il num. 380. e sotto il num. 458.

Il microscopio Solare, oppure Microscopio *Camera oscura*, ed il microscopio per gli oggetti opachi, sono invenzione e trovato di Monsieur Luberkhun, e sono stati eseguiti in Inghilterra dal Sig. Cuff. Veggansi le *Trasf. Filosofiche*, sotto il n. 458. pag. 516. 518.

MICROSCOPIO Camera oscura. Veggasi il seguente Artic. **MICROSCOPIO Solare.**

MICROSCOPIO per gli oggetti opachi. Il microscopio per gli oggetti opachi rimedia l'incomodo, ed inconveniente d'aver in vicinanza dell'occhio il lato, o fiancata oscura d'un oggetto: conciossiachè per mezzo d'uno specchio d'argento concavo, in grado estremo ridotto a pulimento, e lustro, nel cui centro trovasi piantata una lente ingrandente gli oggetti, l'oggetto medesimo viene a rimanere sì forte illuminato, che può altri benissimo farsi ad esaminarlo con ogni facilità. Veggansi le *Trasf. Filosof.* num. 458. Sez. 9.

MICROSCOPIO Solare. E' il microscopio Solare composto d'un tubo, d'uno specchio da rimirarsi, d'una lente convessa, e d'un microscopio. Il tubo è di rame, del diametro a un di presso di due dita, fissato in un collare circolare a leva, per sì fatto modo, che può essere voltato a talento in giro in una macchinetta od ordigno quadrato; e può agevolissimamente essere accomodato, ed aggiustato ad un foro nell'

imposta d'una finestra per sì fatta maniera, che la luce di fuori non possa penetrare entro la camera se non se pel tubo poc' anzi mentovato. Attaccato alla macchinetta per via d'arpioncini in quel lato, che viene senza la finestra, è uno specchio da rimirarsi, il quale per mezzo d'un filo di rame congiunto venendo giù per la macchinetta, o telaio, può a piacimento esser mosso o verticalmente, od orizzontalmente per gittare i raggi del Sole per entro il divilato tubo di rame entro la camera oscurata. L'estremità del tubo di rame senza l'impolla contiene una lente convessa per raccogliere i raggi, e per condurli al foco; e nell'estremità, che rimane dentro la camera, rimansi invitato, o fermato colla vite il microscopio da tasca di Monsieur Witsou, con l'oggetto, che dee essere esaminato, applicato al medesimo in una lamella, od alliscia scorrente. I raggi del Sole venendo ad esser diretti dallo specchio da rimirarsi pel tubo sopra l'oggetto, l'immagine o pittura dell'oggetto medesimo viene con infinita distinzione, ed in forma sommentemente vaga, ed appariscente ad esser gettata sopra un parapetto di carta bianca; e questo oltre ogni immaginazione esser può ingrandito. Veggansi le *Trasf. Filosof.* num. 458. Sezione 9.

MIDOLLA. Nella vegetazione la sostanza morbida spungosa nella parte centrale delle piante, e degli alberi. Siccome la sostanza del tronco negli alberi diviene legnosa, la midolla viene ad essere compressa, ed intirizzita, e stirata ad un sì fatto grado, che ella viene a totalmente scomparire, e dileguarsi.

Da questo è chiaro, ed evidente, che l'ufficio della midolla nella vegetazione non può essere gran fatto considerabile, conciossiachè ella non sia di una perpetua durata. A motivo di sua struttura spungosa ella sembra d'ipostissima, e nata fatta per ricevere qualunque soverchio umidore, che sia per trasudare per le porosità delle fibre legnose. Se dall'eccesso di un siffatto umido, oppure per qualsivoglia altra cagione egli avvenga, ch'ella marcisca, e perisca, siccome assai sovente veggiamo accedere negli olmi, l'albero tira innanzi benissimo la sua crescita,

feita, e sostienfi egrediamente bene senza essa, prova somma, ed indubitata del non essere d'uso essenziale nella vegetazione. Veggasi *Boerhaave*, Chem. p. 139.

La midolla degli alberi viene ad essere continuata di vantaggio, e più oltre entro le parti loro minute, assai più di quello altri si faccia ad immaginare, e di quello, che venga universalmente concepito: conciossiachè i ramuscelli più piccioli, ed i gambolini delle foglie perfino, e dei fiori ne abbiano veramente l'adeguata loro porzione, secondo, ed a norma dell'indole, e natura dell'albero, al quale appartengono; ed eziandio le stesse costole di mezzo delle foglie, allorchè ci facciamo ad esaminarle col microscopio, non sono senza la loro porzione rispettiva di midolla. Una Sezione trasversale di una di queste costole della foglia di un albero midolloso, mostra un'estremamente vaga disposizione, ed ordine di vasi, o dire le vogliamo picciole vescichette, contenenti una quantità di un liquor chiaro, e somigliantissimi in tutto, e per tutto a quei vasi, e vescichette delle quali è composta la midolla stanziente entro i rami dell'Albero. Egli è ben vero però, che in queste foglie, e costole di foglie la midolla medesima non è rotonda, come nel tronco, e nei rami, ma bensì piatta, e scorde da un'estremità all'altra del gambo in forma di una sottilissima costola bianca, la quale vasi diminuendo via via che va accostandosi alla sua punta.

La midolla delle piante finalmente sembra appunto quella sostanza, che diciamo midollo negli animali, vale a dire un ammassamento, o congerie di un numero infinito di vescichette, che sembrano dalla Natura destinate a separare un fugo più fino di quello, che è necessario pel nutrimento delle parti più grossolane dell'albero. Viene osservato, come quelle Piantе, le quali hanno una porzione di midolla più abbondevole dell'ordinario, producono una copia assai maggiore di fiori, di quella, che si producono le altre piante. Esempi evidentissimi di siffatta asserzione veggansi nel rosajo, nel sambucb comune, e somiglianti altri parecchi; e nelle piante frutacee, la copia dei fiori

non è soltanto immensamente abbondevole, secondo la quantità della midolla grandissima, che stanzia nei loro pedali, e gambi, ma sembra che la midolla venga a condursi dai pedali, e gambi per ogni, e qualunque verso, e per fino ai medesimi semi. I semi lunghi del Mirride dolce, e di altre piante somiglianti, allorchè non sono maturi, altro in sostanza non sono, che mera midolla. Veggansi *memoires Acad. Scienc. Roy. Paris.* aon. 1709.

MIDOLLA Spinale. Nei pesci la midolla spinale non iscorre giù per le vertebre, o sia pel mezzo delle vertebre, siccome appunto ella fa negli altri animali, ma ella vien condotta per tutta un'intera serie di apofisi, le quali trovansi nella parte superiore dell'osso, e perciò vengono denominate Apofisi dorsali, affine di distinguerle dalle altre, le quali, a solo motivo di loro rispettiva situazione son dette laterali, o ventrali. Tutte queste Apofisi dorsali delle vertebre nella base loro son concave; e per questo mezzo vengono a somministrare un canale continuato per questa midolla. Le basi delle apofisi più basse, od inferiori portantisì, e raggiungentisi dall'ano alla coda, hanno somigliantemente la specie medesima di cavità nella loro base: ma questa serve unicamente pel passaggio dei più grossi vasi sanguiferi.

MIDOLLO. Presso che tutte le ossa contengono entro le loro capaci cavità, o celle il midollo, vale a dire, quella sostanza soffice, untuosa, la quale in alcuni è più solida, in altri è più morbida. Questa sostanza, mentre stanzia nelle cavità delle ossa grosse, viene più particolarmente, e come autonomasticamente appellata midollo: quando poi trovasi dispersa per le picciole cellette, o cavità cellulari, viene comunemente appellata fugo midollare. Il midollo delle grosse ossa concave è una massa composta di numero infinito di picciole vescichette, o cellette membranose unite, e congiunte insieme, e comunicanti l'una coll'altra, guernite di vasi sanguiferi, e di nervi, e ripieni di una finissima materia dolce oleosa. Tutte queste divise cellette vengono fasciate, vestite, e circondate da una mem-

membrana finissima, la quale non altrimenti che un' interno periosso s'attacca serratamente alla superficie inferiore dell'osso, per mezzo di numero infinito di vasi capillari, e di altre spezie parecchie di minutissimi filamenti. Questa sostanza retata, o reticolare delle ossa scorre già per questa massa midollare, e per così dire, la frammezza di grasso, e di magro, e per sì fatto mezzo sostienla nel mezzo delle grandi cavità divise. Il midollo della sostanza cellulare, o dire la vogliamo cavernosa delle ossa, vien diviso da picciole lamelle, o costole, ossee, e per i filamenti della sostanza reticolare delle ossa medesime, in un' ampio numero di vescichette, o cellette membranose, le quali soppannano, o foderano le celle ossee, e comunicano a vicenda l'una coll'altra.

Il midollo cellulare nella tessitura cavernosa di alcune ossa, differisce da quello, che stanza nelle grandi cavità delle altre, non meno rispetto al colore, che alla consistenza. Egli è liquido, e di un color rosso per ogni, e qualunque verso; dove per lo contrario l'altro è assai più solido, ed è soltanto rosso nella superficie. Questa differenza è dovuta ai vasi sanguiferi, che scortonno per cadauna celletta membranosa, dove per lo contrario il midollo stanziente nelle grandi cavità sembra di esser provveduto de' vasi medesimi soltanto nella membrana comune. Parecchie di quelle cellette midollari vengono ad essere similmente divise dai filamenti ossei della sostanza cavernosa; e questi piccioli filamenti, non altrimenti che quelli della tessitura reticolare vengono ad esser coperti da porzioni della membrana midollare, come da un periosso.

Le membrane midollari esser possono separate, e disgiunte dal liquore, che in sé contengono, con porre in molle in acqua caldissima tutta la massa, e dopo tratto tratto col gentilmente spremela. Ma queste due sostanze prese insieme quelle sono, che dagli Anatomici vengono comprese e caratterizzate col termine comune di midollo, e non già od all'una, od all'altra di esse separatamente, e diversè considerata. La membrana midollare è in estremo scassibile, siccome lo è

simigliantemente il sugo, il quale dee esser di necessità osservato, e considerato per conoscere ciò, che realmente debba intendersi per sensibilità del midollo. Il midollo per mezzo della sua parte liquida, ed untuosa viene a rendere le ossa in alcun grado, e per certo modo pieghevoli, e meno stritolabili, siccome ci va penetrando la loro sostanza in piccioli gradi. Questo continua nelle ossa fin no alla vecchia età, ed allora le ossa medesime, rimanendoe prive, divengono fragilissime.

In quelle ossa, che sono denominate *Ossa innominata*, ossa senza nome, anonime, non trovanfi ampie cavità interne; ma la loro sostanza essendo cellulare, o cavernosa, non contengono perciò massa midollare, ma le loro celle vengono ad esser tutte inumidite da un sugo midollare, il quale distillasi incessantemente per la membrana, della quale sono queste fasciate, e foderate. Nell'osso del femore il midollo stanza in una grossa massa nel mezzo della cavità dell'osso, ed in piccioli distinti mucchi nelle cellette di cadauna estremità. Il primo vico penetrato a differenti distanze da ossei filamenti, e vien per ciò ad esser fiancheggiato, e fatto forte in tutti i movimenti violenti, ed urti, come nel correre, nel saltare, ed in moti similiani. Nelle ossa della gamba la disposizione è la medesima a capello; e nelle ossa dei piedi trovasi il midollo adattato egregiamente bene alla loro interna struttura, quella elasticamente seguitando, ed è stanzato in mollecole entro le porzioni cavernose, ed in masse poi in quelle date porzioni di ossa, che hanno le cavità per riceverle. Così il midollo di tutte le ossa del Tarso trovasi disperso in mollecole, perchè la loro struttura interna è spungola. Nelle ossa poi del metatarso, e nelle prime falangi delle dita dei piedi, vi è disposto in quella medesima guisa, che trovasi nella tibia, e nella fibula, vale a dire, stanzavi in mollecole nelle estremità, e nel loro mezzo in masse, o maggiori, o minori, secondo appunto le grossezze delle cavità rispettive. Nelle altre falangi, le quali sono interamente spungole, trovasi coerentemente disposto in mollecole. Nelle vertebre, nel-

lo sterno, e nelle costole, la struttura interna di tutte le quali ossa è cellulare, e spungosa, il midollo trovavasi soltanto contenuto in picciole porzioncelle separate, ed alero realmente non è, che un fugo rosso midollare. Le ossa della testa essendo di pari nella maniera medesima, o simigliante cellulari nella loro struttura interna, contengono simigliantemente il loro midollo nella stessa guisa in porzioncelle separate, e distinte, e slanzianti nel diploe entro cellette membranose. Veggasi Winslow, Anatomia, pag. 118. pag. 136. pag. 150. & seq.

La traspirazione della materia untuosa del midollo non è conficcata già al tempo della vita dell'animale, che ella è di pari eziandio trasudata nel morto cadavere, ed è di un' intoppo, ed ostacolo grandissimo ad imbiancare, nettare, e rimondare le ossa in uno scheletro; conciossiachè se non venga fatta un' apertura in una delle estremità di un' osso, e che per questa apertura non venga fatto uscire fuori tutto il midollo, che slanzia in tutt' esso osso, e ciò per via di iniezioni di acconci, e dicevoli liquori fattavi con una siringa, o schizzetto, l'osso, tuttochè alla bella prima sia riuscito di renderlo perfettamente bianco, indi a non molto con ogni sicurtà diverrà giallo, e ciò a cagione della divisa traspirazione del midollo dentro l'osso contenuto, la qual cosa indubitabilmente succede, o nella più calda stagione, od altrimenti. Da questa stessa ragione avviene simigliantemente, che i lavoratori di ossa, i quali costumano di tagliare sempre, e costantemente le ossa per lo luogo in due parti, e cavarne fuori tutto il midollo, ed eziandio tutta la sostanza spungosa delle ossa medesime, la quale posson supporre, che ne contengano porzione, appunto perchè conoscono, e ben fanno, che se altrimenti adoperassero il calor solo di qualsivoglia mano, farebbe divenir gialli i loro lavori, tuttochè estremamente bianchi, allorchè gli haono fatti. Dee essere osservato, avervi nelle ossa concave parecchie picciole aperture, per le quali passanvi i vasi sanguiferi, che partono dalla membrana racchiudente il midollo; quindi apparisce, come le ossa vengono ad

Suppl. Tomo III.

essere inconfutabilmente nutrire ugualmente dal di dentro, che dal di fuori, inttochè ciò non sia dal midollo, ma dai soli vasi sanguiferi. Così le due tavole del cranio sono evidentemente nutrite; vale a dire, la tavola esterna dai vasi del pericranio, e la tavola interiore dalle ramificazioni di quei vasi, i quali trovansi sparsi, e diffusi lungo la dura madre.

Egli è stato supposto, che la quantità del midollo venga ad essere accresciuta nelle ossa, secondo il crescere della Luna; ma è stato toccato con mano con ogni maggiore evidenza, esser questo un' erronea e falsissima opinione; conciossiachè la crescita ed aumentazione del midollo in ogni e qualunque osso, dipenda unicamente dalla quantità del nutrimento, e dallo stato di quiete, che alla creatura è concesso.

La sensazione del midollo è stato un punto, intorno al quale è stato ragionato dagli Scrittori, che ne hanno trattato con grandissima diversità. Allorchè è stato tagliato via un membro, o fattane l'amputazione, e che è stato lasciato nudo il midollo, se il paziente venga toccato sopra il midollo medesimo con alcuna sostanza ruvida, senecvi un acutissimo, e sensibilissimo dolore. Sonosi certuni fatti a supporre, che la divisa sensazione nascesse piuttosto dalle membrane, che dalla sostanza del midollo. Questo fatto pertanto venne posto in una indubitabile certezza da un' operazione sommamente curiosa, tuttochè barbara in estremo e crudele, effettuata sugli occhi dell' Accademia di Parigi. Sugli occhi adunque dell' Accademia venne troncata una gamba ad un animale vivente, e l'estremità dell' osso gli venne lasciata affatto nuda, furono con estrema diligenza e scrupolosità tagliate, e tolte via tutte le membrane, e questo con infinito dolore, e vero martirio di quella creatura: quando fu cessato il dolore di queste membrane, venne introdotto, ed affondata la punta d' uno stiletto entro il midollo, senza toccare alcuna altra parte, in quest' atto l'animale ebbe ad esprimere, ed a fare evidentissimamente conoscere una vivissima ed acutissima sensazione dolorosa con segni di maggiore acuità, che in qualunque altra delle prime crudeli operazioni. Questa faccenda venne con estrema esattezza più e più volte ripe-

Bbb

tuta,

tuta, e sempre e costantemente coll'infesso evento; di modo che si rende evidenzissimo, che il midollo nello stato suo naturale è suscettibile in estremo grado di dolore, ed in estremo sensitivo. Quanto più poi sarà egli tale nei corpi malaffetti ed infermi! Veggansi *Memoir. Acad. Scienc. Roy. Paris*, ann. 1700.

Si facevano a supporre i buoni Antichi, che il midollo servisse pel nutrimento delle ossa; e le loro ragioni per creder ciò, erano, ch'essi sapevano, come nella sostanza delle ossa non entrano vasi sanguiferi, onde esse possano essere alimentate, e nutrite, avvegnachè tutti i vasi di somigliante specie, cui essi scuoprivano, andassero direttamente entro le loro cavità, ove il sangue ch'essi contenevano, sembrava, che soccombesse ad una specie di coagulazione, la quale venisse a convertirlo in midollo; e che per siffatto mezzo venisse a rendersi un alimento o nutrimento acconcio per le ossa: e di vantaggio offervano i buoni Antichi in prova di ciò, come più lungo che si fosse l'osso, e più violenti che si fossero gli usi, a quali era destinato, più larga e maggiore si era la sua cavità per contenere copia maggiore della divisata materia nutritiva.

Simiglianti ragioni, tuttochè a prima fronte sembrano grandemente probabili, nulladimeno vengono con ogni agevolezza maggiore confutate, ed affatto dileguate da un'elatta ed accurata osservazione. Noi veggiamo nei soggetti giovani un vastissimo numero di vasi sanguiferi distribuiti per la sostanza delle ossa, la tessitura delle quali ossa in quel tempo è molle, rilasciata e spungosa. Dee essere similantemente osservato, come hannovi non meno nel corpo umano, che in quello dei brutti animali moltissime ossa, le quali, secondo questo sistema, non dovrebbero nè poco, nè punto esser nutrite, come quelle che prive sono totalmente di quello midollo. Di questa specie vi sono di pari le corna dei Cervi, e l'altre moltissime creature, le quali, tuttochè non contengano parte menoma di midollo, nulladimeno vegetano, e vengono su rigogliosissime. Hannovi similantemente altre ossa, le quali son concave, e che tuttavia sono soltanto vestite d'una membrana glandulosa: tali

appunto sono le cavità, che trovansi fra le parecchie parti delle due tavole del cranio. Nell'Elefante poi le ossa sfogliate, le quali sono in luogo del Diploe, non contengono ombra di midollo, e sono unicamente vestite e coperte d'una membrana avente qua e là varj vasi sanguiferi. Le concavità di quelle ossa, che somigliantemente compongono le zampe de' granchi, de' gamberi, e simiglianti, non contengono midollo, ma soltanto i muscoli, l'ufizio de' quali si è il muovere quelle date parti; e ciò non ostante tutte quelle crescono, e vengono nutrite, non altramente, che quelle ossa, le quali nelle loro cavità contengono tanta copia di midollo. Ultimamente può essere adeguatamente concluso, come le ossa non son già fatte concave unicamente, perchè elleno debbano contenere il midollo, ma unicamente affinchè vengano ad essere più leggere, e più acconce al moto. Veggansi *Memoir. Acad. Roy. Scienc. Paris*, an. 1700.

Somministra l'Osservazione prove abbondantissime, che continuamente una quantità grandissima del midollo medesimo traspira per la sostanza solida delle ossa, ed in questa sua azione egli è d'uso grandissimo, quantunque non nel nutrire, tuttavia nel preservare le ossa; avvegnachè la sua materia oleosa ed untuosa ammorbidisca le rigide fibre, delle quali l'osso è composto, e venga a renderle più arrendevoli, morbide, e flessibili, e per conseguente tutto l'intero osso molto meno soggetto a rompersi, e sfanciarsi.

MIELE. Ella si è cosa evidentissima, che le api raccolgono la loro provvisione non meno di miele, che di cera dai fiori delle Pianta. Gli Scrittori delle prime età conobbero questo fatto, ma non avevano cognizione distinta delle parti varie dei fiori, le quali somministrano a questo amabilissimo, e sommamente industriosissimo insetto quelle due sostanze infra esse differenti cotanto.

Noi troviamo, come la cera vien somministrata dalla farina contenuta negli apici dei fiori, o siano quelle gemme, o bottoncini, che terminano i loro stami: ed il miele viene somministrato da una parte dei fiori, la quale sembra, che in essi non sia stata conosciuta esistente, se

Se non se dopo le ammirabili scoperte del sovrano Botanico Linneo. Quello egregio Autore ha denominato queste parti dei fiori *Nectaria*. Sono queste certe vescichette, o dire la vogliamo glandule situate in vicinanza della base di cadaun petale, e che vanno filtrando, e segregando continuamente un sugo nettarco, o mellissuo. Sono quelle così differenti rispetto alla lor figura e situazione in fiori diversi, che quello Autore giudiziosissimo le ha fatte una parte delle sue generiche distinzioni. Siccome è stato innanzi osservato, che le api conoscono la struttura di quelli stami dei fiori assai meglio, di quello noi ci facciamo, anche da tempi i più moderni; di modo che è giuoco forza il confessare, che esse ne hanno sempremai conosciuto l'esistenza, ed il più acconcio luogo, e la natura di quelli Nettarei, tuttochè noi ne siamo stati sempre allo scuro, e che sieno venuti a nostra con- tatta soltanto pochi anni sono. Si ferma, ed aggiustasi l'ape sempre e costantemente sopra questa parte del fiore, ed afferrandola da essa ne succhia od il miele, od un sugo di una siffatta natura, che sotto il manipolamento, e lavoro d'essa ape diverrà miele. Ella riceve questo dato sugo sopra il suo corpicciuolo, e portafelo a casa nel suo alveare, ova scaricafene affatto, vuotandolo entro quelle cellette, cui ella si era innanzi preparate per depositarvelo. Veggasi *Reaumur*, *Istoria degl' Insetti*, v. 9. p. 386.

La maniera, onde l'ape procura siffatto sugo, verrà ad essere assai meglio conosciuta, se noi ci faremo ad osservare la struttura del suo tronco, o torso, o dir lo vogliamo tromba. Questo istrumento è di una struttura differentissima da quello della Zanzara, e di tali infettucciacci, i quali vivono, e pasconsi del nostro sangue; ma egli è a capello della figura medesima e fatto come quello delle *pechie*, e d'alcune altre creature di specie somigliante. Questa proboscide, o tromba in tempi differenti comparisce ora più, ora meno lunga. Allorchè la creaturina trovasi in istato di quiete, la tromba è corta, e se ella venga esaminata in questo tempo, col tener sospesa la testolina dell'ape tra le dita, noi verremo a toc-

car con mano, essere una sostanza alquanto piastra, lucida, e sfavillante, della consistenza del corno, e di un colore castagno. Questa sorge dalla parte di sotto od inferiore della testa, e vien condotta in una larghezza uguale all'estremità dei denti, ed ivi piegasi, e si rivolge verso il petto, diminuendosi per ogni verso in grossezza, finchè ella viene a terminare in una punta. Quando è in piaeimento dell'animaluccio, spiega questa proboscide alquanto, e viene a formare una specie d'uncino colla medesima fotea la testa, ed assai frequentemente stendela, ed allungala per tutto il suo tratto, ed allora questa stalla diritta, e come intirizzita in una linea retta dalla testa: assomigliasi grandemente ad un becco di un uccello, allorchè si trova in quella situazione, ed in simigliante guisa ella è più aguzza, e ad un tempo stesso più dura, e più lustra. L'origine di questa tromba, o proboscide trovasi nella parte inferiore della testa, vicino appunto a quel sito, ove questa s'attacca al collo, ed ha una specie di giuntura in quella parte ove arriva a raggiungere l'estremità dei denti, e piegasi indietro di bel nuovo nel suo stato di quiete. Distinguono i Naturalisti siffatto istrumento dell'ape in due porzioni per mezzo di questa giuntura, appellando quella, che raggiunge l'estremità dei denti, la proboscide anteriore, e quella che ha l'inserzione colla testa, la porzione posteriore. Veggasi *Reaumur*, *Istoria degl' Insetti* v. 9. pag. 391.

Quando la proboscide è in istato di quiete, noi non veggiamo parte di sua superficie reale, ma soltanto una specie di fodero, o custodia, in cui ella vien conservata, e difesa. Questo fodero, allorchè venga diligentemente esaminato, vien trovato esser composto di due parti, che possono esser dette due distinte e separate guaine, una delle quali vestendo, e cuoprendo una porzione di sua lunghezza, e l'altra soltanto una parte di sua superficie. Caduna di queste due guaine è composta di due pezzi comeavi, i quali possono addimandarsi acconciamente mezzi foderi, mezz guaine, e queste possono sempre esser vedute col premere la proboscide. Il semplice filamento piatto, che è l'organo

teale del fucchiamento, oppure in altri termini la proboscide, o tromba reale, sarà veduta allungarsi, e stendersi lungo questi pezzi, che staccherannosi dalla medesima in ciascun lato. La porzione anteriore della tromba medesima, allorchè trovasi inflata d'inazione, è alquanto piatta, o compressa, essendo tre, o quattro volte più grossa di pari, che larga, ed avendo dei contorni od asfittature tondeggiate. Questa via venendo per tutto il suo tratto via via più picciola dalla sua origine, o radice, alla sua estremità, ove viene ad essere terminata da un picciolo bottoncino, o fiocco, il quale vedesi patentemente fuori nel suo mezzo. Le orlature, o contorni di questo bottoncino son tutti coperti di peli, ed è similantemente pelosa tutta la porzione anteriore della stessa proboscide. La superficie superiore di questa porzione sembra totalmente, ed insieme cartilaginosa; ma la superficie inferiore comparisce esser tale soltanto in parte, il rimanente di essa sembrando composto di una membrana ripiegata, la quale è capace d'aprirsi all'occasione per un'espansione maggiore. Questa membrana scorre, e si porta lungo tutto il mezzo della parte inferiore della proboscide, ed è della natura medesima della membrana, la quale unisce, e connette insieme i vari anelli del corpo.

Allorchè la Creatura stassi fucchiando i sughi d'alcun fiore, questa parte anteriore della sua tromba, o proboscide gonfiassi, e perde affatto la sua forma piatta da noi descritta. E' questa un'osservazione, che colta della malagevolezza, e della briga, ma può farsi nell'appresso maniera:

Collocherai la testolina di un'ape innanzi ad una candela, e mentre ella trovasi nel foco di una perfettissima lence, procurerai, che venga compressa la parte posteriore della proboscide; questa verrà a spingere una gocciola di liquore nella porzione anteriore, la quale scadrà via via, e grado per grado facendosi strada fino al bottoncino, o fiocco descritto della estremità d'essa tromba. Per tutte le parti, per le quali passa questa gocciola, la tromba, o proboscide medesima sarà veduta gonfiarsi, e tondeggiare, o divenire più rotonda nella sua figura. Il gonfia-

mento della superficie anteriore, o superiore, che è un corno, o dir la vogliamo una compiuta cartilagine, non sarà così facilmente veduta, ma la membrana, che scorre, e portasi lungo la parte inferiore, o di sotto, e che viene a formare una specie di bianca costola, o striscia nel centro, sarà veduta stendersi, ed allungarsi, e divenire grandemente più larga, e più dilatata di quello per innanzi ella si fosse; e per questo solo mezzo la cavità della proboscide verrà ad esser fatta molto maggiore e più ampia, che altrimenti, eziandio tuttochè la parte cornea, o cartilaginosa nemmeno per ombra venga a gonfiarsi. La parte posteriore della proboscide è molto più fissa, e fatticcia, e comparisce assai più forte, e gagliarda dell'altra. Il valentissimo Monsieur Reaumur ci ha somministrato eccellentissime figure non meno, che egregie ampie descrizioni delle varie parti di questo curiosissimo organo, all'opera del qual Valentuomo noi rimettiamo di buona voglia i nostri Leggitori. Veggasi Reaumur Istoria degl'Insetti, v. 9. pag. 398.

Oltre la descritta tromba, o fiore, o proboscide, ha l'ape una bocca sommarmente dilatata, ed ampia. Questa però ella si è assai volte fiata per fissato modo coperta colle altre parti, che non è cosa agevole il perfettamente scorgerla, e rilevarla. Allorchè la proboscide trovasi estesa per tutto il tratto di sua lunghezza, la bocca dee essere rintracciata, immediatamente sotto i denti, o maciulle, ed in questo caso ella trovasi bene spesso tanto perfettamente coperta colla lingua, che se questa non vengane dilungata non è possibile in conto veruno lo scorgere. Questa bocca con questa ampia, e visibile specie di lingua non dee esser supposta soltanto particolare all'ape; avvegnachè abbianla altri parecchi insetti; e tutte le vespe, e pecchie della specie più grossa, possiedono a capello e perfettamente la stessa. Quanto alle loro parecchie parti, sono sì moltiplicemente maggiori di quelle delle api, e perciò farà sempre meglio il farsi ad esaminare la bocca, e la lingua in queste vespe più grosse, che nell'ape medesima. La lingua presenta varie, e parecchie apparenze in tempi differenti; avvegnachè ella
fissi

fiati talora della forma della lingua degli altri animali, ed in altri tempi ella comparisce più sottile, e più stretta: alcuna fiata la sua punta è semplice, ed alcun'altra ella è divisa in tre parti, o triforcata, le quali tre parti, o punte in alcune occisioni, vengono ad esser disposte non altramente che un giglio.

La bocca, quantunque sia all'ape una parte di momento, ed importanza somma; nulladimeno ella vien pressochè non curata, o per lo meno superficialissimamente considerata dagli Autori in generale; ma l'uso della medesima si è evidentissimamente il dar passaggio a certe date sostanze nel corpo dell'amabilissimo animaluccio. Così se un'ape la quale abbia raccolto il miele, sia presa, e tenuta sospesa infra le dita, ed alcun poco spremuta, il miele verrà ad essere sforzato a venir fuori in goccioline dall'estremità della proboscide, e queste goccioline verranno a cadere, ed essere ricevute entro la cavità od apertura della bocca.

Allorchè un'ape entra in un fiore, che abbia i sughi nettarej sopraddecritti, o dir le vogliamo più acconciamente glandule mellifue, o velicchette nella base dei petali, ella incontrasi generalmente con alcuna porzione di questo sugo, il quale è stato mandato fuori da queste stesse glandule, e trovasi diacer quivi in forma di una materia zuccherina nel fondo del fiore. I sughi dei vegetabili sono zuccherini, e di sostanza di miele in altre parti oltre i fiori, ed ivi trovansi in certe stagioni, e tempi dell'anno, in cui noi troviamo le foglie dell'acero, e d'alcuni altri alberi eziandio coperte tutte al di sopra di questo sugo, trasudato, e travasato dalle loro foglie, e stantesi sopra la superficie di quelle in una forma, che ha una somiglianza grandissima, ed analogia col miele, che rende all'occhio lustre, e sommamente attaccicce, se vengano toccate, e maneggiate, e dolci, non altramente che il miele fiato o la manna, assaporandole. Questa faccenda sopra le foglie avviene soltanto in alcuni dati tempi dell'anno; ma questo caso medesimo accade e si sperimenta sempre, e costantemente, ed in tutti i tempi nei fiori delle piante. Noi possiamo sempremai assapo-

rare il miele nel fondo, o centro d'effi fiori, e questi sughi nettarej scaricantisi continuo dai loro parecchi vasi, sicchè altra briga non ha l'ape, per trovargli, e prendercigli, che d'insinuare la sua proboscide colà entro nel diviso fondo del fiore. Se avvenga, che l'amabilissimo insetto venga osservato, mentre si sta facendo questo lavoro, e scellerà altri maravigliato in veggendo con quanta vivacità e svelterza lo si cinguisca. La tromba, o proboscide, che è il solo istrumento, che ricevea questo sugo, vien da essa cacciata, e spinta colà entro in mille differenti movimenti, e vi si accorcia, e vi si allunga, e stendesi, si ritira, e discendesi, e si ripiega in infinite fogge, e direzioni, e ciò per arrivarlo, e nettarlo dalle varie parecchie parti del fondo del fiore, e per sì fatto modo viene a rimondare, e raccogliere tutta fino all'ultimo atomo la materia ivi depositata.

L'opinione generale di quegli Autori, che hanno scritto intorno agli insetti, è stata, che la tromba, o proboscide dell'ape sia appunto una specie di tromba, o sifone, che i sughi nettarej, e mellei dei fiori vengano ad essere ricevuti in essa per via di succiamento. Questo parrebbe che non abbisognasse di così varj e tanti movimenti per esser dall'ape effettuato, conciossiachè se la proboscide dell'ape operasse non altramente che un sifone, od una tromba, altro non farebbe all'ape medesima necessario, che per la sua proboscide nel liquore, e l'azione sua comune farebbe di necessità il succhiare, e tirar su tutto il sugo, senz'altra briga, fatica, e movimento vario. Ma il valentissimo Monsieur Reaumur a forza di più siate ripetute esperienze, ha evidentemente provato, come quella parte dell'ape non è una tromba, o sifone, ma semplicemente, e meramente una lingua, acconciissima soltanto a bravamente leccare, piantata nell'estremità di un più acconcio, ed adeguato trasporto, per cui la materia leccata, o lambita, vien precipitata, e gittata entro il corpo dell'animaluccio. Se il lato interno di un tubo di cristallo, o di vetro, del diametro a un di presso di un dito, e mezzo, venga inzavardato in certi luoghi di miele, essendo in alcu-

alcuni luoghi il miele lasciato in goccioline, ed in altri luoghi disteso sottilissimamente sopra la superficie, le api verranno vedute effettuare le loro varie azioni nel prenderlo.

Se questo tubo venga in qualsivoglia situazione piantato in vicinanza di quei dati luoghi, ove frequentano le api, vedranno incontanente intanarsi dentro due, o tre di esse, ed allora la bocca, od imboccatura del tubo si può ferrare per ritenervele ivi entro racchiuse. Ben tosto quelle dimenticheranno d'essere imprigionate, e faranno a divorare qua, e là il miele, e nel loro ciò eseguire, agevolissimamente, e con tutta la maggior distinzione per le fiancate esteriori del tubo scorderanno i varj loro movimenti. In quei dati luoghi, ne quali il miele trovasi sparso, e sottilmente disteso sopra la superficie, elle andranno volgendo per ogni e qualunque verso l'estremità della proboscide intorno intorno, ed applicheranno in varie direzioni al cristallo innalzato, appunto come farebbero un cane, il quale leccasse alcuna cosa rimasta attaccata ai lati di un piatto: ed in quei luoghi, ove il miele trovasi in goccioline, l'ape altro non fa, che internar nella gocciola stessa la sua proboscide. Ma allora ella non ritienla colà entro ferma quietamente, appunto come si farebbe, se la proboscide lavorasse non altramente che un sifone o tromba, succhiando, e tirando su la materia; ma tratto tratto la cava fuori, e quando tienvela dentro, le dà varj sfioramenti da lato a lato della gocciola medesima del miele, ed i movimenti, che l'ape fa, corrispondono a capello a quelli della testa, e della lingua di un cane, e non già ad alcuna di quelle operazioni, o movimenti, che fanno in succhiando. Tutta l'intenzione dell'ape sembra, che sia il cuoprare, ed innalzare la sua lingua per ogni, e qualunque verso col liquore, e poi che ha ciò a suo talento ottenuto, il tirarla, ed infoderarla entro la sua guaina da noi sopra descritta, la qual guaina forma appunto il rimanente della proboscide. La materia, che ha raccolta, vienvi ad innestarsi, ed esser nettata dalla guaina medesima; ed allora a forza di ripetuti

allungamenti, ed accorciamenti, o contrazioni della medesima proboscide, vien la materia condotta, e trasportata alla testa, e quindi gittata entro il corpo. La diligentissima, e sommamente accurata arte dell'ape nel porre entro il suo corpicciolo unicamente quelle tali sostanze, le quali sieno le più acconce, e più appropriate alla sua impresa, venne con ogni ciattezza, e finezza maggiore scoperta accidentalmente per mezzo di un'Esperienza fatta da Monsieur Reaumur con tutt'altro fine, ed intenzione di quel valentuomo. Bramava egli di vedere il passaggio sopraditato, per cui l'Ape conduceva i luoghi nettare, o mellei entro il suo corpo. Con siffatta intenzione melsolo il valentuomo alcuna finissima polvere azzurra con una data porzioncella di miele, e collocò la misura innanzi all'ape, promettendosi, che il liquore colorito gli avrebbe fatto rilevare la strada per cui questo liquore passava nel corpicciolo dell'insetto; ma per lo contrario egli ebbe a toccar con mano con sua sorpresa, come questa picciola ereaurina era valentissima a separare, e disgiungere una estremamente minuta polvere, come era quella, dal miele medesimo, di modo che ella giugneste bravamente a mangiarsi tutto il miele puro, e separato, e lasciasse intatta addietro la polvere fino ad un menomo atomo. Veggasi Reaumur, *Illoria degli insetti*, Volume 9. pag. 403.

Egli è certissimo, che il miele, o sugo mello, viene ad essere ricevuto entro il corpicciolo dell'ape per via di questa specie di leccamento, e non già per mezzo di un metodo di succhiamento, conciossiachè l'apertura, che trovasi nell'estremità della proboscide, se ella si fa realmente una sola, la qual cosa è grandemente da rievocarsi in dubbio, ella si è picciola, e minuta a segno, che il liquore non potrebb'esser vi, se non sensibilissimamente, ed a stento grandissimo innestato, e ricevuto, dove per lo contrario si è certo, ed indubitato, che una gocciola di miele, quantunque assai considerabilmente grossa, possa sopra una lastra di cristallo, od altramente, viene divorata, e tolta in dall'ape presto che in un batter d'occhio. Quello fatto viene a com-
prca-

prenderli egregiamente bene, qualora ci facciamo a supporre, che l'ape lambisca, e lecchi il miele in quella guisa, che poc'anzi abbiamo additata.

E' stato da parecchi autori supposto, essere il miele il solo cibo, onde pascanli le api, che lo raccolgono; ma è più che evidente, questa supposizione esser falsa, ed erronea. Il cibo comune dell'ape si è la farina de' fiori di differenti specie, la quale, poichè ha servito di nutrimento ai loro piccoli corpicciuoli vien di bel nuovo per le loro bocche da esse spinta fuori in gran parte in forma di cera. Con questa cera medesima gli amabili insettucci formano i loro fori od alveari, composti di varie cellette, entro le quali allevano i loro figliolini, ed entro alle quali ripongono il miele, che dee servir loro in quelle stagioni, nelle quali vien loro vietato il portarsi vagando per procurarsi altro cibo. Vi sono parecchie stagioni di specie somiglianti in cui esse non possono andar fuori a zonzo; ed in alcune delle quali non vi ha cibo acconciato per esse, se lo potessero. In questi dati tempi a loro contrari rimangono le bestioline entro le case loro, ed allora si cibano di quel miele, del quale avevano fatto per riserbo la provvisione; ed in evento, che questo non sia tanto, che possa bastare, trovansi ridotte in estrema carestia, e talvolta, il che non di rado realmente avviene, ne periscono di pura fame gli interi feami. Veggasi *Reaumur*, *Historia degli insetti*, Vol. 10. pag. 85.

L'ape non infacca il miele dentro il suo corpicciuolo per mezzo della sua proboscide, siccome parecchi Autori sonosi fatti a supporre, nel primo raccogliere, che ella fa il medesimo dal fondo dei fiori. Questa proboscide ad altro ufficio non serve all'ape, salvochè di raccogliere il dolce sugo in piccole goccioline dai nettarei ascondigli, o glandule dei fiori. Alorchè quell'organo è ben ben carico di questo sugo, o sia del miele, ella lo depone sopra la sua lingua, la quale ella cava allora fuori per tale effetto; e quando quell' secondo organo lo ha ricevuto, incontanente ritira in dentro la lingua nella sua bocca, e così il miele viene ad essere avvallato entro l'efosago della bestiolina.

E' l'efosago dell'ape un canale lungo, sottile, e diletine che passa per eniro il torace dalla bocca dell'amabile insetto. Verso il suo termine in questa parte, viene ad essere allungato in una specie di sacchetto, o borsetta, la quale forma il primo stomaco dell'ape.

I fanciulletti della campagna conoscono, e fanno molto bene, ove stanza questo ricettacolo del miele, e bene spesso fanno ad uccidere una quantità grandissima di pecchie, e mangiansi il miele, che cavano da questo descritto sacchetto, succhiandoselo. Ma tuttochè questi ragazzetti abbiano perfettissima conoscenza di questa parte dell'ape, nulladimeno, malgrado ciò, uomini di sommo conto, e sapere sonosi ingannati a partito, ed hanno preso una cosa per un'altra rispetto al suo uso. Il Miraldi lo prese questo sacchetto per una borsetta racchiusa nell'estremità inferiore, e soltanto destinata a ricevere, ed infaccare il miele, e ad aprirsi, e spaccarsi di nuovo alle occasioni; ma lo Svammerdamio per mezzo di anatomizzare con diligenza, ed accuratezza maggiore quell'insettuccio, ebbe a toccar con mano, come era uno stomaco reale, il quale andava ad aprirsi, e metter fece in altro, o sia secondo ventricolo.

Il primo stomaco, allorchè è vuoto, è nulla più di un bianco filamento, il quale essendo concavo, è valevole a ricevere il miele; e quando lo ha infaccato, ella va gonfiandosi, e dilatandosi, a proporzione della quantità, che ella va ricevendo, e che ella contiene, e viene strettissima nella sua parte più bassa, od inferiore, in quella parte cioè ove ella congiungesi coll'altro stomaco, o sia secondo ventricolo. E' questo una specie di vescica bianchissima, ma trasparente, e trovasi comunemente assai fimo difesa, e dilatata, e per sì fatto modo vestita, e coperta di ampi, e grossi muscoli circolari, che presa, e considerata tutta insieme assomigliasi ad un roba avente parecchi circoli, o cerchi, vale a dire ad un tubo cerchiato. Questo stomaco fassi, e diviene di bel nuovo sottilissimo, somamente diletine, ed angusto nella sua estremità inferiore, ove va a congiungersi con

gli intestini . Il secondo stomaco, e gl'intestini dell'ape sono affatissimo fiate trovati pieni zeppi di copia abbondevolissima di cera grezza; ma per lo contrario il primo stomaco altro non contiene, che solo miele . Veggasi *Reaumur*, *Istoria degli insetti*, Volume 10. pag. 89.

La quantità del miele, che ciaschedun fiore è valevole a somministrare all'ape, non è che sommamente picciola: e perciò innanzi, che venga fatto all'ammalabilissimo insetto di empersi la cavità del suo primo stomaco di questo dolce sugo, gli è giuoco forza il portarsi a ricercare numero grandissimo di fiori; ma tosto che ella abbia ciò ottenuto, la creaturina volassene incontante al suo alveare, e quivi scarica il da sé raccolto tesoro in luogo di sicurezza, ove ella possaene servir per cibo in alcuno altro tempo, allorché appunto ella ha meno agio ed opportunità di portarsi per le campagne a proacciarcelo. Aristotile, ed alcuni altri fra' buoni Antichi, osservarono, come l'ape nel raccogliere una porzione di miele ricorresse soltanto ad una data specie particolare di fiore . Così se nella prima mossa d'el suo predare siasi fatta dal lambire il miele da una viola mammola, pel rimanente della sua carica, non fermerassi che sopra le sole mammolette . Ma con buona pace di quei vecchioni, tanto benemeriti però, quanto ogni spassionato sapiente sa, e confessa, questo è un majuscolo errore; conciossiachè non abbiavi cosa più comune del vedere un'ape sopra un letto di fiori in un giardino procurarsi quella copia di miele, che le abbisogna, da ogni e qualunque fiore di specie diversa .

Lo Svammerdamio, il quale non aveva idea, che le api fossero provvedute di una bocca, scelsi a supporre, che queste bestioline scaricassero il miele entro le cellette dell'alveare dal picciolissimo orifizio, ch'ei ravvisò nell'estremità della loro proboscide: ma le ciò disse, era giuoco forza, che una siffatta operazione fosse delle più lente, e tediose del mondo, avvegnachè non è già il miele scaricato dall'ape nel suo alveare in quello stato medesimo, in cui ella lo ha ricevuto nel suo stomaco, ma è molto più siso, co-

me quello, che è passato in una specie di concozione . La verità si è, che il miele viene ad essere scaricato emanando fuori dall'ape per quella parte medesima, per la quale ella lo ha preso, e raccolto, ed introdotto nel suo corpicciuolo, e questa parte si è la bocca, la quale per tale effetto è tanto larga, e grande, che basta . La maniera, colla quale le api fanno a riempire i loro favi, è sommamente regolare: fanno esse sempre, e costantemente a riempire le cellette più dilongate della parte superiore, o più alta dell'alveare, e quando queste son piene, vanno via via per ordine empando quelle, che prossimamente seguono fino all'ultime, o le più basse cellette .

Il primo stomaco dell'ape ha tutti i movimenti necessari di contrazione, e d'allungamento per gittar fuori ciò che in esso contienfi . Questo con ogni maggiore evidenza vien veduto nell'anatomizzare un'ape, il cui stomaco trovisi pieno di miele; ed è cosa agevolissima il concepire, che la conseguenza delle contrazioni di necessità sia il forzare il miele a venir fuori, *Idem, ibid.*

Il metodo di scaricarsi dell'ape nelle comuni cellette non può essere veduto a motivo appunto della opacità dei lati di quelle; ma negli alveari di cristallo hannovi delle cellette, nelle quali con somma facilità può esser veduta tutta l'operazione . Ella non è cosa rara l'averle le estreme cellette d'un favo, che arrivino a toccare il cristallo medesimo, e parecchia d'esse in questo caso, che si congiungono al cristallo, hanno soltanto quattro lati, o fiancate di cera, ed il cristallo fa le veci degli altri due lati, o fiancate delle cellette medesime . In queste particolari cellette adunque ella è cosa d'un piacere estremo quella di osservare tutta l'intera operazione e lavoro dell'ape . L'ape adunque, che viene alla cella caria, caccia la sua testolina nel più profondo della cellette, e scarica fuori dalla bocca tutto il miele dal suo stomaco in un brevissimo tratto di tempo, ed apparentemente con picciolissima briga, o fatica . Ma siccome la quantità del miele raccolto da una sola ape è picciolissima in proporzione alla grandezza della cellette, questa cellette medesima non può rimaner
pic-

piena, se non se dopo un numero grande di ripetute operazioni della specie medesima. Siccome questa faccenda esser non può condotta a termine, ed effettuata dall'ape medesima in alcun tempo comodo; e siccome per altra parte la fatica, e l'opera di queste amabilissime bestioline è fatta e condotta a termine fra esse in comune, così appena la prima ape ha fatto il suo ufficio, che vienlese a far lo stesso suo ufficio una seconda, dopo di questa una terza, e così vanno seguitando, e l'una all'altra succedendosi in questo lavoro, fino a tanto che la celletta è totalmente piena. Nel procedimento di fomigliante lavoro ella si è così agevolissima l'osservare, che ciò che apparisce essere l'ultima quantità del miele scaricato, e vomitato entro la celletta, è sempre e costantemente di un'apparenza, e mostra differenze dal restante. Tutta la quantità prima è d'un colore, e d'una consistenza medesima, e quello è di una natura di crema, ch'è sempre più sfofo, e faticcio del rimanente del miele, e sembra d'una somma utilità nell'economia dell'opera, avvegnachè serva a un tempo medesimo a conservare e difendere il miele umido e molle, ed insieme ad impedire, che per alcun accidente venga a versarsi, e scorrer fuori della celletta. Veggasi *Reaumur*, *Istoria degli Insetti*, vol. 10. p. 89.

Quantunque fissata specie di crema, che assai acconciamente addimandar possiamo crosta, comparisce esser la quantità del miele ultimamente vuotata dalle api, nulladimeno la faccenda non è realmente tale, avvegnachè sembri piuttosto esser quella quantità, ch'è stata raccolta dalla prima pecchia, e cadauna quantità o porzione di miele recente e fresco, che via via vien dalle api condotto alla cella, vien da esse aggiunto sotto, e non già sopra alla sua superficie. Rispetto a questo lavoro egli è sempre osservato, che l'ape, la quale viene alla cella colla sua carica di miele, non scarica tutt' in una volta il suo miele entro la medesima, ma intinandosi entro la cella più al di sotto della medesima, ch'ella può mai, ella spigne innanzi il suo paio anteriore di zampettine, e con esse fatti un' acconciissimo foro per entro la divisa crema, od incrostatura. Mentre quello foro vien mantenuto aper-

Suppl. Tomo III.

to dai piedi, l'ape vomita il miele in grosse gocciolate dalla sua bocca; queste cadendo entro il foro fatto dalle zampe di lei, va mescolandosi colla massa sottoposta; e l'ape innanzi che se ne voli via riunisce o modella una nuova crosta, e chiude bravamente il foro, che prima fatto aveva; e quello medesimo graziosissimo, e sommaramente giudizioso lavoro vien regolarmente fatto da cadauna di quelle api, che ha parte, e che contribuisce nella provvisione di quella tal data celletta.

Ciaschedun'ape, la quale tornasi all'alveare carica di miele, non vassene però a depositarlo ad una cella, ma assai tovemente si ferma, e se ne libera scaricandolo entro l'alveare in alcuna data parte del medesimo; la fatica del favo od alveare venendo da esse condotta a termine in comune, l'ape ch'è stata fuori qua e là vagando in cerca del miele, in vece di portarsi a dirittura ad alcuna delle rispettive cellette, bene spesso si porta a quei dati luoghi dell'alveare, ove le altre stanno attualmente lavorando nella fabbrica dei favi, od intorno ad altro lavoro, e servizio necessario, quivi ella fausti innanzi, e fa vedere il suo capolino, e forzando il miele alla sua bocca, chiama quelle api, affinchè portinsi intorno alla sua bocca medesima a prenderlo, affinchè esse non vengano obbligate a lasciare il lavoro per la gran fame. Esse pertanto cibansi della provvisione portata all'alveare da quell'ape coll'introdurre la loro proboscide entro la bocca di quella, in quella stessa stessissima guisa, che la introducono nel fondo dei fiori, allorchè da esse il miele medesimo raccolgono; ed assai frequentemente l'ape carica in questa maniera medesima ciba tutte quelle api raminghe, che ella incontra in suo viaggio, che per la fame eransi dilungate dal lavoro del suo ultimo impiego.

Le varie parecchie cellette del fiale, o favo in cadauno alveare trovansi in guisa differente ripiene di miele, e per differenti effetti ed imprese: alcuna d'esse è lavorata, preparata, e provveduta di miele per esser consumato immediatamente, alla prima occasione cioè di rea e sinistra stagione, o per fomiglianti accidenti: ed alcune d'esse vengono conservate, aggiustate, e

Ccc con-

conservate con assai maggior diligenza pel sostegno degli sciami nell'Invernata.

Egli avviene soventi volte, che nella stagione del miele, dannosi delle giornate sommamente piovose, tempestose, ed eziandio fredde, nelle quali non hanno le api agio di portarsi per la campagna in cerca del cibo: in occasioni similgianti tutto lo sciamo delle api cibasi del miele stanziante entro le cellette particolari, che da esse sono destinate per un uso immediato; ed eziandio nella buona stagione, quelle api, che trattengono a casa, che occupansi nei necessari lavori, e che non vengono provvedute del necessario cibo da quelle api, che sono state fuori vagando alla cerca, si portano a cibarsi in queste medesime cellette di uso immediato.

Le cellette del miele destinato per siffatto necessario uso, vengono a distinguere con ogni maggiore agevolezza da quelle, che debbon servire per magazzini di provvisione, allorchè sia in capo, e terminata la stagione del raccogliere il miele, ed allorchè fa di mestieri, che tutto lo sciamo delle Api sussista necessariamente delle prede fatte già nelle lor prime scorrerie. Quelle cellette, cui esse intendono, che debban servire per uso immediato, son sempre, e costantemente nella lor vetta, o sommità aperte; dove per lo contrario quelle, che son destinate per la provvisione dell' invernata sono tutte coperte, difese, e ferrate, e sopra, e sotto con un forte, fillo, e gagliardo labbro, e possonsi acconciissimamente assomigliare ad altrettante cassette di confettura cristallizzate, ermeticamente sigillate, conciossiachè la ferratura sia della materia medesima della sostanza del vaso. Veggesi *Reaumur*, Istoria degli insetti, Vol. 10. pag. 94.

In una stagione rea, e contraria alla raccolta del miele da' fiori, i favi, o fiavi di un'alveare trovansi copiosamente provveduti, e pieni nelle cellette occasionali, molte delle quali vengono ad esser vuotate dalle Api; ma nelle stagioni doviziose, allorchè vi è stata provvisione grande di cibo, da trovarsi per la campagna, è cosa comunissima il trovare tutti i fiavi composti di cellette piene sigillate, e ben

chiuse nella lor vetta per le provvisioni dell' invernata.

La maniera, colla quale le api fanno i labbri, o dirle vogliamo difese, e copertoj delle loro graziosissime cellette, si è la seguente:

Formano esse alla bella prima un circolo, od anello di cera, appunto dentro l'area della cella: a questo cerchio ne vanno aggiungendo un' altro similgiante, e formano un terzo dentro a questo secondo. Per similgiante mezzo l'apertura vien renduta sempre più picciola via via, e per via di una continuazione della medesima manifattura, la cella viene a rimanere alla perfine serrata, essendo terminato il coperchio e venendo ad essere per similgiante guisa composta la celletta di un vasto numero di circoli concentrici.

L'uso di questo coperchio non è già per tener a coperto il miele dallo scorrer fuori della celletta, avvegnachè la sua propria spessezza, e grossezza, e per la sua adesione alle fiancate della cella, insieme colla crema, od incrostatura, colla quale è coperto nella sommità, verrebbe ciò ad essere, più che a sufficienza impedito; ma viene ad essere per sì fatto modo prelevato, e tenuto a coperto da una schiera di oziose, trasandate, e ghiotte api, quali mangiano assai più di quelle, che lavorano, ma sono a segno infugarde, che non vagliono a sorvegliare la coperta, e così ad asferrare, ed a pascersi sopra ciò, che è contenuto entro le celle divilate.

Egli ha similgiantemente un' altro uso, e questo si è il conservare, e mantenere il miele racchiuso nella sua propria, ed adeguata consistenza; conciossiachè se questo fosse lasciato aperto, verrebbe a perdere la sua naturale spessezza; ed è stato assai volte osservato, che le Api non si cibavano del loro miele, allorchè trovissi per tal rapporto di un menomo che alterato.

Il prodotto delle fatiche, ed operazioni dell'Ape non meno nel miele, che nella cera, è di un servizio inellicabile al Mondo tutto, generalmente parlando, ed in quei luoghi, ove le api riescono nei loro lavori a dovere di un vanaggio massimo ai proprietari. Il valore del miele

è, a

è, a vero dire, molto minore ai di nostri di quello si fosse nelle più rineulate età; allorchè il Mondo non conosceva il Zucchero; ma quantunque l'uso di questo ottimo prodotto abbia grandemente diminuita la necessità del miele, tuttavia l'altro articolo, vale a dire, la cera, è sempre più andato in su in questo tratto di tempo, ed è eccedentemente cresciuto in valore; e siccome ella è stata sperimentata di uso in moltissime occasioni, in quel tempo che non era conosciuta, e siccome non vi è stata rinvenuta altra sostanza, che supplir potesse in suo luogo, così ella è divenuta molto più valutabile di quello ella si fosse per innanzi.

Ella si è cosa evidentissima, come tutto il prodotto delle satiehe di questi industriosissimi insetti, sì la cera, che il miele, altro non sono, che materia raccolta dai fiori delle piante; e siccome egli è di pari chiaro ed evidente, che hannovi diecimila fiori, che muojonsi intatti nei campi, e nelle boschaglie, per non, che venga su in vicinanza di quei dati luoghi ove conservansi le api, e che potrebbero unicamente usare con comodo grandissimo per siffatto effetto; così ella si è una verità innegabile, che vi sono centinaia di migliaia di libbre di queste sostanze lasciate andar male, di più di quelle, che vengansi a lavorare, ed a portare ai mercati. E' questo un Articolo a sezzo considerabile per rapporto alle ricchezze di un Regno, che il prode, e giuditiosissimo Monsieur Reaumur lo credette meritevole di esser vivamente, e con tutta la maggiore intenzione raccomandato alla Corte di Francia, per incoraggiar la gente ad alzare, e piantare, e moltiplicare in ogni, ed in qualunque luogo degli sciami di Api, avvegnachè per siffatto modo si farebbero ottenute infinitamente più abbondevoli comodità simiglianti in esso Regno, di quello trovivansi di presente. Ed, a vero dire, siccome le Api fanno una specie di coltivazione, la quale con agevolezza così grande si mette in piedi, e si stabilisce, e che conservasi e mantienlisi con sì poco disturbo, e con presso che niuna spesa, ella si è veramente una maraviglia, che elle non vengano più ampiamente, e con maggior fre-

quenza presso di noi coltivate, e propagate, ed eziandio presso la tellè mentovata numerosissima nazione.

Il metodo proposto dal valentissimo Monsieur Reaumur, di incoraggiare questo ramo di coltivazione, è veramente uno dei migliori, che rinvenire si possono; e nominatamente quel vantaggio non è per un Principe disprezzabile, che alcuna cosa potrebbe esser ricavata dalle tasse, che pagare si farebbono ad ogni, e qualunque Factor campagnolo, od affittuale, il quale avesse una copia di alveari, che trascendesse un tal dato, ed assegnato numero, e così regolare con adeguata proporzione simiglianti imposizioni.

Il massimo articolo da esser tentato per aumentare, e dilatare viemaggiormente questi amabilissimi insettucci, dovrebbe essere il procurare di far sì, che non venissero ad essere ingiuriati, ed uccisi da noi stessi, e di impedire la loro mortalità in certi dati tempi, nei quali naturalmente ne periscono per se stesse in numero presso che infinito. Queste stagioni della mortalità delle api sono l'Autunno, e l'Inverno. Uno dei gran mezzi di conservare, e di moltiplicare le api, sarebbe l'abolire quella barbara e di pari pregiudicevolissima costumanza, che trovasi presso parecchie nazioni di rovinare, e distruggere tutto l'alveare delle api col fine di cavarne fuori il miele.

Il metodo comune nella Francia, ed in Inghilterra si è questo: Quando il Fattore, od Affittuale trova dal pelo, che un'alveare pieno di fiali di miele, zappata una soffetta in terra, che sia capace di ricevere la base dell'alveare. Quindi collocando entro questa soffetta non adeguata porzione di ceneci di tela di lino inzuppati nello zolfo liquefatto, gli dà fuoco, ed immediatamente collocando sopra essi ceneci l'alveare cuopre al di sopra tutti i lati con della terra, affinchè non ne possa sfolare il fumo, nè alcuna ape fuggirsi: in siffatta barbara guisa le Api tutte, fino ad una, rimangono soffocate. Altri in vece dello zolfo servono per tal faccenda delle pietre combustibili, ed altri di altre cose: e costoro si fanno a credere, che in Inghilterra non meno, in qualsivoglia altra Regione fredda, non

abbavi se non se questo unico mezzo per ritrarre dalle Api un qualche vantaggio; e che soltanto nella Grecia, e nell'Iralia ed in altri fissati paesi, i quali sono ben provveduti di fiori per tutto l'intero giro dell'anno, possano quei popoli procurarsi del vantaggio in coltivando, ed in propagando un fissato prodotto, ed in lasciando vive le api.

Per giustificarsi di questo loro barbaro procedere, essi ci vanno dicendo, come per fissato loro metodo vengono a distruggere soltanto una sorte di Api vecchie, le quali trovansi oggimai incapaci, o di produrre più mele, o di ingenerare nuovi sciami di api, e che divorerebbono nell'Invernata la parte massima di ciò, che elle avessero messo insieme, e provveduto nel decoro dell'estate. Veggasi *Reaumur*, *Istoria degli insetti*, Vol. to. pag. 358.

Questa seconda, a dir vero, si è la ragione verace di loro procedere, e realmente costoro per l'avarizia di ricavare alcune poche libbre di più di cera, e di miele, fannosi a distruggere uno sciame di Api capace di raccogliere un'altra smigliante porzione, ed insieme di ingenerare, e produrre altre api, che rimpiazzino le altre, giunto che sia il punto, o periodo, in cui queste prime naturalmente periscono.

La distruzione che farebbero del loro prodotto queste creature riuscirebbe tuttavia infinitamente minore di quello di costoro, e di quello che alla bella prima ella comparisce essere; conciossiachè la cera non soffrirebbe nel decoro dell'invernata ombra menoma di diminuzione, e consisterebbe soltanto nel valore di pochissime libbre di miele tutta la perdita, che questa canaglia va deplorando, qualora lasciasse intatto e conservassero in essere uno sciame di api infinitamente più vantaggioso di quello che possa altri per avventura immaginarsi. Può, a vero dire, talvolta accadere, che uno sciame di api possa perire in capo a quattro, o cinque anni; ma ella si è cosa senza paragone più frequente, che duri a vivere, otto, ed anche dieci anni; e noi abbiamo eziandio degli esempj certissimi di sciami di api, che son giunti a vivere per fino i trenta anni. In

questo caso che vasta distruzione mai non è quella cagionata dall'uccidere, ed annientare quello sciame dell'età di quattro anni, il quale farebbe vissuto il lunghissimo tratto di ventei anni di più, e che ogni anno avesse mandato fuori, tre, ed anche quattro sciami novelli di api giovinette? Da questo sarà agevolmente veduto quanto grande verrebbe ad essere in pochissimi anni la propagazione, ed accrescimento delle api, messo a confronto di quello, che è, qualora fosse bandita fra noi questa sola barbara costumanza, la quale non solamente distrugge in questo caso tre volte ventisei, ma eziandio tutti quelli sciami, che nel corso comune delle cose farebbero da cadauno di questi stati prodotti, numero, a dir vero, infinitamente maggiore, di quello far si possa alla bella prima ad immaginare.

Se in cambio di distruggere, ed annientar le api ogni, e qualunque volta che noi prendiamo, e raccogliamo il loro miele, noi procurassimo un poco di conservar loro la vita, la faccenda non verrebbe sperimentata così difficultosa, e malagevole, come altri se la figura: avvegnachè non vorrebbe mica la fatica di Ercole per far passare uno sciame di Api da uno in altro alveare; ed in alcuni casi farebbero i veri mezzi di conservare un altro sciame delle api medesime. Hanovi parecchi sciami deboli, siccome comunemente addimandangli, i quali nel decoro dell'invernata muojonsi tutti, e periscono. La verace cagione della morte di questi sciami si è l'essere entro lo sciame così poche le api, e se in vece di distruggere tutte le api di un assai popolato alveare, parte ne venisse aggiunta ad uno di questi sciami deboli, questo in tal caso verrebbe non solo ad essere preservato, ed i loro lavori nella vengente estate verrebbero a riparare ampievolmente la picciola quantità di miele, che stata sarebbe necessaria pel cibo, e mantenimento loro nel decoro dell'invernata.

Il Montfort nel suo Trattato delle Api fa parola di una Legge fatta dal Gran Duca di Toscana, imponente non merzana pena a chicchessia, che fosse stato accusato di aver distrutto uno sciame di api:

apit e se una sì fava legge fornigliante si trovasse in vigore di par quì presso di noi, la conseguenza della medesima ne sarebbe, che noi verremmo incontanente ad avere una infinitamente più abbondevole copia di miele, e di cera prodotta anno per anno dall'accrefimento, e moltiplicazione delle api, le quali una miserabile, e vituperosissima avarizia sacrifica con danno grandissimo di tutto il Regno ad un meschinissimo guadagno di poche persone, cadaun'anno barbaramente distruggendole. Oltre il numero grandissimo di api, che vengono annualmente nella divisa guisa annichilate, e distrutte, havvene un numero grandissimo, che periscono cadauna invernata fra i mesi di Novembre, e di Aprile, di maniera tale che digrossissimi sciami, che entrano negli alveari sul principiar dell'inverno, pochissime sono quelle api, che vi sono rimaste nell'estate seguente.

Quelli Autori, i quali hanno scritto intorno alle Api, hanno parlato a lungo delle loro malattie non meno, che dei loro propri, ed accorci rimedj; ma il dotto, e valentissimo Monsieur Reaumur ha ristretto la faccenda a molto poco, ed asserma, come i distruggitori grandi delle api sono soli due, vale a dire, la fame, ed il freddo, e che qualunque si fosse il metodo, che altri si rinvenisse per tenere quelle amabilissime bestioline a coperto di questi due loro grandi nemici e fatali durante il corso dell'invernata, verrebbe sempre, e costantemente a trovar vive entro l'alveare nella Primavera tutte quelle api, che v'entrarono nell'Autunno. Veggasi Reaumur, istoria degli insetti, Vol. 10. pag. 357.

Somma però esser dee la delicatezza, e diligenza, che dee osservarsi nel maneggio di queste api, rispetto al preservarle: avvegnachè egli accada assai sovente, che appunto il volerle diligentissimamente difender dal freddo, divenga la verace cagione, ch'esse muojansi tutte di fame. Il sempre grande, ed avvedutissimo Autore della Natura ha per sì fatto modo provveduto per questi animalletti, che siccome in certe tali stagioni, cessano i campi di somministrar loro un'abbondevole provvi-

sione di cibo, così elle cessino di aver bisogno di una così abbondevole copia del medesimo. Lo stesso freddo, che rannicchia le piante, e le impedisce dal germogliare, ed al fiorire, rannicchia di pari, e fa intrizzire le api, e le colloca in uno stato, nel quale vengono a respirare pochissimo, e per conseguente vengono ad abbisognare di pochissimo nutrimento. Di fatto nei tempi più freddi dell'anno elleno traspirano così poco, che la loro vita non trovasi in pericolo ancorchè elle non prendessero cosa menoma, per riempiarze la loro perdita.

Se vengano esaminati gli alveari in tempo delle più rigide brine, e geli, la qual cosa può farsi senza il menomo pericolo, avvegnachè le api trovinsi così torpide, ed in uno stato così quieto, ed intrizzito, che l'Alveare può esser voltato fott' insù, e per ogni, e qualunque verso a talento, senza porre alcuna delle api in esso contenute, in moto; queste api faranno sempre, e costantemente trovate in mucchi ben considerabili in vicinanza del centro dell'alveare, fra i fiali. Allorchè la Terra sghiaicciassi, e che il Sole batte sopra l'alveare, quel tepore fa risvegliare le api dal loro letargo, elleno cominciano a muoversi intorno, ed a far' uso delle loro ale: ma siccome in esse di conserva col moto loro fanno sentire la necessità di prender cibo, e siccome in quei dati tempi le campagne non somministrano loro il cibo medesimo, così esse son forzate a ricorrere ai loro favi, e cibansi quivi del miele, e della cera delle loro cellette, cui esse avevano appunto per siffatte occasioni provveduta.

In queste date occasioni fanno sì le api sempre e costantemente dai favi più bassi dell'alveare, allorchè abbisognano del medesimo, e quindi gradatamente vanno avanzandosi ed inoltrandosi ai più alti. Sembrerebbe questa una sconvenevole maniera, siccome il miele de' fiali inferiori si fu quello, che esse ultimamente raccolsero; ma la verace ragione oode queste bestioline procurino, che questo ultimo sia il primo mangiato, si è, che questo si fu quel miele, che da esse venne raccolto nell'Autunno, e che vien sempre, e costantemente sperimentato meno proprio, ed

ed acconcio per conservarli, di quel tal dato miele, che da esse venne raccolto nella Primavera, e nei mesi estivi.

Sembrerebbe, che siccome il Verno si è la stagione, che uccide le api, più rigido, che il verno corra, con più facilità, ed in maggior numero, dovessero ucciderle. Ma vien toccato con mano, diversissimamente addivinare: conciossiachè per lo contrario le Invernate calde, e sciroccali quelle appunto sieno, che distruggano, e facciano strage di maggior numero d'api, come quelle che conservarle in uno stato da doversi cibare, e che non somministran loro alcun cibo, onde procurarsi da vivere di fuori. Vien sempre mai di pari trovato, che quelli sciami, che sono ridotti tardi all'alveare, vale a dire, quei tali sciami, che non hanno avuto, che picciol tempo di raccogliere e d'ammassare le loro provvisioni, durante il tempo, che elle sono state insieme, innanzi che il verno le frastornasse, sono grandemente soggette a perire, prima che torni la Primavera, in evento, che non sieno provvedute di miele, che ciò impedisca.

Adunque un certo dato grado di freddo rendesi necessario nell'Invernata per preservamento di queste creaturine; ma dall'altra parte un grado di freddo soverchio grande le uccide, e le distrugge. Pertanto le invernate moderate sono per elle le migliori di tutte le altre; avvegnachè nelle estremamente severe elleno muojonsi di freddo, e nelle Invernate estremamente miti, elleno muojonsi di fame. Egli si è certo però, che l'ape è meno valevole a far testa al freddo di qualsivoglia altro de' nostri insetti in uno stato scapollo, o solo; ma siccome queste creaturine sono conservate fra i fiali in grandi mucchi insieme, e sotto la coperta di un tepido alveare, il grado di freddo è molto più picciolo che disperamente fuori dell'alveare, ove cadauna ape stantesi da se sola inevitabilmente andrebbe a perire. Questo viene agevolissimamente conosciuto dalla familiarissima comparazione fra il dormire di un uomo sulla nuda terra per la campagna in una notte orrida, e severa, ed un dato numero d'uomini, che la notte medesima dormansi insieme sotto un terrato padiglione, piantato, ed

alzato nella medesima aperta campagna. Con tutta la probabilità la sola, e ramminga persona in questa freddissima notte esposta al cielo aperto morirebbe agghiacciata; mentre l'altre persone non ne risentirebbono ombra menoma di danno. Veggasi *Reaumur*, *istoria degli Insetti*, vol. 10. pag. 360.

Siccome il numero delle api produce, e cagiona nell'alveare un tepore, che le preserva tutte, l'osservazione del loro perire in tempo d'Inverno, allorchè trovinsi nell'alveare medesimo in poche, viene ad essere agevolissimamente appianata, e spiegata. Potrebbe peravventura sembrare strano, come un'isoleto, che toccandolo, è freddo, sia poi capace, e valevole a diffondere un tepore di questa specie: ma viene ad esser provato a forza d'esperienza, la saccenda andar appunto in simigliante guisa entro gli Alveari; e questo tepore viene osservato esser molto minore durante il tempo, che le api trovansi in quiete, di quello siasi allorchè asolano, e battono le loro ali intorno.

Varrone e Columella sono del numero di quegli antichi Autori della Coltivazione, i quali danno questo piano, ed agevole metodo di ravvivare le api allorchè sembrano morte dal freddo, il qual metodo di presente viene in parecchi luoghi praticato. Questo si è il porre delle ceneri calde intorno intorno all'alveare, o di spruzzarle leggermente sopra quei mucchi d'api, che sembrano giacerfi affatto morte nei fondi degli alveari.

Le Api mentre rimangonsi vive ed in buono stato, e condizione nelle fredde stagioni, vengono trovate in mucchi, i quali sono composti di numeri assai copiosi d'esse attaccate, ed avvicicchiate l'una l'altra per le loro zampoline. Allora quando il freddo diviene così intenso, che giunga ad impedire i loro movimenti ed a totalmente distrugger l'uso in esse delle loro membra line, le loro zampe perdono la presa, e così esse precipitan giù scomposte in numeri copiosissimi al fondo dell'alveare, ove compariscono effettivamente, ed assolutamente morte. In istato somigliante può altri prenderle in mano, senza il menomo timore, o pericolo d'esser punto, o danneggiato dal loro

qua-

pungiglione; e tuttavia in istato somigliante può esser loro restituita la vita con ispruzzar sopra effe delle ceneri calde. Questo però è un metodo veramente sozzo; e siccome il tepore è l'unica cosa, ond'elieno abbisognano, così può esser loro più comodamente, e più dicevolmente somministrato, col prender l'alveare, e collocarlo in una camera calda, e presso che in un batter d'occhio quivi vedranno le api riprender fiato, e risuscitare. Nelle stagioni di un freddo meno intenso, e se vero, basterà soltanto il prendere, e cavar fuori le api, che giacciono nel fondo dell'alveare, non altrimenti che fossero effettivamente morte, e riscaldarle sopra un piatto tenuto sospeso sopra il fuoco, fino a tanto che tornino insè, e che comincino a rampicare qua, e là, e muoversi, ed allora incontanente ricollocarle di nuovo entro l'alveare. Ma in evento, che la stagione continui ad essere severa ed eccedentemente fredda, fa onninamente di mestieri, che la bocca dell'alveare venga al di sopra chiusa, e che l'alveare medesimo venga collocato in un luogo bastantemente caldo, ove converrà lasciarlo fino a che la stagione venga in qualche modo a raddolcirsi, e correr meno severa. Questo riscaldare le api trovate senza moto nel decorso dell'Invernata nei fondi degli alveari, se venga fatto opportunamente, ed in tempo, non falla mai di ricovar loro la vita, ed il moto; ma se altri aspetterà a fare questa faccenda dopochè le api sienosi rimase in tale stato per parecchie giornate, radda sarà quella volta, che riesca a bene. Numero pressochè infinito di api si è quello, il quale può essere conservato dalla morte in tempo d'Inverno coll'andare investigando gli Alveari nella divisata maniera, e nel porre tutte quelle api, che troveranno nel fondo degli alveari medesimi, in vicinanza del fuoco per ricavarle, e quello è un metodo infinitamente migliore di levare gli alveari dai luoghi loro, e porgli a starli per tutto il tratto dell'Invernata in luoghi caldi: la qual cosa, tuttochè sia alcuna finta assolutamente necessaria, nulladimeno ella non dee essere effettuata, allorchè possa in alcun'altra guisa essere schivata, come-

chè ella sia sempre, e costantemente accompagnata da ree, e sinistre conseguenze, di maniera tale che il metodo migliore sembra essere nelle Invernate le più crude, e severe, il prendere soltanto quegli alveari, i quali non hanno che poche api in essi stanziati, e quelli porgli al coperto, e lasciar poi fuori quelli che sono bene, ed adeguatamente popolati, ove il numero grande delle creaturine farà sì, che l'una l'altra conservi, e mantenga, e quelle poche api, che verranno a cader giù dai mucchi descritti nel fondo dell'alveare, potranno esser ricovrate di tratto in tratto nella divisata maniera col riscaldarle. Veggasi *Reaumur*, Istoria degli Insetti, Vol. 20. pag. 382.

Siccome però sarebbe grandemente desiderabile, che venisse rinvenuto un metodo di preservare, e tenere a copertogli alveari tutti da malattie ed inconvenienti, e seguirare a lasciargli tuttavia in quei luoghi medesimi, ove star sogliono l'Estate, così Monsieur Reaumur cimentò, e sperimentò più, e più cose a tal proposito, e con tal fine. Il primo, ed assai familiar metodo, cui egli tentò, si fu quello di cuoprir gli alveari con dello strame, e questo col fine di conservarne fuori, per quanto possibil fosse, l'aria fredda. Cid egli eseguì per mezzo di piantar nel terreno de' pioli, o bastoncini alti da terra per ogni, e qualunque verso quelle sette in otto dita dalla base dell'Alveare, e così alti, che le loro punte sorpassassero il tratto d'altrrettante dita la vetta, o sommità dell'alveare medesimo, e cid fatto riempì sopra, e sotto di strame tutto lo spazio, che rimaneva vuoto fra l'alveare, e i piccioli pali. Fra i parecchi alveari, cui egli diedi a difendere nella divisata maniera, le api di molti d'essi furono trovate morte tutte fino ad una nella seguente Primavera; ma in esaminandogli alveari egli apparse, queste esser morte realmente di fame, non già di freddo; avvegnachè in questi dati alveari non fosse trovato atomo menomissimo di miele.

Parlano i buoni Antichi d'un metodo sommamente straordinario di conservar le api entro i loro alveari, e questo si era il riempere una parte assai considerabile del vuoto di cadauno alveare dei corpi di pic-

cio-

ciolissimi uccellini, che erano stati uccisi, sventrati, e fatti feccare per tale effetto: questo era certissimamente un metodo di mantener fuori degli alveari con ogni sicurezza parte dell'aria fredda; ma egli si è un metodo sì sciocco, e sì sconvencevole, che non vi avrà peravventura testa d'uomo, che dal tempo loro in qua siasi curato di sperimentarlo.

Un'altro metodo immaginato dal vellentissimo Monsieur Reaumur ebbe riuscita migliore; e questo fu di conservare gli Alveari, entro grossissimi tubi con della terra o con del fieno. Per questa impresa egli scelse alcuni alveari, i quali fossero più poveri, ch'ei potesse avere, e nel cominciare del verno pose ciascheduno di questi entro un tubo assai ampio, e capace, la sommità del quale venne per tale effetto tolta via: questi alveari però non vennero collocati immediatamente nel fondo del tubo, ma venne piantato nel fondo d'esso tubo un letto di terra, o di fieno della grossezza di quelle sei dita, e coperto appunto con quel coperchio, che era stato levato via dalla sommità del tubo medesimo. Quando questi alveari furono nella divisa guisa collocati, tutto lo spazio, che rimaneva fra le fiancate dell'alveare, e quelle del vaso, fu ricoperto, e ripieno di terra, o di fieno minutamente stritolato, e tanto il fieno, che la terra furono accomodati in guisa, che venissero a rimanere a livello colla vetta del tubo non solo, ma che venissero a fare come una cupoletta, o monticello sopra la verga.

Parecchi contadini hanno la costumanza di coprire ponendovi prima sopra certo loro arzigogolo di bacchette, i loro alveari con dei covoni di paglia di grano, o con fascelli d'altra generazione, nell'Invernata. Ma in questo caso le api muojonsi nel decorso del Verno, non altramente che facciansi allorchè i loro alveari son collocati in una camera, ove muojonsi o pel soverchio caldo, o per trovarsi in uno stato soverchiamente confinato, e ristretto. A fine d'impedire siffatto inconveniente il prode Autore immaginò, e trovò il ripiego di somministrar loro un mezzo di comunicazione coll'aria viva, ed aperta eziandio in quello stato, tutte le volte, che

fosse espediente il ciò fare. Pertanto affine di ottenere l'intento ei procurò, che fosse fatto un foro in una fiancata di cadaun tubo capace d'ammettere, e di ricevere entro di sé un tubo quadrato fatto, e composto di quattro fortissimi pezzi di tavoletta. Questo tubo era largo quelle due buone dita, ed alto a un di presso un mezzo dito; e veniva quivi entro a riuscire, e rimanere stanziato nel fondo fallo del tubo, nel quale dovea starsi accomodato l'alveare, in guisa, che venisse a raggiungere la bocca, od apertura dell'alveare medesimo, ed era d'una lunghezza siffatta, che veniva a soverchiare, od avanzare di quelle tre a quattro dita i lati del tubo medesimo. Essendo introdotto il tubo, e nel fondo fendovi collocata una padelletta piena di miele, con una carta tutta foracchiata, aggiustata per acconcio modo sopra la superficie del miele, di modo tale che le api potessero cibarsi del miele medesimo, senza che potessero inzavardarsi, intridersi, e lordarsi nel miele medesimo: Tutto questo apparato venne messo in assesto per ricevere l'alveare, il quale allora venne piantato, ed aggiustato sopra la padelletta di miele colla sua bocca corrispondente alla bocca, od imboccatura del tubo. Poichè fu collocato l'alveare nella maniera divisa, vennevi aggiustata sopra la terra, od il fieno nella sopradescritta foggia, ed il tubo per conseguente nel suo di sopra rimase tutto ripieno. Veggasi *Reaumur*, Istoria degl' Insetti, Vol. 10. pag. 384.

Le Api si rimasero quiete nelle descritte abitazioni tutto il tratto dei mesi di Novembre, di Dicembre, e di Gennaio; e nei mesi di febbrajo, e di Marzo fuoli grandissimi delle medesime furono vedute venir fuori dei vasi nei piccioli tubi, e ritornarsi al luogo medesimo cariche nella maniera a capello la medesima delle comuni Api nei mesi Estivi. Tuttotchè gli Alveari comparissero in questo tempo a maraviglia bene conservati; nulladimeno per una rigida, e severa stagione, che sopravvenne verso la fine di Marzo, e che continuò per tutto il tratto del mese d'Aprile, le api di due alveari non comparvero più fuori, e questi essendo esaminati, furonvi trovate dentro tutte

tutte morte fino ad una. Queste però erano morte di pura, e sola fame, avvegnachè non fuvi trovato nei vasi il menomissimo rimasuglio di miele. Gli altri alveari avevano alcuna porzione di miele nei loro fiali, allorchè appunto vennero collocati entro i tubi; e le api in questi stanziamenti erano mantenute con quello, e con dell'altro miele, che era stato posto nelle padelle, di modo che esse si vissero durante tutto il divisato tratto di tempo, e fecero un floridissimo sciamè per la vengente Estate.

Questo pertanto sembra un metodo ammirabile di preservare tutti gli alveari delle api nell'intero decorso dell'Invernata, e può condursi ad effetto con picciola brigata, e con una assai leggiera spesa. Sembra, che per la desertita coperta la tetra faccia riuscita migliore del fieno; ma fa onninamente di mestieri, che questa terra sia perfettissimamente arida, ed asciutta allorchè vienvi posta, e che colla diligenza medesima venga dopoi tenuta difesa, ed a coperto della pioggia, e ciò per mezzo d'un copertojo di stame piantato sopra il divisato tubo. Egli è vero, però, che il fieno non sembrò, che venisse sperimentato disettofo, come una coperta; imperciocchè quantunque fossero i due alveari coperti di terra quelli, che riusciron bene nella descritta Esperienza, nulladimeno, siccome gli altri due in una totale sicurezza, e stato prospero passata avevano tutta l'Invernata, e le api erano rimaste vittime della sola fame nel decorso della desertita rea stagione di Primavera, così non havvi luogo da dubitare, che farebbero riuscita egregiamente bene di pazzi, che gli altri due, se fosse stata data, e somministrata loro copia più abbondante di miele. Veggesi *Resumer*, loco citato.

Hannovi parecchie circostanze necessarie per formare del buon miele, quali appunto sono un'aria calda, e chiara, un perfetto stato di sanità nelle api, ed una data quantità di fiori aromatici, dolci, ed odorosi in vicinanza dei loro alveari. Il miele tratto fuori degli alveari nel principio dell'Estate è similmente preferibile senza paragone a quel miele, che vien raccolto dagli alveari medesimi

Supp. Tom. III.

nell'Autunno; avvegnachè la prima sia la stagione, nella quale le api trovansi nel più vegeto, e robusto loro vigore, e le piante di pari nello stato loro più florido e più rigoglioso.

Monsieur Lemery nella sua Analisi del miele falsi ad osservare, come due libbre di miele fino, e perfetto distillato a bagno maria somministra sei once di chiarissima, e limpidissima acqua totalmente insipida, e spirante odore di miele. Quest'acqua viene comunemente appellata la rugiada del miele. Una copia assai più abbondante di stemma può esser procurata per mezza di continuare la distillazione, ma quella vien su torbida, e sporca. Questo liquore tuttochè insipido, asaporandolo, contiene nulladimeno dentro di sé un'acido occulto, avvegnachè fa divenir rosso il girasole; ma con tutto questo non eccita fermentazione nè con gli alcali fissati, nè con gli alcali volatili. Sendo allora la cucurbita collocata sopra un calor di arena, alterannovisi sopra quattr'once di un'acqua pellucida giallognola, ed agra, asaporandola, spirante un potentissimo, e forrissimo odore di miele, ed avente alcun poco di odore empiematico. Questo liquore tigne il girasole di un color rosso più carico della prima acqua pur'ora additata. Venendo accresciuto di vantaggio il fuoco, veggionvisi alzare delle nuvole bianche, le quali ingombrano, e riempiono la testa della cucurbita, ed il recipiente; e queste vanno alla per fine a condensarsi in un terzo liquore, il quale viene appellato spirito di miele. Questo liquore sarà ad un di presso nella quantità di tre once, di un colore rosso, e di un odore empiematico, avente però nulladimeno un gustosissimo sapore, ma riuscendo al palato di una sensazione acre, ed abbruggiante. E' questo un'acido più potente, ed energico dell'uno, e dell'altro dei due primi, e fermenta bravamente se venga mescolato con un'alcali.

Venendo di bel nuovo accresciuto il fuoco viemaggiormente, alzansi più e più nuvole, e vien finalmente prodotta una quarta specie di liquore; questo è nella quantità a un di presso due once, di un colore atancino, e di un sapore acido,

D d d

ma

ma affai meco agro del terzo divifato li-
quore, come quello, che contiene mag-
gior copia di olio, che lo ammorbidefce,
e raddolcife. Fermenta quello, non al-
tramente che il terzo liquore, con gli
alcali, e tigne di rosso il girafolo. Quan-
do la diffillazione è nella defcritta manie-
ra tutta coodotta a termine, rimarranno-
vi nella cucurbita quindici once e mezzo
di uno fpumello carbone nero lutto leg-
geriffimo. Vegganfi Memoires Acad. Roy.
Scienc. Parif. ann. 1706.

Questo carbone effe dec allora collo-
cato in una ftorta per una recente diffil-
lazione; e fotto quello vafò facendo agi-
re un vivaciffimo, e gagliardiffimo fuo-
co, alzerannofi dal medefimo fette once
di un liquore rofficcio feuro, il quale mac-
chierà le dita di un color di arancia, spi-
rerà un'odore di abbruciato, ma mal-
grado ciò riterrà in sé non fo che di pia-
cevole, e riuferà, affaporandolo, di un
gufto acido, ed in eftremo agro punge-
nte. Oltre il divifato liquore alenderà nel-
la ftorta la quantità di due once di un
olio nero fiffo, che fembrerà a capello
pece liquida. E' quello fimigliantemente
di un fapore agro, il quale è unicamen-
te dovuto ad alcuno dei falì del miele,
che trovànfi incorporati in effo. Nel mie-
le medefimo ftanza copia di olio più ab-
bondevole, ma queft'olio non afcende nel-
la diffillazione difgiunte, e feperato, ma
incorporato, e melfcolato con gli altri
liquori; e quefti dopo che è ftato co-
fti con effi pel tratto di alquanti gior-
ni, precipita dai medefimi, e difgiu-
gnofi, e vien trovato attaccato ai lati per
ogni verfo del fondo del vafò. La mate-
ria, che rimaofi addietro nella ftorta, è a
un di preffo fette once di un negro car-
bone, di una leggeriffima teffitura fpun-
gofa, ed infipidiffimo, affaporandolo, e mo-
ltante di contener dentro di fe foltanto
alcuna porzioncella di fale.

Noi veggiamo da tutta la fin'ora ac-
curatamente defcritta Chimica operazione,
come trentadue once di miele viene a fom-
miniftrare ventiquattr'once, e due dram-
me di liquore, il quale viene a formare la
differenza nel peso fra il miele, allorchè
venne poffo entro il vafò chimico, e l'ul-
timo capo morto. Ventidue once, e fci

dramme fono la quantità ivi confervata
dei varj liquori, il rimanente fendofi di-
leguato, e volato via per le giunture de i
vafi, ficcome in fatti fempre, e coftan-
temente avvien nelle diffillazioni di genere
fi fatto. Vegganfi Memoir. Acad. Royale
Scienc. Parif. ann. 1706.

Il Capo morto di quella non meno, che
di parecchie altre diffillazioni di miele,
formando il tutto tre libbre e mezzo, ven-
ne collocato entro un vafò di terra cotta
non invetriato, e poffo fopra il fuoco a
calcinarfi pel tratto di dieci buone ore:
quefto prele intieramente fuoco, e s'acce-
fe non altramente che l'ufuale carbon co-
mune, ed arfe fino a perdere dieci once di
peso, ma fenza cadere, o convertirfi in
cenere. Il carbone, che vi rimala dopo
il divifato abbruciamento poffedeva un fa-
pore più falato di quello poffedeffe per io-
nanzi. Qualfivoglia liquore acido, che ve-
niffe verfato fopra quello carbone fermen-
tava in quella fteffa teffiffima guifa, che
avrebbe fermentato con gli aleatici comu-
ni; ed allorchè veniva gittato nell'acqua
per formarne una lifcia, mandava fuori
delle vefcichette apputto come fa la cal-
cina viva, fe venga gittata nell'acqua me-
defima: e nella maniera comune di fare
e di comporre i falì lifciali, quefto eb-
be a fomminiftrare una dramma e mez-
zo di un acre fale alcalico. E' cofa offer-
tabiliffima, come il Capo morto del mie-
le calcinato contiene, non altramente
che le altre coeori dei vegetabili, veraci
e genuine particelle di ferro, le quali at-
taccanfi bravamente al coltello calamitato.

MIELE, fiali, o favi del miele. La co-
ftruzione, o fabbrica dei fiali, o favi del
miele fembra una delle parti più fopren-
denti, e maravigiofe dei lavori di quelli
amabiliffimi inletrucci, ed i materiali, on-
de quefta fteffa fabbrica è compofta, i qua-
li, tuttochè evidentiffimamente raccolti dai
fiori delle Pianta, nulladimeno, per quanto
noi de' medefimi conofciamo, non efifto-
no in effi fiori in quella forma, e perciò
è ftato un punto, che ha fomminiftrata
grande occasione di fpeculare a' curiofi. La
regolare ftruttura del fiale altresì non è nie-
te meco maravigliofa e foprendente. Al-
lorchè vengono ponderate, ed efaminate
le parecchie cellette, onde effo fiale è com-
poffo,

posso, sembrerebbe altrui, che siate sollero consultate, e messe ad effetto le più efatte regole della geometria per la composizione, ed innalzamento delle medesime; e tutti quei comodi e vantaggi, ch'esser potrebbero mai desiderati, ed investigati in una cosa di specie somigliante, vengon'ivi evidentissimamente rilevati, trovati, ed effettuati. Veggasi *Resumet*, Istor. degl' Insetti, vol. 9. pag. 410.

Le api nella struttura di questo ricettacolo, o magazzino del loro miele, sembra, che abbiano somministrato la soluzione d'un Problema geometrico malagevolissimo, ed a vero dire, imbarazzato e confuso, con tante e di varie condizioni, che avrebbe messo col capo a segno, e tenuto a bada i più prodi coltivatori di questa Scienza. Siffatto Problema potrebbe acconciamente essere espresso negli appresso termini:

Essendo data una quantità di cera, per ridurla in un dato numero di cellette angolari, ed uguali, di un'ampiezza, o capacità determinata, ma la massima capacità, che può esser fatta con quella quantità di cera, e che a tempo medesimo quelle cellette vengano ad essere per il fatto modo disposte, che prendano il minor luogo, che sia mai possibile nell'alveare. Per questa ultima condizione egli si è necessario, che le cellette tocchinl'una l'altra per sì fatta maniera, che non rimangavi spazio angolare infra esse, nè alcuna cavità, o spazio. Le Api adunque hanno bravamente effettuato tutto questo con formare tutte le cellette esangolari, o die le vogliamo, tubi di sei lati uguali, od esagoni. La forma triangolare, quadrangolare, o qualsivoglia altra figura per le cellette, poteva, a vero dire, esser fatta così disposta fra l'una e l'altra celle, che non venissero a lasciare spazio vuoto infra sè: ma in tal caso colla medesima data quantità di cera non farebbesi potuto formare un numero eguale di celle. Il corpo dell'ape essendo tondeggiato, verrà similmente ad essere ricevuto entro una celletta esangolare, senza lasciar vuoti tali grossi spazi, come di necessità sarebbe avvenuto entro una celletta triangolare, o quadrata.

Il metodo di formare due ordini, o si-

lari di cellette in ciaschedun favo è di pari mirabilissimamente eseguito, e fabbricato per risparmiare il superchio consumo della cera: conciossiachè, se esse avessero fatte queste cellette semplici, e separate, o per meglio dire, cadaun favo da sè, distinto, o semplice, sarebbe stato di mestieri, che ciaschedun favo, o fiale avesse avuto la sua rispettiva base particolare, e similmente cadaun ordine, serie, o filare di cellette il loro rispettivo fondo di cera: dove per lo contrario in sì fatta maniera non solo fondo viene a servire a due celle, e non havvi che una sola lastra o lamella di cera nel centro di un favo doppio, o raddoppiato. Havvi però questa ulteriore difficoltà, che ciò accompagna, vale a dire, che le varie cellette non sono così altrettanti tubi esagoni aventi basi compresse e dilatate, oppure tubi di un'ampiezza o larghezza uguale per ogni e qualunque verso, ma sono queste realmente agnèze, e puntute nel fondo; avvegnachè cadauna d'esse sia una cella esangolare con una base piramidale. Ciascheduna di queste basi è composta di tre rombi uguali, e così cadauna d'esse basi per somigliante maniera viene a diventare la base d'altre tre cellette nell'opposto lato del favo.

Questo viene agevolissimamente dimostrato a coloro, che posseggono la Geometria per mezzo di parecchie figure, e posizioni delle basi opposte delle cellette dei due lati, o fiancate del favo: ma la spiegazione familiarissima di ciò ad un Osservatore comune, e non geometrico, si è col cacciare tre piccioli spilli per la base di qualsivoglia celletta, cadaun d'essi nel centro del rombo, il quale forma un lato di questa base. Se dopo di ciò il favo venga voltato, i tre spilli verranno trovati nei centri di tre differenti cellette del lato, o fiancata opposta. Questo ripiego cagiona un risparmio sommo della cera, o materia componente il favo, o fiale: ma oltre a questo havvi altro considerabilissimo vantaggio, ed è, che gli angoli da somigliante combinazione di basi risultanti fiancheggiano, e forniscono estremamente tutto il vaghissimo lavoro.

La materia, di cui il favo è composto, viene a cullare alle Api così grandi brighe,

D d d 2 e 4.

e farica in raccogliera, che non è maraviglia, ch'elleno vadano con sì gran risparmio, e con incresposità quasi dissi estrema, mettendola in opera per cavarne tutto quello che mai possono con poco. Le fiancate delle cellette sono tutte affai più sottili della sottilissima carta, eppure, malgrado ciò, elle vengono ad essere così forficate dalla loro stessa disposizione, che sono vevolissime a resistere, ed a far testa ad ogni e qualunque movimento, ed urto dell'ape, allorchè trovasi dentro le medesime, siccome in fatti ella è frequentissimamente obbligata a starvi, e fermarvisi. L'effetto dello spingere, che fanno le api i loro corpiccioli entro le cellette, farebbe lo scoppiare, o crepare delle cellette medesime nell'oro sommità, contro il quale inconveniente non trovansi ben riparate. Ma affine d'impedire inconveniente siffatto, quelle amabilissime, ed ingegnose creaturine stendono un cordone o fascia rivoltata di cera intorno intorno la verga di cadauna celletta per sì fatto modo, che rendesi a mala pena possibile, che vengano a screpolarsi, o spaccarsi in questa particolar parte. Questo cordone o ruotoleto di cera è per lo meno tre volte più grosso dei lati, o fiancate della celletta medesima, ed è eziandio molto più fatticcio, e più gagliardo negli angoli delle cellette, che nelle altre parti; di maniera tale, che l'apertura di cadauna delle cellette non viene ad essere perfettamente, ed a capello esagona, tuttochè la sua cavità interiore sia regolarmente, ed elastissimamente tale. Vegg. *Reaumur*, *Istoria degli Insetti*, vol. 10. pag. 21.

Le basi delle cellette non sono sempre perfettamente trilateri: alcuna fiata, in vece dei tre rombi, dei quali sogliono essere composte, sono per lo contrario composte di quattro pezzi, avendo l'ape cominciato male il suo lavoro: ma in questo tal dato caso particolare ella si è cosa ammirabile l'osservare con quanto estrema esattezza, e diligenza sieno dopoi uniti, e congiunti i due più piccoli pezzi, e ciò, affinchè l'angolo, che questi formano, esser possa più esattamente, che sia possibile, vicino ad essere uguale a quello di uno dei rombi, di modo che la ba-

se della celletta continua a rimanere quasi che a capello trilatera.

Ellà farebbe una cosa infinitamente desiderabile il veder le api in attuale opera nel formar che fanno queste loro vaghissime, e sommantemente regolari fabbriche: ma rendesi a stento grande possibile il vedere alcuna cosa di questa specie con distinzione, eziandio col vantaggio così giudiziosamente immaginato, degli alveari di cristallo: conciossiachè un'ape non opera, nè lavora in similante occasione da se sola; ma in qualunque situazione, che la fabbrica vada innalzando, veggionvisi delle torme o cisse insieme tutte in pronto, ed affaccendate per ajutarla, ed assisterla a vicenda l'una l'altra; ed i loro movimenti sono così snelli, pronti, e veloci, e tanto nascosti, ed occultati per istarsi l'una innanzi all'altra, che poco poichissimamente può rilevarsi di questi moti medesimi. Ad ogni e cadauno istante vanno portandosi al luogo del lavoro api novelle, e quelle, che prima ivi trovavansi affaccendate, via se ne volano; e con somma frequenza quelle, che arrivano ultimamente al luogo, vengono spedite altrove tosto, che quivi son capitate. Hannovi soltanto alcuni cortissimi momenti, nei quali i cristalli degli alveari possono presentare una veduta di quelle bestioline regolarmente nel lavoro loro impiegate, conciossiachè il momento, in cui altri vede un'ape lavorare nella fabbrica, in quel momento medesimo noi veggiamo altra ape, o volar via, od alcun'altra ape postarcele dinanzi, di modo che, o per un verso, o per altro, viene occultata presto che in tutto anche in questi dati momenti la veduta.

Questi lampi di veduta instantanei però sono più, che bastevoli a renderci evidente, e piano, che l'ape servesi de' suoi dentolini nel modellare, e nel dar forma alla cera. Il lato, o fiancata della celletta vien sempre e costantemente ricevuta in questa occasione fra i due dentolini dell'amabilissimo insetto, e per mezzo di ripetuti colpi sopra cadaun lato di cadaun dente, il lato medesimo viene ad esser ridotto ad un'acconcia, e dicevole sveltiglieria, e la cera viene pel mezzo me-

del-

deffimo ad effere lavorata con una propria, ed adeguata confistenza, e fermezza.

Egli è stato fuppolto da certuni, che tutto quello piano di un' estremamente efatta efecuzione geometrica rifpetto alla ftruttura, e fabbrica dei favi, fia immaginario, e fantastico: che l'ape in effa fabbrica abbia minor merito di quello venga comunemente fuppolto, e che la mera adefione o pofizione contigua di un dato numero di pezzetti rotondi, o globuletti di cera, venga a produrre un dato numero di figure efagone regolari, allorchè quefti medefimi globuletti vengano infieme uniti, e comprefsi. Ma chechè eoftoro facciano a cianciare, non può altri applicare all'ape un fiffatto agevoliffimo metodo nelle fue fabbriche. Ella da principio, e comincia la fua cella, e lo fteffo fa in cadauna di effe, regolarmente dalla fua bafe, la quale non è già efagona, ma bensì triangolare; ella faffi prima ad innalzare uno dei tre rombi, che effe dee la bafe di due dei lati dell'efagono; fopra di quefto ella innalza i due lati, o fiancate della celletta; di cui dee effere la bafe. Forma ella dopo un fecondo rombo, e fimigliantemente i fuoi lati della celletta; ed ultimamente ella ne forma un terzo, il quale viene a chiuderfi con gli altri due; ed i due lati, o fiancate angolari alzate, od erette fopra quefto, venendo a ferrare, e chiudere nella maniera medefima degli altri, tura la celletta vien ridotta al fuo termine, e finimento.

Mentre una forma, o drappello di api trovasi impiegato nell'innalzare per fimigliante modo una cella, le altre trovansi ugualmente affaccendate nel fabbricare le altre comodità, ed ufi delle fue parti nella ftruttura delle altre celle, ed alcune terminano le giunture, o connelfioni delle celle, delle quali i fuoi lati formano una parte. Altre fimigliantemente trovansi impiegate a lavorare nella bafe, preparando, e piantando i fondamenti per le altre celle, le bafe delle quali debbon' effere formate in parte fopra i varj rombi di quefte: conciofiachè fempre, e conflantemente lavorino le api da ambi i lati del favo, o fiale nel tempo medefimo.

Veggafi *Reunmar*, *iftoria degli infetti*. Vol. 10. pag. 30.

Dannofi parecchie occafioni, nelle quali le api trovansi grandemente affrettate, ed affaccendatiffime per innalzare in breve tratto di tempo gli ammirabili loro edifizj; in quefti dati cafi particolari elleno ftendono foltanto i fondamenti delle celle, e lafciano di terminarle, e condurle alla dicevole, ed adeguata loro altezza in progrefso. In cafi fomiglianti affai frequentemente un fiale viene ad affere terminato in ambi i lati, rifpetto alle bafi romboidali, o triangolari delle cellette, ed aggiuntavi foltanto una porzioncella dell'altezza dei loro lati, o fiancate efangolari, la quale altezza vien da effe dopo condotta a finimento con loro agio, ed a piacimento. Siccome in parecchi lavori di un'arte fonovi impiegate parecchie mani per condurre a peritoto finimento alcun pezzo di manifattura, così appunto va la bifogna nella fittica, e lavoro delle api: non conduce mai al fuo perfetto termine e finimento una cella una fola ape, ma la prima opera infra effe pianta il lavoro grezzo, o l'orditura della fabbrica, e lafcia poi ad altre lavoratrici il raffinamento, e la perfezione, e compimento della fabbrica medefima.

Nei noftri lavori ella fi è cofa beniffimo conofciuta, che i primi fgroffamenti del lavoro fonoi più agevoli non meno, che quelli che fi effettuano con maggior prontezza; e ficcome un dirozatore di metalli può fomministrare copia grande di lavoro, e di impiego per molti raffinatori, e brunitori, e fimiglianti, così un'ape formerà i primi rudimenti, o dirozamenti della fabbrica di parecchie cellette in breviffimo tratto di tempo, quando un numero grande di altre fa di melfieri, che venga impiegato dopo nel finimento, e compimento di cadauna di effe celle. Quefto fi è il lavoro, il più neceffario: conciofiachè fe il primo lavoratore della cella faciffe i fuoi lati, o fiancate della fottigliezza, della quale debbon' effere quefte fiancate medefime, romperebbonfi fotto il pefo degli operaj nel dar loro forma: vengono per tanto quefte fiancate lafciate faticce,

ticee, e rozze, e grossolane, e le api, le quali vengono dopo, danno a quelle forma migliore co' loro dentolini, e ponendovisi sopra posson' esser vedute raffinare gradatamente il lor lavoro, fino a tanto che abbandonano alla perfine, allorchè è ridotto a perfettissimo finimento. Questo finimento, o compimento vien fatto, ed eseguito a forza di vivacissimi ripetuti colpi dei denti di queste nostre amabili bestioline dicontra i lati, e col frequentemente ridurgli insieme non alitramente vengono ad affilargli. Questi mezzi servono parecchie fiate a spianare le muraglie di cera, che formano i lati, o fiancare, ed a tagliar via le disuguaglianze in quei dati luoghi, ove questi lati medesimi sieno soverchio grossi, e faticci. E' la cera fra queste picciolissime lavoratrici una comodità sommaramente preziosa, costa loro soverchio caro l'esserne defraudate, od in farne sciacquo, e coerentemente quella data ape, che ne ha tagliata, e rimondata via una buona quantità, non lasciala già entro la cella trasandatamente, ma levandola via con diligenza veramente estrema, raccogliela, e formane una picciola pallottolina della grossezza di un capo di spillo, e conducuala a quei dati luoghi, ove altre sue compagne trovansi occupate nell'innalzamento, e fabbrica di altre celle.

Nel momento in cui l'ape è volata fuori colla sua soma prende tosto un'altra il suo luogo, ed entrando entro la cella finisce, e termina il lavoro che fa di bisogno intorno ad essa, mentre l'altra operatrice, ed entra in un'altra cella o dassi ad ajutare quelle compagne, che trovansi occupate nell'erezione di nuove cellette. Così il lavoro viene ad essere condotto a fine da tutte congiuntamente, e di conserva, e cadauna in tutta la grand'opera ha il suo rispettivo peso, ma non già in alcuna parte particolare dell'opera stessa.

Nello sciame delle api hannovi parecchi maschi, o sieno api grosse, che sono comunemente appellate fuchi, *fucis*, calabroni, ec. Quelle hanno le loro celle particolari; conciossiachè quelle che sono appropriate per le api ordinarie, o sieno api da lavoro, che non sono del sesso, non farebbero capaci, ed acconce a contener-

le nello stato di verme, o crisalide. Siccome fra le celle del medesimo favo, o fiale, alcune sono destinate per ricevere il miele, ed altre per servir di stanza ai vermi, o crisalidi, o sieno gli allievi, e figliolini delle api, così fra quelle seconde havvene un numero considerabilissimo, che sono più capaci, e di maggior estensione delle altre fiate, e lavorate per questi maschi. La grandezza usuale comune delle cellette è tale, che in un'alveare dell'altezza di quelle quindici dita, e largo quelle dieci dita, vengono comunemente comprese a un di presso nove mila cellette. Le celle di maggior estensione destinate per le api maschi, vien trovato non essere esagoni regolari, avvegnachè due dei loro lati, o fiancate piantate diametralmente opposte l'una all'altra, sieno più picciole delle altre fiancate, o lati. La differenza però è di pochissima considerazione, e momento; ed allorchè le altre cellette vengono ad essere rigorosamente, e con tutta l'intenzione esaminate, e ponderate, verravvi similgiatamente trovata la differenza medesima ne' loro lati, o fiancate, in proporzione alla loro grossezza, avvegnachè due dei lati dell'esagono sieno sempre, e costantemente alcun poco più piccioli degli altri quattro lati. Veggasi *Raccontur*, lib. degl'insetti Vol. 10. pag. 34.

Quelle cellette, che hanno servito, oppure, che debbon servire per abitazioni dei vermi, o crisalidi delle api comuni, e delle api maschi, o fuchi, sono bene spesso fatte similgiatamente servire in altri tempi per ricettacoli, o magazzini del miele; ma quantunque queste sieno indifferentemente fatte servire, od a questo, od a quell'uso, ve ne ha tuttavia delle altre, le quali sono unicamente destinate a ricevere il miele.

La celerità, colla quale uno sciame di api ricevuto entro un'alveare in cui trovansi quelle bestioline stanziato in guisa, che loro piaccia, e che vada loro a fantasia, ed a genio, conducono a fine, ed a perfettissimo compimento l'opera tutta dei loro fiali, è veramente sorprendente, ed in estremo maravigliosa. Trovansi numerosissime torme, o drappelli di api tutte in un tempo medesimo impiegati nel lavoro,

voro, e perchè questi drappelli non possano frastornare infra sè, od esser di briga, e di incomodo l'uno all'altro, elle non pongonsi già a lavorare sopra il primo fiale fino a che il medesimo sia condotto a termine, e compiuto, ma quando è gittrato il fondamento di questo primo fiale, si portano a lavorare sopra l'altro fiale; di modo che veggionsi nell'alveare bene spesso i lineamenti, rudimenti, e fondamenti già piantati di tre, e di quattro differenti appartamenti, ed ordini di camere in un tempo medesimo; e così parecchi seiamasi destinati a condurre innanzi il lavoro di cadaun fiale.

I varj favi, o fiali sono tutti piantati paralleli l'uno all'altro, e fra essi vien lasciato uno spazio, od intervallo fisso, che le api in fra essi possano con ogni maggiore agevolezza, e comodo passare; ed assai sovente elleno piantano una parte dei fiali in una direzione contraria al rimanente; di maniera tale che, mentre gli altri sono piantati orizzontalmente, quelli vengono a rimanersi a capoll perpendiculari.

Quantunque i lati, o fiancate di tutte le cellette sieno estremamente sottili, nulladimeno i fiali sono estremamente pesanti, allorchè trovansi pieni di miele. Questo verrebbe a far correr pericolo alle fiancate medesime di rompersi, e sfiancarsi con questo peso in corpo, qualora elleno fossero soltanto legate, e raccomandate alla sommità; e per questa ragione le api fanno, ed aggiungono a quelle fiancate parecchi sostegno, fiancheggi, e contraforti per ogni, e qualunque parte elleno possono mai, attaccandole, e raccomandandole in moltissimi luoghi l'una all'altra, e bene spesso fissandole alle fiancate dell'edifizio per via d'assai valide groffe, e solide masse di cera.

Fato di miele, pietra. Nell'istoria naturale è questa noa denominazione data da parecchi Scrittori delle cose naturali ad una particolarissima specie di corallo fossile, il quale viene comunemente trovato in ampie masse, e queste per ogni, e qualunque verso piene zeppate di ben capaci cellette esagonali, rassomigliantisi a capello a quelle dei favi, o fiali naturali delle api. Sono queste leggerissimamen-

te scannellate, e d'ordinario scorrano giù, ed internansi assai profondamente nella pietra.

MILLEPIEDI. Sono i Millepiedi, *Millepedes*, insetti ottimamente conosciuti, messi in opera per moltissime occasioni nella medicina. E' questo insetto altramente denominato *Asellus*, oppure *Oniscus*, dagl'Inglese *wood-louse*, dagl'Italiani *centogambe*. Il nostro Monsieur Ray descrive sette differenti specie di millepiedi, o centogambe, alcune delle quali noi le veggiamo, e le abbiamo tuttogiorno sotto gli occhi, alcune altre poi sono assai più rare. Sono queste: 1. Il Millepiedi, o centogambe comune appellato dagl' Scrittori delle cose mediche *asellus asellinus*. E' questo assai più sottile, e più piatto, o compresso della specie paonazza, e porta le sue antenne dirette all'innanzi, ed il suo colore è un grigio bruniccio pallido: l'ultimo anello del suo corpo è acuto, non anulare, e le dipendenze dei lati sono forcuti, e tale si è similmente la sua coda. Questa specie di centogambe è comunissima nelle mura vecchie, e sotto le cortecce degli alberi di vecchia data. 2. Millepiedi, o centogambe maggiore paonazza, o livido. Questo è assai considerabilmente più grosso del primo, ed è di un color nero pendente al paonazzetto oscuro: l'ultimo circolo del suo corpo è anulare, non aguzzo, o puntuto, e la sua coda non è forcuta: il suo corpo, non altramente che quello del primo centogambe, è diviso in quattordici anelli, e va ruotolandosi, ed aggomitolandosi con somma agevolezza in una rotomda pallottolina. 3. Millepiedi grande marino, *Marinus Asellus magour*. E' questo tre volte più grosso dei centogambe della specie comune: il suo corpo è diviso in dodici anelli: i suoi occhi sono grossi, e rotondi: le sue antenne son lunghe, e sono composte soltanto di tre punte: la coda è doppia, ed ha quattro corna: il suo colore è alcun poco più pallido del centogambe della specie comune. 4. Il Millepiedi, o centogambe montagnolo, *asellus montanus*: questo è della grossezza del centogambe della specie paonazza, o livida, e non altramente che questo si faccia, venendo toccato, s' aggomitola in una pallottolina:

il suo corpo è diviso in undeci cerchi, od anelli; ed il suo colore è una mescolanza di nero, e di rosso. 5. Centogambe di Cornovaglia grande. Questo è lungo a un di presso un dito: le sue antenne sono lunghissime: egli ha quattordici gambe, ed è di un color bruno pendente al rosso. Vien questo distinto da tutte le altre specie per la forma o configurazione della sua coda, la quale è una lamella piatta nella sua estremità divisa in tre punte: i suoi piedi hanno tutti nella loro estremità una specie di uncini e le sue gambe interiori sono considerabilmente più lunghe delle altre. 6. Millepiedi, o Centogambe acquajolo, *asellus aquaticus*. Questo è alquanto più picciolo, più sottile, e più diligine del Centogambe della specie comune: le sue antenne sono in estremo sottili, ed il suo colore è un grigio scuriccio pallido con una striscia oleura scorrente all'ingù dal suo dorso: il suo corpo è composto di sette giunture, cadauna delle quali ha un paio di gambe, il suo paio di gambe delle gambe è assai più lungo degli altri, ed ha un altro segno, o marca particolare, e queste sono due estremamente sottili cornettini scappanti fuori dalla coda, e formanti una specie di forcuncino. 7. La settima specie finalmente si è il Millepiedi marino corto, *asellus marinus brevis*: è questo non meno più largo, e dilatato, che assai più corto del centogambe della specie comune, ed ha due dipendenze da cadaun lato della coda, delle quali fa uso in nuotando: questo è del color medesimo del Millepiedi della specie comune, ma ha una lista, o fascia negra scorrente all'ingù nel suo dorso: i suoi occhi son piccioli: il suo corpo è composto di dieci giunture, oltre la coda ampia, e dilatata, aggomitolasi, venendo toccato, non altrimenti che il Centogambe della specie paonazza, e sotto ciascheduno anello del suo corpo, oltre un paio di gambe, ha due pinne, le quali servono per nuotare. Veggasi Ray, Historia Insectorum, p. 41.

La prima e la seconda specie de' Centogambe vengono comunemente messe in opera promiscuamente nella Medicina; ma la seconda, o sia la specie de' millepiedi paonazza, che s'aggomitola, sendo

toccata, in una pallottolina, è la specie medicinale più dicevole, e conveniente.

Oltre questi propri Centogambe, od *Aselli*, hannovi alcune altre specie denominate comunemente dagli Scrittori *Pulices Marini*, Pulci di Mare, i qual mostrano d'approssimarsi grandemente all'indole, e natura delle specie divise de' Centogambi, o Millepiedi, così propriamente denominati. Sono questi gli appresso:

1. Il Pulce marino cornuto: il corpo di questo insetto è composto di dodici giunture: egli ha sette paia di gambe, e le gambe interiori sono considerabilmente più lunghe delle altre: le antenne altro non sono, che un paio di lunghissime corna, e nella base di queste stannovi due altre cornettine assai corte, e sommarmente sottili: ha delle pinne coll'ajuto delle quali nuota, ed è di un color biancastro, ed ha una corporatura sommarmente segaligna, sottile, e diligine. 2. *Pulx Marinus Bellonii*, Pulce Marino del Belloni. E' questo della forma *communium asellorum*, dei Centogambe ordinari, e comuni, ma alcun poco più segaligno, e diligine, e d'una corporatura più tondeggiata, e le sue gambe sono assai considerabilmente più lunghe: il suo dorso è seuro: i suoi occhi son grandi, e negri: e le sue antenne vengono ad essere articolate, ed hanno due altre picciole antenne sorgenti fuori dalle loro radici: il suo corpiciuolo è pellucido, e muovesi con sveltezza, e vivacità sorprendente nell'acqua: la sua coda è composta di un grosso fardello di peli. Trovasi questo particolarissimo insetto in copia abbondevolissima sotto le pietre dalle fiancate dei fiumi in vicinanza del mare. 3. *Pulx aqua dulcis*, Pulce di sorgente, Pulce d'acqua dolce. Differisce pochissimo questo insetto, e quasi di nulla dal testè descritto insetto appellato Pulce marino del Belloni, ma è singolare per quei doli luoghi, ne quali unicamente suole abitare, e sono le rive, e la mola, o melma delle sorgenti calde d'acqua dolce, entro le quali non può vivervi alcun altro animale, siasi di qualunque specie esser si voglia. Veggasi Ray, Historia Insectorum, pag. 44.

MILZA. Il prode Monsieur du Vernoy ha aggiunto un'opinione di vantaggio a tutte quelle molte, che già erano state messe sul tappeto, in rapporto all'uso della milza. Dall'osservare un'ampio spazio vuoto in vicinanza della milza nell'addome d'un corpo morto, la grossezza proporzionale de' suoi vasi sanguiferi, e finalmente la struttura della milza analoga a quella del pene, Monsieur du Vernoy fassi a conchiudere, che la milza nel corpo d'una persona vivente sia soggetta a rigonfiarsi, non aleramente che un manico, o soffietto: ma il buon Monsieur non fa dirci, e per conseguente non ci dice, come ella venga per sì fatto modo ad esser mossa, nè per quale effetto ella sia mossa. Veggansi Comment. Acad. Petropolit. Tom. IV. pagg. 156. 157. & seq.

Monsieur Lieutaud argomenta, che la milza sia più grossa per una copia più abbondevole di sangue in essa stanziante, allorchè lo stomaco è vuoto, e che quello sangue è violentato, e forzato ad uscirne fuori allorchè lo stomaco è pieno, per accrescere il fegugamento della bile. Veggasi Histoire de l'Academie des Sciences Paris. ann. 1733.

Noi abbiamo un racconto nelle nostre Filosofiche Traduzioni sotto il numero 451. dell'estrazione d'una parte della milza di un uomo, la quale aveva cominciatto a mortificarsi, e che malgrado sì tremenda operazione l'uomo non si morì, ma si riebbe intieramente, e poscia si gode la sanità perfettissima.

E' stata estratta, e troncata fuori del ventre dei cani la milza bella, e intiera senza il menomissimo loro danno. Monsieur Boyle parla di un'esperienza fatta sotto i suoi occhi della totale estrazione della milza di corpo ad un braeco giovane, il quale si riebbe, e venne a perfettissima guarigione in una quindicina di giorni. Veggasi Boyle, Opere Filosof. Compend. Vol. I. p. 27.

Il Dottor Pozzi riferisce con ogni esattezza i fenomeni, cui egli ebbe ad osservare nell'aprire, e tagliare un mastino, al quale, quando era giovinetto, era stata cavata di corpo la milza. Il fegato di questo cane, che era più grosso, e più pesante dell'ordinario, era di pari più fra-

Suppl. Tom. III.

gile, e stitolabile: la vena porta era grandemente dilatata, ed allargata: la veltica del fiele era piena di bile, e questa era assai più acre di quello esser soglia comunemente. Da simiglianti fenomeni ci fecesi ad immaginare, che l'uso della milza fassi il separare un liquore simigliantissimo allo spurto, il quale sia valevole di diluire la bile, ed a far cessar per sì fatto modo alla sua soverchia acrimonia. Veggansi Saggi Medici d'Edimburgo.

L'incertezza, in cui ci troviamo, per rapporto all'uso reale della milza, ha dato luogo peravventura alla nozione, che gli uomini vivrebbero senza la milza; e che in moltissimi casi contribuirebbe grandemente alla buona sanità di certe date persone l'estirpare, e tagliar fuori del corpo umano quella viscera inutile. Nel Giornale dei Sapienti havvi un piano, od istoria di un metodo per distrugger la milza senza gli orrori, che cagionati vengono dall'operazione dell'aprire il corpo.

Questo venne eseguito da una persona, la quale applicò un coltello di legno alla superficie del corpo appunto in quella parte, ove trovasi la milza stanziata, e percuotendovi vivacemente sopra con un maglio, o martello di legno, disse al paziente, come egli aveva oggimai sfaccata, e rotta la sostanza della milza; e che ora null'altro rimaneva salvo ch'ei prendesse alcune particolari medicine, cui egli aveva già per tale effetto preparate, e manipolate, per distruggerla totalmente, e per farla venir fuori del corpo per evacuazione.

La follia, " degna di riso, e di compassione, " di una pretensione di spezie somigliante, siccome chicchessia immaginerebbe, farebbe per se sola stata bastante di far ridere tutto il mondo; eppure malgrado ciò molte e molte stultissime persone si sottomiserò a sì scempiata operazione fino a tanto che veduto fu un'infelicitissimo giovane in Pietroburgo morto sul colpo nell'operazione medesima della pur ora mentovata spezie del coltello, e del maglio, o martello di legno; e siccome il suo ventre venne orribilmente a gonfiarsi, così venne desiderio ai congiunti di lui di far'aprire il cadavere del giovane.

E c

vane

vane sconsigliato. La cagione della sua repentina morte fu toccato con mano, essere stata un'emoragia, la quale aveva ingombrata affatto e ripiena la cavità dell'addome, e che procedeva dal rompimento della milza medesima fatto dal diviso colpo. Questo funesto accidente ebbe alla per fine a convincere quella gonza popolazione, come il troncare, e ferire la milza non dovea essere più lungamente riguardato come un mezzo di mantenerli sano. Veggansi *Acta Petropolitana*, Vol. t. p. 381.

Infarcimento della Milza, Infartus Lienis. E' questa un' infermità, la quale consiste in un' enfagione, o rigonfiamento di quella rilasciata viscera cellulare, che riconosce la sua vera e genuina origine da un ristagnamento del sangue verso il ramo splenico, in cui sembra, che la Natura abbia avuto intenzione di sollevarsi dal foppraccario d'una pletora per mezzo di scartare una porzione della massa per i vasi corti, *per vasa brevia*. Veggasi *Juncker, Conspect. Medic.* p. 194.

L' Infarcimento della milza differisce da un' ostruzione dello splene, o sia la milza medesima, in questo, che questa seconda infermità, o disordine è una totale soppressione del sangue in essa viscera, e quella una soppressione soltanto parziale. Questa indisposizione vien con troppa frequenza messa a mazzo, e confusa colle ree affezioni nefritiche, ed è, a vero dire, in generale, della classe delle malattie ipocondriache, ma nasce, e procede soltanto da una spenale, e particolare derivazione del sangue a questa sola viscera, e non già ad alcuna delle altre parti adiacenti, o la medesima circondanti.

Segni di questa malattia. Un' infarcimento della milza viene scoperto, e rilevato da un' enfagione o rigonfiamento del lato sinistro, alcun poco sotto le costole spurie, accompagnato da dolori fissi, e permanenti, sebbene non gran fatto acuti, nè violenti. Simiglianti indisposizioni assai sovente danno l'osità, avendo delle frequenti remissioni, avvegnachè rari sieno quei casi, ne quali elleno continuino nello stato medesimo più di una, o di due giornate. Durante il tempo dei sintomi, ef-

sendo la malattia molto peggiore, prova il paziente una difficoltà di respiro, ed un' ansietà de' precordi, ed assai generalmente un' abbassamento degli spiriti: a questi malori può essere aggiunto, avervi per lo più unita una tosse secca, ed il frequente incomodo di rutteggiare.

Persone sottoposte all' infarcimento della milza. A fissata indisposizione, generalmente parlando, trovansi molto più sottoposti gli uomini, che le donne, se non se nelle età di mezzo, e nei più avanzati periodi della vita, nelle quali circostanze sogliono le donne essere per lo contrario soggette a questo malanno più degli uomini. Le persone di un' abito melancolico trovansi di pari soggette, e grandemente tormentate, ed assistite da un' affato malore, e quelle tali, che per innanzi sono state bersagliate da malanni ipocondriaci; e che sono state impropriamente trattate, e disaccoppiate con i medicamenti astringenti; e tutte le persone di una vita sedentaria, e studiosa, o che perdono, od impiegano tempo moltissimo in pensare, ed in meditare.

Cagioni di fissata indisposizione. Sono queste una vita sedentaria, ed una dieta di una specie soverchio grossolana, e pesante: un' intralasciare delle abituali cavate di sangue, od altre evacuazioni: oppure un troncamento, o soppressione dei regolari corsi mensurali, o delle scariche moroidali: un trattamento improprio nelle febbri intermitteni a forza di Medicine astringenti, oppure delle febbri d' indole acuta, con medicamenti soverchio refrigeranti, ed una costipazione abituale. A queste cagioni può essere aggiunta una indisposizione ereditaria.

Prognostici in simigliante indisposizione. E' questa un' infermità di un pericolo non immediato al paziente, e più recente, che ella siasi, allorchè il Medico imprende a medicarla, più agevole si rende la sua guarigione. Se questa indisposizione venga lasciata in balla di se stessa, ella degenera in abituale, e non porta però seco pericolo di morte, ma se venga per disaccorciamento modo, ed impropriamente medicata, c'è assai assai sovente la base delle più ostinate Quartane, o pure degenera in uno scirro, il quale può essere per tratto lun-

lungchissimo portato addosso senza pericolo menomo della vita, ma ultimamente il tutto viene con frequenza pur troppo grande a finir in lentissima febbre etica, ed in gonfiamenti edematosi, ed ascitici: nelle donne viene assai volte a finire in un vomito sanguigno: ed alcune volte, sebbene somamente di rado, sopravviene una stasi infiammatoria, e suppurante, ed, o per tefesi, o per vomito, viene in questo caso ad essere evacuata, e vuotata una materia nera fetentissima, e purulenta.

Metodo della cura. L'abito pletorico, che dà l'origine a siffatta indisposizione, dee esser abbassato a forza di cavate abbondevoli di sangue dal piè destro; e queste poi converrà ripetere per acconcio modo nella Primavera non meno, che nell'Autunno ciaschedun'anno: e nelle femmine fa onninamente di mestieri, che i corsi menstruali vengano ridotti ad una adeguata regolarità, secondo il comune ordinaro meososo noto, siccome è di pari somamente necessario il richiamare negli uomini le regolari sanguigne scariche delle morici, per mezzo d'applicare alle vene moricoidali le mignatte. La spezzera dee esser corretta, e diradata a forza di decocti d'enuia campana, d'isopo, e cose somiglianti; e per via di mezzane, moderate, e ripetute dosi di tartaro vetriolato, di gomma ammoniac, od altre tali medicine, come anche sarà necessario il prendere di tratto in tratto gentilissime dosi di rabarbaro, e di senna in infusione. A simiglianti cose può essere assai dicevole l'uso esterno dei topici medicamenti risolvendi, e corroboranti, quali appunto sono gli unguenti di malva di palude, l'impialtro di gomma ammoniac, e somiglianti, ed ultimamente dovranno dal dotto, e saggio Medico le preparazioni acciajate: a queste uniscono, ed aggiungono certo numero di cotali cose riputate specifiche, quali appunto sono la Robbia, e le radici di Capperio, l'Androsacea, il Millefolio, il Capelvenere bianco, la Scolopendria, la cortecia o scorza del Frassino, ed il legno del Tamarisco. Vegasi *Juncker*, *Conspect. Medic.* pag. 197.

Scirro della milza. E' questo un tumore indurito della milza cagionato da un

ristagno, e raccoglimento fiso degli umori, e questo proveniente dall'elamento delle loro parti più sottili. Questo malore è alcuna fiata compiuto, altra non tale; ma nei casi grandemente favorevoli, egli si è un male infinitamente più pericoloso di un'infarcimento della milza medesima, e di una guarigione senza paragone più malagevole, e difficiliosa. Vegasi *Juncker*, *Conspect. Medic.* pag. 201.

Segui di uno scirro nella milza. Sono questi una durezza sensibilissima, e palpabile sotto le costole del sinistro lato, che si va dilatando, estendendosi alla volta dei lombi con sensazione di un peso, per così esprimersi, come pendente in quella parte; e quindi è, che il duere sul destro fianco riesce sempremai scomodissimo non solo, ma somamente penoso altresì. La faccia è di un vero pallore di morte, e bene spesso questo pallore oscuro, e cupo vien di pari comunicato alla cute di tutto il corpo; e comunemente scorge un circolo nero intorno intorno alle orbite degli occhi. Havvi similamente una sensazione di stringimento nel petto con alcuna difficoltà di respiro, ed una tosse asciutta. L'appetito suol d'ordinario essere voracissimo; ma talvolta è alterato da nausea, senza la menoma ombra d'apparente cagione. Il ventre suol'essere comunemente alquanto costipato, ma ciò irregolarmente avviene. Sembra di pari, che in tali pazienti venga intaccata la mente, e la persona rimansi oppressa da tenebrosa fantastieaggine, da silenzio, e da ansietà, senza ombra menoma di cagione visibile. Ultimamente scorge in questi tali pazienti una gonfezza per lo più nel piè destro, la quale tratto tratto, e gradatamente va prendendo pace, e dilatandosi, e da principio radissime volte viene considerata.

A simigliante sconcerto di sanità sono ugualmente sottoposte le persone d'ambidue i sessi, ma, a vero dire, non è però un male, che sia gran fatto comune. Quei tali uomini, che per lungo tratto di tempo sono stati battuti da malori tipocodruici, e quelle tali femmine, che sono rimase lungamente soggette ad attacchi, ed affezioni isteriche, sono a tal disordine grandemente sottoposte; ed a

Ecc 2 que-

queste esser possono aggiunte tutte quelle persone, che menano una vita indolente, applicata, speculativa, e sedentaria; e quelle tali eziandio, le quali nei casi intermittenti sono state da imprudente Medico trattate coi medicamenti astringenti.

Cagioni di uno scirro nella Milza. Oltre le cagioni da noi poc' anzi additate, assaiissime s'ate viene ad esser prodotto, ed ingenerato nella Milza uno Scirro, da un qualche colpo violento, o da altro simil-gliante urto esterno: una dieta troppo grossolana, dura, e di cibi fitti esser può a buona equità la veracissima cagione instrumentale del gittarsi i fondamenti nella milza di un siffatto male: ed una cagione non lieve esser può di pariaggiata a tutti i divisi casi, dalle violentissime passioni d'animo.

Prognostici in questo male. Negli Scirri recenti, od ingenerati di fresco, e tali, che trovansi per ancora non compiuti, e non, confermati, ha il Medico alcuna speranza di riuscire nel vegir' a capo di una cura: e per lo contrario nei casi di vecchia data, e negli scirri oggimai compiuti, a confermati, havvi, senza lusingarci, speranza pochissima di guarigione. Havvi però se non più questo conforto pel paziente, che eziandio portando un siffatto scirro addosso, qualora però sia lasciato in balla di se stesso, nè vi pooga un qualche imperito, e faccente Medicaltro, od altra persona la mano, che stuzzichi, siccome volgarmente diciamo, il vespaio, se lo terrà addosso in tanta pace molti, e molti anni, senza pericolo della propria vita.

Havvi in uno scirro una perpetua, e costante tendenza al corrompimento, ma questo puossi altri piuttosto prometterla da uno sfacelo, che da una suppurazione di indole infiammatoria: ma allora quando vengono messi in opera gli Emollienti, vi ha pericolo sommo, ed imminente: conciossiachè siccome questi sono vicinissimamente uniti ai medicamenti maturanti, così questi assai frequentemente producono l'effetto di questi; ed è cosa più che indubitata, che in casi simil-glianti non può altri in verun conto promettervi giammai una lodevole suppurazione.

Metodo di Trattamento. Questo caso ef-

fer dee omninamente trattato nella maniera medesima medesimissima degl' infarimenti della milza, da noi già poc' anzi esposta; ma in questo caso debbon' esser messe in opera medicine risolventi più gagliarde, e più efficaci, avvegnachè il male sia assai più caparbio, ed ollinato. La Genziana, la Brionia, e la radice di Aro, colle cinque radici aperienti, e le erbe capillari, colle gomme energiche, o potenti, quali, a cagion di esempio, esser possono il galbano, il sagapeno, l'ammoniaco, e le altre di indole siffatta. Fa simil-gliantemente di mestieri, che vengano ordinate le adeguate, e giudiziose cavate di sangue, tosto che saranno state nettate, e rimonde le prime vie; e pottrassi assai dicevolmente applicare al di fuori l'impiaffo di cicuta coll' ammoniaco. Ma in evento, che il caso sia veramente siffatto, caparbio, ed insuperabile, sarà sempremai consiglio più sano il lasciar totalmente da un lato ogni, e qualsivoglia sorta di medicatura, e lasciar fare alla sola natura. Veggasi *Junker*, *Conspectus medicus*, pag. 202.

MINERALE. Minerali Inglefi. Il sapientissimo nostro Dottor Woodward ha osservato, come i minerali Inglefi sono grandemente più prezabili, ed in numero maggiore assai, di quello sia stato universalmente supposto. La terra-grafica, che è una cosa di prezzo così vile, che da moltissimi non vien tampoco curata, osserva questo valentuomo, come ella è preloschè di altrettanto valore pel nostro commercio, quanto esserlo si possa qualsivoglia altro articolo di prodotti forestieri. La proprietà, che questa particolar terra possiede, di imbeverli cioè dell' olio, e del grasso, non è già connota unicamente al pochissimo rilevante servizio di lavar via, e mangiarsi le accidentali macchie, che altri fassi sopra gli abiti, od altri panni; ma ella è di pari di un' uso così grande nel nettare, e pulire le lane, ed i panni fatti di quelle, che noi non avremmo già tanto guadagnato, nè ci faremmo tanto vantaggiati, siccome fatto abbiamo nel traffico, e nel commercio delle pannine, qualora posseduto noi non avessimo fra i prodotti del nostro Regno questo fossile in così grande abbondanza, e così

così a buon mercato, e ad un tempo stesso così eccellentemente buono, e perfetto. E' questa terra un' esempio della preminenza del nostro suolo sopra gli altri tutti. Altro esempio somigliante noi lo abbiamo chiarissimo nel nostro piombo nero, che volgarmente addimandasi da noi *Wadd*, ed è un minerale di ufo non meno, che di valore grandissimo rispetto a parecchi rami del traffico, e delle arti: e che in niuna altra Regione viene scavato dalle viscere della terra così fino, buono, e perfetto, come in Inghilterra, e nelle nostre Colonie; e quello di questi secondi luoghi, tutto che sia di lunga mano migliore di quello di qualunque altra nazione, nulladimeno appetto al nostro proprio Inglese natio, è grandemente inferiore.

L' Ambra, e quella specie di pietra nera appellata *Genro*, *Jest* Inglese, trovansi in copia grandemente considerabile, e sono prodotti uguali a quelli, che scavansi in qualsivoglia altra parte del Mondo. Il nostro Carbone seannellato avvienssi di molto alla bellezza del *Genro*; ed eziandio il nostro carbone comunissimo per far fuoco, e in grado sommo superiore in bontà, a quello di tutte le altre parti del mondo noto, nè in qualunque altro luogo vien trovato, e scavato in copia così abbondevole, come presso di noi. Le terre non meno, che le arene, o ghiaie Inglese è cosa notissima, e da chicchessia confessata, esser superiori a quelle di qualunque altra Regione, in niuna delle quali non vedrannosi nè così bei quadri, e spiazzi di erba, nè così adeguate passeggiate ghiaiate siccome veggionsi negli Inglese giardini. Abbiamo noi similmente, e pietre, pianelle, ed altri necessarj fossili somiglianti per fabbricare in sufficientissima abbondanza.

Il vetriolo, e l'allume trovansi in copia assai più abbondevole in Inghilterra, che in qualsivoglia altro paese; e vengono ad essere così agevolmente lavorati, o cavati fuori delle loro terre metalliche che gli possiamo vendere più a buon mercato di qualunque altra popolazione, che gli possiede fra i prodotti del proprio suolo. Veggasi *Woodward*, Catalogo dei Fossili, Vol. I. pag. 5.

Lo stagno è un' altro articolo, per cui ha l' Inghilterra posseduto sempremai una preminenza grandissima sopra ogni, e qualunque altra nazione. La sola Contea di Cornovaglia produce più stagno, di quello produconsi le altre parti tutte del nostro Mondo: ed è cosa oggimai a tutti notissima, che lo stagno di Inghilterra soverchia in bontà quello di ogni altro paese, non meno rispetto al suo valore, o pregio, che in riguardo alla quantità.

La miniera del piombo è somigliantemente più ubertosa, e più ricca in Inghilterra, che in ogni altra Contrada, e quivi vien trovata in copia molto maggiore, che altrove. Oltre di questo il nostro piombo si squaglia più di buon grado nel fuoco, e ricerca minor briga e fatica non meno, che spesa nel lavorarlo, di quello vogliasi qualsivoglia altro piombo: ed è, allorchè trovasi lavorato, assai più fino, e più duttile di ogni altro piombo.

Non nasce questo già da alcuna particolarità, che stanzii nel metallo, avvegnachè il piombo siusi in tutti i paesi il medesimo, allorchè stato sia bene, ed a dovere purificato nella maniera medesima; ma lo spalto, che gli giace intorno, e che trovasi mescolato colla nostra miniera piombina, è di un' indole, natura, e disposizione fissata, che viene agevolissimamente lavorato, ed interamente dividersi, e parte da esso, lasciando il metallo più puro, di quello esser potesse procurato dalle comuni grandi operazioni, che si eseguiscano nelle altre contrade; di modo che sono i forestieri, malgrado ogni loro arte, forzati a spedirlo via molto meno puro, e rimondo del nostro.

Il Rame, ed il Ferro trovansi di pari in copia grandissima in Inghilterra, e non ha guari, che sono state ridotte in uso parecchie miniere di fissati metalli, le quali non erano nemmeno conosciute prima dei modernissimi miglioramenti dell' arte chimica.

MINIERA. Non è già la scoperta delle miniere sempre, e costantemente accompagnata dalla certezza di un vantaggio. La prima cosa, che esser dee rispetto a questo punto considerata, si è, se la miniera possa essere scavata con vantaggio di chi la fa scavare; e per essere va-

lucivo-

levoli a determinarsi sopra simigliante punto, noi dobbiamo con ogni diligenza maggiore ponderare la natura, e la situazione del luogo, e confrontare il risultato del tutto col vantaggio, dalla ricchezza della miniera medesima, e dai pesi, che uno s'addossa, rispetto allo zappare, o scavare, allo sguagliare, ed a lavorare la miniera medesima.

Una miniera od è trovata in un monte, in una collina, in una vallata, od in una pianura: di queste le montagne e le colline, vengono a scavarli con agevolezza, e comodo grandissimo, massimamente perchè gli scoloj, e le tane, che è quanto dire, gli andirivieni, e meandri posson' essere in fissati luoghi agevolmente tagliati non meno col farvi scorrer l'acqua, che col formare dei rivoli, e viottoletti per condur fuori la miniera. In qualsivoglia luogo che stanzi la miniera, noi dobbiamo gittar l'occhio attentissimamente sopra le vene, che dalle piogge, o da altri accidenti, possono essere state scoperte; ed ove viene una tal vena rintracciata, qualora ella sia tollerabilmente grossa, ricca ed abbondevole, quivi è sempre buon consiglio quello di aprire la miniera. Ma il luogo migliore, prescindendo da tutto ciò, che diviso abbiamo, per iscrivere, e la situazione più comoda, ed a tutte le altre prescrivibile, non è già, nè una pianura, nè una vetta di un monte, ma le fiancate, od i lati di quello. Veggasi *Shaw*, Lezioni. pag. 244.

La situazione migliore per una miniera si è un pezzo, o sporto montagnoso, arborato, o vestito di bosaglia, sano, di una montata agevole, e sicura, e facente come parte della riva di un fiume navigabile. Conciosiachè il legname è assolutamente, ed indispensabilmente necessario per formarne le macchine, gli ordigni, e gli istrumenti, per fabbricarne delle capanne, per chiudere, e fare i necessari ripari ai lavori, e per lavorare il metallo in miniera. Ma tutto che il legname venisse ivi a mancare, se siavi in vicinanza un fiume navigabile, questo può compensarvi, conducendovelo colla vettura per acqua, che è a buonissimo mercato. Adunque l'acqua non dovrebbe mai

abbisognare. Questa faccenda viene in guisa migliore somministrata da un grosso, e copioso fiume, comechè ella si è di un'ellrema necessità in cento, e mille occasioni, come, a cagion di esempio, per lavare i metalli in miniera, per rivolgere i lavori, e somiglianti indispensabili faccende. Fa altresì di mestieri, che abbiasi tutto l'occhio ad un buon comodo di condotta, non meno per condurre il metallo in miniera, od il metallo stesso spogliato della miniera, ai Fondachi, quanto per provvedere delle cose necessarie gli operaj. Rispetto alle provvisioni, ella è cosa più rara delle mosche bianche, che trovinsi sul luogo della miniera medesima. Veggansi gli Articoli *MINARE*, *SCAVARE*, &c.

MINIO. Nell'istoria naturale de' buoni Antichi è questo il nome, con cui appellavano quella sostanza medesima, cui noi oggi addimandiamo cinabro. E' questo un minerale nativo, di un colore rosso lucente, dal quale è stato estratto l'argento vivo. Questo minerale nativo, poichè divenne di uso assai più frequente, e comune, venne incontanente contraffatto, ed adulterato, e questa frode vien condotta comunemente a fine col piombo in miniera calcinato al grado di divenir rosso; e quindi poichè le due voci minio, e cinabro furono per lungo tratto di tempo usate in comune, e promiscuamente, venne la voce cinabro dopo ad esser ritenuta soltanto per significare il minerale nativo, e la voce minio per dinotare quello adulterato col piombo in miniera; oppure la sola materia rossa adulterante, che è appuoto il fenfo, in cui seguitasi tuttora ad usare.

La voce cinabro però, per la quale essi per lo meno distinguevano, presso i più antichi scrittori delle cose mediche venne usata come un nome di una sostanza differentissima, e tutt'altra, vale a dire per esprimere un sugo vegetabile di un color rosso pieno, da noi appellato sangue di Drago, e che quei buoni vecchi per trattato ben lungo di tempo lo si credettero, e lo bevvero per vero, e genuino sangue di Draghi seccato; e quando gli antichi appellavano il corpo minerale quivi deferito pel medesimo nome, essi facevanli tem-
pte

pre a distinguere l'altro cinabro, qualunque siasi si presentasse loro l'occasione di nominarlo secondo il metodo loro usuale per mezzo di un'adiettivo derivato dal nome del luogo, onde veniva condotto, appellando *Cinabari indicum*, cinabro indiano.

Il cinabro nativo degli Antichi era a capello il medesimo de' cinabri de' nostri tempi, e veniva similmente trovato nella medesima diversità di forme. Ci dice Teofrasto, come egli era duro e petroso, e come veniva loro dalla Spagna, e di Colcide, o Colco, ove veniva prodotto infra le rupi. Veggasi *Hill*, Teofrasto, pag. 190.

Parcechi sonofi fatti a supporre dal nome di un Cinabro artefatto, che leggesi presso Scrittori assai antichi, eh' essi possedessero di pari l'arte, ed il metodo di fare il cinabro artificiale: ma la faccenda è totalmente diversa. Quella sostanza, che da essi Cinabro artefatto addimandavasi, non era, secondo il medesimo Teofrasto, altra cosa, salvo che una finissima sostanza arenosa d'un colore scarlattino, e sommamente lu'tra e rilucente, cui essi avevano da certo dato luogo particolare soltanto, che trovavasi in un Paefo sopra Efeso. Questa raccoglievanla con diligenza estrema, e riducevanla per via di fregamento, o stropicciamento in una finissima polvere, in vasi fatti di pietra, e quindi la lavavano in altri vasi di rame, oppure di legno: la materia più grossolana la sottoponevano di bel nuovo al lavoto del lavamento e dello stropicciamento nella soggia medesima della prima, di modo che per via dei divisi polverizzamenti e lavamenti più sate ripetuti venivano a separare, e disgiungere tutto il puro cinabro, il quale calava sempre, e costantemente al fondo dei vasi, lasciando alla superficie ogni e qualunque mondiglia accidentale.

Il cinabro artefatto de' buoni Antichi altro pertanto non era, se non se una particolar preparazione di un minerale nativo, il quale conteneva una data quantità di vero e genuino cinabro mescolato ed incorporato in una abbondevole quantità d'altra materia; e l'operazione medesima in nulla più consisteva, salvo che nel sem-

plicemente separarlo, e disgiungerlo dalla sua altra materia. L'invenzione di questo viene attribuita ad un certo Calliade, uomo Ateniese, il cui impiego era sopra le miniere dell'argento, e venne scoperto, siccome è avvenuto di parecchie altre cose, per mero accidente, ed a caso. Aveva costui unita insieme una vassa quantità di questa specie d'arena, facendosi il buon melone a supporre, che a motivo di suo colore, e di sua lucentezza altresì, ella contenesse dell'oro, ma tutto che ei si rimanesse deluso in questo, nulladimeno nel lavorare intorno a questa arena colla speranza di scoprirne un qualche prezioso metallo, venne a scoprirne, e rintracciarne quello finissimo, ed eccellente colore. Veggasi l'*Artic. CINABRO*, *Ciclopedia*, e *Supplemento*.

Il metodo, col quale vien fatto presso di noi il minio in grossissime masse, o quantità, è il seguente:

Abbrustolano prima questi nostri operaj il piombo in un forno, riducendolo in una specie di litargirio, a forza di continuamente agitarlo, mentre è liquefatto, con una spatola di ferro: questo dopo lo macinano in mezzo due paja di pietre, che lo mandano, o fanno passare da un pajo all'altro, avvegnachè il primo pajo di pietre macini il più grossolano, ed il secondo pajo il più sottile, ed il più fino: queste son fatte lavorare per mezzo d'un mulino, il quale muove a un tempo stesso, e tutte in una volta sei paja di pietre. Allorchè è stata questa sostanza ridotta per simigliante guisa ad una finissima polvere, vien quindi lavata, e poscia vien posta in un fornace, ove viene abbrustolita per via d'un fuoco di riverbero, per due o tre giorni, ed in tutto questo tratto di tempo senza dar mai sosta vanno agitando, e dimenandolo con una grossa spatola di ferro, attaccata, e tenuta sospesa per via di un'arpione, ed uno di ferro; e verso il terminare stanno acciappando il momento, in cui è giunto al suo adeguato colore. Quando questo è effettuato, forz'è, che il fuoco non venga portato di là da un certo dato grado, perchè la materia non s'annuoli, e venga a scorrere, e precipitare insieme. Veggasi *Ray*, *Opere Inglese*, pag. 138.

Il minio nella Medicina viene usato, e messo in opera esternamente: quello attut-
ta, e spunta l'acrimonia degli umori, al-
leggerisce e diminuisce le infiammazioni,
ed è sovrannamente eccellente nel nettare
e rammarginare le vecchie ulcere. Egli è
messo in opera in queste occasioni, in pa-
recchi impiastri, ed unguenti delle botte-
ghe.

MIROBOLANI. Ella è cosa evidentissi-
ma dalle Scritture degli antichi Greci,
che ciò che noi di presente distinguiamo
col termine Mirobolani, non era noto agli
antichi medesimi sotto questo nome; e per
avventura ciò che distinguevasi da essi con
tal denominazione, a noi di presente non
è noto: essendo i nostri mirobolani, o
marbolani una specie di prugno, o fusina,
ed il loro, siccome si era un frutto asciut-
to, o piuttosto un frutto della specie delle
noci, così i loro venivano usati negli un-
guenti profumati, ed in altre composizio-
ni, per dar loro un altro odoroso. Que-
sta variazione dal senso originale della vo-
ce, non è nuova tuttavia, e gli Autori,
che cominciarono a far ciò, sono di data
si lontana, che sembra essere stato un er-
rore di pari antico, che la stessa sostanza
di quella specie.

MISERERE. E' questa una denomina-
zione, per cui parecchi Scrittori significa-
no quel tremendissimo male appellato Pas-
sione Iliaca, *Iliaca Passio*, e ciò, che vol-
garmente addimandasi intralciamento, od
attorcigliamento delle budella. Gli Scritto-
ri delle cose mediche distinguono questo
male in tre specie, vale a dire, 1. In at-
torcigliamento interno delle budella. 2. In
Passione Iliaca dipendente da Ernia. 3. In
Passione Iliaca originata da ostruzione.

Nella specie della passione Iliaca d'in-
terno attorcigliamento delle budella, la
situazione degl'intestini in rapporto dell'
uno all'altro viene ad essere alterata e con
frequenza grandissima ha un'assai osserva-
bile raddoppiamento. Nella specie del mal
del Miserere dipendente da Ernia o sia
della specie erniosa, gl'intestini distesi,
ed allungati colle fecce, e colle flatuosità ven-
gono ad esser ricevuti entro lo scroto, oppu-
te in alcun'altra parte per sì fatto modo
che non possono essere con agevolezza ri-
condotti, e restituiti ai rispettivi loro

luoghi adeguati. Ed ultimamente nella
passione iliaca da ostruzione cagionata non
havvi altra cagione salvo la sola, e mera
violenta costipazione.

Il male del Miserere differisce dalle spe-
zie ordinarie della Colica, in grado, av-
vegnachè i sintomi tutti in questo caso
sono grandemente più violenti, e nella
sua situazione siccome l'Ilion, ed i pie-
cioli intestini in questo male sono gl'in-
taccati, ed offesi, così lo sono negli altri
casi colici attaccati, ed offesi d'ordinario
gl'intestini maggiori e più grossi, e vi
ha sempre, e costantemente un pericolo
infinitamente maggiore, che negli altri
casi, od affezioni coliche ordinarie.

Segni della passione iliaca. Sono questi
in estrema acuti, e violentissimi dolori a
traverso il bellico, un'assai osservabile an-
sietà d'animo, con frequentissimo rutte-
giare e bruciore di stomaco, ed un som-
mo calore, od ardore interno: una vio-
lentissima ostruzione nelle budella, sopra
la quale, o niuno, o pochissimo effetto
producono i clisteri; e via via, che la
truce infermità va prendendo piede, ed
aumentandosi, un vomito, il quale, qua-
lora continui, viene alla perfine a con-
durre, e spingere alla bocca gli escrementi
fecciosi, con dolori violentissimi, e con
isfinimenti frequenti: dopo di ciò, se-
mpre i medicamenti non s'accianvi testa,
vi sopravviene un'infiammazione dell'
Ilion, e quindi una suppurazione, ed in-
sieme una mortificazione, nella quale i
dolori partono in un istante, e dileguansi,
ed il paziente infelice cade in sudori ge-
lati, ed in brevissimo tratto di tempo do-
po di ciò si muore. Egli si è questo un
caso estremamente raro; e tuttochè parec-
chie coliche vengano battezzate con que-
sto nome, nulladimeno rarissime s'iate
altri incontri in una reale passione ili-
aca, o male del Miserere. Le persone però
di ogni e qualunque età, e d'ambi i sessi
vengono ad essere sottoposte al male me-
desimo ugualmente per le appresso ca-
gioni.

Cagioni del male del Miserere. Sono que-
ste od un'attorcigliamento, *circumvolutio*,
vel *convolutio intestinorum*, degl'intestini
con una infiammazione immediata o si-
vero un tumore nelle parti dell'intestino

contenute nel sacco ernioso, e l'uso di violentissimi, e potentissimi medicamenti astringenti inducenti, e cagliamanti una coagulazione così fatta, che avvenir non possa naturalmente. Le violente commozioni del sangue in saltando, in cavalcando, in precipitosamente correndo, è stato toccato con mano, aver dato alcuna fiata occasione a sì tremendo disordine, come similmente i violenti starnuti, e le forzate tosse, ed il portare de' pesi soverchio grandi; come di pari i cibi crudi, ed il palcerli di quelle date sostanze, che sono state feccate, ed indurite al fumo, ed eziandio i liquori stauosi, e fermentanti. Alcune fiata è stato dai valenti Medici conosciuto, aver' avuto questo tremendo male evidentissima origine da vermi fatti morire entro le budella, e poscia non evacuati per secesso.

Prognostici in questo male. E' questa una orribilissima malattia non meno per rapporto al pericolo grande, dal quale non va mai disgiunta, quanto pel dolore crudelissimo, che l'accompagna. In quei casi, ove la sua origine è venuta da attorcigliamento, od aggomitolamento degli intestini, poca pochissima si è la speranza d'apporvi riparo; e qualunque volta nasce da un'Ernia, ella è bene spesso nella medesima guisa fatale, massimamente se ella trovisi congiunta, ed accompagnata con un'infiammazione, e con una plethora. Lo stato suo meno truce, e più benigno si è allora quando ella dipende soltanto da fecce indurite nelle budella, e da un'ostinato coltupamento di ventre. Questa viene comunemente superata, e vinta, qualora però il dotto, e sperimentato Medico v'appressi in tempo un'adeguato riparo.

Metodo della cura. Allorchè la eagine del male del miserere si è un'attorcigliamento, ed incrocicchiamento dgl'intestini, tutti gli sforzi della medicina debbon'essere intesi a svilupparli: ma questa è una faccenda, che altri può con maggiore agevolezza concepire nell'animo, che condurla realmente ad effetto. Per venire a capo di sì difficoltoso intento raccomandano certuni l'inghiottire delle palle da schioppo, altri poi una pallottola d'antimonio, ed altri finalmente una libbra di

argentovivo, prendendo, innanzi d'avvalere questa mercanzia, una cucchiajata, o due d'olio di mandorle dolci, ed ordinando di vantaggio il moto, od a cavallo, od il camminare piuttosto affrettatamente dopo aver preso in corpo le divise sostanze. Altri sono d'avviso d'introdurre la canna di un fusiccio entro l'orifizio dell'intestino retto, e spingere il vento, soffiando, all'insù entro gl'intestini, ma siccome in quello caso l'intestino retto trovasi d'ordinario così aggrinzato, e retratto, che stenta a ricevere dentro di sé una semplice canna di un serviziale, così non havvi gran luogo da prometterse alcun buono effetto: e finalmente altri vorrebbero, che vi venisse introdotto, e spinto colà entro del fumo di tabacco. La discussione, o dilungamento dell'infiammazione è appena meno necessaria dell'altra operazione; e questa esser deve effettuata per mezzo delle polveri di nitro, di cinabro, e d'occhi di granchi, che dovranno prendersi dal paziente immancabilmente quattro volte il giorno, come anche con stropicciare tutta la regione dell'addome con dello spirito di vino canforato, entro il quale sia stato in infusione lo zafferano: possonsi di pari con buono effetto applicare all'addome medesimo de' sacchetti d'ingredienti carminativi insieme con della canfora. Ed ultimamente, se vi sia un'abito pletorico, la cavata del sangue è un'operazione sommamente necessaria, e realmente indispensabile.

In quei casi, ne quali questa fatalissima infermità riconosce per trista sua madre un'Ernia, il primo passo, che dee farsi rispetto alla cura, si è quello di tentare il riallogamento dell'intestino nella sua propria sede. Per ottenere questo è giuoco forza, che il paziente si distenda supino giacendo sopra la sua schiena, e converrà poscia applicare alla parte delle fomentate carminative composte di decotti di malva, di fiori di camomilla, e di semi d'anacio, di sinocchio, e di fenogreco, fatti tutti insieme bollire nel latte; ed allorchè non havvi infiammazione, le fomentate di siffatta specie possono essere applicate a foggia di cataplasma, per mezzo d'intuppate una spugna dentro questi decotti.

Fff

Suppl. Tomo III.

ecti, e d'applicarla similantemente all'offesa parte. Sendovi poi l'infiammazione, oppure per impedirla, dee il valente Medico farvi testa, e dilungarla a forza di medicamenti nitrosi, e per mezzo di blandi, gentili, e soavi diaforetici, e tosto che l'intestino sia ricovrato al suo luogo, fa onninamente di mestieri, che vengano applicati al paziente più, e più clisteri, e quello a fine di indurre di nuovo nelle viscere e negl'intestini un' adeguata bassetta.

Allorchè il brutto caso non riconosce altra origine, che un' induramento delle fecce, dovranno quegli alla bella prima prescrivere, da prendersi internamente, i medicamenti nitrosi, e cinabrin, a fine, o d'impedire, o di dileguare, un' infiammazione, e nell'atto, e tempo medesimo dovranno quegli applicare dei clisteri di decotti emollienti, entro ai quali siavi mescolata una porzioncella di nitro, e di canfora, con alquante goccioline d'olio: ed in evento, che venga riputato necessario per eccitare un più efficace stimolamento, potranno quegli aggiungere un' adeguata porzione di sapone di Venezia. Dovranno similantemente introdurre nell'intestino retto delle acri supposte, ed alla regione dell'addome dovranno applicare un' impiastro di sapone Veneziano, ed eziandio dovranno l'addome stesso ben bene strofacciare, e sfregare con ottimo spirito di vino canforato. Potranno di pari applicare ben caldi de' sacchetti ripieni d'ingredienti carminativi, ed ove lo stato del paziente è pletorico, rendesi indispensabile la cavata di sangue.

Sono questi i metodi generali, e per lo più nei casi più benigni, o l'uno, o l'altro di questi riesce a bene, e produce il sospirato buon'effetto. Ma dee essere onninamente osservato, come il miele, tuttocchè da certuni con franchezza venga prescritto, non dee essere in verun conto posto in questi clisteri, avvegnachè ove siavi un' attuale infiammazione, o abbiavi, siccome vi ha pur troppo d'ordinario, una disposizione alla medesima, il miele vi promuove delle suppurazioni. I clisteri di comune acqua calda, con del sale, sono stati sperimentati produrre talvolta degli ottimi effetti. Il paziente dee essere man-

tenuto caldo durante il corso della brutta malattia, e la dieta dee essere in estremo parca, e ristretta, tuttocchè debbasi allargare la mano rispetto alle bevute calde. Veggasi *Juncker*, *Compend. Medic.* pag. 574. & seq.

MISLETOE. Egli è stato formalmente supposto, che il *misletoe* fosse prodotto non altramente, che una specie particolare d'escrescenza dell'albero, sopra del quale vien trovato: ma il tempo, e le esperienze hanno fatto toccar con mano, come questo cresce, e vien su non altramente che le altre Pianta, vale a dire, dal suo seme. Le sue coccole sono di una natura viscosa, e siccome attaccanti, ed impanianti al becco degli uccelli, che le mangiano, così questi nettandosi, e stropicciandosi il becco medesimo ai rami d'altri alberi, quivi s'attaccano, e gettavi le radici, e vegetarvi bravamente. Questo però non è in verun conto necessario per la loro propagazione, conciossiachè le moltissime congerie di piante del *misletoe* trovate comunemente sopra gli alberi medesimi, sembra, che provino con ogni evidenza maggiore, il *misletoe* esser prodotto dal cader che fanno i suoi semi, non altramente, che le altre Pianta tutte, ma che la matrice per questi semi non è già la terra, ma bensì i rami di un'albero vivente.

Gli alberi, sopra i quali il *misletoe* viene principalmente trovato, sono i frassini, ed altri alberi di buccia liscia. Radissime volte vien trovato sopra le querce: e tuttocchè questo possa essere con ogni maggior facilità propagato sopra altri alberi, nulladimeno non è stato osservato giammai, che alligni, e faccia intera presa, e perfetta crescita sopra la quercia. Veggasi *Müller*, *Dizionar. de' Giardin.*

Diessi a credere Aristotile, che il *Misletoe* non fosse una Pianta prodotta dal seme, ma una semplice, e mera escrescenza di quegli alberi, sopra i quali veniva trovato, e questa escrescenza prodotta o da uno stravasamento dei sughi nutritivi dell'albero stesso, oppure da una traspirazione degli stessi sughi, e moltissimi Antori, che di questa ragionarono, e scrissero, portarono l'opinione medesima. Ma Teofrasto, e Plinio furono d'av-

d'avviso, ch'ei dovesse la sua origine ai semi, ma si fecero a credere, essere necessario che quelli passar dovessero prima per le viscere di un uccello, affinchè esser potessero in istato di dilatarsi, e di vegetare.

Sono i semi del misletoe così morbidi, e soffici, che altri immaginerebbero agevolmente, che stati fossero digeriti dallo stomaco di un uccello. I Bolognesi però hanno osservato, che questi semi sono evacuati intieri; ma non vi ha la menomissima necessità di supporre, che passino a siffatto stato, affinchè possano germogliare. Il tanto benemerito delle scienze Signor Malpighi ha descritto con una perfezione inarrivabile i semi del misletoe. Dice questo Valentuomo, che questo germoglio col gittar fuori da due de' suoi angoli due corna; e l'osservazione a capello la stessa è stata fatta similmente dal Camerario. Ma la storia prima regolare che noi abbiamo dell'alzarli grado per grado del misletoe dai semi in Pianta, è dovuta al solo valentissimo Monsieur Ray, il quale dice, essere stata fatta da Monsieur Duody. Il frutto del misletoe sono certe cocole morbide, e soffici tondeggiate, attaccate per mezzo d'assai corto gambo al fondo d'un calice carnosio. Quella porzione della cocola, che trovasi opposta a questo gambo, o picciuolo, è alcun poco piatta, e può esservi agevolmente veduto un picciolissimo corpo scuro lucente d'una figura ovale, che è appunto quella parte del pistillo appellata dall'incomparabile Linneo lo *Stigma*; ed intorno intorno a questo stigma vi sono quattro contrassegni, o marchi bislungi, che mostrano i luoghi, ove erano attaccate le foglie del fiore. La buccia del frutto è sommamente liscia, e levigata, trasparente, e fissa, ed in esaminandola col microscopio, vien veduta piena zeppa di vasi prodotti dal gambo, e l'uovo coll'altro formanti spesso anastomosi. Dentro di questa stanza il seme tutto rinvolto, ed inzavardato entro una materia viscosa, e d'una forma piatta, e d'un colore verdastro. Questi semi vengono a rimaner disgiunti da questa materia viscosa più agevolmente coll'esser messi in mole nell'acqua tepida, e vengon trovati il più delle volte di figura triangolare, ed al-

cuna volta anche di figura ovale.

Allorchè una cocola di misletoe è infranta, e rotta di contro alla scorza, o corteccia d'un'albero, la materia viscosa, che velle, e circonda il seme, si stende in una grossa, e ben fissa pellicina, la quale velle, e circonda per ogni parte il seme, e tienlo fermo, sicchè non possa cadere e staccarsi dalla corteccia medesima: ma frequentissimamente le piogge staccano, e fanno scorrer via tutto dopo, massimamente quando questi semi son caduti sopra la parte più liscia, ed uguale della corteccia dell'albero, oppure sopra quelle date parti di un'albero, che trovansi nette, e ben rimonde dal muschio, o somiglianti. E quindi è appunto, che moltissime delle Pianta del Misletoe, che noi troviamo, o le troviamo sopra la parte inferiore del ramo d'un'albero, donde la pioggia con tanta facilità non può staccarle, e portarlesi via, oppure sopra li fatti rami, che abbiano una buccia ruvida, e come scannellata, oppure sopra quelle date parti di un'albero, che trovansi coperte, e vestite dei muschi comuni degli alberi.

Determinossi Monsieur du Hamel d'investigar la natura di questa mal messa e sgarbata pianta: collocò egli a questo effetto varj semi della medesima entro picciole intaccature, cui avea egli fatte nelle cortecce d'alberi di specie differente, tagliando cioè dei tasselletti di buccia dalla parte riguardante il suolo, e facendo, che i tasselletti, o liste di scorza tagliate rimanessero attaccate dalla parte riguardante la vetta dell'albero, e ciò affinchè l'acqua non potesse portarsi via i semi medesimi; e tutti questi semi riuscirono egregiamente bene, e gittarono il loro germoglio a riserva di quei soli, cui egli piantato avea sopra il fico, sopra del quale fece quel Valentuomo moltissimi inutili esperimenti: La cagione di far perire questi semi, o di toglier loro la facilità vegetante, si fu probabilmente quel fugo lattiginoso, o sia il lattificio di quell'albero.

Essa non è maraviglia, che il misletoe cresca, e venga su di pari sopra qualsivoglia albero, avvegnachè per farlo vegetare, e crescere null'altro richieggiasi, che

l'effetto delle piogge, e delle guazze notturne: e quello Autore ebbe a trovare, che i semi germogliarono nei vasi di terra cotta, e fra le pietre, cui egli conferuò all'ombra lontani, ed a coperto del calor del sole; e da somigliantissime esperienze egli apparve altresì, che la traspirazione degli alberi ajuta, e promuove grandemente il germogliamento di questi semi.

I semi del misletoe seminati, se ci sia lecito il così esprimere, sopra le cortecce degli alberi nel mese di febbrajo, gittano il tallo, e germogliano soltanto nel mese di giugno, ed in questo tempo veggionvisi due piccioli corpiccioli rotondi scappanti fuori da due angoli dei semitriangolari: ma siccome questi semi per rapporto alla loro figura sono soggetti ad alcuna irregolarità, così diporansi somigliantemente colla irregolarità medesima nel lor vegetare, e germogliare, conciossiachè da un seme di figura ovale forge fuori un solo tallo, o rampollo, e da quelli, che sono irregolarmente angolari, ne forgono alcuna fiata quattro, ed anche cinque.

Caduno di questi corpiccioli tondeggianti è attaccato ad un gambo, o picciolo, che ha la sua inferzione nella parte carnosa, o polputa del seme, nel quale trovavisi una specie di scannellature, o solchi, lor che fa comparir la cosa non altrimenti che questi gambi, o piccioli venisser fuori, e sorgessero da una specie di guaina, o di cala.

Siffatta specie di germogliamento è particolarissima al misletoe, avvegnachè niun altro seme non mandi mai fuori altrettanti talli. Quei talli o barboline sono somigliantemente trovate con molta frequenza di lunghezze differentissime, tuttocchè procedano, e vengano fuori da un medesimo seme, nè compariscono, nè fanno veder tutte in un tempo stesso, ma sembra che vegetino differentemente e distintamente.

La lunghezza di queste barboline è in grandissima parte dovuta alla posizione del seme sopra il ramo dell'albero, avvegnachè sempre e costantemente crescano in lunghezza, fino a che raggiungono la corteccia, di modo che, se il seme venga per sì fatto modo collocato, che il germoglio scap-

pi fuori ferrato all'albero, egli viene ad essere proporzionalmente corto; ma s'egli avvenga, che s'avanzi dalla parte superiore del seme, egli volta, e cresce in lunghezza fino a tanto che viene a raggiungere la corteccia, alla quale dee esser fissato.

Volendo Monsier Du-Hamel sperimentare quanto mai potesse esser condotto innanzi questo allungamento della barbolina, collocò due semi di misletoe, i quali avevano già gittato il tallo, e germogliato, sopra un picciolo sostegno, alzandogli, o tenendogli sollevati dal ramo dell'albero. In uno di fissati semi fu voltata la lunghezza verso il ramo, quantunque in una distanza non naturale, e nell'altro venne diretta in un corso totalmente contrario. La conseguenza di questo esperimento si fu, che il primo germoglio fece una crescita in lunghezza il doppio maggiore della lunghezza sua naturale, e quindi la negrezza del corpicciuolo rotondo verso la sua estremità venne a mostrare, che andava a male, e periva; e dopo di un tal fenomeno il germoglio non venne più innanzi, e cessò di crescere; l'altro seme rivolse il suo germoglio all'indietro al sostegno, e quivi fissandosi, però totalmente per mancanza di nutrimento. In altra esperienza facendo un foro nel ramo di un noce, appunto allorchè la barbolina di un seme di misletoe trovavasi a tiro, venne a cagionare, che la barbolina medesima crescesse il doppio di più della sua lunghezza naturale, e finalmente ella raggiunse il fondo del foro, e quivi attaccossi, fece presa, e produsse una pianta vigorissima. Dee esser somigliantemente osservato per rapporto al germogliamento di questi semi, come essi sono i fusi, nei quali la barbolina prende indifferentemente ogni, e qualunque direzione, dove per lo contrario in tutti gli altri semi ella prende la sua direzione dirittamente all'ingù. I semi del misletoe gitteranno il tallo, germoglieranno, e verranno innanzi nei lati superiore, ed inferiore del ramo di un albero, e quei, che saranno presa nel lato superiore del ramo, piegheranno le loro barboline all'ingù, mentre quelli, che saranno presa sull'inferior lato, stenderanno nel caso

me-

medesimo le loro direzioni all'insù.

Le barboline del misletoe, siccome è stato già accuratamente osservato, sono composte di un picciolo corpicciuolo rotondo sostenuto da un gambo, o picciuolo. Quando questo picciuolo è cresciuto, od arrivato ad una fissata lunghezza, che il corpicciuolo arrivi a toccare la corteccia del ramo dell'albero, apresi prima in una configurazione dei tronchi delle mosche, o di altri insetti, e per similgiante modo toccando ferratamente, e strettamente in tutti i suoi contorni, od affilature, viene a rimanete validissimamente attaccato all'albero. Da questa rassomiglianza rispetto alla sua forma ai tronchi, o torli di piccioli animaletti, il valentissimo Dottor Du Hamel ebbe a chiamare queste barboline medesime i tronchi, o torli del seme del misletoe. Le estremità di questi tronchi delle barboline sono similgiantemente attaccati alla corteccia dell'albero per mezzo di una materia viscosa, la quale, allorchè il tronco venga con bel modo, e gentilmente a'zato, tira seco tutti i lati per ogni, e qu'unque verio ad alcuna data lunghezza.

Nella parte interiore di questo tronco, o dir lo vogliamo gemma, o bottone sbocciato, ed aperto, trovansi due sostanze, che debbon'essere onninamente distinte: nel centro stanza certa materia bianca granellosa ed intorno intorno a questa altra materia verdaitra: ambedue queste sostanze sono suse, ma la materia superiore è meno tale della parte bianca centrale: l'esserior sostanza è evidentemente la medesima della buccia esteriore della radice del misletoe, o sia la seconda buccia del suo tronco. Sì l'una, che l'altra di queste due divise sostanze rimangono vivacissimamente attaccate all'albero, avviticchiando in esse le loro parecchie granellature, e queste poi somministrano le radici tutte del misletoe. La buccia, o corteccia esteriore del misletoe è sottilissima, di un color verde carico, ed alcun poco ruvida; ella si è questa alquanto più gagliarda, e resistente di quella buccia, cui ella cuopre; e questa non viene ad essere estesa alle radici della pianta, ma spandesi al di sopra della corteccia dell'albero nel fondo dello stelo, o

gambo, appuno come fanno il corallo, e le altre piante marine sopra le pietre. La materia viscosa, per mezzo della quale il tronco si attacca all'albero, è somministrata da tutte le parti della buccia, ma principalmente dalla sua buccia esteriore, e non è in conto veruno dovuta ai fughi dell'albero, avvegnachè ella venga trovata di pari in copia abbondevolissima sopra quelle barboline, che sono state fatte attaccare alle pietre, e a quelle che sonosi attaccate ai rami degli alberi. In brevissimo tratto di tempo questa materia fissa questi tronchi validissimamente: ma ella si è cosa osservabile, che quantunque la buccia esteriore, o contorni di queste pallottoline aperte, rimanga tutt' all'intorno attaccata alla corteccia dell'albero, le granellature della sostanza interiore, sempre, e costantemente prendono la strada delle ferepolature, e spaccature della corteccia dell'albero, ed in quelle si innanzano. Mentre i semi del misletoe trovansi in questo stato, possono benissimo essere trapiantati in altri luoghi, e piantati, per così esprimerci, sopra altri alberi, e radissima si è quella volta, che non s'attaccino, e non faccian presa.

I semi di questa pianta posson'esser fatti germogliare sopra le pietre, e s'isleranno bravamente nelle medesime i loro tronchi; ma ivi naturalmente in tratto breve di tempo periscono: possono esser però tolti da queste pietre, e piantati sopra i rami degli alberi, subito che abbiano fatto presa, e sienosi filati, come divisammo; ed allora trovandosi in uno stato da poter prendersi il necessario nutrimento, si s'isleranno, ed attaccherannosi all'albero, e dai fughi di quel cominceranno a venir su, e crescere immediatamente.

Egli è stato con somma naturalezza supposto da coloro, i quali si pensavano, che il misletoe non fosse una pianta perfetta, che questo misletoe non avesse radici: ma eziandio quei medesimi, i quali concedevano, che è una pianta perfetta, e vengente su dai suoi rispettivi semi, si fecero di pari a supporre, che non avesse radici. Il Malpighi però afferma, come è cosa indubitata, ed innegabile, che
il

il mistetoe ha la sua radice; ed il Tour-
sforti tiene similantemnte questa me-
desima opinione; ma nè l'uno nè l'altro
di questi due sommi Autori non ce l'han-
no perfettamente descritto.

In quella parte del ramo di un'albe-
ro, in cui vi rn su, e vegeta il misle-
toe, vieni sempre, e costantemente of-
servato una grossizza, e la corteccia è
perpreuamente in parecchi luoghi tagliu-
zata. Ma le radici del mistetoe non pos-
sono per verun modo esser vedute esten-
samente, venendo a rimanere occultate,
ed ascose non meno dalla corteccia dell'
albero, che per l'espansione della bu-
cia, o scorza della pianta stessa nel fon-
do. A fine pertanto di scuoprire, e di
rintracciar le radici, rgl si è necessario
l'alzar con diligenza estrema, e per ac-
concio modo, non meno la corteccia del-
la Pianta, che la scorza dell'albero; ma
la durezza di queste cortecce, ed il loro
trovarsi tenacissimamente attaccate alle ra-
dici rende la faccenda sommamente diffi-
cultosa; nè vi ha, a dir vero, modo nè
verso di riuscire nel tentativo, se non
facciassi bollire questa parte nell'acqua, e
se non si facciano delle diligenti, ed ac-
curate sezioni della medesima, prima che
venga a raffreddarsi. Per simigliante mez-
zo la buccia del mistetoe, e la scorza
dell'albero, vengono agevolmente a sol-
levare, e le radici del mistetoe vengono
rinvenute in parte incastrate per entro la
corteccia, ed in parte entro la sostanza
legnosa del ramo dell'albero.

E' la corteccia degli alberi una sostan-
za composta di vari lrti, o dire gli vo-
gliamo strati, il superiore, od esterno dei
quali è estremamente sottile, e gli altri,
i quali sono più grossi, e più faticci,
vengono ad esser formati dalla estensione
delle fibre legnose, le quali scorron giù,
e portano per lo lungo in una particola-
re spezie di rete, le cellule della quale
son ripiene di una sostanza parenchima-
tosa. E' questa la struttura di tutte le scor-
ze, o cortecce degli alberi, a riserva del-
la sola prima, od esteriore sottilissima: ma di
queste cortecce, quelle sono sempre, e
costantemente le assai grosse, ed abbon-
devoli, e ricche, le quali trovansi più

internate, e più vicine alla sostanza le-
gnosa dell'albero.

Ella si è cosa osservabile, che quando
un insetto ferisce, o fora la corteccia di
un albero, od una pianta, vi ha sem-
pre una derivazione maggiore dei fughi
alla parte forata, o ferita, che alrove, e
quindi è che vengansi in quelle date parti
foracchiate a formare delle gallorzoie, od
altre simiglianti escrescenze, e tubercoli.
Questo appunto sembra essere anche in ciò
il caso medesimo, e l'applicazione del tron-
co del seme del mistetoe, e la penetra-
zione drlle sue radici, sembra essere si-
migliantemente, il ferire la parte tanto,
che basti a cagionare, e produrre nella
maniera stessa una derivazione di una quan-
tità abbondevolissima dei fughi medesimi
pel nutrimento della tenera pianterella.
E siccome le radici internansi, e fanno
una presa più profonda, così vieni fatto
uno sfravamento maggiore dei fughi dell'
albero, e per conseguente vieni di ne-
cessità formata una spezie di tumore.

Frà le parecchie radici del mistetoe,
havvene alcune, le quali si stendono fra
le parti più abbondevoli di sugo della cor-
teccia, ed altre poi, le quali penetrano
entro la sostanza legnosa, o legno del ra-
mo. Quelle spondonsi, e dilatansi agevo-
lissimamente per ogni, e qualunque ver-
so, siccome queste sono appunto formate
in quel tempo, in cui l'albero trovasi
ben provveduto, e veramente pieno di sa-
go, che volgarmente diceasi l'albero è in
lucehio.

Egli è stato da parecchi supposto, che
le radici del mistetoe penetrassero la so-
stanza legnosa dell'albero; ma tutto che
sembri, chr le apparenze favoriscano gran-
demente un siffatto sistema; nulladimeno
egli è più che certo, la faccenda accade-
re diversamente. Le radici delle tenere
pianterelle, allorchè son passate, ed han-
no penetrato prr tutte le lamelle della
corteccia, giunte che sono alla sostanza
legnosa, tornano indietro, e si fermano;
in quella stessa stessissima maniera appun-
to, che fanno le radici delle piante, al-
lorchè nel loro viaggio s'imbattono in pie-
tre, od in cosa simigliante, e vannosi al-
largando, diramando, e spondendo oriz-
zon-

zionalmente fra la corteccia interiore, ed il legno, oppure tornarsi ancora a rimontare verso la corteccia, la sciolta, e sugosa natura della quale trovasi più proporzionata, ed acconcia, per somministrar loro il nutrimento, di quello sialo, ed esser lo possa la dura sostanza del legno. Egli è vero, che nel fare le sezioni dei rami, ove vengono su, e vegetano le vecchie piante del misletoe, vengono a ricovrare delle radici, a dir vero, alcune volte eziandio dei legnosi steli della pianta asfondati nella materia del duro legno; ma questo è meramente, ed unicamente dovuto all'interiore corteccia del ramo, la quale divenne legnosa da quel tempo, che vi penetrarono le radici, non già, che le radici si facessero la loro strada entro quella sostanza, che nel tempo di loro penetrazione trovavasi attualmente legnosa.

Vengono di pari trovate costantemente delle congerie d'escrescenze legnose, similantissime a porri, gozzi, e bernoccoli intorno a quel dato luogo, ove vien su, e vegeta il misletoe: e questi vengono ad esser formati non altrimenti che le gallozzole legnose prodotte sopra gli alberi per le punture degli insetti po' anzi divise, da uno stravalamento dei fughi legnosi. Queste formano il rigonfiamento intorno a quella parte del ramo ove vien su il misletoe, e queste escrescenze, via via, che divengono legnose, e che gonfiano intorno alle radici, servono a cuoprirle col legno duro, il quale stare non farebbono in conto alcuno valevoli a penetrare. Queste tendono bastantemente probabile che le radici del misletoe non penetrano il duro legno; ma ciò, che prova assai più evidentemente, che così va la bisogna, si è, che le i rami degli alberi pieni di piante di misletoe vengano tagliati, e spaccati in direzioni varie, appunto nel luogo dell'infezioni, e congiungimento della pianta, i parecchi circoli anulari del legno vengono perentro trovati perfettissimi, regolati, e nel totale stato loro genuino naturale, eusi bene, come se il ramo si fosse già formato nel tempo, che il misletoe girò sopra esso ramo le proprie radici. Quelle radici mostrano l'età del ramo in quel dato tempo; ma sopra que-

ste hannovi sempre parecchie altre lamelle, che sono appunto ciò, che essi formano, fin dal tempo che ivi cresceva, e veniva su la piantarella del misletoe; e quelle, che erano state formate fuori delle lamelle interiori della corteccia, io cui le radici del misletoe fatte avevano moltissime ferite, e grandissimi stravalamenti dei fughi, vengono trovate, tuttochè legnose, piene zeppelle delle radici medesime della pianta, e sono sommamente irregolari, e piene di bernoccoli, che vengono appunto cagionati, e prodotti da questi stessi stravalamenti, non apparendo in vettura conto simiglianti ai circoli anulari del legno formato innanzi. Le fibre legnose nell'esteriore, o sia il legno già formato, sono dislese in direzioni sommamente irregolari, e le radici del misletoe in fra essi possono agevolissimamente distinguere dal loro colore.

Il misletoe, siccome la corteccia, in cui le sue radici erano sparse, induritesi, e divenute legno, troverebbonsi nello stato di un'albero piantato in un terreno il quale grado per grado petrificasse intorno ad esso, e per conseguente, che lo facesse di necessità perire: ma la natura ha provveduto al suo mantenimento in casi simiglianti; e conciossiachè, siccome queste radici trovansi imprigionate nel legno, e vieni formata una nuova corteccia dal succhio dell'albero, così il tronco del misletoe manda fuori una nuova serie di radici, le quali spandonsi, e si dilatano per questa nuova corteccia in guisa somigliantissima alla prima; di modo che, quantunque una pianta di misletoe abbia eziandio altrettante serie delle sue radici incorporate perentro la dura sostanza del legno, dalla quale non può trarre ombra menoma d'adeguato necessario nutrimento, ne ha però bastantemente alcune di queste radici bastevoli pel suo sostentamento, sparse, ed attaccate sulla corteccia di nuovo formatasi.

E' il misletoe assai frequentemente trovato in questo stato; nè, a vero dire, noi ci dobbiamo fare a supporre, che quantunque il legno non sia valevole a somministrare tanta copia di sugo, quanta ne può somministrare la corteccia che non gliene somministri nè poco, nè punto; conciossiachè le radici della pianta non petrifica-

riscano, allorchè hanno penetrato quella follanza dell'albero, la quale dopo diviene perfetto legno: «ziandio allorchè trovansi nello stato suo più duro esse radici seguitano a rimanersi perfette; ed in uno stato di vita, e senza ombra menoma di dubbio, tuttchè non somministrano alla pianta una gran porzione di nutrimento, per lo meno gliene somministrano alquanto poco. Altra cosa grandemente osservabile in quelle piante di misletoe, molte delle radici delle quali trovansi stanziate nel duro legno, si è, che le radici sparse, e diffuse per la corteccia, hanno bene spesso un'assai grosso bernoccolo nelle loro estremità, il quale è con ogni probabilità fornito di buon numero d'aperture e passaggi per ricevere i fughi, dei quali esser dee nutrita la pianta, e che vengono a servire il luogo d'altrettante radici.

Trovansi, a vero dire, alcuna fiata delle piante di misletoe, le quali pienamente, ed interamente vivono, e mantengono pel nutrimento, che ricevono dal legno: sono quelle nello stato degli innesti dei comuni alberi da frutto: ma queste piante di Misletoe sono rarissime; ed è pressochè un miracolo, che una pianta di misletoe faccia presa, e riesca, allorchè vien tentato il cimento di propagarla col metodo comune dell'innestatura, tuttchè le piante medesime del misletoe con somma facilità esser possano propagate, o per meglio dire, innestate coll'unir l'una all'altra, o per via d'avvicinamento, *per juxta positionem*.

Altra circostanza degna di tutta l'osservazione, si è, che quantunque alcune piante di misletoe sieno state trovate venir su, e vegetare, e crescere a maraviglia bene colle loro radici aderenti soltanto al legno, nulladimeno generalmente il legno riesce alle piante medesime fatale, e mortissime piante di misletoe sono state trovate morte, ed appassite col solo essere la parte legnosa dell'albero ascisa su, e formata in una specie di porro, o di bernoccolo, intorno ad esse, e per via di ferrare tutt'all'intorno il loro stelo, impedendo loro qualsivoglia comunicazione colla corteccia, per mezzo di gettare nuove radici. Questo comunemente avviene allorchè le piante del misletoe son debo-

li, e che il ramo, sopra del quale essa vegeta, è gagliardissimo, e sommamente vigoroso: siccome per lo contrario, quando le piante sono vigorosissime, e picene di rigoglio, e che il ramo dell'albero è debole, e dilagino, nel qual caso le radici d'una grossa pianta di misletoe alcuna fiata penetreranno tutta intorno la corteccia, e prenderannosi, e tireranno a sè tutto il nutrimento, il ramo medesimo verrà a perire, e marcirsi: ma il misletoe in questo caso non è valevole a supplire il luogo della parte assamata del ramo medesimo, ma tutta la parte rimasta del ramo stesso si muore per lo lungo fino al tronco del suo albero, ed il misletoe per conseguente perisce di conserva con esso ramo.

Tuttchè sia evidentissimo, che questa pianta venga ad essere propagata pel suo rispettivo seme, nulladimeno ella propaga di pari bene spesso per via di talli, e non è cosa rara il trovare dei giovani rampolli della larghezza d'un dito, o due scappanti fuori dai vecchi germogli. Quei Giardinieri, che hanno cari i loro alberi, sono in estremo diligenti nel distruggere le piante del misletoe dai medesimi, e queste fanno essi con somma proprietà, avvegnachè sia chiaro, da ciò che finora divulgato abbiamo, più della luce del sole, che il Misletoe defrauda l'albero, sopra di cui s'attacca, vegeta, e cresce, d'una parte grandissima dei suoi fughi nutritivi. Il metodo comune pertanto di troncar via le piante del Misletoe per tale effetto, non si è in veruna maniera bastevole; avvegnachè i gambi vecchi mandino fuori assai sovente dei nuovi rampolli, e le radici sommoistrano dei talli, di modo che il caso diventa, e fa più peggiore di prima. A vero dire, altro modo non havvi di distruggere questa pianta, salvo che tagliando via insieme con essa una parte del bernoccolo, ch'ella forma nel ramo ov'ella cresce.

Le radici del Misletoe, mentre son giovanette, son verdi, tenerissime, e granellose, come lo si è similantemente la corteccia delle radici più vecchie; ma queste hanno dentro di sè un filamento legnoso. Non sono quelle regolarmente tondeggianti, ma assai sovente son piatte, e compresse.

preffe, e d'ordinario adattate nella loro forma e configurazione, e proporzionate a quel dato luogo, ove trovansi stanziate: intorno poi alle loro inserzioni ella non è cosa rara il ravvisarvi una specie d'allungamento della loro buccia, la quale si mescola, e s'immischiava colla corteccia dell'albero, sopra del quale allignano, e vengono su.

L'effusione, od espansione delle ramificazioni del misletoe è assai più lenta di quello sìalo l'effusione, o erefeita delle radici del medesimo. Il primo anno, e bene spesso il secondo eziandio l'pendono questi rami tutto intero nel lor primo germoglio, e nell'alzarli in una positura dritta, ed assai fissa fixe un'operare similante riesce loro fatale.

I semi, siccome già qui innanzi offerivamo, s'attaccano, e fanno presa sopra i rami dell'albero per mezzo, e coll'ajuto di quel sugo viscoso, ed impaniante, che contienfi entro le cecole della pianta. Le barboline quindi prodotte affiggonsi per via del bottoncino concavo, che trovasi nella loro estremità, alla corteccia dell'albero; e l'altra estremità delle medesime trovandosi tuttavia tenuta ferma e legata nel seme, tutto il tratto viene a formare una specie d'arco. Allorchè il bottoncino terminante la barbolina ha girato bene la sua radice, ed approfondata nella corteccia dell'albero, e che già comincia ad inviare copia abbondevole di sugo nel suo picciuolo, il qual picciuolo esser dee lo stesso o tronco della stessa pianta, la quale va tratto tratto, e gradatamente separandosi e sciogliendosi dal seme; e questa riesce assai frequentemente un lavoro di malagevolezza grandissima; avvegnachè trovandosi il seme tenacissimamente attaccato, a motivo della sua materia impaniante e viscosa di presente seccatosi sulla corteccia dell'albero, tien fissa all'ingù l'estremità del gambo, o stelo per modo, che bene spesso non riesce bastante la forza, e facilità innalzante della pianta stessa a vincere questa pressione, e così rimanvi nella divelta sua forma arcuata, e perisce; e frequentissimamente l'estremità aperta e sboccata vien cacciata e spinta via dal suo ritegno sopra la corteccia dalla resistenza; e così la tenera piantarella si muore.

Supp. Tom. III.

Quei rampolli che sorgono, e vengono su soli, e semplici da semplici semi, con frequenza grandissima rimangono distrutti in questa attaccatura: avvegnachè essi soli far debbano testa alla forza di tutto il seme, che lor s'oppone: e qualora vi riescano, l'alzan su, e le lo conservano nella loro estremità attaccato: ma ove il seme medesimo manda fuori tre o quattro barboline, queste tentano, e fanno forza d'alzarli per altrettante direzioni diverse, e loppa, o vesta del seme viene d'ordinario a rimaner lacerata dagli sforzi di quelle, in tre, od in quattro pezzi; ed ogni e cadauna barbolina portanco la rispettiva sua porzioncella sulla vetta, diviene una pianta da sé, e distinta. Sembrerebbe da ciò, che i lobi seminali fossero necessarii alla crescita della tenera piantarella; ma ciò non avviene in conto veruno; conciossiachè se i gambi, o picciuoli delle varie barboline vengano troncati, mentre trovansi attaccati al seme, non impediscono d'un menomo che, nè intristiscono tampoco la crescita della piantarella medesima.

Ella si è una circoscritta in questa pianta sommamente singolare, che i suoi semi producano separatamente varie piantarelle. Siffatta proprietà non è da verun altro vegetabile polliduta. Egli si è vero però, che sono stati veduti due nocciuoli giovanetti sorgere, e venir su da una sola, e medesima nocciuola: ma noi sappiamo però, eh' entro un medesimo guscio d'una nocciuola trovansi bene spesso due mandorle, o semi: dove per lo contrario un solo, e semplice seme vien contenuto entro una cecola del misletoe, e per quanto venga eliminato, ei comparisce d'una semplicissima struttura uniforme, tuttocchè non abbiavi ombra di dubbio, essere il medesimo seme composto secondo il numero delle tenere piantarelle, cui egli produrrà, di tre, di quattro, ed anche di più semi perfettissimi.

Allora quando il seme della tenera piantarella del misletoe si è liberato nella sua estremità della loppa, che lo vestiva, e che si è innalzato all'insù, vien rilevato, com'egli viene a terminare nella sua estremità in un bottoncino, o specie di gemma somigliantissima a quella degli altri rampolli, che contengono le foglie.

Ggg

Que-

Questo bottoncino però rimansi non alterato tutto il suo primo anno, ed alcuna fiata anche tutto il decorso della seconda annata di sua età: nella vengente Primavera compariscono nel bottoncino due foglie, e nelle ale di queste due foglie veggonvi due altri bottoncini: ed indi ad alcun tratto di tempo da questi bottoncini, o gemmette medesime spuntan fuori i rami terminati comunemente da due, ma talvolta anche da tre foglie. Sono queste il prodotto del terzo, e del quarto anno: in tutti gli anni poi, che vengon dopo successivamente, formansi de' nuovi bottoncini nelle ale medesime delle foglie, e le ramificazioni da essi dipendenti allargansi, e si spandono con tanta regolarità, che con grandissima frequenza l'arbutto, o pianta tutta presa insieme viene ad essere d'una forma, o figura regolarmente rotonda.

Le foglie vecchie ingialliscono, e cadon giù dalla pianta, ed in luogo d'esse foglie cadute non ve ne forgon già delle nuove, di modo che i gambi vecchi, e per conseguente tutta la parte inferiore della pianta rimansi nuda, e le foglie trovansi unicamente sopra la circonferenza della pianta medesima crescendo sopra i ramuscelli giovanetti.

Ella si è un'osservazione degna d'essere rilevata, e considerata, che cadaun bottoncino del misletoe contiene i rudimenti, o sia la tessitura prima, e modello di tre giovani ramificazioni, e quindi ciaschedun nodo, o nocchio dovrebbe esser guernito di sei rami; e questo anche avverrebbe, ma varj dei ramuscelli giovanetti muojonsi per lo più o prima che scappin fuori dalla descritta gemmetta, o bottoncino, oppure incontante dopo l'aver quindi altrata la testa.

Fra le altre singolarità di questa pianta ella si è similantemente cosa degna di tutta l'osservazione, che i suoi gambi o steli non hanno quella tendenza naturale a quelli di tutte le altre piante, d'alzarsi cioè, direttamente all'insù: imperocchè se quelli vengano innanzi, e crescano sopra la parte inferiore d'un ramo d'on albero vi crescono così regolarmente all'ingiù, come sarebboni all'insù, qualora allignassero, e crescessero dall'altro lato, e quello senza la menomissima apparenza,

che patiscano ombra di violenza o di danno, o senza mostrare la menoma inclinazione a rivolgersi, e tendere all'insù.

E' stato detto da taluni de' vecchi Autori, che il misletoe conserva le sue foglie per tutto il tratto dell' Invernata, allorchè questa pianta allignata sia in un albero della natura de' sempre verdi, come l'alloro, e fomigianti; ma che quando le foglie dell'albero, sopra del quale vegeta il misletoe cadono, cadono di pari le sue foglie. Ma questa è una fondonia patentissima, avvegnachè il misletoe conservi le sue foglie tutto l'anno quanto è lungo, e largo, cresca, e vegeti sopra qualunque albero esser si voglia, e fa bravamente testa alla più orrida Invernata.

Allignerà il misletoe, e verrà su benissimo sopra ogni e qualsivoglia sorta d'alberi; ma non vegeterà però, nè verrà su così bene, nè col vigore, e rigoglio medesimo sopra tutti gli alberi. Il pero, il melo, la spinalba, o pruno bianco, il tiglio, sono gli alberi, sopra de' quali il misletoe riesce a maraviglia bene. La quercia, il nocciuolo, ed il ginepro gli riescono assai contrari. Monsieur Du Hamel non fu mai da tanto, che gli venisse fatto di propagarlo seminandolo sopra l'ultimo di quelli alberi: ma vi è stato talora trovato propagato naturalmente, tuttochè in una condizione è stato assai interistito. Verrà su il misletoe, ed allignerà di pari sopra piante annuali; sebbene sopra di queste non può venire in alcuna altezza, cenciossiachè i gambi o steli di queste piante annuali morendo e seccandosi nell' Invernata, il misletoe perisce di conserva con essi steli. Grandi furono gli stenti e le brighe, che presefi il valentissimo Monsieur Du Hamel nel seminare il Misletoe, e nel cimentare di farlo allignare, e venir su nel terreno, e in fatti alla perfine vi riuscì così bene, che i semi giunsero a germogliare, e le loro barboline crebbero ad alcuna lunghezza; ma queste non trovando sostegno proprio, ove fissarsi ed appoggiarsi, tutte le piante del misletoe così fatte germogliare, perirono infino all'ultima: quindi sembra, che questo sia assolutamente un arbutto parasitico, e che non possa venire innanzi, se non se sopra un qualche altro albero.

E' il misletoe coperto, e vestito di due
bus-

bucce, o cortecce, una esterna sottilissima di un colore verdastro alquanto aggrinzata, o rugosa, e granellola: e sotto questa di una buccia più faticcia, e più grossa, di un color verde più pallido, ed alcun poco granellola, e framischia, o divisa qua, e là con delle fibre legnose. Sotto questa seconda buccia, o corteccia interiore stanza il legno, il quale allorchè è secco, e durissimo, ma non ha menoma apparenza di granellatura, e viene a tagliarsi con eguale agevolezza per lo lungo, ed a traverso. Il gambo fra due nodi, o nocchi è perfettissimamente diritto, ma nel nocchio prende delle grandi piegature. Ciascheduno di questi pezzi dello stelo, o gambo del misletoe, rappresenta in alcuna proporzione la tibia della gamba umana, sendo alcun poco più grosso in una delle sue estremità, che nell'altra, e sempre, e costantemente assai più picciolo, e minuto nel mezzo, di quello si sia nell'una, che nell'altra delle sue estremità. Questo lega, e congiunge lo stelo, o gambo, che ne vien dappoi, non già alla foglia e secondo la maniera comune degli altri vegetabili, ma per una specie di articolazione, ed ha una specie di epifisi somigliantissime all'ossa. L'analogia viene cizandio condotta più innanzi somigliantemente in questo, che siccome nei giovani animali l'epifisi delle ossa sono tutte morbide, e tenerelle, ma negli animali più vecchi, ed avanzati, divengono più dure, così di pari in questa pianta i rami tenerelli, e giovanetti separansi agevolissimamente nelle loro articolazioni, ma per lo contratione i rami vecchi sono ugualmente dure, che in qualsivoglia altra parte dello stelo.

Le foglie del misletoe son grosse, sisse, e faticce, senz'essere fugole, il loro gambolino, o picciuolo è sommamente corto, e scorronvi lunghezza quattro, o sei cosole, che arrivano a raggiungere l'estremità esteriore della foglia senza produrre alcuna visibile, od osservabile ramificazione.

E' il misletoe una pianta rigogliosissima, e sommamente vivace, ed è una di quelle, alle quali ha la natura voluto concedere maschi, e femmine in piante, od individui distinti della specie medesima.

Gli Autori però non trovansi totalmente di accordo per rapporto alla maniera di questo fatto. Plinio afferma assolutamente, avervi due sorti di misletoe, una portante frutto, e l'altra non già. E da Monsieur Edmondo Barrell vien confermata, e fiancheggiata grandemente siffatta opinione colla sua propria osservazione, dandoci un piano, od istoria di cinque semi di misletoe, egli fece venire su, e vegetare in piante, due delle quali i cerco, e portaron frutto e le altre soltanto fiorirono, senza far frutto. Il Tournefort, il Linneo, ed il Boerave però affermano, come il fiore, ed il frutto non son prodotti in due differenti piante, ma bensì sopra rami differenti di una medesima pianta, o del medesimo individuo. Questo punto si rimase in somigliante modo dubbioso, fino a tantochè Monsieur Du Hamel determinossi di investigare in ogni, e qualunque forma la verità del fatto, e le esatissime osservazioni di questo Valentiniano ebbero a confermare intieramente quelle de' buoni Antichi, e di Monsieur Barrell. Di vantaggio egli aggiunge, come tutto l'abito delle piante maschio, e femmina del misletoe è a segno differente, che con ogni maggior facilità vengonsi disgiuntamente a distinguere, senza ricorrere per ottenere questo ai loro fiori, ed ai loro frutti, nè gli venne mai, e poi mai fatto di rinvenire nelle sue osservazioni ad un solo fiore sopra una pianta femmina, nè una sola, e semplice coccia sopra una pianta maschio.

Le gemme, che contengono i fiori maschi del misletoe, sono più rondeggiate di quelle, che contengono i fiori femmine, o dir gli voghiamo più acconciamente gli embrioni del frutto, o delle coccie, e sono di vantaggio tre volte più grossi. Le gemme fanno distintissima mostra di sé sopra i rami nell'autunno, e nel mese di Dicembre sono di una grossezza considerabile, tuttochè non solamente inchinati ad aprirsi; e le piante femmine trovansi tuttavia piene gremitte delle coccie del primo anno. Le gemme maschi vengon su, e crescono ordinariamente a tre a tre sopra un gambo, o stelo medesimo, e sbocciano nel mese di Febbra-

jo, oppure sul principiare del Marzo. E' il loro fiore tutto di un pezzo regolare, formando una specie di aperta campana, ed è tagliato in quattro porzioni, le anodature, o nocehi portandosi all'ingiù alla metà del fiore, ed i segmenti essendo altrettanto mezze ellissi. Hanno quattro faccette corpicciuoli ovali, o quattro germogli granellati, i quali trovansi uniti, ed attaccati alla parte inferiore della campana, e che sollevansi sopra i suoi labbri: dapprima questi sono verdastri, ma doppiò fannosi, e divengono gialli; son questi picci di una polvera estremamente fina: Altro questi veramente non sono, che gli stami del misletoe, e quella parte, o porzione di essi, che comparisce granellata all'occhio nudo, coll'ajuto del microscopio vien toccato con mano, esser formata in una congerie di cavità superficiali, o leggierie fomigliantissime a quelle dell'erba morella. Sono i fiori piantati, od ammassati in mucchietti, sci o sette di essi cioè, tutti insieme, o nelle ale dei rami, oppure nelle estremità di quelli; e poi che fatto hanno l'ufficio loro, nel mese di maggio si cadono. Le piante femmine hanno i rispettivi loro fiori od embrioni delle coccole, o frutto, nei siti, e luoghi medesimi, ma in una stessa giuntura non ve ne ha di quelli, che tre, o quattro soli. Questi sbocciano, ed apronsi nel tempo medesimo, che sbocciano i fiori della pianta maschio, cioè delle altre piante da noi sopradescritte. Allorchè questi fiori sono perfettamente aperti, noi veggiamo l'embrione del frutto coronato con quattro petali, i quali son piantati in una specie di scerpolo, o spaccatura, la quale scorre tutt'all'intorno del frutto, e che via via, a proporzione che il frutto ingrossa, tal si distingue vie maggiormente.

Sono questi petali dapprima uniti alle loro vettelle, e vengono in questo tempo a formare una specie di cono; ma tosto che s'ingrossano, ed apronsi, formano allora e rappresentano la figura di una corona antica, ed in questo tempo vien riveduta nel mezzo una specie di ruvida elevazione, o rilato granellato, fomigliantissimo alla buccia di un'arancia, e di un color brunciccio. Questa porzione

del frutto, che trovasi sotto l'inserzione dei petali dilatati, ed allungasi assai più di quella, che trovasi sopra i medesimi, dimodochè quando quelle sonosi avanzate ad una certa data grossizza considerabile sembra, che i divisi petali trovinsi meramente piantati sopra esse.

Nel principiare del mese di Giugno i petali sono presso che tutti caduti, ma con tutto questo le quattro inserzioni continuano a rimanersi distinguibili sopra la coccola: e noi possiamo benissimo osservare sopra le loro vettelle, siccome in questo tempo sono a un di presso della grossizza di un granello di sementa di canapa, una scura prominenza, o rialzamento, che è il timante del rialzamento, o protuberanza contenuta entro i petali; ed in tagliandogli vieni nel mezzo trovato il seme, che è d'un colore verdastro. Le coccole continuano la loro crescita per tutto il tratto dei mesi di Luglio, e d'Agosto, e trovansi maturi nei mesi di Settembre, ed d'Ottobre. Veggansi *Memoires Acad. Roy. Paris*, ann. 1740.

MISTURA. Mislura semplice, *Mixtura Simplex*. Così denominasi nella Farmacia una particolar forma di medicamento, praticata nelle prescrizioni, o ricette d'alcuni Medici moderni. Ella è fatta questa mislura semplice coll'unire, e mescolare insieme dieci once dello spirito triacale canforato di Bates, sei once di spirito di Tartaro, e due once di spirito di vitriolo. Questi spiriti così mescolati debbon'esser tenuti ermeticamente chiusi, e sigillati in un vaso di cristallo per lo spazio di tre buone settimane, affinchè possano perfettamente, ed intieramente mescolarsi, ed incorporarsi insieme. La dose poco più, poco meno, è d'una dramma. Le sue virtù medicinali sono, che ella fa tosta alla putrefazione, che promuove il sudore, e che fa bene grandissimo nelle febbri maligne. Veggasi l'Articolo *MISTURA* (*Ciclopedia*.)

MISURA. Non ha guari che ha il pubblico avuto alcuni sommamente accurati confronti fra alcuni dei pri, e delle misure Franzesi, e quelle dell'Inghilterra il cui risultato si è:

1. La mezza canna di Parigi, come si

rileva dal modello esattissimo conservato nella Società Reale, contiene dita Inglese della prova, o modello medesimo, 38. 355; quindi egli apparisce che il braccio, ed il piede Inglese è al braccio, o mezza canna di Parigi, a un di presso come 107. a 114; conciossiachè siccome 107. è a 114; così 36. è a 38. 35514.

2. Le due marche Parigine, o sia peso di sedici once, danno di peso di danari Inglese, grani 7560; quindi apparisce, che la libbra di dodici once di peso Inglese, oppure 5760. grani, è a due marche, o peso di sedici once di Parigi come 16. a 21.: che l'oncia di Parigi porta di peso Inglese grani 472. 5.; e che per conseguente l'oncia di peso Inglese è all'oncia di peso di Parigi, come 64. è a 63.

3. La libbra Inglese di sedici once pesa grani Inglese 7004.; quindi l'oncia di libbra di peso da sedici once, delle quali sedici fanno una libbra vien trovato uguale a 437. 75. grani da libbra da dodici once. E ne seguita, che la libbra da dodici once è alla libbra da sedici once a un di presso come 88. è a 107.; così è 5760. a 7003. 636.; che l'oncia della libbra da dodici once è all'oncia di libbra da sedici once, a un di presso come 80. è a 73., purchè come 80. è a 73., così è 480. a 438. Ed ultimamente che la libbra, e un'oncia di peso da sedici once per libbra è alle due marche, e un'oncia di peso di Parigi, a un di presso come 63. a 68., imperciocchè come 63. è a 68. così è 7004. a 7559. 873.

4. Il piede di Parigi, espresso in decimi, è uguale ad 6. 0654. del piede Inglese; oppure, che è lo stesso, contiene dita Inglese 12. 785. Veggansi le Traduzioni Filosof. sotto il N. 465. Sezione.

MISTO. L'azzurretto mulo, cui noi veggiamo alcuna fiata sopra i nostri campi, e sopra le nostre pasture la mattina, tuttochè sia bene spesso innocente, egli è stato nulladimeno sperimentato, e toccato con mano, essere in alcuni luoghi la cagione attuale della peste, e d'altre parecchie malattie del bestame bovino, e d'altri animali cornuti da pascolo.

Il valentissimo Medico Dottor Winklar ci somministra nelle nostre Filosofiche Traduzioni l'istoria d'un contagio, o peste d'

animali, infestante l'Italia tutta, e parecchie altre regioni, il qual morbo vedevasi visibilmente stendersi sopra quelle campagne in forma d'un azzurretto mulo. In qualunque luogo questo azzurretto venisse scoperto, era cosa più che sicura, che i bestiami se ne tornassero alle loro stalle ammalati: comparivano pigri, intristiti, e pesanti, ricusanti qualsivoglia specie di cibo, e moltissimi d'essi morivano nel brevissimo tratto di ventiquattrore. Nell'apertura fatte di questi animali furono trovate le milze grandemente ingrossate, e corrotte, e le lingue loro sfacciate, e corrose: ed in alcuni luoghi quelle persone, che non stavano sopra di sé, e che non avevano riguardo veruno nel maneggiare quegli animali, rimasero infettate, e morirono coi sintomi del male medesimo, che uccideva il loro bestiame. La cagione principale di siffatta malattia sembrò essere l'elamento d'alcuni malsani vapori della terra; ed ivi era osservabile, che l'anno iannanzi, che simigliante sventura accadeva nell'Italia, quella medesima bell'issima Regione era stata batutta da quattro scosse di Tremuoto.

Il metodo della guarigione, che sul fatto ebbe migliore riuscita si fu il seguente:

Tolto che qualsivoglia animale dava segni d'essere ammalato quella brava gente gli esaminava la lingua, e se sopra essa vi si trovassero delle aste, o delle picciole pustole, o vescichette, ponevasi a sgrabiare la lingua medesima con un istrumento d'argento avente a' suoi lati acutissime dentature fino a tanto che questa grondasse sangue in tutte quelle parti, ove trovavansi le aste: allora il sangue veniva con estrema diligenza nettato, e levato via con un pezzo di tela, e poscia tutta la lingua dell'animale più, e più volte veniva lavata, e rilevata, con aceto, e con sale. Ciò fatto facevano avallare all'animale medesimo l'appresso Medicamento:

Prenderai di filiggine, di zolfo, di polvere da schioppo, e di sale, di cadauna di quelle sostanze parti uguali; mescolerai le medesime con tanta quantità d'acqua, che sia valevole a ridurre il tutto in

in

in una mistura così sottile, che possa essere ingoiata, e tre, o quattro volte il giorno ne farai avvalere all'animale una cucchiata ogni volta. Quel bestiame, che non ammaltato venne trattato a capello colla medesima medicatura, e che il bestiame ammaltato, e la conseguenza di questo metodo si fu, che nelle Terre degli Svizzeri, ove fu praticata, morì pochissimo bestiame in confronto di tutti gli altri paesi, ne quali la strage fu veramente orrenda.

Ella si fu cosa grandemente osservabile, che siffatto contagio, in questa occasione sembrò procedere e dilatarsi lentissimamente, e con somma regolarità. In ventiquattro ore dilaravasi pel tratto di due miglia Tedesche. Questo fenomeno ci conservollo per tutto il corso di sua strage, e non comparve in luoghi grandemente dilungati nel tempo medesimo.

Comechè la superficie della terra mandava fuori quelli effluvi pestilenziali nuo- degli animali da pascolo schivò l'attacco de' medesimi in portandosi per le campagne, ma quelli eziandio, che vennero conservati nelle loro stalle, e che vennero cibati nelle lor mangiatoie, ebbero a provare il medesimo male, e nella guisa, e maniera medesima degli altri lasciati andare al pascolo per l'aperta campagna. Il dottissimo medico Siare si fu d'opinione, che il male contagioso venisse originato da certi dati insetti, i quali non potessero volar più innanzi di due miglia Tedesche nel divisato tratto di tempo, vale a dire, in un giorno: e che quelli insetti facessero lor cammino regolarmente, e dispergessero la malattia, ovunque passassero: ma volevansi delle dotte, e sperimentate persone, le quali in questarista occasione si facessero ad esaminare lo stato dell'aria non meno, che quell' degli animali medesimi. Veggansi le Trans. Filos. n. 145.

MISY. È questo nell'istoria naturale il nome di una pastecolata sostanza sottile messa in opera con somma frequenza da' buoni Antichi nella Medicina, e supposta essere uno di quei medicamenti degli antichi, de' quali di presente non si ha più contezza, ma ciò fuor di proposito, ed erroneamente; conciossiachè continui ad

essere comunissimo in tutti i Domini Turcheschi, e non di rado venga trovato nelle miniere non meno in Crennitz, che nell' Ungheria. Ella si è questa una sostanza assai considerabilmente consistente, tuttochè di una testitura irregolare, ed apparentemente niente compatta, ed assomigliantesi grandemente alle nostre sfoglie marchesite; ma ella si è peiva non meno della durezza, che del peso di queste marchesite, e non è infiammabile.

Viene il Misy comunemente trovato in assai grosse masse sciolte, le quali sono d'ordinario larghe, e piatte, e disuguali nei loro contorni, od orlature: ma alcune volte esse formano queste masse insieme uniti degli interi strati, i quali bene spesso sono continuati per un' assai considerabile lunghezza, ma rade volte oltrepassano la grossezza di quelle tre dita, e assai sovente stanziano non altramente, che quali vene orizzontali infra gli altri minerali metallici. E' il Misy morbido, e liscio, toccandolo, e può essere stritolato, e ridotto in pezzi fra le dita, e non meno al di fuori che nelle sue parti interne è di un color giallo pallido sommarmente vago, e lucente, avvicinandosi grandemente al rame nella somiglianza, allorchè questo metallo è ben netto dalle sue scorie, e ripurgato. La sua sostanza interna apparisce composta di congerie di lucidissime picciole molecole comunemente, e per lo più di figure angolari. Non è coperta d'alcuna incamicatura, o crosta, che la vesta, e circonda; ma poichè siati stata per alcun tratto di tempo esposta all'aria sopra la sua superficie prende un colore più cupo, ed oscuro di quello innanzi possedesse. Non ecciterà la menomissima effervescenza se venga il Misy mescolato con i Menstrui acidi, e le pongasi nel fuoco acquista un color porporino assai carico. L'acqua scioglie una porzione grandemente considerabile della sua sostanza, e questa può quindi agevolmente esser disgiunta e separata dal liquore per via di svaporamento, o di cristallizzazione, e comparisce essere dell' indole, e natura medesima del comune vetriolo verde: conciossiachè sieno i suoi cristalli a capello della stessa stessissima figura, e lo stesso stessissimo essendo l'effetto, ch'è

produce in un decotto di gallozzole, che lo converte in un batter d'occhio in inchiostrò. Mostra presso che evidentemente d'affomigliarsi assai ad un corpo sulfureo, e perciò altri resta grandemente maravigliato del suo non essere infiammabile. Veggasi *Hiller*, *Istoria dei Fossili*. pag. 666.

Simigliante sostanza, per quanto sia a nostra conteeza, non viene altramente messa in uso presso alcuna nazione; Dagli antichi veniva riputata della Natura medesima del calcite, ma che possedesse le virtù di questa sostanza in un grado più fiavole. Facevansele essi venire dall'Egitto, e dall'Isola di Cipro, e mettevano in opera esternamente, servendosene come topico nelle emorragie, ed in alcune spezie di eruzioni cutanee.

MISY. Questa voce misy poi nella Botanica è un nome dato da Teofrasto non meno, che da tutti g'antichi Scrittori Greci ad una spezie particolare di tartufo, o dire lo vogliamò fungo sotterraneo di un sapore gustosissimo, ed in estremo delicato. I tartufi della Numidia, e d'alcune altre parti dell'Africa, vennero sempremai riputati grandemente superiori a quelli di qualsivoglia altra parte del mondo. Appellarongli alcuni moderni settittori *Terfez*, *Camaba*, oppure *Kema*, e venivano portati a Roma, ove erano stimati a segno, che non aveavi piatto, che gli soverchiasse. I Romani chiamavano questi particolari tartufi, tartufi della Libia, e sembra con infinita probabilità, che questi fossero quella sostanza medesima, che da' Greci addimandavasi Misy di Cirene. Dee essere osservato, come i Greci generalmente nei primi tempi avevano scarsiissima conteeza, ed interesse colle nazioni, e colle facende dell'Africa; e tutto ciò, che essi avevano da quella parte del noto mondo, viene asserito, che lor veniva di Cirene, quivi trovandosi alcune vecchie cittadi dei loro primi Padri, colle quali mantenevano non meno una spezie d'amistade, che di traffico. Il *Thyon*, che è una spezie d'albero che alligna, e vien su in copia grandissima pressochè in tutte le parti dell'Africa, e che è la cosa stessa che il *Citrus Romanorum*, vende in simigliante maniera attribuito a

Cirene dal medesimo Teofrasto. E così allorchè questo Autore parla dei tartufi, egli aggiugne, che il Cireneo Misy soverchiava di lunga mano rispetto al suo sapore, e suo gusto le altre spezie tutte, le sue espressioni leggonsi ampiamente distese presso Ateneo; e quindi Plinio ha tolta di peso la sua istoria, cui egli termina nell'appresso guisa; "La cosa, cui essi addimandano Misy nella Provincia di Cirene, è di quella spezie; ma ella si è più po'puta, e di un sapore, e di un'odore più delicato." E' questo il senso delle parole di Plinio giusta il testo, che ci rimane nei nostri esemplari di questo Scrittore: ma egli si è grandemente probabile ch'ei traducesse Teofrasto meglio di ciò, che questi esemplari ci mostrano, per lo meno noi conosciamo assai bene, che ciò, che effodice non è cosa sua propria, ma tolta di peso da questo Autore, e perciò noi abbiame tutto il dritto d'intenderlo nel suo genuino senso, cioè, che le radici del Misy Cireneo hanno un'odore soavissimo, affomigliantesi a quello delle carni di fresco tagliate. Veggasi *Plinio*, l. 19. c. 3.

Ella si è cosa certissima, e indubitata, che questo Misy Cireneo dei Greci antichi è la cosa medesima medesimissima, che il delicatissimo tartufo Africano, o sia il *Terfez* di Leone Africano, e dei moderni; e Plinio lesse certamente alcuno degli antichi Scrittori, che aveva di ciò sentore e da essi medesimi ha preso un piano ed istoria dei tartufi Africani, vale a dire, che questi sono i tartufi più delicati del mondo; e tuttavia ei non conobbe, che questi tartufi Africani erano la cosa medesima, che il Misy di Cirene, del quale immediatamente dopo ragiona colle parole di Teofrasto.

MITRA. Questa voce mitra è usata dagli scrittori dell'Istoria Irlandese per esprimere una spezie di moneta bassa, che ivi era comunissima intorno l'anno 1270, oppure come alcuni vogliono, trent'anni innanzi, e secondo altri, soltanto trent'anni dopo questo tempo. Aveanvi, oltre la mitra, parecchi altri pezzi di moneta, che dinominati venivano, secondo quelle figure, che erano impresse, o coniate sopra' essi, come a cagion d'esempio, *rosaj*, *lionine*,

nine, aquile, ed altri somiglianti nomi. Quelle monete venivanvi trasportate di Francia, e da altri paesi etandio, ed erano di una lega a segno inferiore alla lega delle monete correnti del Regno, che a stento grande potevano montare al vero valore di un mezzo soldo l'una. Alla perfine sfattee rec monete vennero bandite nel 1300. ed in luogo di quelle furono coniate, e battute delle monete buone. Quelle furono le prime monete Irlandesi, nelle quali fu lasciato fuori lo scettro. Queste furono battute sotto il Regno d'Eduardo figliuolo del nostro Re Arrigo terzo, e trovansi fra le altre antichità di questo paese. Mostrano queste la testa del Re entro un perfetto triangolo. Il soldo nostro, allorchè è ben mantenuto, pesa ventidue grani, ed il mezzo soldo, dieci grani, e mezzo. Veggasi *Simon*, monete Irlandesi.

MODELLO Forma. I modelli, o forme nell'istoria Naturale son definite, essere particolari corpi Fossili, composti di particelle dissimilari di una tessitura sciolta, soffice, e cedente alquanto duttile, allorchè è umida, composta di particelle argillose, separate dall'arena, o dirlo vogliamo polvere, o linatura delle pietre, e che vien d'ordinario a trovarsi mescolato con rimasugli, e reliquie putrefatte di sostanze vegetabili, ed animali.

Di Classe somigliante di corpi, o sostanze, ve ne ha due generi, cioè I. Le *Thryptomictes*, o sieno forme, o modelli di una tessitura rilasciata, e frangibile. E 2. le *Gloiomictes*, che sono modelli, o forme di una tessitura più compatta, tegnente, e viscosa. Veggasi *Hill*, Istorica dei Fossili.

Per le parecchie specie di forme, o modelli vegetabili veggansi gli articoli *Thryptomictes* e *Gloiomictes*.

La bontà della forma, o modello per gli affari, e faccende degli orti, e de' giardini, vien rilevata dall'inspezione, dall'odore, ed anche dal tatto.

Quelle terre, o trrrieci appellati modelli, o forme son riputate, e tenute per le migliori, le quali sono di un colore scuro lucido, o nocciolino. E' questo sempremai il color migliore del concio, o governo delle terre, e d'altri suoli naturali;

e questo è riputato il migliore, se la terra venga con agevolezza rotta, e tagliata, e che non attacchi, e non s'invischi alla marra, od alla zappa, ma che sia lustra, stritolabile, e si rompa in minutissime zolle; e che sia di una siffatta natura, che correndo stagioni asciutte non riugonsi, e non si sciepoli, e che per lo contrario nelle stagioni, e tempi umidi non diventi una specie di calcina. Dopo di questa il modello, forma, o terra lascia migliore si è la bigia cupa, e la rossigna; e le peggiori delle altre tutte son riputate quelle, che sono di un color lucido, e di un color di stralino oscuro. Questi trovansi nei nostri scopeti; ed anche comunemente.

Quella tal data terra da modello, che è di un color chiaro abbronzato non dee per conto veruno esser prefelita: ma quella di un color giallogno pendente al rosso, o viceversa, vien tenuta per la più inferiore delle altre tutte. Questo trovasi comunemente in luoghi di grande ampiezza, nelle grandi largure, e deserte, e rade volte di prse, e naturalmente poc' altro produce, che signamirhe, e felci. Veggasi *Müller*, Dizionario del Giardinere.

Fra tutti quei terreni, che ci fanno giudicar di sé dall'odor loro, quello è giudicato, e stimato il migliore, il quale dopo, che vi è piovuto sopra, o che è stato zappato, o vaogato, manda fuori un'odore agreevole, anzichè ributtante. Ma per mezzo del tutto questi terreni possono essere giudicati con accuratezza maggiore; con ciòsiachè esser possa per somigliante mezzo conosciuto, se quelli terreni sieno soverchio arenosi, o soverchio cretosi, se sieno più teneri, detersivi, e sdruciolevoli: oppure più grossolani, argillosi, porosi, e stritolabili. Ciò, che noi dobbiam giudicare il migliore per mezzo del tatto si è una natura di mezzo fra gli estremi nell'uno, e l'altro dei due divisi stati, vale a dire, quel siffatto terreno, che scioglierassi e romperassi agevolmente, e che sia composto di un' adeguata, e giusta porzione di sabbione, e di creta, che non s'attaccherà alla vanga, od alla zappa, od alla zappa, od alle dita dopo ogni leggera ploggerella, che gli cada addosso.

L'analizzare la terra da modello per mezzo dell'acqua, consiste nel lavarla in

grandi quantità nell'acqua calda, ed il filtrarne poscia il liquore. Lo svaporare quest'acqua ad un grado considerabile di concentramento, ed è manifestamenti di un sapore salino, ma non sa, nè produce la menoma alterazione nello sciroppo di viole marmole: che perciò è evidente, che il sale in essa contenuto non è, nè un sale alcalico, nè un sale acido, ma un sal neutro. Simigliante analisi essendo continuata di vanaggio, e condotta più innanzi, possono le particelle esser disgiunte, e conservate così separate, e sarà toccato con mano, trovarvisi un'abbondevolissima porzione di arena, una data quantità di una melma leggiera, capace di rimanersi per lunghissimo tratto di tempo sospesa nell'acqua, ed un'altra melma assai più pesante, che s'affondasi in un batter di occhio nell'acqua medesima. Per mezzo di un'analisi di qualsivoglia terra da modello, o terra grascia nella divisa maniera effettuata, noi possiamo trovare le sue vere, e genuine particelle costituenti, ed esser valevoli a mescolare, e comporne una similare, ed analoga per la crescita di qualsivoglia pianta particolare, cui ella produce. Ma le piante hanno l'aiuto, ed assistenza non meno del calore, che dell'umido, nel cavare, e tirare a sé i loro sughi dalla terra; che perciò non farà le non cosa dicevolissima, e coerentissima lo sperimentare l'effetto del fuoco sopra il soggetto medesimo. La terra da modello, o terra grascia comune de' giardini, o da orto distillata in una storta in un fuoco nudo, od aperto, maneggiato, o manipolato, nei suoi varj gradi, somministra un'acqua, e l'olio, e lo spirito somigliantissimi a quelli dei soggetti animali, e possibilmente provenienti da alcune particelle eterogenee mescolate, ed incorporate colla terra, ed un asciutto *caput mortuum*, o dire la vogliamo un terriccio indolente rimasto nel fondo del vaso.

Le particelle della sostanze animali, vegetabili, e minerali ondeggianti, e svolazzanti nell'atmosfera, e quindi cadute, e precipitate sopra il terreno, possono benissimo somministrare alla terra grascia ortense, o da giardino alcune delle proprietadi, e queste differenti, in differenti luoghi, e

paesi; siccome è evidentissimo nelle vicinanze di Londra, ove la terra grascia trovata così impregnata, ed impinguata di fumo precipitato sopra essa dall'Atmosfera, che perciò ella differisce cotanto da quella delle aperte campagne. *Shaw*, *Lezoni*, pag. 64.

MODELLI, o forme da monete, e da conj. Sono questi una spezie di forme concave formate di creta, aventi dentro di sé delle figure, e delle iscrizioni delle monete antiche Romane, trovate in parecchie parti dell'Inghilterra, e che vien supposto essere stati serviti per conj di antiche monete.

Il valentissimo nostro Monsieur Baker avendo avuto la buona sorte di incontrarsi in alcuni di questi modelli scavati nella Provincia Shrop, aventi i tipi, ed iscrizioni medesime di quelle delle monete antiche Romane presentò una esattissima istoria delle medesime alla nostra Reale Società.

Questi modelli furono trovati in cavando, o zappando del fabbione in un luogo, che addimandasi Ryton nella Provincia di Shrop, discosto a un di presso un miglio dalla grande strada maestra di Watling. Sono tutti questi modelli della grandezza del *Danarius Romanus*, e poco più grossi del nostro mezzo soldo Inglese: son composti di un terra liscia da pentolaj, o da fornaciaj, la quale sembra, che prima di esser messa in opera, sia stata vagliata dalla polvere, e dall'arena, e ben battuta, maneggiata, od intrisa, a fine di renderla più acconcia a prendere una bella, appariscente, e rilevata impressione. Furonvi parecchi di questi modelli trovati insieme, e di questa razza non di rado trovantene nella Provincia di York; ma sembra, che non ne sieno stati trovati de' somiglianti in qualsivoglia altro Regno, salvo, siccome è stato asserito, che ne furono un tempo trovati in alcuni in Lione. Sono questi alcuna fiata trovati in grandi congerie uniti e congegnati insieme lato per lato in uno spietto piatto di creta, non altrimenti che stati fossero destinati per fare una quante di monete, od impronti tutti in una volta, e tanto questi, quanto gli altri tutti, che sono stati trovati, sembra, che sieno stati dell'

H h h

Im-

Imperadore Severo. Questi modelli trovansi alcuna fiasa coll' impronto impresso da ambedue le loro facce, ed alcuni hanno da uno dei lati la testa dell' Imperador Severo, e nell' altro lato alcuni ben noti rovesci di questo stesso. Sembra evidentissimo questi modelli essere stati destinati per meri conij da monete, tutto che non è gran fatto agevole il dire, in qual maniera possano essere stati per tale effetto messi in opera, massimamente questi modelli, o forme, che portano le impressioni in tutt' e due i lati, qualora però non potesse esser supposto, che non c' niassero due pezzi in un tempo medesimo coll' ajuto di tre forme, delle quali queste fossero quelle di mezzo.

Se per mezzo di disporre questi modelli una specie di ordigno, o cassa di ferro, siccome i moderni nostri fonditori fanno delle forme di bronzo per improntare i loro tipi, il metallo fuso agguagliato agguagliatamente potrebbe esservi versato, e questo a dir vero, sarebbe un modo di coniare in estremo agevole; conciossiachè siffatte forme richiedino spazio brevissimo di tempo, e poca spesa per esser fatte, e perciò, tutte ch' esse fossero, poco vorrebbero a rinnovarle soventi volte.

Questi modelli o forme sembra, che sieno state tutte sufficientemente per farle iodurre; ma non già a segno di renderle di pari porose, che i nostri mattoni, od embrici cotti, la qual sovrachia cottura, e porosità avrebbe fatto lor perdere quella liscenza, e quella piana, ed ugual superficie, la quale nei medesimi si ravvisa così fissa, e serrata, che qualsivoglia metallo fosse formato in essi, non avrebbe la menoma apparenza di quei forispligianti all' arena, dai quali vengono di ordinario a distinguersi le medaglie, e le monete falsificate, e contraffatte.

MODERATORE. Anello moderatore. Servesi nell' Anatomia il Valsalva di questa espressione anello moderatore per significare quell' anello, che i muscoli dell' occhio formano insieme al nervo ottico nel fondo dell' orbita. Egli asserisce, che le fibre esteriori di questi muscoli, che s' alzano, o sorgono dal nervo, forz' è, che l' accorcino, allorchè contraggonsi, e che quando agiscono le fibre interiori s' forz' è,

che lo comprimano; di maniera tale che queste differenti fibre dei muscoli dominano quivi in guisa sommamente diversa il fluido nervolo.

Descrive similmente il Valsalva altro tale anello, che fa tondeggianti i nervi motori dell' oculo, ma confessa, ed accorda, non esser questo nè sì appariscente, nè così distinto, siccome lo è il primo. Veggansi Saggi di medicina di Edimburgo, Compend. Vol II. pag. 410. 411.

MOLA. Mola pesce sole nell' Ictiologia. Veggasi Favola dei Pesci n. 27.

Uno di questi pesci, che pesava cinque cantari, o sia cinquecento libbre, venne preso anni sono nelle vicinanze di Plymouth, ed essendone fatto bollire un pezzo della sua carne, per sperimentare di qual sapore si fosse (avvegnachè alcuni Autori abbiancello descritto non altrimenti, che ottimo per le Tavole) venne trovato, in vece di essere di una massa forte, e compatta, tutto disfatto, e convertitosi in brevissimi minuti in una gelatina perfettissima, di modo che non potesse esser cavato fuori, se non che con de' romajoli, o cucchiaj. Quanto al colore, ed alla consistenza questa gelatina assomigliavasi a capello alla colla di amido per infaldare le biancherie, quando è fredda, ed aveva pochissimo, o niun sapore, nè gusto di pesce, ma bensì un sapore in estremo gustoso, e delicato: attaccavasi però questa gelatina tenacissimamente alle labbra, ed alle dita, comparando in sommo grado colloso; e siccome gli Antichi non possedevano altra colla, salvo quella fatta di pesce, venne sperimentata questa gelatina medesima rispetto alla qualità sua agglutinante sopra il cuojo, e sopra la carta, e venne toccato con mano, come corrispondeva egregiamente bene, ed a capello alla colla fatta di pasta comune, ma per alcuno accidente non venne fatta la prova della medesima sopra il legno.

Essa sarebbe cosa degna della più seria attenzione adunque, allorchè se ne porga alcun' altra simile occasione, lo sperimentare, se la verace, e genuina Icthiocolla esser possa preparata con far bollire la sopradescritta gelatina. Veggansi

ganfi le *Trans. Filosof. n. 456. pag. 220.*

E' pertanto la voce Mola nella Zoologia il nome di un pesce, comunemente denominato dagl' Inglefi *Sun-fish*, pesce sole. E' quello pesce d'una figura veramente particolareissima. Il suo corpo è largo, e corto, e la sua estremità posteriore vien terminata da un ala, o piuma circolare, che gli serve di coda; di modo che comparisce somigliantissima alla testa di un grosso pesce staccata, e disgiunta dal suo corpo. E' questo pesce di ordinario della lunghezza di quei due piedi, ma alcuna fiata trascende di assai questa grossezza, crescendo fino alle duecento libbre di peso. Questo pesce non ha scaglie, ma è tutto coperto di una pelle dura, ruvida, ed asprissima. La sua schiena è negra, e la sua pancia bianchissima, i lati poi sono d' un colore fra il bianco, ed il nero. La sua bocca in proporzione alla grossezza del pesce, è picciolissima, e quando ei l' apre, è rotonda. Le sue mascelle son dure, e nel di dentro sono affilate non altrimenti che un coltello: esternamente poi sono aspre, e rassembrano distinte come da ordini, o filari di denti. La sua testa non isporge in fuori del suo corpo di un menomo che. I suoi occhi son picciolissimi. Egli ha soltanto un paio di ale; o di pinne, le quali son piantate in vicinanza delle squaglie della testa, le quali sono soltanto due fori ovali, ed ellittici coperti colle loro proprie membrane. La sua carne è soffice, e morbida, e le sue ossa son tutte dilegini, ed una specie di tenerume. La sua pelle rimanfi tenacissimamente attaccata alla carne, nè vien dalla medesima staccata, che a stento grande. Vien questo pesceato nel mare mediterraneo, ed alcuna fiata anche nei mari Britannici. Veggasi la Tavola dei Pesci, come sopra. Veggasi in oltre *Willughby, Hist. Pisc. pag. 151.*

MOLA. Una mola, o sia un falso concepimento nella medicina altro non è, che un ammasso, o conerzione membranosa, e fibrosa formatafi nella matrice, contenente di ordinario una copiosa quantità di sangue fisso, o coagulato. Questa mola alcuna fiata vien prodotta nell' utero oia, ed alcun' altra nel tempo medesimo

insieme con un feto regolare. Hannovi parecchie origini, che esser possono assegnate a simili conerzioni; ma la molto usuale sembra che sia l' essere stata lasciata indietro una parte delle fecundine dopo un aborto. Nelle persone assai giovani queste sono meno pericolose, e rade si è quella volta, che rimangansi entro la matrice per tratto più lungo di un anno; ma nelle donne più avanzate negli anni rimangonvi per tratto lungissimo di tempo, ed assai sovente cagionano per fino la morte di colei. Allorchè quelle mole sonosi prodotte nella matrice nel tempo medesimo con un feto regolare, sogliono per lo più desraudarlo d' una porzione del suo nutrimento, e cagionano delle doglie false, e moltissime indisposizioni, e sconcerti irregolari in tutto il corso della gravidanza: ma queste sono accompagnate con minor numero di accidenti nel tempo del parto di quello, che facciansi allorchè sonosi prodotte sole nell' utero. Quegli Autori Tedeschi, che fatti sonosi a serivere delle meraviglie ci contano delle istorie di simili conerzioni, ed ammassi, che erano, dicon' essi, animali viventi, armati di rostro, e di artigli, ad aventi ampie bocche, e che qualora trovavansi entro la matrice in compagnia del feto, divoravanello, e distruggevanlo. Ma queste sono favole ridicole, e falsissimi racconti, adattati però all' impasto di quelle teste, e debbonfi riguardare sull' istesso piede, che dagli uomini assennati vengono conferate le fantasie di *Sooterkins*. Veggasi *Juncker: Conspect. Medic. pag. 727.*

I Segni di una mola stanziante nell' utero sono in estremo dubbiosi; e duranti i primi mesi della gestazione egli si è presso che impossibile il distinguerla da un verace feto genuino: ma dopo fissato termine, se i sintomi della gravidanza proseguiscono, e che nel tempo, in cui la creaturina stanziante nell' utero dovrebbe agitarsi, la donna non senta il menomo moto, egli dee in tal caso sagacemente sospettarsi, che la mola si trovi nell' utero di colei; e questa faccenda diviene assai più evidente, se dopo questo tempo accaggia un corso irregolare, ed incerto di scariche sanguigne dall' utero

in tempi differenti. In questo caso havvi similamente oltre a ciò, una rilasceatezza così grande nei ligamenti dell' utero, che questo non ritiene il suo luogo, e situazione nel corpo; ma allorchè la donna si volge nel letto, sente manifestamente un certo peso morto, che va tuotolandosi, e calcando da un lato all' altro dell' addome. Viene di pari osservato, che in questi casi, tuttochè il ventre gonfi, ed alzisi non altramente che segua, allorchè stanziavi un verace feto genuino, nulladimeno il ventre medesimo non è così bene tondegiato all' innanzi, ma nel mezzo è più piatto, od appiannato, e più turgido, e rilevato verso i fianchi, di modo che la carica sembra condotta o sopra l' uno, o sopra l' altro fianco, o scompartita fra l' uno, e l' altro lato, e che il mezzo del ventre rimangasi affatto vuoto. Havvi similamente in questo caso sempremai una sensazione di un peso nella parte inferiore dell' abdome, assai maggiore, senza paragone di quella, che la donna provi, allorchè contiene nell' utero realmente un fanciullino. Nel tempo regolare del Parto, il caso diventa più manifesto, e patente, di quello si fosse per innanzi; conciossiachè allora, o non affacciassi ombra di doglia da partorire, o se si fanno queste doglie sentire, sono leggerissime, e nulla affatto considerabili, sommamente irregolari nel loro andare, e venire, nei loro periodi, e tali, che bastevoli esser non possono in verun conto per l' esplosione di un feto. Allora quando la mola avviene nel tempo medesimo in compagnia di un feto, ella è cosa estremamente malagevole lo scoprirla prima del tempo del parto, o se un prode medico, o chirurgo se ne avvisi prima del divisato termine, niuna cosa può esser tentata se non se nell' atto di partorire, nel quale dovrà di conservare col feto essere esclusa: dopo questa esclusione la matrice, od utero della donna dovrà in quella maniera esser nettato, colla quale purgare, e rimondar si dee diligentissimamente negli aborti. Negli altri tempi, allorchè il caso è ovvio, e patente, avervi cioè, o stanziare nell' utero una mola, senza feto, dovrannoosi per più, e più giorni in ogni me/c som-

ministrare alla paziente i comuni medicamenti stimolanti, o forzanti, e ciò appunto dovràsi praticare, allorchè la donna trovasi in vicinanza del punto, in che s' aglionte venire gli usati corsi mestruali; e qualora questi non producano l' intento, dovràsi ricorrere alla mano della prode, e sperimentata levatrice. Veggasi *Juncker, Conspect. Medic.* pag. 723.

Noi leggiamo presso Monsieur Kerkring un' esempio straordinario, e sommamente singolare di una mola, entro alla quale trovavasi racchiuso un bambolino. Tutta quella massa venne alla bella prima dalla levatrice, e dagli altri tutti batterzata per un salso concepimento, e come tale sarebbe stata gettata via, e sacrificata, se a caso trovata ivi presente non si fosse una avveduta persona, che avendo scorto in essa massa alcun picciolo movimento, volle, che la mola fosse aperta, e di fatto trovovvisi un vago fanciullino vivente, ivi racchiuso. Veggasi *Kerkring, Specul. Anatom.*

MOLOSSI. Molossi artificiali, od artefatti. E' stato rinvenuto un metodo di comporre dei molossi dalle mele, senza l'aggiunta dello zucchero. La mela, la quale riesce assai meglio delle altre in simile operazione, è una mela estiva di una grossezza mezzana, gustosissima nel suo sapore, e piena a segno di sugo, che sette staja, o buselli Inglese, somministreranno un buon barile di cedronè.

La maniera di fare di questi molossi l' appresso:

Le mele debbon esser macinate, e messe sotto un torchio. Quindi il sugo dovràsi far bollire in un gran calderone fino a tanto che ne sia svaporata la quantità di tre quarti del tutto. Questa faccenda dovrà esserfuarsi con un fuoco moderato pel tratto ad un di presso di sei ore colla quantità del sugo sopradidato: in questo tratto di tempo diverrà della consistenza, del sapore a del colore medesimo dei molossi, o sieno s' consigliali dello zucchero.

Servono questi nuovi molossi per tutte le manipolazioni della specie comune, e riescono d' uso grandissimo nel mantenere e conservare il cedronè. Due quartucci di questo liquore posti in un barile di cedronè conserveranno per tratto lunghissima

di tempo incorrotto, e darannogli, oltre a ciò, un vaghissimo colore.

L'invenzione di al fatta artificiale specie di molossi noi la dobbiamo a Monsieur Chandler di Woodstock nella nuova Inghilterra, il quale vivendo in una data distanza dal Mare, ed ove i veraci molossi erano sommamente cari, e vi si trovavano con difficoltà somma, provvide questo molosso pel bisogno della sua propria Famiglia, ed in brevissimo tratto di tempo venne a renderlo comune in tutto quel vicinato. Dee essere osservato, come questa specie di mela odorosa estiva è sommamente acconcia a fare un cedronè, ch'è la specie migliore di quante sieno finora conosciute. La gente della nuova Inghilterra cibi i suoi majali colle rimondature, e coi torsoli di questa specie di mela, e la conseguenza di questo cibo si è, che le carni dei porci di quella contrada sono le più perfette, più sane, e più sane di quelle di tutti i porci del Mondo. Veggansene le *Transaz. Filos.* n. 374. pag. 230.

Spirito di Molossi. E' questo un chiarissimo e purissimo spirito, di cui uso grande fanno in Inghilterra, ed è composto dai molossi comuni, o dire la vogliamo triaca comune sciolta coll'acqua, e fatta fermentare nella maniera medesima del malto, o sia spirito comune di malto. Se nel procurare, e nel fare questo spirito non verrà usata alcun'arte particolare, non riuscirà così vinoso come lo spirito di malto, ma più roseo, e meno pungente ed acuto, ed anche meno acido, tuttochè altramente d'un sapor più netto, siccome il suo olio essenziale è d'un sapore meno nauseoso. Quindi se nella soluzione fatta forte per tale effetto sia stata fatta diligentemente, e per acconcio modo fermentare della fresca o recente feccia di buon vino, la quale trovisi bene impregnata di tartaro, lo spirito per simigliante mezzo diverrà assai più vinoso e vivace, ed approssimerassi più da vicino all'indole, ed alla natura degli spiriti forestieri.

Dopo la prima distillazione fatta dei molossi, o spiriti di molossi, o fondiglioli nei vasi bassi, gli spiriti medesimi esser debbono rettificati, e nei rettificamenti successivi debbon'esser fatte le adeguate aggiunte. I sali alcalini così comuni nel retti-

ficamento degli spiriti di malto in questo caso fa di mestieri tenergli onninamente lontani, come quelli, che non confanno poco, nè punto con quello spirito, e converrà mettere soltanto in opera i sali neutri, quali appunto sono i fondiglioli di vetro, il sal comune decrepitato, il sale sforzato di Paracelso, detto comunemente *sal enixum Paracelsi*, ed a quelli simiglianti: ma soprattutto non deess'altri promettere da siffatti sali cosa di momento, e che agguagli per modo alcuno un'accurato, e diligente rettificamento procurato a bagno maria, senza la menoma altera mescolanza. Per mezzo di questo solo per due, o tre fiate ripetuto, cadauna volta con acqua recente, lo spirito diverrà tutt'in un fiato procurato tale, che sarà acconcissimo per gli usi eziandio i più delicati.

Ove lo spirito di molossi sia ridotto alla forza di prava comune, se si trovi, che non posseda quella vinosità, che sia sufficiente, sarà cosa dicevolissima, e sommamente propria l'aggiuguerli un'adeguata quantità di spirito di nitro dolce; e se lo spirito sia manipolato a segno, che apparisca limpido, e chiaro, colla divisa agevolissima aggiunta diverrà perfetto ad un tal grado, che verrà preso comunemente per una pura acquavite di Francia.

Allorchè questo spirito è stato distillato di fresco, comparisce, non altrimenti che gli altri spiriti tutti, senza colore, e limpido siccome l'acqua; ma i nostri Distillatori gli danno sempremai una specie di tinta giallognola, la quale noi sappiamo venir data, e somministrata agli spiriti forestieri dalle barilozze stesse, nelle quali ci vengono spediti. Hanno costoro parecchi metodi di dare a questi spiriti un tal colore in un subito; ma i due che vengono grandemente praticati sono, o per via di un'estratto di legno guercino, o per via di zucchero abbronzato. Siccome gli spiriti di molossi vendonsi assai più cari di quello vendasi lo spirito di malto, così avviene, che c' incontriamo assai fiate in questi spiriti adulterati con una mescolanza di quello spirito medesimo, ed a vero dire rado si è quello spirito di molossi, che ci venga portato senza una porzione grande
di

di spirito di malto in esso mescolata. Possiedono parecchi un modo di mescolare il malto nel liquor fermentante, e da questo il prodotto del tutto viene ad essere grandemente accresciuto, ed il venditore può quindi assicurare colui, che compra, che lo spirito è così puro, come è uscito dal verme.

Ai dì nostri è l'Inghilterra il paese, ove fatti massimamente questo spirito. Un tempo facevasi in copia abbondevolissima in Francia, e massime nel fiume de Loire, ma di presente noi non ne possiamo avere sotto severissime pene. In Olanda similmente non ne posseggono, e ciò a motivo del dazio orribile posto sopra la triaca in favore dei lor propri venditori di zuechero.

Pochissimi sono quelli spiriti di molossi, che trovinsi ridotti alla forza, ed energia d'alcohol, o spirito di vino, quautunque, allorchè lo spirito di molossi medesimo sia rettificato a siffatto segno in un'aeconcia, ed adeguata maniera, egli sia pochissimo inferiore al reale alcohol del vino, il nome del quale è così ben conosciuto presso di noi, tuttochè la cosa, che importa il nome stesso, non veggasi in questo paese, nè realmente peravventura ci stanzi. Conciossiachè tutto quello, che noi addimandiamo spirito di vino, altro veracemente, e realmente non sia, se non lo spirito di malto ridotto ad un alcohol imperfettissimo, o sia ad uno spirito presso che intieramente infiammabile. Porzioni sorprendentemente abbondevoli di spirito di molossi vengono messe in opera nell'adulterar l'acquavite, il Rosolio, e l'aracco; e grandissime quantitati veogono messe in opera sole nel fare il rosolio di ciliege, e d'altri prodotti per via d'infusione, nelle quali tutte da moltissimi vien così questo spirito preferito agli stessi spiriti forestieri i più perfetti.

In molte occorrenze di manipolamenti i più delicati, ed esatti nelle nostre distillerie composte lo spirito di molossi supplisce bravamente le veci di un purissimo, e chiarissimo spirito di malto, per il quale noi non abbiamo peranche rinvenuto il metodo di procurar con vantaggio in copia grande. La nostra acqua di cannella, di cedro, ed altre finissime acque cor-

diali son fatte con questo spirito; avvegnachè lo spirito di malto verrebbe a somministrargli un sapore disagiadevolissimo.

Havvi similmente un altro uso, al quale serve egregiamente bene siffatto spirito, e pel qual uso non sarà così buona riuscita qualsivoglia altro spirito forestiero eziandio il più perfetto: e questo si è per fare un vino estemporaneo, pel quale parecchie persone sono portatissime, e del quale sono in estremo vaghe. Veggasi l'articolo *Vino estemporaneo*.

Quello spirito tinge le mani di un color giallognolo, come anche le altre sostanze, che vengansi inzuppate, e perciò potrebb'esser benissimo di uso ai Tintori. Egli si è di pari possibilissimo, che sia per riuscir vantaggioso nel far l'aceto à coloro, che sono in ciò impiegati: ma l'uso il più vantaggioso di tutti gli altri per cui serva questo spirito, si è pel medesimo distillatore, il quale, se aggiungerà un'adeguata porzione d'esso spirito a quella triaca, che è destinata per la fermentazione, riuscirà di uso sommo in tutto il procedimento dell'operazione, ed accrescerà in una maniera sommamente considerabile quantità del medesimo spirito: ma la proporzione in rapporto alla materia bisogna onninamente, che non sia soverchiente. Veggasi *Show Saggio* sopra l'arte del distillare.

MONETA. L'antica Latina espressione *Aes grave* è stata disinita, assai diversamente dai Critici, ma rimansi tuttora incerta. Il Buddeo, e Giuseppe Scaligero, seguitati dall'universale degli Scrittori di cose somiglianti intendon l'espressione per un pezzo di rame in massa, che è quanto dire, senza impronto, o senza essere stato coniato; e ricevuto in pagamento di mercatanzia, e somiglianti a solo peso. In questo senso verrebbe a capello a significare quest'espressione *Aes grave* lo stesso, che *aes rude*, e perciò verrebbe ad opporsi all'altra espressione *aes signatum*. In sì fatta forma appunto eran tutte quelle specie, che venivano pagate nei tempi primi di Roma. Veggasi *Buddeo*, de Ase, lib. 1. pag. 178. e lib. 2. pag. 622. *Hoff. Historia rei nummariz*, lib. 2. pag. 73. *Walker, cu Coins*, sopra le Monete, Parte 1. cap. 1. pag. 3.

Altri Autori poi intendono per lo contrario per *aes grave* grossi pezzi di rame ridotto in moneta, o coniato, contenente, a cagion d'esempio, un asse, *as*, o sia una libbra di questo metallo, quali appunto noi troviamo oggi aver corso in Itvezia. (a) Viene asserito, che quelli portarono il titolo, e furono denominati *aes grave* fino a quel tempo, che vennero ridotti ad un peso, e forma più picciola. (b)

Il Gronovio per lo contrario, che l'asse, *as*, o libbra peso, non ebbe l'appellazione d'*aes grave*, se non se dopo la loro riduzione. Conciossiachè qual necessità vi sarebbe stata di chiamar questi pezzi *aes gravis*, moneta pesante, in un tempo, che non era conosciuta moneta più picciola.

(a) *Veggansi le Trans. Philos. n. 197. p. 1701.* (b) *Salmast. de mod. usur. c. 16. Volsius, Etym. in voce as.*

Dopo la riduzione gli Autori, che ebbero occasione di parlare della moneta antica, che di presente è fuor d'uso, non seppero meglio caratterizzarla e distinguere dalla specie nuova, che era più leggera, e che col denominarla *aes grave*, moneta pesante. Veggasi *Gronovius, de Pecunia veterum*, lib. 3. c. 15.

Tutte le restè riferite opinioni vengono rigettate affatto dal Kuster, non altramente che errori, nei quali sieno quegli autori osaduti unicamente per essersi confinati, e ristretti alla comparazione di un pezzo di metallo più pesante con un pezzo del medesimo più leggiero. Asserisce costantemente questo Scrittore, come gli antichisti per questa espressione di *aes grave* non intendevano alcuna specie particolare di moneta di rame, che differisse rispetto al peso, od alla forma dalle altre specie del metallo medesimo. Espressione somigliante viene da essi usata per dinotare, non già alcuna, ma bensì ogni e qualunque specie di moneta di rame, messa a confronto coll'oro, o coll'argento, il quale, in rapporto alla grossezza, e massa dei pezzi, era assai più leggiero, tutt'orchè di valor maggiore. Il termine, od espressione *aes grave* pertanto, secondo il sentimento di questo Autore, venne soltanto introdotto, poichè essi cominciarono

a coniare, o battere in monete l'oro, e l'argento: conciossiachè essendo la voce *aes*, moneta, allora comune a ogni, e qualsivoglia specie di moneta, essi non potevan fare una speciale applicazione della medesima al rame, o sia alla moneta di rame, senza che vi unissero l'aggiunto *grave*, pesante, il quale venisse a limitare il suo significato, e ne dilungasse l'equivoco. Noi non dobbiamo pertanto farci ad immaginare, che allora quando gli Autori parlano di una specie di Moneta, cui essi addimandavano *aes grave*, moneta pesante nei tempi primi di Roma, che allora ivi alcuna moneta si trovasse, che avesse una siffatta appellazione; ma che quelli Autori accomodantisi alla costumanza dell'età, in cui vivevano, allorchè la voce *aes* veniva indifferentemente a qualsivoglia specie di moneta applicata, trovasse necessario, in favellando della Moneta antica, la quale era soltanto di rame, e di un peso assai considerabile, il distinguere dalla moneta nuova colla qualificazione, o coll'adattarle l'aggiunto *grave*, pesante, servendosene colla voce, o termine generale *aes*, moneta. Veggasi *Kustl. Dilquis. quid fuerit aes grave?* stampata nella sua Diatriba anti-Gronoviana in Amsterdam 1712. in 8. E veggasi *Jean le Clerc, Biblioth. choisie*, Tom. 24. pag. 111. 112. Gli estratti, e le notizie di quest'opera vengono somministrati nel *Journal des Sçavans*, Tom. 3. pag. 254. Veg. di pari *Memoires de Trev. ann. 1713. pag. 924.* Item ann. 1714. pag. 517. *Histoire Acad. Inscript.* Tom. 11. pag. 346.

Questo sistema però, tuttochè plausibile vien rigettato, e confutato da parecchi dottissimi letterati, e massimamente dal Prizomio, e da Monsieur Ward. (c) Il primo ha composto una Dissertazione apposta sopra simigliante Soggetto, in cui l'opinione del Gronovio viene di vantaggio ventilata, esaminata, e difesa. (d)

(c) *Dissertatio de asse*, pag. 18. 19.

(d) *Dissertatio de aere gravi*, *Leyden 1713. ne abbiamo un Estratto nel Journal des Sçavans*, Tom. 4. p. 202. 203. Veggasi in oltre Pitiscio, *Lexicon Antiq. in voce*, e *memoires de Trevoux ann. 1729. p. 1253.*

MON.

MONTAGNA. L'origine dei monti, o montagna sembra esser dipenduta da esplosioni fatte dal di dentro delle viscere della Terra per mezzo di fuochi sotterranei, ed è cosa infinitamente probabile, che ogni, e qualunque montagna abbia sotto di sé delle immense cavitadi, o me-rocismi: che questo possa essere stato il mezzo usato nella creazione per far, che apparisse la terra asciutta, non è niente affatto ripugnante alla retta Ragione, nè incongruente; conciossiachè provi presso che ad evidenza l'istoria, che i fuochi per entro le caverne sotterrane hanno imperverato, e son passati furiosamente sotto i mari, nè havvi la menomissima ombra di naturale impossibilità della sussistenza di fuochi somiglianti entro fissate caverne, eziandio, allorchè la Terra trovavasi in tutta la sua superficie coperta, ed inondata d'acqua, siccome appunto si era nella sua prima creazione.

A parecchi autori sembrano le montagne difetti, ed imperfezioni del globo terrestre; ma con buona pace di quelli poco Filosofi Scrittori sono i monti per lo contrario veracemente, e realmente di massimo uso non meno, che di positiva necessità pel buon'essere al degli uomini, che degli altri animali tutti. Mol- tissime creature viver non possono, se non se in certe particolari situazioni, e le stesse vette, o sommità delle più alte, e delle più gelate montagne, sono i soli luoghi, ne quali alcune creature al della specie degli uccelli, che di quella de' quadrupedi, viverranno, nè viver potranno per modo alcuno in altra parte del globo. Di specie somigliante sono fra i quadrupedi i Caprioli, e le camozze, e fra gli uccelli il Lagopo.

Le sole montagne son quei luoghi, che valevoli sono a somministrare all'uomo i varj parecchi metalli, che sono di lui così grandi nella vita; conciossiachè se questi metalli fossero prodotti in un terreno piano, e livellato, sembra cosa in estremo evidente, che non avrebbe arte umana, che giugner potesse a consecrare asciutte sempre le miniere, onde non potrebbe l'uomo in quelle operare: oltre il non poterli aver dagli uomini il som- mamente considerabile vantaggio dell'

forgetti, e dei fonti, se non se per l'ajuto delle altezze dei colli, e dei monti. A vero dire sembra questo essere il massimo disegno delle montagne, che le loro cime o sommità essendo piantate nel mezzo dei continenti, possono per somigliante modo servire per distillare l'acqua dolce per l'uso indispensabile dell'uomo, e dei bruti animali; e le loro altezze in tanto esser tali, in quanto esse possano dare una calata a queste correnti siffatte, che elleno colino e portini a basso soavemente, e per somigliante modo vengano ad essere di un beneficio maggiore alla creazione. Così quanto più profondamente noi ci facciamo a considerar la natura, forz'è, che tanto più noi ammittiamo i suoi lavori; e quello appunto, che in essi lavori sembra difetto, ed imperfezione a coloro, che riguardano le cose buccia buccia, nè in esse s'internano, assai sovente al giudiziofo, esatto, giusto, e penetrante occhio, riesce, ed è realmente un maggior beneficio, ed una più prezabile bellezza. Veggasi Ray, Ragionamento Fisco-Teologico cap. 3.

La difficoltà del respirare in cima alle vette delle altissime Montagne è una cosa sentita con tale evidenza, che non può esser convinto della certezza del fatto, se non se colui, che si è trovato a portata di farne per sè medesimo l'esperienza. Il Signor Acolta assai giudiziosamente ci descrive ciò ch'egli sentì e provò per se stesso sopra le vette delle più alte montagne di Pariscaca.

I Monti dell' Armenia, e massimamente quello, sopra del quale vien supposto, che si arrestasse l'Arca del Santo Profeta Noè, è stato renduto di pari famoso per caeonti somiglianti; tuttochè le nevi, che trovansi perpetuamente stanziati sopra le cime di queste montagne rendano impraticabili, ed inaccessibili le loro sommità; quelle persone, che s'acrampiano più in su, che posson mai, vanno perpetuamente sperimentando, che la respirazione va loro divenendo sempre più difficultosa via via, ed a proporzione, che vanno avanzandosi verso le vette, e sono forzate a prender fiato assai più spesso, che nelle pianure; ed a quei viaggiatori, che di ciò si lagnano, le loro scorte o guide dicono sem-

premai, che un siffatto incomodo è cosa oggi mai notissima, ed un fenomeno, al quale forz'è, che sottopongasi qualunque uomo, che ivi si trovi.

Le montagne della Linguadoca, ed i Pirenei altresì producono l'effetto a capello il medesimo. Le persone assai curiose hanno alcuna fiata sperimentato ciò che loro avverrebbe, rimanendosi, come hanno fatto, pel tratto di più ore sopra la cima di quelli monti, e perpeusamente v'hanno provato la difficoltà medesima di respirare; ma è assai più probabile, che ciò possa esser prodotto dalle esalazioni di certi dati vapori usciti dalla terra in siffatti luoghi, meno carichi d'un peso d'aria, di quelli dei siti più bassi; e ciò comparisce sempre più probabile nel portarsi sopra il Monte Teneriff, se parecchie persone trovinsi in una buona brigata insieme unita, e che montin su per differenti tratti del monte, alcune persone respirano meglio d'altre, e ciò è fenomeno assai comune: e le medesime complessioni di certuni vengono ad essere ingiallite dalle esalazioni, le quali vengono evidentissimamente, e sensibilmente conosciute e distinte dal loro odore, e dalla loro acutezza, dove per lo contrario altre persone, che montano per l'altezza medesima in tratti, o porzioni differenti del monte, schivano siffatto incomodo.

Il Monte degno di maggiore osservazione di tutti gli altri monti del noto Mondo, rispetto alla sua forma, è quello appellato il Monte inaccesibile, *the medle mountain*, Monte Ago nel Delfinato.

E' questo un'ampissima eminenza piantata, per così esprimersi, sott'insù, o col fondo a l'insù, o per dir più chiaro, che posa colla sua vetta, non altrimenti che si fosse la sua base aguzza sopra il terreno, ed alzasi colla sua base dilatata ed ampia per l'aerea campagna. Questo monte ha nel suo fondo una circonferenza a un di presso di mille passi, e la medesima circonferenza sopra la sua rovesciata vetta passa i due mila. Sopra il centro del piano nella sommità trovavisi una picciola, e strettissima altra prominenza, o collina, la quale però è altissima.

Guadagnossi questa montagna la denominazione di Monte Ago, o monte dell'
Suppl. Tom. III.

ago, dall'esser supposta inaccesibile, ed impraticabile a chiechessia, a motivo del suo sporgere estremamente all'infuori. Malgrado ciò alcune arditissime persone tentarono una volta d'arrampicarsi, e colà sopra nella più rilevata vetta ebbervi a trovare un prodigioso numero di samozze, animali, che non hanno per modo alcuno la qualità d'arrampicarsi, e che non avevajo ombra menoma di dubbio, che avessero salito, o sceso il monte, e che ivi per molte e molte eradi erano propagate, tutto che riesca infinitamente difficultoso, e malagevole a chiechessia l'appianare il come sianfi dapprima in siffatto luogo trovate. Veggasi Hist. Acad. Roy. Paris. ann. 1700.

Catene di Montagne. E' questa una frase, della quale servono i Geografi per esprimere quelle serie, o continuazioni di monti, che scorrono in uguali, o rette linee lungo tutta una Regione, e che ovunque trovinsi piantati compariscono disposti in ordini non interrotti. S'ingegna e s'arrabatta il Padre Kircher per provare, che quelle catene sono anulari, e che assolutamente raggiungonsi, e legansi tutt' all'intorno al globo della terra, abbracciandolo da Nort al Mezzodi, e quindi di bel nuovo al Nort, o Settentrione; e nella maniera medesima dall'Oriente all'Occidente, e di bel nuovo dall'Occidente all'Oriente; scomparendo, e dileguandosi soltanto all'occhio il corfoloro, per un'avvedutissima provvidenza della natura, per entro ai fondi del mare, onde l'immenso corpo dell'acque ivi trovantesi, avrebbe per simigliante modo il suo movimento libero, e non contrastato nel suo canale, ma apparendo di bel nuovo nella linea medesima, in ogni, e qualunque delle picciolissime Isole, che fanno mostra di sé nel tratto di lor corso retro, da quel paese, ove fu veduto l'ultimo anello della catena, a quel dato paese, nel quale comparisce, e fa di nuovo vederfi il primo anello. Dice questo buon'uomo, come queste immane prominente masse, o mucchi di terra, e di pietre non solamente servono a fiancheggiare, sostenere, e fortificare la fabbrica di questo vastissimo globo della Terra, ma che hanno di vantaggio un'altro grand'uso, che è proficuo non solo all'uomo, ma agli ani-

mali bruti altresì, ed ai medesimi vegetabili eziandio; ed è che questi sono i magazzini, ove stanziano i grandissimi serbatoy dell'acqua dolce, necessaria cotanto alla vita di tutte le creature: che quivi trovansi congregate queste acque, e che quindi vengono ad essere agevolissimamente versate sopra le parti più basse, od inferiori del globo. In Europa i grandissimi Serbatoy d'acqua, che danno il lor bisogno a tutte le regioni di tratto, ed estensione immensa, trovansi piantati in quella amplissima catena di monti, che addimandasi le Alpi, dalle quali, non altrimenti che da un'inesaustibile magazzino, vengono ad essere sufficientemente annaffiati quei vastissimi tratti di terreno somamente ubertoso, che si giace sotto esse Alpi.

Quelle montagne, dalle quali è composta questa porzione della vastissima catena anulare scorrente dal Nord al Mezzodì intorno intorno il globo, appellansi con tre nomi differenti, Cotte, vale a dire, monti Retei, col Vogelo, e gli Apennini: da quelle montagne vengono vomitati gl'immensi fiumi, che bagnano questa ubertissima parte del noto Mondo, vale a dire, il Danubio, il Reno, la Ronna, la Mosella ed un numero presso che infinito d'altri, cadauno dei quali, dopo che ha somministrato il bisognevole d'acqua a tutto un tratto d'estensione vastissima, scarica tanta copia d'acque ad ogni momento nel mare, che la mente rimane stupefatta in risedendovi sopra, ed in considerando onde mai ne possa aver copia così immensa un solo fiume. Questi fiumi, ed una moltitudine d'altri più piccioli, ed oltre a questi, un numero grandissimo di Laghi di vastissima estensione, vengono tutti suppliti, o compensati, o provveduti, dalla Idrosilaccia, o dire gli vogliamo serbatoy delle acque raccolte, e congregatesi nei fondi di queste montagne. Veggasi *Kircher Mundus Subterraneus*.

Le Alpi, tuttochè più, o meno vengano provvedute di questa immensa copia, ed abbondanza d'acque, nulladimeno elle non sono ugualmente concave pel ricevimento di quelle, e per conseguente non tutte contengono i supplementi per un

tratto eguale di terreno: è questo provveduto perciò dalla natura per mezzo d'un vasto numero d'altri più piccioli monti, i quali in parecchie parti di quelle Regioni, per le quali passa questa catena, scorrono dai suoi lati simiglianti a minori annodature, e stendonsi sopra alcuna, o più grande, o più picciola parte della Regione.

Sono questi una specie d'ausiliari supplementi, ed in moltissimi paesi servono in luogo di capi, o polle originali; ma i fiumi da questi propagati quantunque sieno quanto è sufficiente per i bisogni, ed occorrenze degli abitanti delle regioni poste nelle pianure, non iscaricano però quella vasta quantità d'acqua soverchiante nel Mare, siccome quei fiumi fanno, i quali derivano l'origine loro dalle maggiori montagne. I monti Norici nella Germania, il Vogelo, moltissime montagne del Delfinato, e quelle dell'Italia, le quali scorrono dalle fiancate di quella lunga catena, la quale raggiugne, non altrimenti, che la spina d'un corpo, tutta per lo lungo quella Regione, queste montagne, io dico, sono tutte di questa specie, e lasciano tutte questo beneficio ai paesi posti nelle pianure. I monti Pirenei, non meno, che quelli della Carpatia, somministrano perpetuamente un vasto numero di fiumi sbocanti dai loro fianchi, ed i Fiumi della Spagna, della Polonia, e d'Ungheria, riconoscono tutti, niuno eccettuato, l'origine loro da questi serbatoy elevati d'acque nelle catene delle montagne, che passano per essi. Le Regioni, le quali sono stese in ampie pianure, sono trovate per tratti sommarmente dilungati non interrotti da alcuno di questi anelli, od annodature delle divise Catene di monti, sono i soli luoghi, ne' quali la sete, ed i secchi producono la distruzione non meno degli animali, che delle piante; e, generalmente parlando, quella regione, in cui trovansi parecchie, ed altissime montagne, è abbondevolmente, regolarmente, e costantemente bagnata, ed annaffiata non meno dalle più picciole, che dalle più ampie correnti d'acque.

La disposizione dei monti sopra la superficie del globo della terra sembra affai più regolare di quello è stato supposto da coloro

coloro generalmente, che non hanno veduto che picciol numero de' monti medesimi in un tempo in paesi particolari: sono quelli realmente disposti in serie, o di re le vogliamo catene distendentesi, e raggiungentesi per vastissimi tratti, ed estensissimi, ed in alcune da un polo all'altro, dal Nort al mezzogiorno.

Una catena grandissima di monti continuata dall'Irlanda per la Scozia, per l'Inghilterra, e per la Germania con un tratto diritto fino alle alpi, che sono, per così esprimerci, una vastissima annodatura in quella catena, disposta più strettamente, e serratamente, e più elevata, ed innalzantesi delle altre tutte.

Queste vengono nella serie medesima succedute dagli Apeonini, i quali scorrono per tutto il vasto tratto dell'Italia non altramente che la spina dorsale degli animali, e vengono continuati nella serie medesima da quelli della Sicilia; e da questi la stessa stessissima catena vien condotta nell'Africa, e continua fin colà, ove i monti denominanti i monti della Luna. Quindi altra vastissima annodatura, od anello di questa sommaramente detta catena vien condotto fino alle parti più rinculate dell'Africa, e termina per quanto apparisce alla nostra veduta, nel Capo di buona Speranza; nè vi ha ombra menoma di ragione per dubitare, se questa catena venga ad essere continuata nell'opposto continente, e così tratto tratto eziandio nei più dilungati, ed estremi confini del polo meridionale. Quindi la serie, od ordine medesimo prende di bel nuovo il suo corso, e cominciando, per così dire, una novella catena dal polo meridionale, vien condotta per le picciole regioni meridionali conosciute agli Stretti Magellanic. Quivi innalzano sopra le nubi l'alticci capo le famose montagne Andes dell'America Meridionale, e lungheffo questo vastissimo tratto, vien la catena condotta per quella parte del nuovo Mondo entro l'America Settentrionale, e quindi di bel nuovo al polo gelato, ivi terminando, ove ella comincierà, ripure venendo ivi ad attaccare, e congiungere l'altra parte della catena, ove noi prenderemo il principio del nostro piano, od istoria della medesima; di maniera tale che venendo tutta la serie a for-

mare un pendaglio, od un circolo intorno intorno al Globo, non ha nè principio, nè termine, se non se nella nostra immaginazione, o per meglio esprimerci, nella nostra ignoranza delle parti del Mondo, per le quali ella vien condotta nella medesima regolarità, che in quelle contrade colle quali noi abbiamo commercio, e dove ce ne vien data contezza dai Mappamondi.

Altra vastissima catena di montagne scorrente colla medesima regolarità e nella maniera medesima formante un pendaglio, o circolo intorno intorno a tutto il globo della Terra, taglia quella ad angoli retti, e viene ad essere nel suo corso continuata. Questa vienene per la Tartaria da un principio oltre modo dilungato dalle nostre inchieste dietro questa vastissima regione, e continuandosi pel mezzo della Scizia, viene a formare una serie, che comparisce, e fa mostra di sè nell'Indie Orientali, scorrendo lungheffo il mezzo di quella vastissima Regione al Capo Conorino: ivi la catena affondasi entro il Mare; ma se il suo tratto, o corso venga con esattezza contrassegnato, verrà conosciuto, e toccato con mano, esser continuata questa catena nella traccia medesima per l'Isola di Ceylan: quindi ella viene a condursi sotto acqua al punto ad essa opposto nei limiti del continente e quindi per mari, e per terre a noi non per ancora note vien condotta fino al dorso della Tartaria, dal quale noi abbiamo cominciato la nostra istoria. Noi non abbiamo se non se picciolissime prove, a dir vero, di sua continuazione per un tratto vastissimo di questa sua carriera, ma per una mancanza di tal fatto noi non dobbiamo già acagionarne la natura nella sua disposizione, ma bensì la propria nostra ignoranza, che non può se non se pochissimo fissare con evidenza, che questa catena viene ad essere continuata colla medesima foggia, e maniera regolare, siccome lo si è l'altra, e piantata elasticissimamente con essa ad angoli retti.

Siccome il continuo fluir, e riflusso di quel vastissimo corpo di mari dall'Oriente alla volta di Occidente, potrebbe per mezzo della tremenda sua forza produrre alcun disordine, ed inconveniente alle

connessioni della terra, così la providissima natura ha provveduto, per fiancheggiare, e corroborare la fabbrica tutta di questo globo, di catene, o circoli trasversali di montagne, che sono disposti per fissato modo, che vengono di necessità a fortificare, e conservare insieme connesse, e combaggiata tutta la macchina in una maniera validissima. Una serie di questi anelli scorre, e si porta direttamente dall'Oriente alla volta di Occidente fin dai più dilungati confini dell'Imperio Chinesse per tutta quella vastissima Regione, ed ivi questi vengono serrati dalle frontiere di quel paese medesimo, e vengono poscia ad esser continuati per la parte Occidentale della Scizia, per l'India, e pel Mar Caspio, per l'America, per l'Asia minore, per la Macedonia, ed ai Monti Reti, i quali portano, e conducono la catena medesima alle montagne della Gola Narbonesc, e queste quindi ai Pirenei; queste montagne poi vengono condotte alla volta di Occidente nella medesima catena diretta, per quanto può l'occhio umano averne la traccia, ed apparentemente ella viene a scorrere verlo quel punto, dal quale principiammo il nostro piano, o descrizione in guisa tale, che vienlese a formare per essa un circolo regolare, non altrimenti, che per le altre, ove cadauno anello di csa catena esposto alla nostra veduta, per la cognizione, che abbiamo delle Regioni, per le quali questa passa, e parecchi de' quali anelli sono stati tuttora lasciati alle future nostre scoperte, qualora siano per avere questa buona intenzione, e questo lodevolissimo coraggio di intraprenderle a dovere.

Coloro, i quali farannosi a precipitosamente, e tutti in un subito giudicare del presente sistema, potranno per avventura supporre, che manchi del suo dovuto peso, e momento, conciossiachè le catene dei monti quivi descritte non comparisce, che sieno regolarmente in esso condotte, e fatte scorrere pel fondo del mare, dal primo anello in un continente, od in una terra, al primo anello, trovantesi nella terra, o continente a quello apposto; ma tutta la catena sembra senz'ordine troncata, e confusamente rotta od in uno, od in altro Promontorio,

e che soltanto venga ad essere rinnovata, e non già regolarmente, e non interrottamente continuata nell'altro Promontorio: ma egli si è in estremo probabile, che, *quantumvis* ciò non sia così ai nostri occhi evidente, e manifesto, le divise catene di montagne vengano ad essere continuate sotto gli alvei, o letti dei più profondi, ed altissimi mari nella medesima medesimissima foggia regolare, colla quale son continuati nel più aperti, e parenti continenti, o terre, tuttochè le vette, o sommità loro non si sollevino, e s'alzino, sopra la superficie delle acque, ma sieno soltanto vedute in quei luoghi, nel corso dei quali incontransi qua, e là disperse, e sparpagliate delle Isole, fino a tanto che di bel nuovo esse arrivano nel terreno di mezzo. Una disposizione somigliante non dee per conto alcuno essere attribuita, od al caso, o ad irregolarità, ma comparisce ai largovegenti, e sensati uomini uno degli ammirabili effetti della infinita sapienza del sommo Autore della natura.

Il vastissimo corpo di mari, che fa scia, e circonda il globo col suo necessario, e perpetuo flusso, richiedeva un netto, libero, e franco letto, in cui ruotar potesse l'immenza congerie delle sue acque; e le vette delle montagne comparisce, esser state interrotte nel corso di quello immenso fluido, affinchè aver potesse un libero, e spedito canale, e che non troneassero coi loro intoppi per fissato modo il suo corso, che forzato quindi venisse a rovesciare le sue acque sopra tutta la superficie della Terra.

MONTAGNOSO paese, o terreno. I terreni montagnosi, o diaciono sopra le vette dei monti, oppure nei fianchi, o fiancate di quelli, o finalmente nei bacini, e dirupi di luoghi rilevati. Questi di ordinario posseggono un suolo arenoso, alcuna fiata sassoso, e come di scoglio, alcuna fiata un suolo ghiaioso, o viceversa di terra grascia, ed alcuna fiata finalmente fissati terreni son composti di una terra argillosa attaccaticcia, o di una terra grassa nera. I nostri fattori campagnoli le usano, o per ingrassare il belluame, o per seminarvi il grano, secondo che questi dati terreni o sieno umidi, od asciutti, la quale con-

side-

siderabilissima differenza da altro non proviene, che dalla loro situazione, e dalla loro natura.

Quei dati particolari terreni, che diacono, e trovansi piani, ed uguali sopra le cime, e sommità dei monti, sono di ordinario asciutissimi; e quelli, che formano dei baci, o fiancate, esser sogliono per lo più, umidissimi, a cagione dell'acqua, che va fermentando, o che scorre continuo sopra essi. I suoli gelosi, e massimamente della specie argillosa in siffatti terreni, sono i più soggetti degli altri tutti ad esser bagnati, e molli, singolarmente nel tratto dell'Invernata, come quelli, che ritengono l'umido per tratto lungissimo di tempo; quantunque abbisogni questi similmente gl'incomodi dei terreni arenosi, e sassosi nelle medesime situazioni, di scorpolarli cioè, e spaccarli nell'estate. La terra graccia nera, e l'altra terra grassa color di nocciuola in luoghi, o terreni di quella razza, riescono le migliori per la semina dei grani, non meno, che per pascolo degli animali, massimamente se quest'ultima terra rimanga a coperto della troppo comune sventura di esser piena gremita di vermi. Questi siffatti terreni nè vengono ad essere soverchio innaffiati, ed umidi nell'invernata, nè troppo riararsi nel tempo estivo.

I terreni in prominenza di suolo pantanosi hanno alcuni vantaggi, come a cagion d'esempio, abbisognano assai spesso di essere riattati, ristorati, e governati, i quali disadvantages non hanno i terreni di indole medesima trovantisi in situazione piana, od al basso: ma in tal caso questi tali terreni compensano l'incomodo coll'abbondevole raccolta del fieno, il quale riesce anche sempre mai assai più fino, più odoroso, e più perfetto di quello di qualsivoglia altro terreno.

MORCHIA. Altro non è la morchia, a propriamente parlare, che un sugo acquoso di colore oscuro, il quale, viene ad essere spremuto insieme coll'olio fuori delle olive nel torchio, ma il quale collo stare per tratto lungo di tempo in quiete, si separa dall'olio medesimo, e cala al fondo del vaso.

Certuni definiscono la morchia, a-

murca, per secciosità, o parte più grossolana, o fondigliosa delle olive, e questa è un'espressione niente affatto dicevole, anzi sommamente incoerente; conciossiachè quella sostanza, che dall'olio precipita a basso, poichè è stato l'olio pesto nell'Orcio, o nel barile, è propriamente denominata *seccia*. Viene asserito che l'oliva sia composta di cinque differenti sostanze, vale a dire, di osso, o nocciolo, di seme, di sansa, di olio, e di morchia. Veggasi *Calo. Lexicon Jur.* p. 66.

Se la morchia facesse bollire entro un vaso di rame fino a tanto che giunga a conseguire la consistenza del miele, diviene una droga di alcuno uso nella medicina, come quella, che vien reputata un'altringente, ed un'efecante (a) ed in fatti siccome tale, e con simigliante invenzione medica ella vien talora prescritta, e praticata nella medicatura delle ulcere non meno, che contro le indisposizioni dei denti, degli occhi, e simiglianti. (b)

(a) Veggasi *Savary, Dict. Commere. Tom. I. pag. 96.* (b) *Vegg. Burgav. Lexicon medicum, Tom. I. pag. 617.*

Applica Ippocrate il termine morchia *Amurea* ad uno stato del fegato crudo, immaturo, putrido. Veggasi *Hippocrat. Aphor. 45.*

Alcuni Scrittori hanno simigliantemente dato il nome di morchia a quel sugo, o fluido, che vien trovato entro i reni succetoriati, *renes succenturiati*. Veggasi *Castell.* *Lexicon medicum* in voce *amurea*. Veggasi altresì l'Articolo **SUC-CENTURIATI**.

MOROIDI, o morici. Sono le moroidi, o morici distinte dalla maniera, e dal tempo, che elleno affacciansi, e tornano a farsi vedere, e provare al paziente, od in un tratto regolare e periodico, oppure vago, ed irregolare.

Segni delle moroidi. Vengono queste per lo più precedute da una sensazione dolorosa, non meno, che da una tensione negli ipocondri, e da certi movimenti vibratorii, o spastici intorno alla regione dello stomaco, del mesenterio, e della milza; e quello, che è assai più ovvio dei divinati segni, havvi una certa sensazione, per così esprimersi, non altramente che di un duro nocciolo attaccato

cato nell'estremità dell'intestino retto, e che quanto più in su che venga questo nell'intestino medesimo sentito, tanto più malagevole, e disfacilito riuscirà lo sgorgamento della scarica moroidale, e tratto di tempo più lungo vorravvi innanzi che ella facesi vedere. Di conserva con simiglianti sintomi falsi bene spesso sentire di pari un tenesimo. Sono quelli pertanto i comuni antesignani delle affezioni moroidali; ma dannosi ciò non ostante delle persone, che vengono dalle morici assaltate senza il menomo dei divisati segni antecedenti. Quando sono le morici presenti havvi uno sbocco, o scarico di sangue, e questo sangue ordinariamente purissimo, e florido in quelle date persone, le quali sogliono avere questo spurgo con frequenza, e regolarmente: in altre persone poi, che ciò hanno di rado, ed in guisa irregolare, ed imperfetta, il sangue comparisce di ordinario nero, e grumoso; ed in alcuni casi, massimamente in quelle date persone, le quali non hanno avuto uno sgorgo, o flusso genuino, e proprio di specie somigliante, vienvi spurgata, e mandata fuori una sanie, o materia corrotta, in vece di sangue puro. Radissime fiate lo sbocco languigno dalle morici è volontario, ma comunemente vien forzato, e violentato a sgorgar fuori da un gagliardo pigliamento, o dalla durezza delle fecce, in ilearicandosiene la persona. Veggasi *Juncker, Conspect. medic. p. 47.*

Personi soggette alle morici. Molestano le morici ugualmente ambi i sessi, ma veggionvisi sempremai con frequenza maggiore sottoposti gli uomini, che le femmine. Son queste assai frequenti nelle persone di mezza età, e nel più avanzato tratto della vita; ed allora quando attaccano la gioventù, esser sogliono comunemente mercanzia ereditaria.

Cagioni delle morici. Fra le cagioni delle morici esser dee riconosciuta una plethora, e la grossezza del sangue, avvenchè radissime volte ne sia la cagione una manifesta sottigliezza, ed acrimonia del medesimo sangue, tuttechè venga pur troppo, e troppo spesso supposto così andar la faccenda. Gli scuotimenti gagliardi, e violenti dell'addome, come a ca-

gion di esempio anche i soverchi urti, e sacchettamenti pel violento camminare, e cavalcare, assai sovente produrranno questo incomodo, come altresì una vita sedentaria, nella quale per la compressione dell'addome viene ad essere impedita la circolazione nella vena porta: somigliantemente un intralasciare alcuna usata evacuazione di sangue, uno stravizzo, ed abuso di cibi calorosi, e di potenti, ed energici liquori spiritosi, ed il prendere dell'aloè, o delle medicine di indole somigliante. Nella Saffonia le morici sono frequentissime dal trasmodato uso, che appunto far suole quella nazione dell'Elixir Proprietatis; e nell'Ungheria dal soverchio mangiar, che fanno dell'aglio: dalle violente fasciature, e strettoie delle budella, e per le passioni di animo, massimamente ira, e timore, e finalmente da una venetea, o gallica infezione verranno somigliantemente le morici prodotte: ma quell'ultima cagione suol ingenerare le morici cieche, o quelle sieno, che non gittan sangue, od ellene.

Prognostici delle Morici. Le Morici, allorchè hanno il corso, o sgorgo loro piacevole, naturale, e non trasmodante, ma moderato, riescono d'un beneficio e vantaggio summo alla sanità, ed assai fiate le impediscono, e tengono dilungate le malattie gravi e violente. Sono queste di pari la medicina più accettata d'ogni e qualunque immaginabil rimedio, e specifico nelle affezioni ipocondriache; abbassano inoltre il delirio, ed assai volte tengono dilungati gli attacchi podagrici. Ma tuttochè le Morici abbiano, e portin seco tutti i divisati assai rilevanti vantaggi e benefici, allorchè sono moderate, quando però esse trasmodino, oppure allorchè continuino il corso loro per tratto di tempo soverchio lungo, sono sempre mai accompagnate con rei e pravi sintomi, e non di rado sono eziandio pericolose. Inducono nel paziente una somma debolezza, e col tratto del tempo elleno fanno divenir l'uomo, o la persona cachetica; ma ell'è cosa rarissima, che le morici sieno così veramenti nel loro sbocco languigno, che vengano a cagionare una morte assai presta, sebbene abbiamo esempi dell'aver alcuna fiate prodotto anche questo fatale scon-

certo. Il troncarle così in un subito è cosa sempremai rea e pericolosa, e spessissime fiate viene a produrre in brev'ora de' sintomi fatali, vale a dire, scirrosità delle viscere, infiammazioni, melancolia, pazzia, o mania formale, sbocchi di sangue dalla bocca, e non di rado la aonsequenza rea di pratica somigliante, si è una formale idropisia, ed iterizie nere, &c. Quelle persone, che sono attaccate dalle morici nella loro gioventù prima, vengono generalmente con esatta regola a portarle pel corso intero del viver loro, e questi tali radissime volte giungono alla vecchisia: per lo contrario, allorchè non affacciansi sulle persone, prima che queste non sieno avanzate negli anni, e che dopoi continuano il corso loro moderato, e regolare, sogliono d'ordinario promettere una lunga e prospera vita. Ultimamente, allorchè le moroidi sono continue, e che s'fgorano senza dar mai sosta, havvi cagione grandissima di sospettare d'uno stato scirroso, ed emacerato di alcuna delle viscere addominali.

Metodo del Trattamento. Allorchè le moroidi non si sono peranche affacciate, ma che hannovi già i segnali del loro esser vicine, ella non è sempre cosa dicevole l'asfrettare, od il promuovere i loro sbocchi, conciossiachè radissima quella volta sia, che questi corrispondano esattamente, ed a capello all'aspettazione; ma allora quando abbiavi motivo assennato, e presso che certezza della mala riuscita, ella è sempremai cosa migliore il fare ogni sforzo per dilungarle, e per fare una rivulsione col cavar sangue dal braccio e dal piede, e nell'atto e tempo medesimo fortificare, e consolidare il tono delle parti a forza di decotti di millefoglio, o con simiglianti medicamenti. La cavata del sangue poi esser dee ripetuta in avvenire in certidati determinati periodi, e qualora rendasi necessario, dovrasì continuar l'uso de' rimedj interni: ma allorchè le moroidi hanno già presa la loro strada, tosto che il paziente sente il segnale del loro avvicinamento, lo sbocco, o scarica loro dee essere per gentile e soave modo promossa sempremai per mezzo d'affai moderato uso dell'elisir proprietatis, oppure colla tintura d'olileboro, ovvero colla sua resina, fat-

ta, e procurata collo spirito di vino: esternamente poi coll'applicazione delle mignatte, oppure, qualora ciò non sia bastevole, coll'aprire a dirittura le vene moroidali colla lancetta. Veggasi *Juncher* *Consp. Medic.* pag. 47.

Durante il tempo dello sbocco, o corso sanguigno, qualora questo sia moderato e benigno, non havvi ombra menoma di bisogno, o d'ajuto di medicamenti, ma dee onninamente essere offervata una dicevole ed adeguata dieta: dovranno *canes pejusi* & *angues* tener dilungati tutti i cibi stutolenti, siccome di pari ogni e qualunque cibo altringente: dovrasì di pari moderare, e restringere l'uso de' liquori spiritosi, e l'animo dovrasì conservar libero affatto, e securo da ogni inquietudine, e singolarmente da moti disordinati di passioni. Allorchè lo sbocco o scarica è soverchio picciola a scarla, questa dee essere onninamente per adeguato modo promossa; e quando la medesima è realmente soverchio grande e trasmodante, e che le forze del paziente nè toccano, nè vagliono a portarla, dovranno dal savio Medico prescrivere al paziente le medicine nitrose, cinabrine, ed asforbenti, come anche le polveri preparate di sal prunello, ed il cinabro, siasi questo poi o nativo, od antimoniaie; in evento, che abbiavi urgente necessità, a questi rimedj potrasì con assai dicevolezza aggiungere alcuna gentilissima oppiata, come, a cagion d'esempio, le pillole di storace, oppure di ciuoglossa. Dopo fissata medicatura dovranno applicare al paziente dei gentilissimi clisteri, e dopo di tutto ciò avrà il suo luogo acconcio l'uso dei noti specifici: fra questi virtù ed efficacia mirabile possiede un decotto del millefoglio comune; sebbene sono simigliantemente d'uso assai grande i decotti di capelvenere, o di alcun altra delle erbe note d'indole somigliante. Poichè gli accessi faranno a capo, sa onninamente di melheri, che venga ripetuta la cavata del sangue negli Equinozi, e di tratto in tratto, vale a dire, a tempi adeguati dovranno far prendere al paziente delle soavi purghette, e soprattutto delle dolcelle di rabbarbaro, il quale possiede una qualità, e virtù asfregente, per la quale viene in tal caso

calo ad essere sommamente proprio; oltrechè queste stesse doserelle di rabarbaro possonsi di pari con profitto prendere anche nel tempo del corso sanguigno.

MOROIDI cieche. *Hæmorrhoides caecæ*. E' questa una denominazione data dagli Scrittori delle cose mediche a ciò, che gl' Inglese appellano *piles*, che in sostanza significa moroidali e crescenti. Sono queste cieche morici infarcimenti esterni degli esterni vasi moroidali intorno all' orificio dell' intestino retto, le quali alcuna fiata formano dei tumori semplicemente rigonfi, ed alcune volte dei tumori infiammatori, e sono destinate dalla Natura queste cieche morici per la scarica del sangue da quella parte, per ricever o sollievo delle emorragie.

Le moroidi cieche sono di due specie, vale a dire, o semplicemente rigonfianti, o tumide; quelle della seconda specie sono dolorose ed affittive, e quelle della prima sono senza dolore. Le morici cieche semplicemente rigonfie sembrano affatto similanti ad una sottile vescica trasparente ripiena di sangue nero, o pendente al nero, e vengono accompagnate da un incomodo non sensibile, se si eccettui il tempo, in cui altri scarica il ventre, quando queste cagionano una sensazione, che assomigliasi a quella, che proverebbe uno, che avesse incagliato in quella parte un nocciolo di fulina, o corpo somigliante, che ne chiudesse il naturale passaggio; ed oltre a ciò sentiti nella parte medesima di tratto in tratto del calore straordinario.

Le Moroidi cieche tumide sono situate un poco più indentro nella cavità della verga dell' estremità dell' intestino, ed assomigliansi ad un tumor duro, ed infiammatorio: quelle, a vero dire, se si voglia parlare con proprietà, altro in lesione non sono, che surculi di quella parte, e cagionano dei dolori violentissimi, ed in estremo acuti, a cagione della sensibilità grande delle incamiciature, o tuniche nervose, muscolari, che vestono gl' intestini.

L'arcechi Autori, oltre alle pur' or descritte, riconoscono sotto la denominazione di morici, o moroidi cieche, ogni, e qualunque sorta d'elecrenza tumida, come anche delle rigonfiature fungose, ed

esulcerate, che talvolta nascer sogliono intorno all' ano. Egli è però vero, che queste vengono ad esser distinte dall' appellatione particolare di moroidi bastarde, moroidi ipure; e riconoscono ordinariamente l' origine loro da infami attacchi venerei; ma sogliono di pari alcuna fiata procedere dalle morici rigonfianti, le quali, nei corpi di temperatura, ed abito intaccato, e guasto, ed in quei dati corpi altresì, che sono grandemente soggetti a ferositadi ulcerose, alcuna volta degenerano in quelle particolari gonfiezze secche, e verrucose, le quali con appellazioni particolarissime addimandansi dai medici *Thymi*, *marisci*, ed anche *Ficus ani*. Veggasi *Juncker*, *Consp. Medic.* pag. 233.

Le moroidi cieche, o sieno morici esterne, differiscono dalle moroidi, o morici interne in rapporto alle vescichette, alle quali debbono l' origin loro, conciossiachè le interne nascano, e procedano dalla vena porta, e le esterne per lo contrario dalla vena cava: differiscono le medesime similantemente in riguardo alla loro grossezza, e per rapporto altresì alla copia del sangue, che mandao fuori; avvegnachè le morici interne sogliono scaricarne, e mandarne fuori comunemente una mezzana, e moderata quantità; ed in evento, che sieno frastornate, ne gittan fuori una grandissima porzione: dove per lo contrario le morici esterne radissime volte mandan fuori la menoma gocciola di sangue, ma fanno soltanto mostra di sè, comparendo nella divisa forma di tumori ciechi. Le morici interne hanno similantemente i loro periodi determinati, e regolari, e con somma frequenza offerivano elastamente, ed a capello l' ordine dei mesi delle regolari scariche menstruali delle femmine, facendosi vedere quelle negli uomini, come quelle fioriscono nelle donne. Le esterne poi per lo contrario non osservano periodi regolari, ma fanosi vedere massimamente nella Primavera, e nell' Autunno, od io vicinanza di quelle stagioni: e compariscono di maggior mole, ed hanno copia più abbondante di sangue ad esse derivato in quelle date persone, sopra le quali sogliono comparire, e farsi vedere più spesso. La loro grandezza in soggetti, e persone diver-

Se è in estremo differente , e varia : conciossiachè in certuni elle sieno della grossezza di un'ordinaria nocciuola , in altri poi di una noce , ed in alcuni finalmente elle giungono ad essere della grossezza di un'uovo di piccione , ed anche di un'uovo di gallina .

Le moroidi cieche turgescenti , o romponsi e spaccansi dispersè naturalmente , o richieggiano la mano del Cerusico per aprirle ; e quando viene effettuata questa operazione , non solamente elle mandan fuori , e scaricano il sangue in esse contenuto , ma ne suppliscono anche dopo un'ulteriore quantità . Morici appellate tumide , hanno tutti i segni di tumori infiammatori , nè sono disgiunte giammai da acutissimi , e violentissimi dolori .

Persone sottoposte a questa specie di moroidi . Le moroidi esterne turgescenti avvenute sogliono massimamente a quelle Persone , che sono di un'abito di corpo stematico , e pìutosto : queste a vero dire si fanno vedere sopra quelle donne talora , che trovansi incinte , e continuano ad incomodarle per tutto il tratto della gestazione del feto , senza che elleno sieno in conto veruno del diviso temperamento , e specialmente verso gli ultimi mesi di loro gravidanza , ed in modo particolare ciò avvien loro , qualora elle sieno per lunghissimo tratto di tempo a sedere : come anche queste medesime morici sogliono soltanto comparire alle donne nel tempo stesso delle doglie del Parto , allorchè il feto con tutto il suo peso gravita , e preme sopra il pelvi .

Cagioni di queste morici . La cagione generale di quelle si è una pletora accompagnata da una spessezza , o grossezza del sangue : quindi la Natura tentando di sollevarsi , ed alleggerirsi per mezzo di un'emorragia di fissati vasi sanguigni , fa derivare una copia più abbondevole di sangue dell'ordinario in essi vasi , ove questo rimansi , e secondo lo stato suo differente , viene a formarvi , o delle semplici vescichette , oppure dei tumori infiammatori .

Le cagioni poi accidentali , che partoriscono , o danno l'adito a questo male , sono le trasmodate attrizioni in quelle parti , dal cavalcare per tratti lunghissimi di via , coloro massimamente , che a tale

esercizio non sono usi ; da umore mordace , od acuto colante intorno alla parte ; da un penoso scariarsi degli escrementi in coloro , che sono in estremo duri di corpo , e dalle doglie del Parto nelle donne . Dice il sommaramente dotto Junekero , come queste sogliono alcuna fiata nascere in quelle date persone , le quali pongansi a sedere in una seggiola , od in somigliante sedile subito dopo che da quel sedile medesimo alzata siasi alta persona , che eravi stata per buona pezza adagiata , la quale avesse le moroidi esulcerate . A tutto ciò dee essere aggiunta , come questa specie di moroidi assai sovente deriva dall'aver trasalciato quelle cavate di sangue , alle quali la persona era avvezza ; da un'imprudente abuso di medicamenti aloetici , d'elileboro , e d'altre calorse medicine , ed ultimamente dall'uso trasmodato di cibi soverchio conditi , e calorosi , e di liquori spiritosi .

Prognostici in questa specie di morici .

Le moroidi cieche trovansi sempre , e costantemente in uno stato di tendenza ad un termine salutare , che è quanto dire , ad una evacuazione di parte del sangue sovrabbondante negli abiti di corpo pletorici ; ma a motivo della picciolezza dei vasi , ove queste sono formate , bene spesso tradiscono l'intenzione della natura , e non giungono al fine adeguato . Allorchè queste , o romponsi naturalmente , o vengono aperte dall'arte , vengono per alcun tratto di tempo a somministrar una scarica , la quale può benissimo compensar quella , che vien fatta dalle moroidi interne . Allorchè queste romponsi per se stesse , comunemente in progresso sannosi ulcerose con somma facilità , ma fissato incomodo non è mai accompagnato da alcun dolore violento , e grande . Tosto che queste sono aperte , il vaso , onde veniva formato il tumore , diventa menzionato , e grinzofo in quella parte , e forma una specie di papule , o sieno piccioli tubercolletti , i quali , qualora altri non prendasene una propria , ed adeguata cura , bene spesso continuano a scaricare , e mandar fuori una picciola porzione di sangue , ogni , e qualunque volta la persona pongasi a fare i suoi agi , e che abbia il corpo indurito ; ed eziandio in alcuni casi questi

K k k

tu-

tubercolotti hanno continuato, senza dar mai la menoma sosta, a scaricare una picciola quantità di sangue per anni, ed anni: oltre a ciò, alcuna fiata fogliono di pari degenerare in certe picciole ulcere serpeggianti, e producenti acuto pizzicore, che perciò s'indimandansi dai Medici *Serpigo ani*, e *Pruritus ani*. Questo è un'incomodo in estremo inquietante, e fastidioso, e non di rado suole affliggere quelle tali persone, le quali sono soggette alle morici esterne, tuttochè dagli autori delle cose mediche non venga gran fatto considerato: questo non dilatasi, nè prende luogo, ma bene spesso si fissa, e continua a starsi in un medesimo sito per mesi parecchi; ed in evento, che a forza di un'imprudente trattamento venga ad esser quiodi dilungato, frequentissimamente torna a risorir di nuovo con assai maggior forza, e violenza nelle parti a quella, in cui prima trovavasi, adiacenti, ed alcuna fiata ingenera dei malori d'indole, e natura più trista in luoghi più lontani. Veggasi *Juncker*, *Conspectus medic.* p. 239.

Non meno le moroidi tumide, che le turgescenti trovansi sopra il paziente senza pericolo della vita del medesimo, se si eccettuino però quei tali casi ne quali elleno vengano ad esser violentemente troncate, e sopresse, in quelle date persone singolarmente, che per tratto lungo di tempo vi sieno state sottoposte.

Le moroidi tumide però portano seco un pericolo, del quale sono affatto al coperto le moroidi turgescenti, vale a dire, che se le prime vengano trattate negligenzemente, elle verranno alcuna fiata a produrre una suppurazione, la quale va bene spesso a finire in una esulcerazione fistolosa. Questo malore avviene pur troppo frequentemente, allorchè quelle vengano tagliare soverchio profondamente durante il tempo di loro maturamento, e che poscia son mantenute aperte per tratto di tempo soverchio lungo senz'esser ben netate, e rimonde. Allorchè le affezioni moroidali s'annoi ulcerose, divengono assai più attaccate, e contagiose d'ogni, e qualunque altra malattia, che s'attacca; e siccome questa è una nozione, che possiede pochissima gente, quindi è che moltissimi quelli sono, i quali son malmenati da siffatto disordine.

Metodo della Cura. Le moroidi cieche turgescenti, se vengano trattate col metodo comune dei tumori, e delle picciole ulcere dalla mano di prode, e diligente cerusico, radissime volte sono accompagnate da triste conseguenze. Le tumide poi arrecano un disturbo infinitamente maggiore. Fa di mestieri, che il primo tentativo sia di purgarle: ed a simigliante effetto la cavata di sangue dal piede è una delle prime, e delle principali cose, che debban'essere effettuate, nei casi, ove abbiavi un'abito di corpo pleorico, e poi debbon'esser prescritti al paziente gagliardissimi, e potentissimi decocti di millefoglie, facendogliene prendere parecchie dosi fra la giornata, oltre la somministrata necessaria applicazione dei topici medicamentosi esterni, quali appunto sono l'unguento di Linaria, e le radici di scrofularia: queste medicine sono da certuni riputate speziei, e gli Autori Botanici strepitano contando, e magnificando a piena bocca le maraviglie dei loro effetti.

Se per via de' divisi merzi, dopotè, o quattro giorni di prova, non vi si veggia speranza, che queste moriei piegino la testa, e cedano, in tal caso non debbi lasciarsi mezzo alcuno di farle venire a maturezza colla maggiore speditezza, che mai sia riuscibile. Per tale effetto dee soprattutto esser preferito un cataplasma composto di cipolla abbrustolita, d'olio di semi di lino, e di grasso di vitello; e quando i dolori sono violenti, ed acuti, debbonsi al paziente di pari somministrare de' medicamenti per bocca, quali esser possono, a cagion d'esempio, con somma dicevolezza, il nitro colle emulsioni rinfrescative, e qualora rendasi veramente necessaria, una gentile oppiata altresì. L'olio d'uova viene similantemente assai commendato per l'uso esterno, col fine d'alleviare il dolore. Poichè quelle morici caparbie son ridotte a dicevole maturezza, debbon'essere dalla mano di sperimentato Cerusico aperte con estrema diligenza, e non meno il rimondarle, che il farle cicatrizzare dovrà allora esser fatto avanzare con tutti i mezzi possibili, ed immaginabili. Internamente poi dovranno far prendere al paziente le medicine soavemente rilasceranti, e queste esser possono l'Elettua-

rio

rio lenitivo, e cosa somigliante, colla manna, colla lena, oppure con altro tale gentil cataratico; e dopo di questa medicatura somministrarannosi con estrema dolcezza i medicamenti purificanti il sangue, quei tali altresì, che sieno atti, e valevoli ad attutare, ed ammansare i soverchi trasmodati moti di quello. Condotta a termine poi che sia la cura, il metodo migliore per porre un'ostacolo alla recidiva si è quello di cavar sangue nella Primavera, e nell'Autunno, e l'applicazione delle mignatte alle vene moroidali in ogni, e qualunque stagione, che altri sentasi della disposizione ad un novello attacco. *Juncker, Conspectus medic.* p. 240.

Soppressioni delle moroidi. Fannosi i medicamenti a considerare la soppressione delle moroidi con tre diversi rapporti. 1. Quando queste non hanno peranche mandato fuori gocciola menoma di sangue, ma che sonosi osservati i tentativi tutti della natura verso la loro apparenza, e sonosi veduti tutti i sintomi di quelle. 2. Quando queste hanno già avuto il loro sbocco sanguigno abituale; ma che il corpo loro è stato troncato usualmente ed impedito da accidenti: e quello è ciò che avviene molto frequentemente in quelle morici che addimandasi morici cieche. 3. Allora quando sono queste state solite da mandar fuori il sangue regolarmente, ed in buona forma, ed in certi determinati, e fissi tempi per una lunga continuata serie di anni: le soppressioni in questi stati infra sè differenti vengono accompagnate da varj e diversi sintomi, e da varj, e diversi disordini, e sconcerti.

Segni delle soppressioni delle moroidi. Sono questi soventi volte le ipocondriache affezioni comuni, facendo alla bella prima mostra di sè in dolori, ed in uno stiramento, o tensione del sinistro ipocondrio, che va dilatandosi, e stendendosi fino alla regione lombare. Questi poi son succeduti da dolori spastici, da coliche violentissime, da enfazioni della milza, da vergente al vomito, da ostinatissima costipazione del ventre, da una durezza nell'addome, ed ultimamente da infarcimenti, ed ammassi scirrosi delle viscere, da melancolia, da mania, e da un vomito sanguigno. Questa si è la trista salange

dei successivi sintomi, la quale disperse, e naturalmente accompagna le soppressioni delle morici interne.

Le soppressioni poi delle moroidi esterne partoriscono bene spesso degli attacchi podagrici, delle rec affezioni nefritiche, e l'orine sanguigne: a queste rec conseguenze aggiungasi poi, come il sintomo sommamente comune accompagnante la soppressione sì dell'emorici interne, che delle esterne, si è un'asmafica difficoltà di respiro, allai fiata non disgiunta da una tosse. Le persone grandemente affatte soppressioni sottoposte da cagioni naturali, sono quelle di una disposizione melancolica, siccome quelle tali, che per ogni menoma ombra intimoriscansi, e si spaventano, e che si affannano, ed attristansi per ogni baja, e quelle finalmente, che da un tenore di vita laboriosa, alla quale erano usi, sono in un subito passati ad un vivere ozioso, e sedentario. Veggasi *Juncker, Conspect. medic.* pag. 84.

L'interne, e naturali cagioni di soppressioni, o troncamenti somiglianti sono massimamente, ed innanzi a tutto, una grossezza, o spessezza del sangue, oppure una violentissima commozione orgaltica del medesimo: le cagioni poi accidentali, ed esterne dei medesimi troncamenti sono l'inadeguato, ed improprio uso dei medicamenti di indole astringente: il fare delle copiose bevute di liquori freddi sendo grandemente la persona riscaldata, ed incalorita; una dieta grossolana, e pesante, ed una freddura soverchio grande dell'addome. Somigliante troncamento, o soppressione è in estremo difficultosa, e malagevole ad essere dilungata; ma viene universalmente sperimentato, che piega la testa, ed obbedisce agli opportuni medicamenti con più agevolezza, allorchè ella dipenda da cagioni naturali, che allora quando ella è dovuta a cagioni esterne, ed accidentali: ed esser dee osservato, come una soppressione, o troncamento delle moroidi, nel primo loro attacco, è molto meno pericoloso, di quando elle trovavansi già manifeste, ed avevano oggimai cominciato a fare l'usato corso loro.

Metodo della Cura. In quei casi, nei quali le moroidi non peranche sonosi as-

K k k 2

fac-

faccie, ma che il paziente ne ha soltanto pravi i sintomi, che debbono ad esse precedere, è onninamente necessaria una cautela grandissima per determinare, considerato l'abito di corpo, e la costituzione del paziente, se sia expediente il promuovere, ed invigorire la loro comparìa, ed alitare, e fiancheggiar la natura nello sforzo, che ella mostra di fare per sollevare, ed alleggerir se medesima; oppure se rendasi necessario, e sia consiglio, e partito migliore il divagare, e condur via per alcun'altra strada il sangue soverchio, e ridondante. In evento, che il corpo trovi in uno stato siffatto, che ci prometta, e pressochè ci assicuri di un flusso ricucibile, e prospero dalle morici medesime, allora dovrai promuovere per mezzo di gentili, e benigni medicamenti aperienti; ma se la cosa vada altrimenti, in tal caso il sangue dee essere divagato, e richiamato ad altra parte per via della flebotomia nel braccio, e dovrà oltre a ciò il paziente mettere in pratica un'assai frequente esercizio del corpo.

Nel caso poi di soppressioni, o troncamenti di flussi moroidali soliti a scorrere ed abituali, innanzi a tutto dovrai fare abbassar la testa ai sintomi colle cavate di sangue dal braccio, e poscia dovranno prescrivere al paziente dei elisir emollienti, quali appunto esser possono assai acconciamente, il latte, in cui sieno fatti bollire de' fiori di camomilla, od a questo somigliante; e dopo un'acconcio uso di somiglianti elisir dovrà esser corretta, e rimodata la rea qualità del sangue a forza di adeguate, ed appropriate medicine interne: i rinvimenti trasmodanti del sangue medesimo dovranno attutire, e reprimere a forza di nitro, di medicamenti assorbenti, e di cose somiglianti, e la sua spessezza dovrà diradare, ed assottigliare colle medicine attenuanti. Fatto tutto ciò dovrà dallo sperimentato, e saggio medico esser promossa la derivazione del sangue medesimo alle proprie parti a forza di medicamenti soavemente stimolanti: tali sono l'aloë, e tutte le preparazioni di quello, e massimamente l'Elisir proprietatis; e potranno somministrare similmentemen-

te in piccole dozerelle lo zafferano, ed il borace: a siffatta medicatura potrà con somma dicevolezza essere aggiunto l'uso dei elisir di indole stimolante, come anche le supposte acri, e richiamanti, ed insieme l'applicazione delle mignatte alla parte. Veggasi *Juncker*, *Conspect. medic.* pag. 87.

MORSO. Vien definito il morso una soluzione della continuità di una parte morbida, o lottice, cagionata, e prodotta dai denti di un animale. Veggasi *Casselli*, *Lexicon medicum*, pag. 510. in voce *morfus*.

Rispetto poi ai morsi velenosi della vipera, dell'alpide, del cane arrabbiato, della tarantola, e somiglianti, veggansi nelle rispettivi articoli *VIPERA*, *ALPIDE* ec. ec.

La pietra bisia, l'erba appellata bisioria, la terra Maltese, e somiglianti vengono da parecchi Autori riputati tutti specifici maravigliosi contro i morsi avvelenanti. Veggasi *Grew*, *Museum Regiz Societat. L. I. §. V.* pag. 52. pag. 227. e pag. 347. Veggansi gli Articoli *PIETRA bisia*, *BISTORTA*, ec. ec.

Le masticature dei ragni, o ragnateli, per lo meno di alcune specie di essi, compariscono similmente velenosi: lo che ha per avventura data occasione a quell'errore pur troppo comune, che questo insetto è velenoso, allorchè venga inghiottito. Veggasi l'Articolo *RAGNATELO*.

Monficur Robie, che è un medico della nuova Inghilterra, ci somministra l'istoria di una persona, che venne morsa in una gamba da un piccolissimo ragnatelo, il quale a caso trovavasi racchiuso entro i suoi filaretti: questo morso venne tostante seguito da un dolor vago acutissimo, prima afferrando la persona medesima nella gamba, poscia nell'angui-naja, e via via andò dilatandosi, ed afferrando il dorso, la coscia, e la testa, accompagnato da varj tristi sintomi. Questo Valentuomo risanolla coll'appresso medicina: Sp. corn. cerv. & tal. volat. corn. cerv. con vino viperino, e con cipolla, od aglio esternamente applicato alla masticatura. Veggansi le nostre *Trasfazioni Filosof.* sotto il n. 382. pag. 69. & seq.

Il sovano Medico, e Filosofo Francesco Redi attribuisce la malignità del morfo di una vipera, ad un certo particolar sugo, o liquore giallo stanziate in una borsettina piantata sotto le gengive di questo animale, che per una fessura nei denti viene infiltrato entro la ferita. Monsieur Bourdelot poi, e Monsieur Charas, non so poi con quali fondamenti, avvegnachè le esperienze del Redi centuplicate hanno provato la veracità di sua asserzione con evidenza più che Geometrica, ascrivono la malignità medesima agli spiriti biliosi irritati, ed all'alito dell'arrabbiato animale. Veggansi le *Transf. Filosof.* n. 83. pagg. 4074. 4075. &c. seq.

Questi Signori impugnanti l'evidenza delle esperienze del Redi per sostenere la contraria loro opinione asseriscono, che i polmoni della vipera sono pieni zeppi di spiriti biliosi, cui ella esala insieme col suo alito, e che in questo mortifero animale havvi un canale, o condotto scorrente, e portantesi dalla cistifellea alla gola, per mezzo del quale vien fatta una più vivace, ed una più copiosa infusione della bile entro la ferita. Ma questa è a mio credere una fantastica maniera di raziocinare per puro, e mero spirito di fatti nome coll'impugnare uomini sommi, e di grandeggiare sopra essi. Questo sarebbe difetto in qualche modo perdonabile; ma ella si è una follia il voler farsi ad impugnare l'evidenza, come appunto avviene nel caso delle esperienze dell'immortale Francesco Redi sopra le vipere, ed il loro veleno. La nuova opinione di questi Saccetti a mal tempo va a terra, e rimane totalmente distrutta col solo esporre, come una tela da ore, e giorni recita dal corpo della vipera fu in Firenze valevole ad uccidere un'uomo scalzo, che avendola in vicinanza di una bottega di uno speziale a caso calpestata, ne venne morfo, ed ucciso avvelenato. Il sempre grande sperimentatore Francesco Redi, dopo il deferito funesto caso, uccise più, e più animali fatti mordere dalle teile delle vipere troncate a bella posta dal corpo delle medesime, e mise il fatto fuor di questione. Aggiungeremo soltanto, e ciò a solo fine, che la gente non venga abbagliata da questi nomi nuo-

vi, e forestieri Bourdelot, e Charas, che avrebbero assai più utilmente in altro impiegato in lor tempo, che in impugnare un'innegabile verità, come il Redi ridusse la cosa ad identità di fatto coll'aver mille fiate ferito infiniti animali di generazione varia, e nelle lor ferite introdotto il divisato liquor giallo stanziate nelle borsette delle gengive delle vipere, tutti questi animali esser morti avvelenati. Veggansi tuttavia le *Transf. Filosof.* n. 77. pag. 3015.

Il rimedio migliore, ed il più efficace per questo morfo si è il succhiare validamente la ferita: è questa una specie di cura, per la quale vengono altamente celebrati gli antichi Marli, e Psilli. Veggasi *Francesco Redi* nelle nostre *Transf. Filosof.* n. 9. pag. 161. Veggasi di pari l'Articolo *VIPERA*.

La cura migliore per morfo dell'Aspide si è un cauterio attuale: a capion di esempio tener sopra la ferita un acceso carbone. Vegg. *Transf. Filosof.* n. 210. pag. 127.

I morfi, o morsiature di varie creature, allorchè sono pazze, maniche, arrabbiate, ec. sono velenose, tuttochè fuori di queste infermità non sieno tali, come di cani, di gatti, di uomini, e somiglianti. Veggansi gli Articoli *Idrofobia*, *CANE ARRABBIATO*, *PAZZIA*, *MANIA* &c.

La voce morfo viene similantemente applicata, tuttochè in un senso meno adeguato, all'impressione di altri corpi, o sostanze aguzze, pungenti, ec. Così vien detto, che la lima morde il metallo, che l'acqua forte morde, o mangia il rame, e somiglianti.

MORTAJO. Viene asserito, che per la Camera di un mortajo, o mortaro di artiglieria la figura sferica è all'altretutte preferibile. Veggasi *Histoire Academ. Scienc. Paris.* an. 1740.

Simigliante proposizione però non è a coperto de' suoi buoni dubbj. Conciosiachè per alcune esperienze colla maggiore accuratezza fatte sugli occhi della nostra Reale Società l'anno 1742. apparisce, come le camere cilindriche lunghissime della medesima medesimissima capacità mandavano, e scagliavano la palla del mortajo lontani-

nissima; lo che può dar motivo giustissimo di sospettare, che un lungo cilindro esser possa una figura migliore, e più a proposito per la camera di un mortajo d'artiglieria, di quella esser lo possa una sfera di una eguale capacità. Veggasi l'Articolo Arme da fuoco (Appendice).

MORTAJO. *Cochorn.* E' questa una picciola specie di mortajo inventato dal famosissimo Macchinista il Signor Barone Cochorn, per iscagliare le picciole granate, o facchetti. Siffatti piccioli mortaj sono comunemente fissati in numero d'una dozzina ad una trave o troneo di quercia, o d'abete, o somigliante in una elevazione di 45.

MORTALITA'. *Registi di mortalità.* Fa risultare Monsieur Simpson la proporzione del numero degli abitanti di qualsivoglia luogo dal numero dei parti, che anno per anno seguono in quel dato luogo medesimo, e questa vuole, che sia di 26. ad 1. Monsieur Kerseboom per lo contrario (a) vuole, che sia di 35. ad 1., lo che Monsieur Simpson scrive a macanza, o difetto delle osservazioni. Ma il valentissimo Kerseboom ha finora mostrato in ventinove tavole, come la proporzione Simpson di 26. ad 1. non può essere in conto veruno ammissa, e che la giusta, ed adeguata si è questa sua propria di 35. cioè, ad 1. Prova di vantaggio questo Valentuomo con alla mano le osservazioni esattissime di Monsieur Maitland, (b) che i fanciullini di Londra dell'età di due anni continuano a vivere in un *medium*, sopra i 37. anni, ed egli osserva, come per la tavola di Monsieur Halley arrivano a vivere 38. anni $\frac{1}{2}$.

(a) *Dottrina delle Annuitadi*, p. 127.
(b) *Veggansi le Transf. Filosof. N. 465. sezione 3. p. 319.*

Fatti M. Kerseboom, ad osservare, che fuori di cadauno centinaio di bambini nati di fresco cinque vengono al Mondo morti o nascono soli cinque morti, e d'ogni centinaio di figliolini nati ne muojano intorno a venti lull'età, e dentro l'età di un anno. Il calcolo poi di Monsieur Simpson. differisce grandemente da questo; avvegnachè egli supponga, che d'ogni centinaio di ragazzi nati ne muojano dentro il primo anno di loro età oltre trentadue. Vegg. le *Transf. Filosof. ib.*

Ha vi una sorprendente disparità offerta fra i Presbiteriani e coloro che dissentono dall'uniformarsi nella Città di Londra al sistema, e confessione pubblica Anglicana rispetto alle ceremonie, e riti del Battesimo, ed è principalmente dovuta alle varie fogge di battezzare, e di sotterrare i loro bambolini, senza mandargli alla loro propria Parrocchia, e senza dar conto in voce, od in iscritto al Paroco pel pubblico Registro. Veggasi Monsieur Maitland, nelle nostre *Transf. Filosof. n. 450. sezione XVI.*

Dal conto ivi dato dei Battesimi, e delle sepolture date nella Città di Londra pel tratto di dieci anni, dall'anno 1626. al 1635. inclusive, egli apparisce, come i Battesimi soverchiavano i mortori, nè vi ha ombra menoma di dubbio, che la faccenda continui tuttora sul medesimo piede. Questa osservazione farà vedere la ragione d'alcuni degli equivoci presi da Monsieur Kerseboom. Vegg. le *Transf. Filosof. n. 460. sez. XVI.*

Monsieur Maitland nel suo piano, od Istoria di Londra fa toccar con mano, come in un *medium*, o tratto di nove anni annualmente vengono sepolte nella Città di Londra 29542. persone, ed in Parigi niente più di 17804. di maniera tale che il numero degli Abitanti della Città di Londra, è maggiore a un di presso del numero di quei della Città di Parigi nella proporzione di 5. a 3. Veggasi Istoria di Londra pagg. 540. 548.

MORTALITA' nelle pecore. E' questa la massima sventura, che accaggia nel conservare questi sommanente utili animali.

Ella si è cosa in estremo malagevole l'impedire la mortalità nelle pecore, in eventoli, che l'annata corra grandemente umida, massimamente nei mesi di Maggio, e di Giugno. Quei luoghi paludosi bassi, e quei dati terreni, nei quali abbondano i ginefreti, sono i più dicevoli, e migliori luoghi per conservarle. Alcune fiata le pecore vengono tenute a coperto di questo male, o per lo meno non prende fra esse gran piede col solo trasportarle in mezzo a campagne di ginefreti. Per preservarle poi da sì fatale contagio ottimamente somigliantemente la gramigna, la senape, il prezzemolo, ed il timo.

Vieni

Vien da certuni proposto di far'avvalere ad ogni pecora un mezzo pugno di sale nero, o sia sale marino una volta il mese, ed anche con più frequenza; nè è se non se grandemente probabile, che questo far possa loro alcun beneficio: ma il modo, e metodo ragionevole, e filosofico, per tener dilungati dai bestiami tutti i loro malori, e per conseguente la mortalità, si è il farli a seriamente considerare, e riflettere, quali sieno le cagioni di queste loro infermitadi. Egli apparisce evidentemente, se vi faremo adeguata ricerca, come le stagioni umide cagionano fra le pecore quel male, che addimandasi marciume, infracidamento, corrompimento, che perciò cosa in estremo dievole farebbe, che i proprietarj, allorchè corrono simiglianti umide stagioni, facessero dilungare dagli ulati luoghi il bestiame, e condurlo, e farlo pascerne ne' più asciutti luoghi, che aver mai si possano, ed in quei dati tempi se i proprietarj medesimi abbiaderanno le pecore massimamente con dell'ottimo, odoroso, asciutto fieno, con della vena, con della crusca, e con cibi di cotai fatta, verranno a dilungare l'occasione di sì nocevole estermio di una bestia all'uman genere in estremo utile; ed in evento, che questi poveri innocentissimi animali fossero alcun poco infettati, ottimo consiglio sarà quello di mescolare co' sopradetti loro cibi alcuna porzione di sale, che sarà un agevole, ed insieme potentissimo mezzo di risanargli. Veggasi *Mortimer*, della Coltivazione pag. 244.

MORTE. Viene immaginato universalmente, che la vita di quegli animali, che da noi addimandansi animali perfetti, consista in un continuato, e perpetuo flusso, e refluxo di sangue, di sugo nerveo, e di aria, andante, e vengente dagli organi principali; e che un'uomo può esser tenuto, e riconosciuto per morto, allorchè non altramente respira, od alita, e che il suo cuore, e le sue arterie hanno abbandonato ogni, e qualunque circolazione, e pulsazione. Lo stesso Lancisi, il quale puossi a buona equità considerare come l'Auore, che d'ogni altro abbia meglio trattato il presente soggetto, dice, che senza un picciolissimo grado di respirazione, e senza alcun leggerissimo mo-

vimento, e tremolio del cuore, non vi ha vita nè può avervi.

In conseguenza di simigliante sistema la pratica generale si è, che allorchè fossero dileguati questi sintomi della vita, incontante son messe da un lato le speranze tutte di conservare nell'animale i piccioli strascichi, o ritagli di vita. Ma il dotto e profondo Medico Monsieur Stevenson non ammette per modo alcuno siffatta Dottrina, come quegli, che è d'opinione, che dopo che cessato sia il movimento del cuore, delle arterie, e dei polmoni, bene spesso rimangavi un picciol grado di principio vitale che merita tutta la nostra attenzione. Dopo un pieno tronamento di tutti questi movinenti organici, dai quali vien detto, e pensato, che la vita dipenda, assai sovente ritengono i sughi tanta porzione del procedimento animale, che bene spesso basta a conservar caldo l'animale medesimo per tratto lungo di tempo; il quale calore, con i propri, e giudiziosi accarezzamenti, e cure, potrebbe peravventura ricovrare nell'animale stesso per intero la vita. Cadauna. Eia non meno, che cadauna Regione, somministra esempi di sorprendentissimi ricovramenti di vita in persone tenute per morte per tratto non mezzano di tempo. Dal numero di coloro, che sono ricovati per puri fortuiti accidenti, noi possiamo a buona equità conchiudere, che numero infinitamente maggiore di persone abbandonate come morte esser potrebbero ricovrate con un poco di briga, e di diligenza. Veggansi *Saggi di Medicina d'Edimburgo*, Vol. V. Art. 77.

Questo ingegnoso Autore si promette dalla sua Teoria, che quantunque uno possa dirsi con proprietà morto, per la cessazione di tutti i soprammentovati movimenti, nulladimeno possa riaversi, e con somma proprietà possa esser detto, che sia novellamente tornato in vita.

La sua Teoria si è, che la cagione del calore animale, eppure del movimento intestino, il quale camminava, e procedeva prosperamente, mentre veniva continuato nei vasi il moto progressivo dei fluidi, è di presente interrotto, o, per meglio esprimerci, indebolito, ma che malgrado ciò continua a procedere innanzi in uno stato

to più basso, od in una maniera più lenta, e meno sensibile, non dissimigliante peravventura dal moto del principiare di una fermentazione, o di una putrefazione.

Per questo grado del procedimento animale la massa de' fluidi, massimamente nel gran serbatoio del sangue venoso, il cuore rarefacendosi, comprimendo per ogni verso, ed essendo contrastato, o rettenuto dalle tuniche, rigonfia per modo, che viene ad empiere la mencia della auricola del cuore medesimo, la quale per alcun tratto di tempo è rimasta vuota; e così stimolando nelle fibre, le quali trovavansi in quiete, le pone di bel nuovo in uno stato di moto, siccome noi veggiamo, che il cuore, poichè è stato divolto dal corpo, se venga punto, o che vengavi gittata sopra dell'acqua calda, torna a battere e far le sue pulsazioni di nuovo, tuttocchè siasi rimasto per alcun tratto di tempo senz'ombra di moto. La destra auricola essendo per simigliante modo ripiena, e stimolata a segno, che venga a contrarsi, empie il ventricolo; questo essendo irritato, simigliantemente si contrae, e vuotasi nell'arteria polmonare, per la qual cosa la circolazione ivi ricomincia, ove erasi troncata, e ne vien quindi per conseguente ricovrata la vita, qualora gli organi, ed i sughi trovinsi in un'acconcia, ed adeguata disposizione per la medesima, come troverannosi peravventura assai più frequentemente di quello altri faciasi ad immaginare.

Quindi sembra, che la morte non sia inevitabilmente accompagnata da un'intera, e totale quiete organica di ciò, che noi addimandiamo i fluidi del corpo: di più, che altri non può esser detto morto fino a tanto che l'energia del sangue non siasi cotanto dilungata, che quantunque richiamata venga da ogni, e qualunque possibile mezzo, non può altrimenti esser valevole a riempire di bel nuovo, e da stimolare in guisa, che si contragga, il daitro seno venoso, e l'auricola del Cuore. Veggasiene un caso grandemente osservabile per fiancheggiare della presente giudiziaria opinione ne' Saggi Medici Edimburghesi Volume V. Art. 55.

Il dottissimo Medico Winslow compose già un Trattato, che è pubblico, intor-

no all'incertezza dei segni della morte.

MOSTO. *Mosto del vino del Reno.* E' quello un liquore, il quale, tuttocchè da certuni venga bevuto, nulladimeno viene sperimentato, o toccato con mano, che attacca, ed offende il cervello enormemente; e di vero non effluendo questo liquore passato per quella naturale effervescenza, alla quale dovrebbe essere stato sottoposto nel fare il vino, così i suoi sali vengono considerati, allorchè trovansi nello stomaco, non altramente operanti, di quello facciansi nel tino, ivi alzando la loro effervescenza, e mandando al cervello abbondevolissimi sottili vapori.

Il mosto del Reno è di due spezie, come quello, che, od è fatto colla bollitura, o senza bollitura. Quello procurato senza farlo bollire viene ferrato tale quale entro i vasi per modo, che non può averun conto operare, e farsi: quello addimandasi mosto di vine. Quello poi fatto per via di bollitura vien preparato nella maniera seguente:

Prendono coloro dei gagliardissimi vasi, che non sieno totalmente pieni di questo mosto, e ponendogli in una cantina, sanovvi alla bella prima un fuoco moderato, e mezzano, che vanno accrescendo, e rinforzando successivamente: quindi di bel nuovo vanno scemandone, diminuendone grado per grado la sua energia in guisa, che la bollitura possa cessare per se medesima. Sifatta operazione è a capo, o totalmente condotta a termine nel tratto di trentasei, od al più di quaranta ore, secondo la grossezza dei vasi, entro i quali trovavasi il mosto: e questi bollitori del vino in vece di candelie comuni le quali a motivo del diviso calore s'agghiarebbono, si servono di sottilissime schegge di legno di faggio. Servono queste simigliantemente per due effetti a un tempo stesso, avvegnachè somministrino loro il beneficio della luce non meno, ma danno lor segno del quando la bollitura è sufficiente: imperciocchè prima di questo tempo la quantità dei vapori, che scagliansi fuori de' vasi, fan sì, che le schegge, o pezzi di faggio diano una luce fosca, ma tosto che questi vapori hanno cessato, e che vengon fuori in minor copia, e che per conseguente la matrice ha bollito quan-

to basti, la luce di queste schegge è più brillante, più lucida, e più chiara. Nel tratto di sette, o d'otto giorni dopo la divisata bollitura, il mosto comincia a fermentare, e terminata che abbia questa fermentazione, egli si è alla perfine vino, o tale addimandasi.

Hanno di più coloro un'altra specie di mosto del Reno, la quale vien preparata nell'appresso guisa:

Fanno bollire il liquore fino a tanto che siatene svaporata la metà; e pongonvi dentro dei medicioali ingredienti, per i quali sono grandemente appassionati: tali appunto sono la scorza d'arance, la radice d'enula campana, e delle coccole di ginepro, o cosa somigliante: il mosto per siffatta maniera medicato fermenta, e lavora molto meno di quello, che farebbe naturalmente, vale a dire, fermenta con molto maggior lentezza. In evento, che il mosto a motivo di una soverchio violenta effervescenza getti fuori la sua fondara, diverrà svanito, snervato, e spollato affatto, qualora però siffatta separazione non venga intasata, e rattenuta da alcuna sostanza untuosa, e grassa, quale si è, a cagion di esempio, il burro fresco, o cosa somigliante. Sogliono pertanto con tal fine coloro porre questa data sostanza sopra una foglia di vite, oppure applicaoo del lardo alla bocca del vaso, ben bene del medesimo inzavardandola. Veggasi *Portius*, de Vino Rheni.

MOSTO. Nella faccenda dei vini addimandasi Mosto il fugo spremuto dall'uva non fermentato, allorchè egli sia stato più e più siate tramutato o travasato, e perciò separato dalla sua posatura. Le botti, o barili destinati per tale effetto veogono ben ben preparati, od affumicati con dello zolfo ogni e qualunque volta vi si dee por dentro il mosto, per impedire la fermentazione del liquore, siccome fermenterebbe benissimo, qualora non si prendessero coloro una siffatta briga, e diverrebbe vino.

Egli si è questo fumo dello zolfo dal travaso, il quale in tal caso impedisce ogni e qualunque tendenza alla fermentazione, e mantiene il fugo naturale dell'uva in uno stato dolce, ch'è appunto sconsueto, e raro fatto per esser mescolato.

Suppl. Tomo III.

lato con i vini in vece di zucchero: per somigliante effetto viene grandemente mescolato in opera in Olanda, ed in alcune altre Regioni, come anche per ricovrare, e per dare una nuova vivacità e brio a i vini patiti o svaniti. Per somiglianti fini quantità grandissime di questo mosto vengono anno per anno condotte qua e là per ogni paese di conserva con i vini forestieri: e nella maniera a capello la stessa vien preparato in Inghilterra un mosto dal fugo delle mele, il quale serve egregiamente bene per le ordinarie operazioni dei vini, che s'imbottano. Per conservare il mosto in questo stato noi veggiamo farsi consumo immenso di zolfo, avvegnachè altra via non può rinvenirli, se non se quella d'affumicare collo zolfo i barili, e le horti. Veggasi *Shaw*, *Lezioni*, pag. 192. Veggasi l'Artic. **TRAVASAMENTO.**

MOSTO artificiale. Un mosto artificiale niente meno buono e perfetto di quello siasi il mosto naturale, ed acconciissimo di pari per la rifermentazione, per ricovrare, per migliorare, e per fare dei vini e degli aceti, può essere composto e preparato nell'appresso maniera:

Prenderai tre libbre di finissimo zucchero in pane, o di tale zucchero, che sia stato perfettamente rimondo, e ripurgato della sua triaca, o fondiglioli: lo scioglierai in tre quartucci d'acqua, ed aggiungerai nella bollitura una mezz' oocia di Tartaro del vino del Reno ridotto prima in finissima polvere: questo si scioglierà con un' assai considerabile ebullizione, e somministrerà al liquore un acido gustosissimo: leverai via dal fuoco il vaso, e lascerai, che si raffreddi, ed allora avrai un mosto artificiale, il quale in ogni e qualunque rispetto assomigliarà nel sapore e nell'odore al fugo dell'uva bianca, allorchè sia bene ed a dovere purificato, e rimondato, e ripurgato dalla sua posatura appunto per farne del mosto. Se questo mosto artificiale venga ben bene affumicato a forza di zolfo, diventerà un mosto perfettissimo, e potrai far acquitare ogni e qualunque sapore a piacimento di colui, che lo lavora e manipola. Veggasi *Shaw*, *Lezioni*, pag. 202.

MOSTRO marino. Quella specie di mostro marino, che dagli Inglesi addimandasi

Lil

Whirl.

Wirlpool, suol esser comunissimo nei fiumi colla sbalzato per varj accidenti, ed è sommamente triviale, e d'una leggerissima conseguenza. Nel mare poi, quella specie di mostro è più rara, ma molto più pericolosa, e dannosa. Da Monsieur Sibbald sono stati riferiti i tristi effetti d'un assai considerabile *Wirlpool* marino fra le Orcadi, il quale era in estremo fatale a i forestieri, tuttocchè non arrecasse il menomo danno di conseguenza a quelle persone, colle quali era assuefatto. Non fissa sua stanza questo mostro in veruna parte di quel paese particolare, ma compare, e s'assie vedere or qua, or là in diverse parti dei confini del mare fra quelle Isole. In qualunque luogo ei comparisca, egli è insuriantissimo, imperverfa grandemente &c. e chiunque per quei tratti di mare si trovasse, perirebbe inevitabilmente, e farebbe rovesciato dal medesimo nelle acque, e divorato, gittandosi entro le barche; ma la gente che naviga per quell'Isole, va molto ben preparata per questo fatto, e sempre, e costantemente porta seco uno schifo, o navicello vuoto, un tranco di legno, oppure un grosso fastello di paglia, o di strame, od alcun'altra cosa somigliante, che tengono presso di sé: tostochè accorgonsi dell'avvicinarsi del *Wirlpool*, gittano questo fastello entro il suo vortice, mantenendo se stessi fuori del medesimo: questo fastello o scianza, qualunque ella siasi, è incontanente ricevuta nel centro, e condotta tutt'acqua; e tosto che ciò sia eseguito, la superficie di quel dato sito, in cui il mostro trovavasi, divien piana, ed essi solcano sopressa con sicurezza: e circa lo spazio di un'ora, essi osservan di bel nuovo il vortice in un altro luogo, d'ordinario in una distanza d'un miglio dal primo vortice. Veggasi *Sibbald*, Prodrum. Historia Scot.

MOTO, Leggi del moto. Di tre Leggi di moto, che costituiscono nel conservamento del 1. *La velocità relativa* nella collisione dei corpi elastici, che è la differenza della velocità di quei corpi, che muovonsi pel tratto medesimo, e la somma, allorchè muovonsi in direzioni contrarie. 2. La quantità di direzione. Veg-

gasi l'Articolo DIREZIONE. 3. La somma del prodotto delle masse per i quadrati delle velocità.

Se si concedano, ed ammettansi due di queste leggi, la terza ne seguirà di mera necessità. Così poni, che A, e B sieno due corpi, che le loro velocità innanzi all'urto, sieno a , e b , e dopo l'urto, o percoscia, sieno x , ed y . Fatti prima a supporre, che tanto innanzi, che dopo l'urto, i corpi muovansi nella direzione medesima, la prima Legge di conservazione dà $a - b = y - x$; la seconda $Aa + Bb = Ax + By$. Quindi per trasposizione $a + x = y + b$; ed $Aa - Ax = By - Bb$; e queste due Equazioni moltiplicate insieme ne danno questa nuova, cioè $Aaa - Axx = Byy - Bbb$; oppure per trasposizione $Aaa + Bbb = Axx + Byy$. Ed è evidentissimo, che se a , o b , di pari che x , od y , sieno prese negativamente per significare, che i Corpi A, e B muovonsi in direzioni contrarie innanzi, e dopo l'urto, o percoscia, questa supposizione non altererà i segni dell'Equazione $Aaa + Bbb = Axx + Byy$. Veggasi *Bernoulli*, Oper. Tom. III, pag. 57.

Il conservamento della quantità medesima di moto nell'Universo è un Principio universalmente tenuto dal Cartesio; ma è stato trovato manifestamente falso, e tenuto soltanto avverarsi nella medesima direzione, che dal grande Isaac Newton viene espresso nell'appresso guisa.

„ La quantità di moto, che è raccol-
„ ta col prendere la somma del moto
„ diretto verso le parti medesime, e la
„ differenza di quelli, che sono diretti a
„ parti contrarie, non soffre cambiamen-
„ to dall'azione di corpi trovantisi fra es-
„ se “. Newton, Principi, Lib. I.

Alcuni Filosofi dopo il Cartesio si son fatti a supporre il conservamento della forza medesima, o sia forza viva, *vis viva*. Veggansi gli Articoli FORZA, e VIS VIVA.

Ma questo si avvera unicamente nei corpi elastici, allorchè havvi un'urto. E quindi quei Filosofi sono stati indotti a sostenere, che tutti i corpi sono elastici per lo meno nei loro elementi, e che non può darsi in conto veruno un corpo infles-

fiessibile, come quello, che è ripugnan- te alle Leggi della Continuità. Veggasi l' Articolo CONTINUITÀ'.

MOTO della membr. Veggasi l'Arti- colo MEMBRA.

MOTO nella musica degli antichi. Ser- vivansi gli antichi della voce moto per significare il passaggio della voce da un suono, o oota acuta, ad un suono, o nota grave, o viceversa. Quello essi es- primevano per *motus minor* *minoris*. Veggasi *Wallis*, Append. ad *Ptolem.* *Harmon.* pag. 153. Veggasi l'Articolo LOCUS.

MOTO nel maneggio. Vien detto, che un cavallo ha un grazioso, ed avvenente moto, allorchè muove, e piega le sue zampe di- nanzi con grandissima agevolezza, e soellezza nel maneggio. Ma se un cavallotrot- ta come intirizzito, e conserva il suo cor- po disteso, e la sua testa alta, e piega le sue zampe dinanzi piacevolmente, al- lora il dire, ch'egli ha dipersè un moto av- venente, implica la libertà di azione della sua fronte.

MOTO muscolare. Il Dottor Brown Lan- grish s'ingegna, ed arrabbattasi per pro- vare, che il sangue non ha effetto im- mediato nel moto muscolare, fondato su- le esperienze delle legature da esso fatte alle arterie crurale, e carotide dei Cani, i quali non venivano quindi a perder l' azione di alcuno dei loro muscoli. Egli però concede, che qualora il sangue vien tutto intercettato, in pochissimi minuti cessa il moto muscolare. L'uso principa- lissimo del sangue verso il moto muscolare si è di conservare le fibre calde, arrendevoli, distese, e totalmente disposte per l'influs- so in esse degli spiriti animali, e di as- sister loro per mezzo del suo moto.

Le fibre muscolari sono cilindri alcun poco concavi, e non già divise in cellet- te: gli spiriti animali sono presso che pa- reotti, od analoghi allo spirito del sale am- moniacale, e somiglianti; e perciò per qua- lunque verso volino dai nervi entro le fi- bre muscolari, verranno ad aumentare la qualità attrattiva delle loro particelle com- ponenti dell'una verso l'altra, di modo che verranno a fargli scorrere più da vi- cino insieme, la qual cosa cagionerà, che e incominciature, o tuniche delle fibre verranno ad essere a un tempo stesso

più faticose, e più corte, ed il musco- lo, in ogni, e qualunque sua dimensio- ne, verrà ad esser contratto. Gli spiriti animali sono fissatamente sottili, da non poter esser fissati, che perciò fanno im- mediatamente la loro scappata per le fi- bre, e lascianle nello stato medesimo, in cui avevanole trovate, tolto che cessi il supplemento dai nervi. Havvi una dif- ferenza nel meccanismo dei nervi spedi- to ai muscoli, che agisce per l'influenza della mente, da quei dei muscoli, che viene asserito che facciano dei moti in- volontari; gli ultimi non avendo inter- rompimento, od ostacolo al corso degli spiriti animali, seppure alcuna fiata le parti, per le quali essi passano, non in- fluiscono sopra essi dove per lo contrario i cervi, i quali servono i muscoli di mo- to volontario, hanno alcuni leggieri sti- ramenti, o coltriogimenti nelle loro estre- mità, od io altra parte, che veogono ad impedire, ed interrompere il corso dei loro fluidi, a riserva di allora quando la loro resistenza viene ad essere soverchiata dal peso, o momento degli spiriti, che viene ad essere accresciuto dalla volontà. L'uso poi dei gangliosi si è l'impedire ogni, e qualunque comunicazione di mo- to da un nervo all'altro, per cui in uno stato di sanità, la sensazione vien sem- pre e costantemente formata sensibilissi- mamente. Veggasi Saggio sopra il moto mu- scolare.

Il Dottore Stuart avendo troncato la testa di un ranocchio, osservò, come nel ficcare una tenta per entro la midolla spi- nale, i muscoli del corpo dell'animale venir ridotti in uno stato di convulsive contrazioni. E che la cosa medesima av- venne ai muscoli della testa, allorchè la testa venne ficcata entro il cervello. Da ciò fassi questo valent'uomo a conchiude- re, che tanto il cervello, quanto i ner- vi hanno parte, e contribuiscono al mo- to dei muscoli in grado sommo. Ciò fat- to ci mostrò l'arteria, la vena, ed il ner- vo crurale di un mastino, e collocando parallelamente ai medesimi un filo, fece sopra essi due legature distanti l'una dall'altra quelle quattro dita; quindi tagliando i vasi di là dalle legature, gli cavò fuori, ed ebbe ad osservare, come il nervo non

rimaneva contratto, tuttochè i vasi sanguiferi avessero perduto tre ottavi di loro lunghezza. Quindi ci fassì ad inferire, che quello, che i nervi contribuiscono nel moto muscolare, nè può nascere, nè può esser dovuto all'Elasticità, ma bensì al fluido, ch'essi contengono, che altro esser non può, salvo una pura acqua elementare. Veggansi le *Trans. Filosof.* n. 424. §. V.

MOTI ritmici. E' questa una frase usata dal Vossio, e da alcuni altri Scrittori eziandio, che hanno trattato degli antichi ritmi, per esprimere quei tali moti, dei quali veniva fatto uso argl' intertenimenti dei Greci, e dei Romani, per somministrare delle idee poetiche, o per fiancheggiar la musica nel solleticare le Passioni. Questi non solamente avevano forza grande, allorchè erano congiunti con i suoni, ma eziandio per se soli, e senza alcuna voce, o suono, erano valevoli ad eccitare le passioni oegli spettatori assai più di quello avrebbe potuto fare il più prode, ed egregio Oratore co' suoi ragionamenti i più studiati.

Roscio il Comico si famoso nei loro Pantomimi, i quali tutti erano rappresentati alla mutola, fu a segno eccellente nel saperli esprimere, per mezzo di questi moti ritmici, o gesti, che Cicerone, ed egli, i quali essendo contemporanei, ed ebbero sopra loro diverse dispute di vario e tutt'altro sentimento, uno di essi usò la forza più energica di sue parole, e l' altro si ridirise a' soli suoi cenni.

MOTO, o movimento nella musica Italiana ha moltissimi significati. Alcuni fissa importa soltanto un moto, movimento, o passaggio da una oota all'altra a qualsivoglia distanza, come a cagion di esempio, una seconda, una terza, od altro qualunque siasi intervallo; e viene ad essere il medesimo, se i gradi intermediati (qualora abbiano alcuno) sieno suonati, oppure soltanto gli estremi dei medesimi, come il primo ed ultimo suono, o nota di qualsivoglia dato intervallo. Alcuni volta riguarda la vicinanza, e la lontananza di tali moti, come, a cagion di esempio, un moto vivace, lento, uguale, languido, e che se io: ed in questo senso vien usato per rapporto ai minuetti, alle gavotte, alle sarabande, ed altri

tali balli. Veggasi cadauno di questi Articoli al suo rispettivo luogo, come l' *Articolo MOTO (Cislopedia)*.

Ma il comunismo, ed a vero dire, il somamente rilevante significato della voce è in rapporto all' *Armonia*; avvegachè i soprammentovati significati della medesima riguardino unicamente la melodia. Veggasi l' *Articolo MELODIA*, ed *ARMONIA (Cislopedia)*.

Per rapporto all' *armonia* intendesi quel moto, che confronta la maniera, in cui una parte superiore, o triplicata si muove da un suono all'altro, con quella maniera, in cui muovesi una parte inferiore, o bassa: Quello dee esser fatto in tre guise. La prima si è, allora quando si la parte superiore, che l' inferiore, o bassa muovonsi di pari nella guisa medesima, od all' insù, od all' iogid, e questo dagli Italiani addimandasi *Moto Retto*. La seconda si è quando in comparando la parte superiore coll' inferiore, o più bassa, una di esse ascende, mentre l'altra discende, o viceversa; e quindi viene appellato *moto contrario*. La terza, od ultima si è, allorchè una delle parti sostiene, o continua il suono, mentre l'altra, od alzasì, o cade sopra qualunque siasi nota; e questo vien denominato *moto obbligato*. Veggasi *Brossi*. *Dizionario della musica in voce Moxo*.

MOXA. Scrivansi i Medici dell' Antichità del lino in erba, in quella maniera appunto, che di presente viene usata dalle Nazioni Orientali la loro *Moxa* per fare de' cauteri in certe date parti del corpo. Il metodo di praticare questa moxa è il seguente:

Un picciolo cono della grossezza del dito pollice dovrà comporsi di questa moxa, o spezie di piuma, in quella stessa densissima guisa, che quelli vengono fatti per un fustitus. La base di questo cono dee essere attaccata, ed agguistata sopra la parte, che dovrassi cauterizzare, a forza di una mucilagine di gomma Arabica, e polcia dee essere appiccato il fuoco alla vetta del cono medesimo, o con una candela accesa, o con un carbone ardente. Per simigliante mezzo tutto il cono verrà ad essere gradatamente consumato, e per conseguente grado per grado la

parte stessa cauterizzata. Simigliante cauterio vien messo in pratica nei casi di podagra, ed in evento, che sulla prima operazione il dolore non cessi, e non dia luogo, dee essere ripetuta l'operazione fino a che ottengasi questo effetto. Veggasi *Ei-stero*, Chirurgia, pag. 319.

MUCILAGINOSO. *Glandule mucilaginosae*. La rapida disuguale depressione nel fondo della cavità coriloide delle ossa innominate, o senza nome, è ripiena di un'assai dilatata piatta glandula mucilaginosa tutta contornata, ed orlata di una sostanza grassa, e tutta coperta di una finissima membrana. Le glandule mucilaginosae delle ossa della gamba diaciano in picciolissimi spazi, depressioni, e tacche, od intraccature superficiali, in vicinanza delle affilature delle cartilagini di cadauna giuntura, e vengono ad esser tutte coperte da ligamenti capsulari. Nelle ossa del piede poi queste stesse glandule corrispondono, rispetto al numero ed alla figura alle depressioni trovantisi fra i contorni, ed i ligamenti cartilaginosi.

Nelle articolazioni dello sterno delle vertebre, e delle costole, le glandule mucilaginosae sono sommamente picciole; ma vengono ad essere accompagnate da altrettante grasse molecole diacenti intorno intorno a cadauna giuntura. L'interior superficie del suboligamentoso, che veste, ed inwards il canale, o condotto osseo della spina, viene ad essere similmente fatta lubrica da una sostanza oleosa, o dire la vogliamo adiposa. E le vere, e genuine glandule mucilaginosae delle articolazioni dell'occipite, e delle mascelle nelle ossa della testa, sono tutte acconciamente proporzionate a quelle date giunture alle quali appartengono, e diaciano fra i ligamenti capsulari, e le circonferenze delle cartilagini. Veggasi *Winslow*, Anatomia, pag. 125. & seq.

MULO. I muli, e le mule vengono massimamente usate in quelle date regioni, e contrade piene tutte di terreni montuosi, sassosi, e dirupati, come a cagion di esempio, intorno alle Alpi, agli Apennini, ai Prenci, e foggianti. In questi dati luoghi particolari ne vengono tenuti e conservati in numero grandissimo; questi animali sono d'ordinario di pelo nero, e

sono forti, nerboruti, membruti, e grossi, essendo per lo più fatti nascere da finissime cavalle Spagnole.

Sono alcuna fiata i muli alti quei quindici, ed anche sedici, palmi; e li migliori costano per fino quaranta, ed anche cinquanta lire sterline l'uno. Non vi ha creatura, che sia più a portata di questa per condurre pesi di gran momento, nè vi ha animale, che lo pareggi, rispetto all'avere il piede sicuro. Sono questi infinitamente più forti per attraversare i carretti, dei nostri cavalli, e sono assai fiato così acconci alla vettura, come i nostri cavalli, de' postiglioni non solo, ma sono eziandio capaci di fare de' viaggi continuati per mesi, e mesi, con scimento, ed anche con ottocento libbre di peso sulla loro groppa. Veramente ella è cosa da farne le meraviglie, che questi tanto utili animali non sieno di vanraggio propagati in Inghilterra, avvegnachè sieno infinitamente più duri, gagliardi, resistenti, e forti, che i cavalli non sono, e sono assai meno di quelli sottoposti ad ammalarsi, oltredichè i muli vivono, e lavorano il doppio dei cavalli medesimi.

Quei dati muli, che son nati, ed allevati in regioni fredde sono assai più duri, e più acconci per la fatica, di quei dati muli, che sono nati, e sono stati allevati in paesi caldi; e quei dati muli, che son leggieri, sono più acconci per carreggiare, carozze, e calessi, dei cavalli medesimi. Veggasi *Mortimer*, della Coltrivazione.

Siccome questi animali prendono molto della natura, e qualità della Cavalla, onde nascono, così potranno essere ottenuti di quella data specie, o leggieri, o più faticci, e robusti, come tornerà conto, o come sarà in piacimento del proprietario. I lamenti, che sogliono fare universalmente rispetto ai muli, ed alle mule, sono, che tirano de' calci, e che sono estimati, e caparbi. Ma questo non da altro dipende, che dalla nostra trascuratezza nell'allevargli, conciossiachè in quei dati paesi, ove vengono con più cura allevati, non sieno niente meno maneggevoli, e gentili, di quello sieno i nostri stessi cavalli.

Sono i muli di due specie, la prima, che


che risulta da un cavallo, ed un' asina, e la seconda, che nasce, e vien propagata da un' asino, e da una cavalla. Quei della prima razza sono meno valutabili; conciossiachè d'ordinario sieno molto zorichi, ed ottusi; ed hanno molto della natura asinina, nè sono gran fatto grossi. Quindi è, che la seconda razza di muli, vale a dire quelli, che nati sono da un' asino, e da una cavalla, è la più propagata in quelle date contrade, ove l'assuso grande di questi utilissimi animali. Per somigliante effetto adunque è necessario, che venga procurato un' asino da monta il più grosso, ed il più perfetto, che sia mai possibile; ed in Ispagna, ove i muli e le mule sono grandemente stimate, un buono, e perfetto asino da monta si pagherà benissimo quelle cinquante, ed anche sessanta lire sterline, solamente di no- lo del medesimo pel tempo della monta. Accoppiano gli Spagnoli con questi dati Asini le più perfette, e le più grosse, e giovani cavalle ch'è s'abbiano, dando a quelle l'asino ad un'altezza di terreno vantaggioso, e collocando la cavalla in un'angusta fossata guernita ai fianchi di forte palizzata.

Affermano alcuni Autori, avervi nella Siria una specie particolare di muli, i quali propagano la loro specie: ma questo con buona pace loro è un'errore mar- tufoleto, conciossiachè in ogni, e qualun- que di quelle Regioni, ove trovansi am- bedue le razze di questi muli, non sia giammai cosa somigliante accaduta.

Se l'asino destinato per la razza venga allattato da una cavalla, vengono questi due animali a familiarizzarsi assai di più insieme da quello altrimenti farebbono di lor natura, e questo potrà farsi con estrema agevolezza, e sempremai col togliere alla cavalla il suo lattenzolo, e porle sotto l'asino, ma fa di mestieri il tenergli allo scuro per una decina, od anche per una quindicina di giorni.

MULTIPLICAZIONE. In cadauna moltiplicazione, propriamente, ad accu- ratamente parlando, fa di mestieri, che il moltiplicatore venga sempre, e costan- temente considerato non altrimenti che un Numero; ed è cosa agevolissima il concepire una quantità di qualsivoglia spe-

zie, per un numero moltiplicata. Ma il parlare di una libbra moltiplicata per una libbra, di un debito moltiplicato per un debito, di una linea moltiplicata per una linea, e cose simili, è cosa intel- ligibile. Per analogia però nell'applica- zione dell'algebra alla Geometria noi c' incontriamo sovente in siffatte espressioni, nè vi ha cosa più comune del trovare $AB \times BC$ per dinotare il Rettangolo



$ABCD$, la lunghezza del quale è AB , e l'ampiezza BC . Ma ciò esser dee sol- tanto inteso per Analogia; conciossiachè se il numero esprimente la misura della- to AB venisse ad essere moltiplicata pel numero esprimente la misura di BC , il prodotto verrebbe ad esprimere la misura di $ABCD$.

Il Segno della moltiplicazione comun- issimamente dagli Algebristi usato è $\times$. Ma i Tedeschi, dietro la tracce del Leib- nizio, servono unicamente di un punto piantato fra le quantità, che si multi- plicano l'una l'altra, così: $a. b$ signifi- ca presso di loro lo stesso, che $a \times b$; ed $AB. BC$, significa lo stesso, che $AB \times$



BC , oppure il Rettangolo di AB in BC , che è quanto dire, il Rettangolo di $ABCD$.

Allorchè le Quantità, che esser deb- bono moltiplicate, sono complesse, colo- ro le colloano entro una parentesi, in- vece di tirar sopr'esse una linea siccome noi usiamo comunemente di fare.

Così, a cagion d'esempio, essi scrivo- no $(a+b). (c+d)$ in vece di scrivere $a+b \times c+d$ pel prodotto di $a+b$ in $c+d$. Alcuna fiata il punto vien traslasciato, co-

$$a:(a+b)(c+d)=a+b \times c+d.$$

MULTIPlicAZIONE nell' algebra. Per moltiplicare delle Quantità algebriche ci abbisogna, che non abbiamo riguardo soltanto alle Quantità stesse, ma eziandio ai loro segni.

La Regola generale per i segni si è, che alloraquando i segni dei Fattori sono similgianti, a cagion di esempio siasi od $+$ l'un' è l'altro, siasi l'uno, e l'altro $-$) il segno del prodotto si è $+$. Ma allorchè i segni dei fattori non sono similgianti, il segno del prodotto è $-$.

Adunque se le Quantità, che debbon' essere moltiplicate, sieno Quantità semplici, troverai il segno del prodotto per l'ultima regola, dopo vi planterai il prodotto delle Coefficienti, e poscia potrai già tutte le lettere l'una dopo l'altra, appunto come in una voce.

Se poi i Fattori sieno Quantità composte, ti farai a moltiplicare ciascheduna parte del moltiplicando per le parti tutte del moltiplicatore, o prenderai l'una dopo l'altra, e poscia andrai unendo, e raccogliendo tutti i prodotti in una sola somma, e quella somma verrà ad essere a capello il prodotto ricercato. Veggasi *MacLaurin*, oppure *Saunderson*, ovvero alcun' altro degli Scrittori Elementari.

La ragione quivi esposta per i Segni del prodotto, vale a dire, $\equiv$ che $+$ per $+$, oppure $-$ per $-$ dà $+$; e che $+$ per $-$, oppure $-$ per $+$ dà $-$, è, a vero dire, nata fatta per imbarazzare, e confondere i principianti. Ma se veogavi considerare, che in ogni, e qualunque moltiplicazione il moltiplicatore è, strettamente parlando, un numero, la difficoltà svanisce incontinentemente; conciossiachè, 1. Quando qualsivoglia Quantità positiva $+a$ viene moltiplicata per qualsivoglia numero positivo $+n$, il significato si è, che $+a$ dee essere inteso, e preso per altrettante unità quante ve ne sono in n , e per conseguente il prodotto è evidentissimamente $+na$, ovvero na , sendo traslasciato il segno positivo.

2. Quando $-a$ viene ad essere moltiplicato per n , allora $-a$ è preso per altrettante unità, quante hannovene in n ; ed il prodotto forz'è che sia $-na$.

3. Siccome una moltiplicazione per un

numero positivo implica un'aggiunta ripetuta, così una moltiplicazione per un numero negativo implica una ripetuta sottrazione; di maniera tale, che alloraquando $+a$ dee esser moltiplicato per $-n$, il significato si è, che $+a$ dee esser sottratto tante volte, quante sono le unità, che trovansi in n , per conseguente forz'è, che il prodotto sia negativo, essendo $-na$.

4. Allorchè dee esser moltiplicato $-a$ per $-n$, allora $-a$ dee esser tante volte sottratto, quante sono le unità, che trovansi in n ; ma per le regole di sottrazione, il sottrarre $-a$ è equivalente all'aggiungere $+a$, così per conseguente il prodotto viene ad essere $+na$.

I casi secondo, e quarto possono essere illustrati coll'importare, e col significato dei segni $+$, e $-$, $+a = a$ forz'è, che sia $= 0$. Pertanto se noi ci faremo a moltiplicare $+a = a$ per n , il prodotto forz'è che s'iegua, o resti nulla, avvegnachè il fattore $a - a = 0$. Il primo termine del prodotto è $+na$ dal 1. caso; che perciò forz'è, che il secondo termine del prodotto sia $-na$, che distrugge $+na$; di modo che forz'è, che tutto il prodotto sia $+na - na = 0$. Adunque $-a$ moltiplicato per $+n$, dà $-na$.

Nella guisa a capello la stessa, se noi ci faremo a moltiplicare $+a - a$ per $-n$, il primo termine del prodotto essendo $-na$, bisogna di necessità, che l'ultimo termine del prodotto sia $+na$, avvegnachè essi due insieme forz'è che distruggansi l'uno l'altro, oppure, che il loro risultato sia 0 , conciossiachè uno dei Fattori $a - a = 0$. Adunque $-a$ moltiplicato per $-n$, forz'è, che dia $+na$. Veggasi *MacLaurin*, Algebra, Part. I. cap. IV. — *Saunderson*, Algebra, Vol. I. pag. 57. — *E. Barrow*, Euclid. Schol. Propol. I. Elem. II.

MUMMIA. In questi nostri stessi tempi trovasi nella Pollozia una certa specie di mummie, o sieno corpi umani, mantenuti, e conservati senza che al loro conservamento abbiavi avuta parte menoma l'Arte. In quella Regione adunque quelle mummie, trovansi entro amplissime caverne in copia assai considerabile. Sono queste secche, od improprie, colla carne e colla pelle attaccate strettissimamente alle ossa, e sono d'un colore ne-

ric-

riccio. Nelle guerre, che parecchie etadi fa infestaron questa Regione, ella si era cosa comunissima per quelle parti di combattenti, ch' erano dalla banda più debole, il rifugiarsi, od intanarsi entro queste cavità, ove i loro nemici, se gli avessero rinvenuti, gli facevano morir soffogati con far de' funchi di stame, di fascine, e di cose somiglianti nell' imboccatura della caverna, e ciò fatto, quivi entro lasciavano i corpi di quegli infelici, i quali fin d'allora sendo rimasti a seppellito da ogni e qualunque comune accidente, sonosi conservati intatti fino ai nostri giorni. Veggasi *Racconti*. Istoria della Pollonia.

MURO. Di tutti i materiali per fabbricarne dei muri per far venire a maturanza i frutti, il matton sotto è generalmente il migliore, come quello, che riflette porzione abbondevole di calore, ritiene il tepore per lungo tratto di tempo, e per la picciolezza di sue giunture viene a somministrare tutto l'agio d'assecare, e raccomandarvi sopra gli alberi con piccioli chiodi. Se queste particolari muraglie sieno fatte sporgere in fuori con pietre vive, e che abbiano a certe date acconce, ed adeguate distanze de' pilastri di pietra, per rompere l'empito e la forza de' venti, e per far' ombra agli alberi da frutto, verranno a fare un muro non meno di sommo vantaggio, che grandemente vago ed appariscente, più che qualunque altra forte di muraglia.

Ella si è alcuna fiata cosa vantaggiosissima il fabbricare queste particolari muraglie ad arcate, affinchè le radici degli alberi possano aver luogo baslevole, e spazio di spanderli e stenderli sott' esse non meno che dall' altro lato delle medesime. Questo rendesi onninamente necessario, allora quando il suolo è una durissima ghiaja; perchè senza di ciò, quando le radici dei peschi, e somiglianti alberi da frutto sono arrivate a raggiungere la ghiaja, non trovano più il nutrimento sufficiente, e per conseguente gli alberi danno a dietro, appassiscono, e muojono. Ma quantunque Monsieur Fairchild abbia sperimentato dei vantaggi grandissimi da somigliante foggia di fabbricare le muraglie, nulladimeno, malgrado ciò, ella viene fissata maniera da Monsieur Miller totalmente disapprova-

ta. Hanno certuni somigliantemente proposto il fabbricare le muraglie a schimbeo; ma l' Autore medesimo in estremo inteso della faccenda della coltivazione universale, ci dà moltissime ragioni, dalle quali ad evidenza risulta, che i muri perpendicolari, e diritti sono a questi grandemente preferibili, e sembra, ch' ei sia di opinione, che se questi muri sporgessero alcun poco innanzi, e facessero come un gentil corpo, verrebbero ad essere anche migliori dei totalmente diritti e perpendicolari. Veggasi *Miller*, Dizionario del Giardiniere.

MUSCHIO. Queste picciolissime piaterelle, tuttochè per molte e molte etadi trascurate dai Naturalisti, ed avute affatto in non cale, per l' industria, e per l' applicazione dei moderni Botanici sono state trovate una numerosissima, ed insieme vaghiissima classe di piante; e quello che si è di vantaggio prezioso, non senza i loro usi nella Medicina, e nelle Meccaniche, ed ezianco per varie occorrenze della umana vita. Il dotto Dottor Dillenius, il quale vi si è applicato sopra, ed havvi studiato con una cura non comune gran fatto, e che ce ne ha somministrata un' assai stimabile istoria, ne ha descritte oltre seicento specie, la parte massima delle quali rinvengonsi nei nostri propri paesi, tuttochè avvienvene alcune, che sieno soltanto particolari, e proprie d' altre Regioni: nè vi ha con tutto questo ombra menoma di dubbio, che trovinsene peranche parecchie in moltissime contrade allignanti, tra le quali rimangonsi ancora celare, ed ignote. Veggasi la Tavola dei Muschi.

I Muschi della Virginia, della Pensilvania, e d' altre parti dell' America Settentrionale, in buona parte sono i medesimi che i nostri muschi Inglesi, ed in parte poi sono differenti; conciossiachè ad un di presso due terzi del numero de' muschi delle divise Regioni per addietro non osservati; sicno di pari comuni a i nostri stessi paesi, ed il rimanente propri soltanto, e particolari di quella parte del noro Mondo. Quelli poi dell' America Meridionale sono pressochè tutti interamente differenti da' nostri muschi. I muschi della Grenlanda, e della Lapponia sono grandemente analoghi, e pressochè i medesimi delle nostre monta-

gne di Welch. E nelle nostre montuose parti del Mondo poste fra i Tropici, hanno moltissime specie di muschi estremamente belli ed appariscenti, somigliantissimi alle felci, che non rinvengonsi in niun'altra parte della Terra.

L'Irlanda, e la Scozia rimangono tuttora nella massima parte ignote rispetto a questo parto, come quelle, sopra le quali non è finora stata fatta alcuna ricerca, nè è se non le grandemente probabile, che somministrerebbono numero grande di pianterelle di muschio finora sconosciute. Non puossi a meno di confessare, che le distinzioni di questi picciolissimi vegetabili sono minute a segno, e la loro apparenza per modo varia negli stati loro differenti, che le ulteriori osservazioni farebbero per ristringere, e diminuire d'affai il numero descrittocene dal Dillenius; ma siccome altri esatti Osservatori ne aggiungeranno probabilissimamente altrettante specie affatto nuove, e veracemente infra sè distinte, così, quantunque sieno per avere parecchie occasioni di toglier via dal costrui catalogo molte delle da esso stabilite, nulladimeno avranno tutto l'agio di rimpiantarne per lo meno un numero uguale di veracemente novelle specie.

Uso dei Muschi. Qualora altro uso non vi avesse in questi minutissimi, e sommarmente vaghi oggetti, che l'ammirare l'opere maravigliosissime del sommo Creatore, questi solo bastevole farebbe a renderle degne dello studio, e dell'attenzione dell'uomo. La varietà, quasi dissi, senza confine della figura, e della struttura delle loro foglie, l'infinita delicatezza dei sottilissimi gambi, o piccioli, che le sostentano, e la regolarità, e l'ordine in estremo accurato, ed elato, onde son disposte, e piantate: la minutezza somma delle loro radici, o barboline, e la sottiliezza estrema degli steli, che sostengono le loro teste, cadauno dei quali è bene spesso più minuto, e d'legine di un finissimo pelo, e la picciolezza inconcepibile dei vasi, per entro i quali condotti vengono i fughi lunghello pel nutrimento della pianterella, e dei semi, sono cose tutte, che a vero dire esser non possono mai ammirate tanto, che basti: come anche la varia struttura delle teste, o sic-

Supp. Tom. III.

no vasi dei semi colle loro loppie, inenunciature, o custodie, per mezzo delle quali vengono ad esser difesi i tenerissimi semi, e le farine fecondanti, somministrano al dotto osservator microscopico una serie d'ammirazione, che non ha termine.

Ma non sono già questi gli usi tutti, per i quali queste maravigliosissime pianterelle sono destinate. Moltissimi di questi usi rimaner possono tuttora per avventura ignoti a noi; nulladimeno però noi sappiamo di presente, e conosciamo benissimo, come parecchie di queste pianterelle appellate *Ufnes*, sono grandi, ed in estremo prezziabili medicine, messe in opera dai valenti Professori di quest'arte nobilissima come dissecanti, ed astringenti sommarmente proficui. Sappiamo, come l'erba muschio comune fatta a calice è uno de' più egregi, e veramente sovrano rimedio per le tosse convulsive de' piccioli bambolini; ed il dottissimo nostro medico Mead ha infinitamente nobilitata quella specie di muschio grigio terrestre appellato *Lichen terrestre suboscureum* dagli Autori, con pubblicare a vantaggio sommo dell'umana generazione le sue virtù in una delle più terribili infermità, che dar mai si possono, quale si è il morbo del cane arrabbiato. I comuni Epatici verdi, sono medicamenti eggiamai conosciuti, e sperimentati negli leucorri del petto, siccome lo sono somigliantemente tali le specie tutte del *Polytrichum*.

I semi del nostro Licopodio vengono con ottima riuscita prescritti nelle affezioni nefritiche; e gl' Indiani ne danno una delle loro specie in moltissime malattie, e, siccome essi ci dicono, e i effetti, e con riuscita maravigliosa. Le coralloidi terrestri bianche comuni servono d'ottimo cibo ai Cervi della Lapponia, allorchè son morte, ed andate male le altre erbe tutte; e le conserve fatte di questi dati muschi servono di cibo a moltissime specie di pesci sì marini, che d'acqua dolce, ed insieme a parecchi uccelli acquajoli. E queste coralloidi, di pari che i muschi di terra, somministrano abitazione accomiatissima a parecchi insetti non meno, che ai loro figlioletti. Parecchie delle specie dei coralloidi non meno, che dei Licopodi vengono sperimentati di uso gran-

M m m

dis.

diffimo in quell'affai vantaggioso ramo di commercio, l'arte cioè de' tintori; nè vi ha ombra di dubbio, che moltissime altre sorti di quelli muschi possedevano di pari queste medesime qualità, tuttochè finora state non sieno rinvenute, e scoperte: e noi possiamo essere scortati a fare delle inchieste di specie somigliante, con farci ad osservare, come parecchie di queste piante di muschio tingono le carte, entro le quali vengono poste a seccarsi di colori in estremo vaghi non menno, che d'infinita durata. I muschi, che vestono, o cuoprono i tronchi degli alberi, siccome mantengono sempre mai freschissimi, e sommaramente vigorosi da quella banda, che rimansi all'aspetto di Sette-trione, seppure vengano su, e vegetano soltanto in quella parte dell'albero, servono a difendere, ed a tenere a coperto il tronco medesimo dell'albero dalla severità imperverantissima de' venti Aquilonari, e dirigono a un tempo stesso il passeggiere nel suo viaggio coll'evidentemente accennare costantemente quella data parte del compasso.

I muschi morbidi, e soffici de' pantani, e de' luoghi paludosi, servono in luoghi moltissimi alla povera gente per empire i loro sacconi, o materassi in vece di lana; e nella faccenda del trasporto delle piante vive da una in altra Regione, non vi ha cosa, che sia di uso tanto grande, quanto i gambi, e le foglie di questi minutissimi vegetabili. Le Piantie sugose, allorchè son ravvolte entro il muschio seccato, vengon su bellissime, e piene di rigoglio; e gli alberi non meno, che gli arbolcelli provano lo stesso beneficio allorchè tengono le loro radici involte entro l'erba muschio alcun poco umida.

La gran qualità dei muschi, che gli rende tanto proficui in calo similgiante, si è, che questi nè riscaldansi, nè fermentano, se vengano bagnati, o s'è sieno umidi, siccome sarebbe costantemente il fieno, od altro strame.

Caratteri dei muschi. Ciò, che dai Botanici viene rigorosamente, e strettamente detto per la voce *Muschio*, si è una Classe di Pianta comprese di un'ordine inferiore ai comuni vegetabili; i generi meno perfetti della quale, sembra che sie-

no intieramente privi di fiore, o di seme, oppure d'alcuna cosa analoga od all'uno, od all'altro, per lo meno, per quanto la nostra cognizione è stata finora capace di rinvenire; e che sieno composti di parti semplici, similari, ed uniformi. I generi alcun poco a quelli superiori possiedono alcuna diversità di parti, e ci fanno conoscere non so che di somigliante ed analogo alla maniera comune della vegetazione; conciossiachè abbiano alcuna somiglianza di quelle parti, le quali servono alle altre piante per la loro fruttificazione. I generi più perfetti dei muschi non solamente sono composti di parti differenti; ma hanno altresì gli organi loro appropriati contenendo una materia polposa, o carnosa, la quale alla perfine si secca, e prende la forma di una finissima, e sottilissima polvere, composta di granellini, cadauno de' quali od è un seme, od un granello di farina, che serve per la propagazione della rispettiva sua specie.

I muschi degli altri è più imperfetti vengono ad essere distinti dagli altri per la loro apparenza dall'occhio nudo medesimo: sono questi od in forma d'una finissima lanugine, o di piuma, cuoprendo la superficie di corpi differenti: od eziandio compariscono non altrimenti che formamente alacotti, e dilegnati filamenti, oppure corpi sfogliati galleggianti e nuotanti intorno all'acqua; oppure come filamenti di una tessitura più fissa, e più staccata, pendenti dai rami d'alberi di vecchia data: ovvero non altrimenti che picciolissimi arbusti, o semplici cornettini, che crescono, e vengon su diritti diritti sopra gli arfici terreni dei monti, o luoghi aprichi, e coperti di scope; o finalmente come corpi dilatati larghi, e sfogliati, spandendosi, e distendendosi sopra le secche cortecce degli alberi, o sopra le rupi, senza alcuno stelo, od altro sostegno.

Le specie più perfette dei muschi vengon trovate nella forma di picciolissime ma sommaramente regolari pianterelle, e videntisi in parecchie ramificazioni, e tutte vestite di foglie. Sono queste di forme, e di strutture differenti, avvegnachè alcune sieno larghe, e sottili, altre: legali-
gne

gne, e pelose; alcune pellucide, e trasparenti, altre opache; alcune lisce, ed uguali, altre pelose. Dalle ale di queste foglie in alcune specie, e dalla vetta, o sommità degli steli, o gambi in altre, alzanvili delle teste di una figura non meno, che di una struttura varia, ma tutte di una sola capsula, od *unicapsulari*. Alcune di queste pianterelle sono nude; altre poi rimangono coperte di una *calyptra*, o dir lo vogliamo cappuccio: alcune slannosi sopra un lungo stelo, ed altre sono piantate talente talente al gambo, o picciolo stesso. Queste teste addimandansi comunemente *capsula*, ed i loro gambi, o piccioli *sete*, nelle specie, che diconsi dagli autori *Mnia*, *Hypna*, *Brya*, e *Polytricha*; ma in quelle specie appellate *Lichenes*, e *Lichenajstra*, gli steli, o gambi addimandansi *pediculi*, e le loro teste *capitella*.

Quei muschi, che addimandansi *Bysii*, *Conserua*, e *Tremella*, compariscono totalmente privi di semi. Le varie parti di questi generi non l'uso di un menomo che differenti infra esse; ed in quei detti *Tremella*, quantunque abbiavi soventi volte un'apparenza di foglie, che assomigliasi a quelle degli alberi, nulladimeno, allorchè vengono esaminate, troverassi, che differiscono dalle medesime in questo, che tanto il lato superiore, che il lato inferiore delle foglie stesse non sono in modo alcuno nè poco, nè punto infra sè diversi.

Le specie dei musci appellati *Usnea*, *Coralloides*, e *Lichenoides*, posseggono tutte alcuna cosa, la quale sembra analoga ad un fiore, o ad un frutto nelle Piantie perfette, e gli altri generi tutti dei muschi, come, a cagion d'esempio, gli *Sphagna*, gli *Hypna*, e somiglianti, hanno, e posseggono perfette fruttificazioni, e producono quella polvere da noi poc'anzi accennata, che serve appunto in luogo di farina fecondante, o di semi, e che propaga con somma regolarità le pianterelle medesime. Le specie appellate *Mnia*, *Lycopodioides*, e sopra le altre tutte le *Lichenes*, o siano muschi Epatici, hanno, e posseggono delle perfettissime fruttificazioni, che sono ovvie, e distinguibili all'occhio stesso. I Muschi appellati *Mnia* hanno le sue teste, o *Capitella*, polverose, le quali con tutta la maggiore evi-

denza compariscono, essere le parti femminili della fruttificazione.

Le *Lycopodioides* posseggono parecchie capsule contenenti la farina fecondante, ed oltre a queste parecchie altre capsule femminili, contenenti i semi, e non hanno farina, che rimangasi sparsa perentro fra le medesime divisioni, o spartimenti.

Le teste dei muschi Epatici, o *Lichenes*, le quali contengono la farina, differiscono dalle altre tutte in questo, che sono *polycocche*: in questo similmente esse differiscono dal seme, portando le teste delle piante medesime, o scake, siccome addimandansi, le quali sono semplici, e che contengono i rudimenti, od embrione dei semi, ovvio, e visibile all'occhio nudo, che può vedergli benissimo crescere, ed aumentarli di giorno in giorno; e la propagazione della pianta da essi semi viene ad essere assai agevolmente osservata per tutti i suoi periodi. Questa cosa però è in estremo singolare, ed infinitamente diversa da quella delle altre piante tutte, avvegnachè tutta l'operazione in null'altro consista, se non nella semplice, e sola dilatazione dei semi, non avendo questi nè cuore, nè occhio; siccome vien detto avervi nei semi delle piante più grosse; non luogo particolare, dal quale la radice, o barbolina germogli, e sbuchi fuori, nè finalmente foglie terminali, ma si spandono semplicemente in ampiezza, e divengono giovani pianterelle somigliantissime a quelle, onde sono stati prodotti.

Gli altri generi tutti dei muschi hanno delle capsule per contenervi il loro seme, o la lor farina propagante. Questi semi in alcuni sono coperti di una *calyptra*, o cappuccio, ed in altri generi di muschi questi semi son nudi. Della prima specie sono pertanto quei dati muschi, che addimandansi *Sphagna*, *Brya*, *Fontinalis*, *Hypna*, e *Polytricha*; e della seconda i *Selaginies*, *Lycopedia*, *Peronie*, *Anthocia*, e *Lichenajstra*.

Le capsule dei muschi detti *Sphagna* non hanno cappuccio, o sia *calyptra*, perchè le teste essendo piantate sopra gambi, o piccioli estremamente corti, e le foglie della pianterella essendo lunghe, vengono ad essere coperte, e difese dalle

medesime; ed avendo, oltre a eò, un rigidissimo, e sommamente resistente, e duro operchio, non abbisognano in conto alcuno d'altra coperta; ma i muschi appellati *Fontinales*, *Hypna*, e *Polytricha* sono nelle loro capsule discesi tutti da spezie di cappucci, o sieno *calyptrae*, affinchè l'umido soverchio abbondante non venga a corrompere, ed a distruggere i loro semi. L'opercolo sdruciolato, o scorre da tutti questi in una direzione trasversale; imperciocchè allora quando la polpa racchiusa entro la capsula matura, e divien seme, o farina prolifica, e propagante, le parti intaccate del margine, ed orlatura alzanosi dalla superficie, ed allargansi, e s'apronsi all'insuori, per mezzo delle quali l'opercolo trovasi in piena libertà di cadere, e per conseguente i semi hanno per tal guisa sotto l'agio di saltar fuori, e cadere, e di propagare le rispettive loro pianterelle.

I *Selaginæ*, i *Lycopodia*, ed i *Lycopodioides* non posseggono nè capsula, nè opercolo, nè cappuccio, o *calyptra*; conciossiachè i frutti di questi generi di muschio trovandosi immersti, o stanziando entro l'ale delle foglie, non abbisognino in conto veruno di simiglianti difese; e coperte; ma stannosi nudi nudi ferrati allo stelo, o picciuolo; e quando son giunti al punto loro di maturanza, apronsi per lo lungo, e girano fuori i loro semi. I frutti degli *Anthocera* apronsi nella maniera pur'or divisa altresì, ma sono di una figura totalmente diversa, e tutt'altra, affomigliandosi a capello alla loppa del grano, dove per lo contrario gli altri affomigliansi nella lor configurazione agli arioni degli animali.

I muschi poi appellati *Peronia* sono veramente in estremo singolari in questo, che le loro capsule sono tutte suracchiate da moltissimi fori, per i quali fori i semi, o la farina propagante viene a scariarsi, e saltar fuori, sendo matura. Le tesse dei *Lichenastræ*, allorchè son giunte al punto di perfetta maturanza, divengono lucide, ed apprendosi in quattro spartimenti rappresentano a capello un Tetrapalo, o sia un fiore cruciforme dalle quattro foglie.

La sostanza, della quale son piene le

capsule, o tesse di tutti i muschi, od affomigliati a semenze, od a piccioli globuletti della farina fecondante dei fiori, che in miniatura sembrano tutti semi d'una figura particolarissima. Le fruttificazioni di queste minutissime pianterelle, sembra, che o sieno prodotte da questi, come semi, che cadono in terra per se stessi; oppure, secondo l'opinione di certuni, sembra, che altro non contengano nelle loro capsule, che sola farina propagante, la quale impregnando i bulbi, o dire gli vogliamo noduli trovantisi nelle ale delle foglie, cagiona, che crescano, vengano su, e vegetino, come viene chiaramente osservato in alcune delle piante più grosse, come a cagion d'esempio, nei bulbi, od occhi prodotti nelle ale delle foglie della Dentaria, e dei gigli, e d'alcune altre piante.

La prima opinione della polvere, cioè stanziante nelle tesse o capsule, trovantisi attualmente perfetti semi, è, a parer nostro, la più probabile, siccome i bulbi nelle ale delle foglie trovansi soltanto in alcune spezie degli *Hypna*, e di alcuni alberi di pochi altri generi; dove per lo contrario la propagazione è ugualmente vegeta, vivace, e certa in quelli, che non hanno alcuno d'essi, che in quelli, che ne posseggono; e la mancanza delle parti femminili della fruttificazione, che vengono a formare altrettanti *Desiderata* nel sistema di Linnæo, è agevolmente compensata, ed il tutto spiegato, ed appianato secondo l'usuale, e comune corso tenuto dalla natura negli altri vegetabili, eol solo concedere che la polvere stanziante nelle da noi tante volte accennate capsule, sieno semi reali, e che i piccioli globuletti sulle cimettine, che circondano intorno l'apertura della capsula, essere la farina prolifica, o propagante.

L'opinione dei muschi eretici, e vengenti su da quelli noduli, che trovansi nelle ale delle foglie, oppure dalle impregnate estremità dei rami, che hanno ricevuto la polvere lor tramandata dalle capsule, era originalmente fondata sull'osservare, che i tralciosi, o ramificati *Hypni* venivan su annualmente, e crescevano in lunghezza.

za, dalle estremità di tutte le loro ramificazioni, e che annualmente andavano perdendo tanta porzione del vecchio gambo o stelo nella radice, quanta ne andavano guadagnando di nuovo nella loro sommità; ma da osservazioni ulteriori, e più accurate apparisce, esser quelli semi reali, i quali sono contenuti entro le capsule nella forma d'una polvere; conciossiachè i Brya, e parecchie altre specie di mulchi altresì, son trovati venir su e crescere da picciolissime macchie, o punti, che sono congerie di loro minutissime foglie, propagate sul terreno, sotto le piante vecchie de' mulchi, appunto, ed a capello, ove era caduta la polvere entro le capsule contenuta; e quantunque venga conceduto, che i mulchi Hypna, ed altri mulchi dilatantisi in ricali, crescano, e vengano su dalle estremità delle ramificazioni, nulladimeno quelli medesimi esser possono similantemente prodotti in forma di piante novelline, dai regolari, e perfetti semi, che sonosi schiusi, ed usciti di dentro le capsule. Ella si è cosa indubitata, che i Brya vengono ad essere propagati per questo mezzo, e che spandendosi, e dilatandosi in ampi ciuffi; e gli altri generi eziandio esser possono così propagati, tutto che posseggano di vantaggio la proprietà d'aumentarsi e d'ampliarli per la crescita dello stelo, o picciolo; la quale, se vogliamo dir la cosa come è in fatto, altro non sembra, se non se la proprietà medesima di parecchie delle grosse piante, di rampicarli cioè nella radice, e di gettar fuori germogli grandemente allungantisi dalle estremità dei loro rami, o ramificazioni orizzontali, collocondosi, o sopra, o sotto il terreno, siccome quelle parti spandentisi, e dilatantisi possono con proprietà maggiore essere così chiamate di quello addimandar si possano radici; avvegnachè le fibre spinte fuori dalle perpendicolarmente entro la terra sieno, a propriamente parlare, le radici; ed è cosa molto ben conosciuta, che queste piante, tuttocchè si propaghino così per la radice, producono di pari del semi simiglianti alle altre, per i quali esser possono ugualmente propagate; e simigliante analogia esser dee ampliata di vantaggio ancora; conciossiachè, siccome quelle piante,

le quali rampicano, e si diramano colle loro radici, producono copia minore di semi, che quelle si facciano, le quali vengono soltanto propagate dai semi; così gli Hypna, che sono il genere di mulchi, in cui quella crescita dallo stelo viene principalmente osservata, sono finissimamente guerniti delle capsule, o custodietto de' semi, e moltissimi d'essi in una stagione non ne producono, che pochissimi; dove per lo contrario i mulchi Brya, e gli altri mulchi eziandio, che non hanno questo diviso vantaggio di crescere, e venir su dalle estremità degli steli, son cadaun'anno trovati abbondevolissimamente coperti in ogni loro mucchio di capsule femminali: conciossiachè appena abbiavim sol ramo, il quale non produce la sua rispettiva capsula. Ora se queste capsule contenessero soltanto una farina capace d'impregnare i noduli da noi più sù additati, oppure le estremità delle ramificazioni, ella si è cosa ovvia, e patentissima, che se ne richiederebbero tante per gli Hypna, quante se ne richiedono per qualsivoglia altra specie di mulchi; ma se essi sono genuini, reali, e perfettissimi semi, ella non è maraviglia, che la natura abbia somministrato i medesimi con somma abbondevolezza a quelle date talispezie, le quali esser debbono soltanto, ed unicamente propagate dai medesimi semi, e che siasi mostrata, e diportata più ristretta in ciò, e più parca con quelle date altre specie particolari, le quali vengono ad essere anche propagate dalla crescita, o per la crescita delle loro ramificazioni.

A tutto questo può a buona equità essere finalmente aggiunto, che le feici, ed altre piante appellate dai Botanici Epifilisperme, s'avvicinano assai più d'ogni, e qualunque altra pianta all'indole, ed alla natura dei mulchi; e quantunque molti Autori sieno stati fatti a sospettare, che la polvere finissima stanziente, e trovantisi nella parte detratana delle loro foglie non fossero per avventura semenze, ma bensì soltanto una semplice farina; nulladimeno è cosa oggimai di presente ben conosciuta, che questo è vero, e perfettissimo seme: conciossiachè sotto parecchie specie di essi mulchi vengono tro-

vata

vate delle nuove piaoterelle, seminatrici per se stesse, vengenti in, e vegetanti nelle loro prime fila, o rudimenti di foglie, e di figura, le quali con ogni maggiore evidenza sono venute fuori dalla polvere caduta dalle vecchie piante; e siccome si è oggimai scoperto, e toccato con mano, esser questo a capello ciò, che segue alle felci, così ella si è cosa probabilissima, che lo stesso bellissimo segua simigliantemente in rapporto ai muschi, allorchè altri facciasi ad esaminargli con maggiore accuratezza di quello siasi fatto finora. Ma se questi granellini di polvere hanno i lobi, e le batbolioe, per le quali i semi delle piante più grosse si propagano, oppure se crescono, e divengono piante simigliantissime a quelle, onde sono stati prodotti, nella maniera appunto dei Lichenes per via di una pura, e mera espansione, e dilatamento; ella è cosa, la quale affinchè possa adeguatamente esser determinata, abbisogna d'ulteriori, e di più diligenti osservazioni.

Egli è evidente, che alcune specie di muschi s' avvicinano grandemente alla natura di quelle piante, le quali possiedono le loro parti virili, e femminili sopra un medesimo fiore, ed a quelle altresì, che hanno le parti medesime sopra fiori diversi. I Lichenes hanno le loro foglie intaccate non altrimenti che quelle delle perfettissime piante, ed hanno nella maniera medesima la loro superficie superiore diversa, e tutt'altra dalla loro superficie inferiore. Hanno questi i loro fiori maschi, o testoline piantate sopra lunghi gambi o piccioli: quelle teste contengono soltanto della farina, ed i semi trovansi stanziati in picciolissime custodiette, o loppo sopra la superficie delle medesime foglie. Quelle, che riguardo alla perfezione vengono dietro di quelle, sono i muschi appellati *Lycopodioides*, i quali hanno i fiori colla farina, ed i frutti co' loro semi disposti sopra uno spigolo medesimo. I muschi *Mnia* hanno le teste di due specie, una cioè membranosa simigliantissima a quelle degli *Hypna*, e d'altri muschi eziandio; e gli altri le hanno polverose e contenenti una polvere visibilissima sopra la loro superficie: le teste d'una di quelle specie contegono evidenti-

simamente la farina, e l'altra contiene il seme. I muschi *Lichenastra* radissime volte vengono trovati con i semi sopra' essi; ma diramansi, e rampicano, e si diffondono grandemente per via delle radici; quindi rendesi meno necessaria in essi una nuova propagazione da esser effettuata per i semi. I *Polytricha* vien supposto, che portino nelle loro teste soltanto della farina, ed hanno le ramificazioni stellate alle loro estremità, per condurle ai semi, che esser debbono impregnanti. Questa è stata l'opinione comunissima; ma ella abbisogna, a vero dire, d'adequata conferma. Alcuni dei muschi *Brya* hanno la medesima apparenza della parte femminile, ed i noduli giovanetti, e novellini nelle ale delle foglie degli *Hypna*, vengono ad essere generalmente riscritti all'uso medesimo. Ma queste altro non sono, che mere congetture; e l'opinione infinitamente più probabile si è, che la polvere nelle teste di tutti i muschi sia un vero, e genuino seme, il quale viene generalmente ad essere impregnato colla farina, che esce dai puntali, che trovansi sopra la bocca della capsula; ed in alcuni esempi, come nei muschi *Mnia*, ed in simiglianti, non altrimenti che in alcune delle piante più perfette, da fiori differenti, in una parte differente della pianta. Veggasi *Dillenius*, Hist. Musc. Introit.

La maniera della semina dei muschi, può esser in generale in alcun grado congetturata, anzi presso che stabilita, da quella di un genere d'essi muschi, che è stata esaminata, ed osservata in tutti i suoi periodi di procedimento, ed alla quale moltissime di quelle di altri muschi esser possono uguagliate, quantunque cadaun genere abbia, e posseda la sua distinta fruttificazione in alcuni rapporti, nulladimeno può benissimo portare una grandissima universale analogia.

Il genere già esaminato, ed accertatamente osservato è appunto quello, che da Moosieut *Dillenius* vien denominato *Hypnum*. Le specie di questo genere di muschi sono numerosissime, e sommamente ovvie, e comuni, ma quel particolare muschio, che fu il soggetto di queste osservazioni, è la specie di corte ramificazioni simiglianti alla feta, che è comu-

ne nelle muraglie di vecchia data, e che dal testè citato Autore vien descritto nella sua Istoria: *Hypnum vulgare, sericum, recurvum, capsulis erectis cuspidatis*.

La testa di questo muschio comparisce all'occhio nudo un picciolissimo corpicciolo bislungo, liscio, di un color giallognolo pendente allo scuro, della lunghezza ad un di presso della nona parte di un dito: è quella coperta nell'estremità sua superiore da una calyptra, o specie di cappuccio membranoso, il quale, quanto alla sua forma, o configurazione, assomiglia ad uno spegnettojo, o ad un'imbuto rivoltato sottosù. Quando questa calyptra, o cappuccio è tolto via, e che la testa medesima viene osservata, ed esaminata col microscopio, la superficie della medesima è osservata tutta scannellata di strisce, o scannellature longitudinali. La base della testa è di un colore aranciato carico, ed è più opaca di tutto il rimanente; e la vetra riman fasciata, o contornata da un'anello similantememente di color di arancia rigonfiante in fuori alcun poco oltre la superficie delle parti contigue della testa medesima. Ottime lenti fanno vedere, e mostrano, come in questa testa non mancano per modo alcuno le parti essenziali alla fruttificazione di quelle che comunemente addimandansi piante perfettissime. Questo anello è veramente un calice monofillo ondato per entro il quale sorgono sedici stami fibrosi piramidali: son questi di un colore verdastro pallido, e sono tutti carichi di una farina ovale bianchiccia. Gli stami tutti divisiati piegansi l'uno verso l'altro dalle loro basi, e vengono, quasi dritti, ad incontrarsi in un punto nelle loro vetterelle. E' questa la loro mostra, od apparenza, allorchè la testa è vicina ad esser matura; ed immediatamente sotto l'arco formato da questi stami havvi un pistillo cilindrico concavo, per cui la farina fa il suo transitò, o passaggio, e viene ad esser dispersa, e sparsa fra i semi nella testa. Il frutto poi è una grossa cassetina piena per ogni, e qualunque verso da una membrana, la quale fa mostra di sé sopra il lato esteriore della testa medesima, ed in parecchi luoghi viene a rimaner contigua alla medesima. Questa capsula,

o cassetina è ripiena di perfettissimi e bellissimi semi, sono questi rotondi, trasparenti, allorchè sono acerbi e non maturi, ma poscia opachi, e di un colore verde sommamente vago, il qual colore ritengono eziandio, quando son secchi. Veggansi le Trasfazioni Filosof. n. 478. Sezione XII.

Allorchè questa testa è dappima prodotta dalla planterella, gli stami sono in estremo segaligni, e sottili, e rimangono dritti; la testa è a stento più grossa del gambo, o stelo; e la calyptra, o cappuccio difendela, e la cuopre tutta al di sopra, per conservare, e tener a coperto la sostanza tenerella della farina dalle ingiurie, ed urti esterni. Siccome la farina medesima gonfiassi dopo in istami, così i semi nella testa aumentansi di pari, e crescono in grossezza, e per l'ampiamento di quelli la testa viene ad essere più estesa in grossezza, e per similgiante mezzo gli stami vengono a rimaner separati, e disgiunti sempre di vantaggio l'uno dall'altro nelle rispettive loro basi, ma volgonsi, e si piegano all'indentro verso i loro punti in guisa, che vengono a formare una specie di copertoja archeggiata sopra lo stigma del pistillo, il quale è uno solo, e semplice, e quindi la farina via via, che va maturandosi, cade entro la testa, ed impregna i semi. Veggansi le Transf. Filosof. Ibidem.

Tutti i muschi, le epatiche, e le alte piante del carattere medesimo, posseggono, e sono dotate delle medesime virtù, e facoltà generali di dissecanti, e di astringenti.

Muschio sopra gli alberi, nell'affare degli Orti, e giardini.

La erefita, e vegetazione di abbondevolissime congerie di muschio sopra ogni, e qualunque specie di albero, è una malattia di pessima conseguenza alla erefita dell'albero medesimo, e reca danno incomprendibile ai frutti degli alberi dei nostri broli, e frutteti.

Il rimedio: prefentanco, e che è in mano di tutti sul fatto, si è il dibarbicare, e levar via dal corpo, o tronco dell'albero, e dai grossi rami il muschio stesso con una specie di coltello di legno, affinchè altro istrumento, come di ferro,

o fo-

o fongliante, non intacchi, e danneggi la corteccia, oppure con un pezzo di ruvidissimo panno pelofo, il quale produrrà l'effetto egregiamente bene, dopo che il mufchio farà ftato ammollato, ed ammorbido dalla pioggia. Ma la cura di tutte la migliore, e che verrà a farci confequire l'effetto, fi è quella di rimuoverne, e di dilungarne la cagione. Quefto adunque effet dee condotto ad effetto per mezzo di derivare altrove, e di dilungare tutta la foverchia umidità dalle radici degli alberi medefimi, e puovvi altri grandemente prevenire quello malore nel tempo appunto della prima piantagione degli alberi, col non piantargli foverchio affondati, e profondi.

Se gli alberi ftieno foverchio fiffi in un terreno d'invole fredde, fempre, e coftantemente verranno ad effer coperti di mufchio; ed il modo migliore, ed il più efficace di rimediare il difetto, fi è quello di fchiarargli, e di procurare, che ftieno più radi. Quando i giovani rami degli alberi fon coperti di un mufchio lungo, e grandemente pelofo, in breviffimo tratto rimarranno diftrutti; nè vi ha modo, nè vefto di apporvi riparo, e di impedir ciò, ma forfè il troncare i rami rafente al tronco, e fe rendafi neceffario troncare eziandio la tefta dell'albero itelfo; concioffiachè il mufchio rifiorirà, e comparirà di bel nuovo; e fe la cagione ne venga dilungata in quello mentre, o col diradare la piantagione, o contrar via, e fare i lavori adeguati nel terreno, dopo di quello i teneri, e novelli germogli continueranno ad effer netti, e rimondi.

In evento, che gli alberi ftieno coperti di mufchio, perchè il terreno fia foverchio afciutto, avvegnachè quefto malore avverrà di pari, fe il fuolo peccifi nell'uno, che nell'altro de' due eftremi, vale a dire, non meno s'è fia foverchio umido, che foverchio riario, in tal cfo il rimedio proprio ed adeguato fi è lo fpandervi della cenina, o terra umida scavata dal fondo di un follo, o di un fiume, ben ben fiffa intorno alle radici, fondendo, ed aprendo la terra ad una data diftanza, e profondità acconcia per collocarvela. Quello non folamente vetrà a

rinfrefcare l'albero medefimo, e ad impedire, che vi vegeti, e vengavi fuquantità grande di mufchio, ma vetrà eziandio ad impedire altri grandi fconceri, e malattie, alle quali trovafi fottopofti pur troppo gli alberi da frutto nel tercol riari, ed afciutiffimi, fra' quali di momento non mezzano fi è quel difetto, che gittan giù i frutti da sè troppo prefto, ed innanzi tempo. Veggafi Mortimer, della Coltivazione, Vol. II. pag. 78.

MUSCHIO Scop. Veggafi l'Articolo SCOPA.

MUSCHIO Seta. Con quella efpreffione mufchio feta nella Botanica vien denominato e diftinto dal celebratiffimo Conte Marfigli una fpezie di mufchio di mare di una finezza, e di una morbidezza grandemente offervabile, affomigliantefi affaiffimo alla feta, più che a qualivoglia altro prodotto vegetabile. E' quefto mufchio pienamente, ed interamente composto di una forte di fiocco di eftremamente fini pelli, o filamenti, ed è di un color verde pendente all'azzurro, e prefto che trasparente. Vegeta quello, e vien fu felle rupi, felle pietre, felle conchiglie, e nicchi, o fopra qualunque altra foftanza, nella quale incontri, e viene comunemente trovato nei piccioli fondi: non è quello così faticcio, e fluffibile, come lo fono parecchie altre piante marine, ma ftropicciandofi va faciliffimamente in polvere fra le dita. Allorchè venga efaminato, ed offervato, col microfcopio, i femplici filamenti non comparifeono di una medefima ugal fuperficie, nè di una teftura uniforme, ma alcuni effer congiunti, e composti non altramente che fe foffero di moltiffimi pezzetti atraccati, e conneffi eftremità con eftremità gli uni a gli altri, non altramente che una collana, od un vezzo di una donna. Quello mufchio è di un finiffimo color verde pendente al paonazzo, e fotto il microfcopio apparifee perfettamente trasparente, ed affomigliafi ad un vezzo o filo di gemme fongliantiffime a quelle appellate acqua marina, od altre a quella fonglianti pietre preziofe. Veggafi Marfigli, Histoire de la Mer, pag. 79.

MUSCHI marini. Quefte picciole piante terrel-

terelle sono bellissime, allorchè rimiranti coll' occhio nudo; ma quando sono esaminate, ed osservate col microscopio, somministrano una piacevolissima diversità di struttura, ed una commendevole varia formazione.

Le specie dei muschi marini comuni ci somministrano una varietà somma di colori, avvegnachè le diverse parti della pianterella medesima compariscano bene spesso dove brunicce, dove gialle, dove rosse, e dove grigie. Nel seccarsi, che fanno queste pianterelle, i colori divengono meno vaghi, ed appariscenti; ma se pongasi la pianterella medesima asciutta di bel nuovo ad immollarli nell' acqua, questi stessi colori vengono in alcun grado a ricovrarsi, e vien toccato con mano, che le variazioni sono comunemente dovute alle giunture, ed alle annodature, o tacche trovantisì negli steli, dalle quali viene ad essere interrotto, e troncato il corso del colore generale, e sono assai sovente essi stessi, o neri, oppure di un colore oscuro, e bruno carico.

Le vetterelle dei loro rami vengono ad essere frequentissimamente terminate da piccole vescichette, o globuletti trasparenti: da certuni queste vescichette sono state prese per i frutti di queste pianterelle, ma con somma improprietà, e con errore majuscolo; avvegnachè altro in sostanza non sieno, che globuletti di chiarissima acqua. Alcuni di essi globuli trovansi uniti, e co giunti in parecchie distanze, e cadauna giuntura è dotata della sua rispettiva particolare forma, e struttura. Osservasi questo appunto nelle due grandi classi di quei muschi marini appellati Coralline, e Conserve. Altri poi sono con un' avvenenza vaghissima diversificati, e frammezzi di bruno, di giallo, e di verde, tuttochè meno trasparenti, somigliantissimi perciò ai muschi di cristallo. Sono queste piccole vaghissime Coralline, e le loro giunture, o commettiture sono di ordinario diversificate con delle macchie, o tacche nere. Ella non è somigliantemente così rara il vedere, nelle estremità delle ramificazioni di queste Coralline, certi piccioli globuletti neri, che compariscono non altramente, che fossero frutti; ma in sostanza, e realmente null' altro sono, che globuletti di acqua così tinta da

Suppl. Tom. III.

alcuni fogli trasudati, e provenienti dalla vaghissima pianterella medesima.

Egli si è però possibile, che questi liquidi globuletti esser possano tanto vicini alla natura del frutto, che giungano a contenere i semi della divinata pianterella. Noi sappiamo, e conosciamo benissimo, come i semi del Fuco marino in generale trovansi avviluppati entro un liquore glutinoso, e conservati appunto nella vettura, o sommità dei ramuscelli della pianta: trovansi questi, a dir vero, in quelle grosse piante circondati per ogni verso, e vestiti da una visibilissima, e sensibilissima membrana, la quale è, a dir vero, più fissa, più faticcia, e più lunga di qualsivoglia altra parte della pianta medesima; e non è cosa impossibile, che questi finissimi, e picciolissimi globuletti aver possano la loro rispettiva membrana circondantegli, la quale sia a segno delicata, fina, e sottile, che esser non possa dai sensi nostri rilevata, e distinta. Veggasi Monsieur *Marsigli* Histoire de la Mer, pag. 80.

I Caratteri genetici di queste piante, dovranno esser osservate sotto i rispettivi articoli particolari di FUCO, CORALLINA, e somiglianti: ma queste minutissime pianterelle bene spesso son trascurate dagli Scrittori della Botanica, tuttochè facciano una mostra così vaga, ed una figura così appariscente, allorchè son rimirate ed osservate colle lenti e col microscopio.

MUSCHIO, *muscus arboreus marinus*. E' questo nella botanica il nome dato dal celebratissimo Conte *Marsigli* ad una specie in estremo vaga, e graziosa di pianta marina. Vegeta questa, e vien su negli scopoli a certe date profondità assai considerabili sotto l'acqua, ed è per lo più alta quelle tre dita in circa. Ella è composta di parecchi rami faticci, gueroiti verso le loro vetterelle di fogliami trasparenti. I gambi, o steli son concavi, e mentre la pianterella stanzia entro il mare, sono morbidi, e soffici, ma quando è asciutta, divengono alquanto duri, e resistenti.

Allorchè questa pianterella viene esaminata, ed osservata col microscopio, la sua superficie comparisce tutta granellosa, oppure tutta coperta di una specie di piccioli glanduletti, le quali son piantate vicinissime l'una all'altra; e se vengano tagliate a traverso, si vede, che la sostanza

Non tut-

tutta è concava, e che questa cavità generale è fatta in guisa, che viene a comunicare con tutte quelle glandulette; di maniera tale che l'ufficio loro si è evidentissimamente di ricevere tratto tratto l'acqua marina, e di condurla entro questa concavità generale, ove ella viene ad essere per ogni e qualunque verso distribuita per tutto il corpo della pianta, e viene a un tempo stesso a servire alla medesima di nutrimento, e di sostegno. Se le foglie di questa pianterella sieno stropicciate sopra la carta paonazza, danoole un color verde giallognolo.

Il tanto benemerito dei prodotti del Mare Conte Marfigli ci ha somministrato una totale analisi di questa pianta: e siccome noi possiamo essere informati dei principj non meno, che delle proprietà di parecchie altre Piantie marie del genere medesimo, così non può essere fuor di proposito, e disacconcio il dar un'estratto delle Osservazioni fatte da questo Gentiluomo Franzese.

Sendo state collocate entro una storta Chimica ventiquattr'once di questa pianta, ne venne sopra cinque once di flemma di un sapore dolceigno, e del colore a capello dell'olio delle mandorle dolci. Lo spirito era di un color terreo scuro, o polveroso, di una natura filata, di un sapore untuoso, e di pari alquanto agro, e l'asciante dopo di sé un gusto amarognolo: di questo oe venne fuori dodici once, e la materia rimase indietro nella storta fu sei once, e tre dramme. Di modo che tutto il prodotto essendo venti tre once, e tre dramme, in tutta l'operazione se ne perdettero, e dileguaronse soltanto cinque dramme semplici in tutto. L'acqua non alterava di un menomo che il colore della carta azzurra nell'immollarla; ma essendo mescolata con un decotto di fiori di malva la faceva venire del colore del frassino. Il decotto di gallozzole divenne di un color paonazzetto; ed una soluzione di verde rami di un colore verdastro con alcuna mescolanza di color di frassino. La Tintura di girasole divenne di un colore azzurretto tendente, od inclinante al bianco. A questa essendo stato aggiunto lo spirito di nitro, cagionò un leggerissimo fumo, ed essendovi dopo di questo aggiunto del decotto di fiori di mal-

va, ne venne prodotto un finissimo color rosso. Lo spirito di aceto cagionò questo colore in verde; ma non venne prodotta menomissima ombra di cambiamento da alcuno degli appresso liquori, cioè, dallo spirito di sale, dallo spirito di sale ammoniac, dall'acqua di calcina viva, dall'acqua di allume, e dall'olio di Tartaro: ma da una soluzione di sublimato corrosivo venne raccolta una quantità di particelle bianche, e grossolane, che vennero poscia precipitate al fondo del vaso. Veggasi *Marfigli*, *Histoire de la Mer*, pag. 73.

Essendo stato esaminato lo spirito con della carta paonazza, non produsse il menomo cambiamento nel colore di quella, essendovi stropicciato sopra, od essendone questa bagnata; il decotto di fiori di malva essendo poscia mescolato con questo spirito, la fece venire di un color verde pallido inclinante al giallognolo: il decotto di gallozzole mescolato con esso spirito, lo cangiò in un color rosso oscuro: da una soluzione di verdetame venne cangiato in un color giallo sudicio, ed ingrossato: e finalmente la tintura di girasole fece divenire di un color di frassino. Essendo con questo spirito mescolato lo spirito di nitro, cagionò un moderato fumo, senza la menomissima bullizione, ed il colore della mistura cangiò in un verde rossiccio: in mescolando con questo il decotto di fiori di malva, lo fece divenire di un color rosso giallognolo. Aggiuntovi lo spirito di aceto, venne a renderlo più fluido, e di un colore meno oscuro. Dello spirito di sale venne cangiato in un color rossigno. Lo spirito di sale ammoniac, e l'olio di Tartaro, non vi produssero ombra menoma di cambiamento; ma l'acqua di calcina viva rendetelo più fluido, ed insieme più chiaro. L'acqua di allume vi raccolse una quantità di materia bianca, e precipitolla: ed una soluzione di sublimato corrosivo, nella maniera medesima, fece divenir bianco, e precipitò al fondo del vaso le parti grossolane. Dal *Copet mortuum* poi ne venne somministrata una dramma, e dieci grani di sale lissiviale filtrato; il sapore di questo non è se non mezzanamente agro, ed il suo colore è un verdastro bianco: se venga stropicciato sopra la carta paonazza, le partecipa il suo proprio colore.

Il decotto di malva in mescolandovi con esso quello sale perdette il suo colore azzurro, e divenne grigio; e coll'agitare e dimenare frequentemente il vaso, venne alla per fine ad acquistare un color giallo. Lo spirito di nitro mescolato con questo sale, non produce col medesimo quella totale, e violenta effervescenza, siccome con moltissimi altri sali fissivi; e se vi veniva aggiunta una porzioncella di spirito di girasole, diveniva del colore del vino rosso. Lo spirito di aceto lo scioglie con estrema vivacità, e con esso divenne torbido, e flosco. Lo spirito di sale scioltelo di pari intieramente, e perfettamente, ma non produsse fumo, tuttochè eccitasse una sommamente considerabile ebullizione. Dall'acqua di calce viva venne disciolto lentissimamente, e sollevato alla superficie; ed in gesso somigliante l'acqua di allume, nel disciogliergli, che fece, venne a rimaner tutta coperta nella sua sommità di un'assai fischiuma. Sendo stato aggiunto a questa il sublimato corrosivo, venne a precipitare di bel nuovo il sale senza azzurro di un menomo che il suo colore. Lo spirito di fiele Ammoniaco, e l'olio di Tartaro non vi produssero alcun cambiamento. Ella è cosa degna di essere riflessuta, come questa pianta non contenga sal volatile.

MUSCHIO marino dilatato, *Muscus marinus latus*. Il muschio marino dilatato e piatto, o compresso, è una pianta marina descritta dal famoso Conte Marfigli. Vien questa trovata in parecchi luoghi a diverse profondità per entro il mare, veggente su, e crescente sopra gli scogli, e sopra le pietre. La sua superficie superiore è composta d'una serie di foglie d'una figura orecchiuta, ammassate e congiunte insieme in una foggia confusa, ed irregolare; ma il lato, o superficie di sotto è liscia, piana, ed ugualissima, salvo che ella è tempestata, per così esprimerci, di un dato numero di morbide e soffici punte, o rialti, i quali non vengono agevolmente rilevati e distinti dall'occhio nudo. Questi rialti, allorchè adoperati in osservandogli il microscopio, rilevasi essere altrettanti piccoli tubi bianchi di figura cilindrica: altro questi con tutta evidenza non sono, se non le piccole aperture,

per mezzo delle quali la pianterella viene a ricevere il proprio nutrimento; conciossiachè in quella, non altramente che nelle altre piante marine in generale, allorchè le radici sono attaccate ad uno scoglio, o ad una pietra, non cavano, nè estraggono già nè dallo scoglio, nè dalla pietra medesima il nutrimento loro, ma altro per mezzo di quelle radici non fanno salvo che fissarsi, e tenerli stabili e fissi alla medesima in quel tal dato luogo; avvegnachè la superficie tutta della pianta prenda e riceva il suo adeguato nutrimento dall'acqua circolante, o circondantela, e cada una parte d'essa superficie agisce non altramente che facciasì una radice, ricevendo il nutrimento pel suo tutto. Veggasi Marfigli, Histoire de la Mer, pag. 73.

MUSCHIO. Il muschio non meno, che altri profumi della Tribù medesima, è stato grandemente, e per lungo tratto di tempo magnificato, e celebrato come un' eccellente antispasmodico, ma tanto il muschio, quanto gli altri profumi sono stati amministrati per l'addietto in doserelle così picciole, che di necessità non hanno prodotto, che leggerissimi, ed inconcludentissimi effetti. I Medici Pratici riputavano un' ampia, e traboccante dose quella di quattro in cinque grani. Ma i prodi Chinesi ci hanno fatto veder d'esser più coraggiosi di noi, avvegnachè comunissima sia costantemente presso di loro la dose di una decima parte di un'oncia.

Il rimedio efficacissimo, di cui servono gli Orientali pel morso del cane arrabbiato, sono sedici grani di muschio, ed assai frequentemente ripetuto da essi nella dose medesima. Veggasi l'articolo PAZZA.

Gli effetti del muschio sono l'ammannare, attutare, e dilungare i dolori, produrre un sonno tranquillo, e promuovere una copiosa diuresi. Quindi da valentissimi Medici è stato sperimentato di usoinfinitamente proficuo nelle affezioni spasmodiche, nelle febbri petecchiali, maligne, e putride, nelle malattie contratte nelle prigioni, nelle tossi convulsive, in quel male appellato dagli scrittori delle cose mediche *subfultus tendinum*, ed in somiglianti disordini a quelli analoghi. Per i casi particolari noi rimettiamo i nostri Lettori a quanto viene disposto nelle nostre Tran-

fazioni Filosofiche, sotto il n. 474. §. 18. Abbiamo rinvenuto simil'amente con accertatissimi effetti essere stato il muschio grandemente proficuo nei malori convulsivi somministrato per via di clistero, siccome osserva nella testè citata Traduzione il dottissimo Medico Wall.

L'Operazione del muschio in alcuni rispetti, assomiglia a quella dell'oppio; ma il muschio è all'oppio infinitamente preferibile in questo, che dato che venga al paziente, non lascia dietro di sé alcuna stupidità, o languidezza, effetti assai più fiati dall'oppio prodotti. Quindi è, che il muschio corrisponda così bene simil'amente in quei casi bassi, ove manca il sonno, e ne quali sono disacconce, ed improprie le oppiate.

Viene asserito, esser cosa più dicevole il somministrare il muschio in pillole, e che coloro, che soffrir non possono i profumi, possono benissimo avvallo in questa forma senza ombra menoma d'incomodo. Conosciamo, siccome l'Etmullero, ed altri Valenianuani hanno da gran tempo osservato, l'odore, o fragranza del profumo assai più fiato venga sperimentato piuttosto pregiudiziale, e dannoso; e per lo contrario la sostanza del medesimo profumo interamente avvallata, aver prodotto, e produrre ottimi effetti. Veggansi le Trans. Filosof. loco citato.

Egli si è veramente un peccato, che un sovrano medicamento di conseguenza così grande, siccome lo si è il muschio, debba esser soggetto ad adulteramenti, e che i caratteri di sua verace genuità trovinsi stabiliti così maleamente.

In una Scrittura medica recitata alla presenza, ed in una Tornata della Società Reale il dì 17. del mese di Marzo del 1742, vennero esposte parecchie guarigioni effettuate dal muschio nel bestia bovino attaccato di morbo contagioso.

Allorchè il muschio comincia ad andar male, i popoli delle Indie Orientali hanno in costume di porlo in una vescica, od in un sacchetto, nel quale sieno stati fatti con un ago parecchi fori, ed appendono così foracchiato sopra un luogo comune, ma non così basso, che il sacchetto arrivi a toccare l'immonda materia. Altri poi o avvolgono tutto una pezza di tela di lino ben bene inzuppata d'urina corros-

ta. Veggasi Boyle, Opere Compend. Vol. 1. pag. 146. & seq.

Asserisce Monsieur Boyle medesimo, come sua propria cognizione, ed esperienza, che il muschio contribuisce grandemente al conservamento della carne. Veg. Boyle, Opere Compend. Vol. 1. p. 30.

MUSCHIO *formica*. E' quella una denominazione data da Monsieur Lister, e da Monsieur Ray ad una specie particolare di formica, che è del numero dell'Insetti fragranti, o profumati.

Vien questo insetto trovato nei lidi, o rive asciutte, e riarie, ed è a segno più picciolo delle formiche comuni, che questo solo basta per distintiva sua caratteristica. Quelle formiche di questa specie, che sono senz'ale, sono di un color giallognolo, e qualora vengano ammassate, od infrante mandan fuori, ed esalano un'odore acuto, ed acido, non altrimenti che le formiche comuni: ma quelle di quelle particolari formiche, che sono guernite d'ali, sono di un colore di carbone negrissimo, e queste in vece dell'odor acido acuto delle altre, mandan fuori un'odore di profumo così veemente, e gagliardo, che non può per modo alcuno esser sofferto. L'odore di tutti gl'insetti fragranti, o profumati, in conservando i medesimi insetti, s'evanisce, e s'inequali; e queste picciolissime creature poichè è alcun tempo, che sieno state morte, e seccate, spirano un'odore assai meno gagliardo, e pungente, ma molto più soave, e gradevole, Veggansi le Trans. Filosof. n. 76.

MUSCHIO, insetto. Servonsi certuni di questo termine per esprimere il capricorno, o sia trischio-learsaffaggio; ma è questa una frase troppo vaga, e niente dicevole per significare questo animaluccio, avvegnachè abbianvi altri insetti, che spirano un'odore così gagliardo, come quello del muschio, e del profumo. Havvi una picciola specie d'ape, o pecchia, che è comunissima nelle vaste pasture della Provincia di Lincoln, ed io parecchie altre parti dell'Inghilterra, che fassi vedere nel mese d'Aprile. Questa bestiolina frequenta costantemente Ranuncoli, e quei fiori detti dai Botanici dente di Leone, *Dandelion*, *Dens Leonis*, e questa spira un gagliardo, e finissimo odore di muschio. Havvi simil'amente una verme da sei piedi, che cibasi di quel ve-

getta-

getabile appellato *galbium latrum*, o sia pajariccio giallo da dama, il quale ispira la fragranza medesima di muschio in un grado niente minore. Si l'uno, che l'altro di questi insetti, come anche il capricorno, o scarafaggio muschio perdono il loro odor di profumo, allorchè son morti da qualche tempo. Vegg. le Transf. Filosf. n. 76. Vegg. di pari l'Art. SCARAFAGGIO *Capricorno*.

MUSCHIO Topo. E' questo un animale comunissimo in parecchie parti dell'America il quale per ogni, e qualunque rapporto assomigliasi a quell'animale terrestre ed aquatico detto dai Naturalisti *Castoreo*, se sola ne venga eccettuata la grossezza. Monsieur Sarazin Membro della Reale Accademia di Parigi falsi ad osservare come coloro nel denominare questi animali col nome medesimo, non fanno altra distinzione, salvo che chiamano il *Castoreo* *Fratello maggiore*, e questo *Topo muschio*, *Fratel minore*. Vivono questi animali nel tempo estivo sopra ogni, e qualunque sorta di pianta, e nell'Invernata fra le massime radici del giglio aquatico. Vivono questi topi in comunità, per lo meno nel decoro dell'Invernata, ed alzano, e si fabbricano per se medesimi certe abitazioni di grandezza diseguali, alcune delle quali fabbricate, e destinate pel ricevimento di una sola famiglia, ed altre poi per un numero grande di tali comunità. La massima loro cura viene da essi impiegata in eleggersi un luogo proprio ed acconcio per simili abitazioni; conciossiachè non solamente reodasi loro necessario il mantenersi in luogo che gli tenga a coperto dalle ingiurie delle stagioni, ma che dia eziandio il varco libero all'acqua, ma però senza pericolo d'esser devallato dalle inondazioni: oltre di questo è necessario, che questo luogo trovi in vicinanza d'ampie piantagioni delle radici medesime, delle quali queste bestioline sogliono cibarsi, e sussistere nell'Invernata. A fine d'aver tutti i divisati comodi necessarissimi alla loro sussistenza, fanno sempremai questi animali le loro fabbriche nelle umide rive d'alcun fiume, il quale abbia un fondo livellato, ed un'ampio letto, senza soverchio alta profondità; e siccome questi siffatti fiumi abbondano sempremai delle da noi divise radici, delle quali essi abbisognano, così fabbricansi essi di pari sempremai una specie di asciutto ma-

gazzino abbondevole di provvioni, e trovantesi a un tempo stesso a coperto delle inondazioni: avvegnachè hanno essi le loro difese preparate per le piccole alzate dell'acqua, sendosi già avvedutamente prima fabbricati delle camere superiori, nelle quali si ritirano, allorchè rendesi inabitabile il pian terreno; e quei dati fumi, che hanno assai ampia area, e picciola corrente d'acque, non sono d'ordinario soggetti a grandi alzate, e rigonfiamenti di piena. Vegg. gli *Memoires Acad. Roy. Par. ann. 1732*.

La grandezza della camera, o casamento è sempre egregiamente bene proporzionata al numero della famiglia, per la quale è il casamento medesimo destinato: la quale sia soltanto per sette, od otto di questi animali, il casamento è della grandezza di due piedi quadrati, e con elastissima proporzione sarà fabbricato maggiore, se maggiore sarà il numero di questi abitanti. Allorchè questi animali hanno disegnato, per così esprimerci, il piano di loro abitazione, vi piantano intorno intorno una porzione di giunchi, i quali giunchi fortificano all'intorno e per ogni verso in una maniera in estremo artificiosa con della creta, comprimendogli all'ingù colle loro zampe, e lavorando anche colla loro coda, la quale è somigliantissima a quella del *Castoreo*, e serve loro, non altrimenti, che al muratore la cazzuola. Hanno essi un varco, o passaggio fuori della loro caletta, il quale lasciano aperto per tutto quel tratto di tempo, che la stagione corre dolce, e temperata; ma allorchè questa falsi in estremo rigida, euoprono questo divisato passaggio, e tutta l'abitazione dopo rimane bene spesso coperta, e sepolta nella neve all'altezza di parecchi piedi: in questo caso essi mantengono dentro il loro recinto, ed hannovi dei pozzi, che somministran loro l'acqua necessaria: hanno somigliantemente delle altre buche, o fosse, che ad altro non servono, se non se a ricevere i loro escrementi; e vanno tuttora forando, e loicando il terreno sotto sotto al fiume per rinvenire le radici dei loro sopraditate per cibarsene.

In questa stagione se trovassimo impediti in qualche modo dal procurarsi il cibo, hanno però, e godono il vantaggio d'essere al coperto degli assalti dei cacciatori: ma allorchè le nevi si sciogliono, e che i
lor

loc calamitanti vengono scoperti, lo che d'ordinario suole avvenire nel mese di Marzo, o d'Aprile, vengono dai cacciatori agevolmente rintracciati, e ne vien fatta gran preda: ma in evento, che questa stagione sialene sbruciolata, grandissimo numero di essi la campa; avegnachè subito dopo questa stagione medesima lo scioglimento delle nevi cagioni delle grosse inondazioni, la qual cosa non avviene in altri tempi, e quella gli spigne fuori delle loro abitazioni da verno in regioni, e paesi più eminenti, e più rilevati. In questo tempo l'animale non vive in società, ma vassi solo vagabondando per la propagazione della propria specie: questa però è una scena similmente perigliosa ad uno dei loro sessi, conciossiachè i cacciatori facciansi ad imitare il fischio, o la voce della femmina, e così veggionli comparire in brev'ora attorno un buon numero di maschi, i quali incontente che sieno giunti entro l'agguato, rimangono chiusi, e divengono preda del cacciatore. Passato che sia il tempo dell'accoppiarsi per la propagazione di questi animali, e che le acque hanno abbassata la testa, le femmine tornansi ai loro antichi abitati, ed ivi sgravansi de' loro figliuolletti, e gli nutrono: i maschi per lo contrario scorrono qua, e là per la campagna fino, che s'avvicini l'invernata, ed allora ritransi di pari in vicinanza delle acque per la lor vita d'Inverno: ma questi loghono per lo più fabbricarsi de' nuovi alloggiamenti cadauna stagione. Veggansi *Memoires Acad. Roy. Paris*, ann. 1732.

MUSCHIO Seme. Nella Materia Medica è questo il nome della pianta detta dagli Autori *Alcea Aeg. piata villosa*, o sia *Malva verberna* Egiziana pelosa. E' questo un picciolissimo seme della grossezza a un di presso di un capo di spillo d'un color grigio bruniccio, della figura di un'arnione, e quando è fresco spira una fragranza di muschio, o profumo. Vien trasportato in Europa dall'Egitto, e dalla Martinica. Servonsene gli Egiziani per bocca non altrimenti che d'un cordiale, ed un medicament'ò provocante: ma in Europa egli è di picciolissimo uso, e presso noi altri Inglese non ne facciamo nella medicina il menomo conto. I profumieri Franzesi però non meno, che gl'Italiani, costumano di porlo nelle loro Composizioni. Veggasi *Lamry*, *Dizion. delle Droghe*.

MUSCOLO. Il sapientissimo Medico, e sovrano Anatomico Monsieur Winslow, nel suo Trattato sopra i Muscoli, nella sua Eliposizione Anatomica del Corpo umano, mostra delle prodigiose varietà nelle azioni di questi organi di moto, delle quali non sene avea appena sentore per innanzi.

Il Dottor Waltherus dopo d'aver comparato i muscoli del corpo umano colle descrizioni de' medesimi pubblicate da parecchi Autori, e massimamente da Monsieur Winslow, ha fatto molte accuratissime osservazioni sopr'essi, che servir possono a buona equità come un Supplemento affai adeguato alla sua *Anatome teneuriorum Musculorum repetita*. Nov. Act. Eruditorum, Giugno 1733.

I muscoli nei pesci non sono piantati, siccome s'elprimono gli Autori, *cancelatim*, oppure l'uno sopra l'altro in una direzione scorrente per lo lungo; ma sono generalmente stesi, collocati e piantati, o trasversalmente, oppure alcun poco obliquamente l'uno dietro l'altro, dalla parte anteriore del corpo all'origine della coda. Somigliante struttura più che in altri vien ravvisata nei pesci spinosi.

Questi muscoli dei pesci spinosi esser possono acconciamente e comodamente divisi secondo la loro situazione, in dorsale, in pettorale, ed in neutro, o neutrale. Dopo di questi i muscoli inferiori di questa parte del corpo, che trovasi in vicinanza della coda, hanno il loro luogo; ed ultimamente i cefalici, o sieno quelli delle parti intorno alla testa.

I muscoli dorsali hanno un' interstizio appunto nel mezzo della lunghezza del dorso, oppure sono separati per lo lungo l'uno dall'altro, e vengono ad esser terminati nei lati al di sopra di contro la spina del dorso. I muscoli pettorale, e ventrale, prendono la loro origine dalla base delle costole, e vengono ad incontrarsi nel mezzo del petto, e della pancia. I muscoli delle parti inferiori del corpo, sorgono lungo la spina dorsale, e vengono ad incontrare l'uno l'altro nel fondo della pancia. I muscoli cefalici servono per i movimenti degli occhi non meno, che delle mascelle, e sono principalmente quattro. I due primi addimandansi muscoli Ipofissari, e gli altri due i muscoli massillari. Sono questi molto appariscati nel pesce gadi, ed in somiglianti. **Mu-**

MUSCOLI dei vegetabili. I muscoli, che trovansi nei corpi degli animali, stati sono il soggetto di numerosissime Dissertazioni; ma quegli, che si trovano nei vegetabili sono stati universalmente meno considerati. Monsieur Tournesfort però ha provato con ogni maggiore evidenza, che parecchi dei vasi delle piante divengono in seccandosi fibre capaci di tensione: che in molte piante hannovi serie numerosissime di queste fibre, le quali hanno tutte la medesima direzione, e sempre e costantemente agiscono tutte insieme, e di conserva, e che possono accorciarsi, o contrarsi soltanto in una data particolare direzione: quindi è, che le parti composte di queste fibre vengono ad essere con infinita proprietà paragonate ai muscoli degli animali.

Per la voce muscolo, altro, a vero dire, noi non intendiamo, che una parte composta di fibre, così determinatamente piantate, collocate e disposte, che per la loro contrazione muover possano la parte soltanto in una maniera certa e determinata; ed in questo senso, che sembra veramente il significato ricevuto della voce muscolo, hannovi parecchi esempi, de' quali può altri servirsene per esprimere le parti delle piante con tutta la maggior proprietà, e giustezza.

Tutti i gusci, teche, o baccelli delle piante leguminose, come dei piselli, e somiglianti, sono composti, niuno eccettuat, di due incamicciature, o tuniche, più o meno convesse nel lato esteriore: queste sono piantate ugualissimamente l'una sopra l'altra, sicchè a capello combaggiano insieme, e questa attaccatura viene effettuata per mezzo d'un numero grande di finissimi vasi: si vengono ad essere attaccati molto unitamente nel dorso, di quello stesso vicino alle spaccature, o commettiture; ed i grossi vasi, da i quali vien condotto il nutrimento non meno alle tuniche, che ai semi, trovansi vasi stanziali, e quindi mandano parecchie ramificazioni all'una, ed all'altra delle tuniche, o g. sci del baccello.

Cadauna tunica, o guscio è formato di due ordini di fibre: l'esteriore disposizione, o serie, od ordine è formato non altrimenti che una specie di rete, e le fila, ond'essa è composta, scappan fuori dal dorso del baccello, e sono propagate

per lo lungo, ed alcun poco obliquamente per la superficie delle tuniche, o gusci, e vanno finalmente a terminare all'affilatura, o commettitura esterna del baccello medesimo, dopo essersi internate nella porzione carnola col complesso dei vasi somigliante ad una rete, di cui essi formano frequenti anastomosi.

Il piano interiore, o dir lo vogliamo serie, e disposizione delle fibre, incrociachiano l'esteriore in quella guisa medesima medesimissima, che i muscoli interiori incrociati nel corpo umano incrociachiano gli esteriori: e questi formano la membrana interiore del baccello. Queste fibre, non altrimenti che le altre, sorgono, ed alzansi dal dorso del baccello, e scorrono obliquamente verso l'affilatura, o commettitura esteriore del medesimo.

Una conseguenza necessaria della divisa struttura si è, che la posizione, od ordine delle fibre esteriori forza è, che asciughi, e si secchi prima delle altre, come anche forza è similitermente, che eissegua della sostanza carnola, in cui queste fibre si trovano situate; e la conseguenza di questo fatto si è, che di mera necessità esse contraggansi, e che tirino l'affilatura della tunica, o guscio, al quale esse appartengono in un tempo medesimo all'insù, ed all'infuori, e che tentino di separarsi, e di disgiugnersi dall'affilatura, o margine dell'altra tunica, tirando via seco la disposizione, o serie interiore di esse fibre: quella faccenda pertanto forza il baccello ad aprirsi, e l'aria, la quale è sommamente calda in quella stagione, in cui i semi di queste piante trovansi nel punto di loro maturezza, introducendosi per entro gl'interstizj della serie, od ordine interno delle fibre, le quali sono esposte alla medesima per l'apertura seguita del baccello, agisce incontanente sopra esse, sicchè queste di pari cominciano ad accorciarsi, e contrarsi. Erano queste fibre un tempo i vasi, per i quali venivano condotti i sughi nutritivi ai baccelli, ed ai semi; ma allorchè un'uso somigliante non è altrimenti per i medesimi necessario, e non ascendono più sughi, poichè i semi sono oggimai giunti alla grossezza loro naturale adeguata, allora aggrinzansi, e si contraggono, nè fanno altrimenti l'ufficio di vasi, ma divengono mere fibre. Suv-

come

come poi queste non asciugansi , nè seccansi tutte insieme in una volta , ma ciò segue necessariamente prima in quelle , che trovansi situate in una distanza maggiore dal gambo , così per conseguenza quelle sono le prime delle fibre interiori ad agire coll'accorciarsi , e diminuirsi . Questa faccenda pertanto comincia nell'estremità , o veta del baccello , e quindi successivamente viene ad essere continuata fino al gambo , o picciolo del baccello medesimo ; e l'effetto si è , che siccome queste fibre interiori sono più gagliarde , ed in numero maggiore delle fibre esteriori , le quali trovansi in questo tempo così accorciate , e sarratte , come , e quanto lo sono capaci , ed esser lo possono , così queste tirano allora all' indietro , ed all' indentro le fibre dell'affilatura , o margine del baccello verso il dorso del medesimo . Allorchè l'aria calda agisce sopra queste fibre per seccare , e per accorciare le medesime , il ritiramento , od accorciamento segue a un di presso ugualmente nell'una , e nell'altra di loro estremità ; e perciò se i due ordini , o disposizioni di fibre si trovassero regolarmente attraversantisi l'uno l'altro , cadauna tunica , o gufcio del baccello converrebbe , che fosse da azione fimgliante di necessità tirato , e contratto in una specie di tubo , o cannello ; ma siccome quelli ordini medesimi di fibre trovansi piantati in una direzione obliqua , e paralleli l'uno all'altro , così forz'è , che l'effetto naturale di loro contrazione sia il forzar la tunica , o gufcio in guisa , che vengano a formare una spira , siccome noi veggiamo appunto accadere esattamente . Le linee formanti la spaccatura di caduna gufcio non possono far resta , nè resistere a somigliante contrazione , avvegnachè esse sieno così riarse , e seccate dall'aria calda , e così vuote , e scovre di fugh , che se vengano stritolate fra le dita se ne vano agevolissimamente in polvere , e vanno in pezzi minutissimi col più leggiero urto , che venga lor fatto . Siffatta Classe di piante ci somministra esempi numerosissimi di questa specie di muscoli de' vegetabili , e sono questi più ovvi , e rilevati , ed appariscenti in esse , che in qualsivoglia altra pianta . L'ingegnossimo Autore del presente sistema ci dà parecchi altri evidentissimi esempi os-

servati sopra altre piante eziandio . Veggansi Memoir. Acad. Roy. Paris. ann. 1693.

MUSCULUS . Musculi Capitis accessorii . E' stato alcuna fiata rinvenuto un picciol muscolo affisso da un'estremità del medesimo all'estremità della prima apofisi trasversale del collo in vicinanza delle inserzioni dei due obliqui , donde scorrendo , e portandosi obliquamente , vien poscia di bel nuovo a rimanersi incastrato , ed inserito dietro all'apofisi mastoide . Vien comunemente immaginato , che questo muscolo sia un terzo picciolo trasversale in quel dato lato , nel quale vien trovato ; ma anzi amiamo meglio di credere , questo esser piuttosto un muscolo addizionale al muscolo superiore obliquo . I muscoli retri , e gli altri obliqui , trovansi di pari alcuna volta doppi , o raddoppiati ; quindi è , che la seconda opinione sembrar debba a buona equità la più adeguata . Veggasi Winslow , Anatomia , pag. 238 .

MUSCULUS fascia lata . E' quello un picciolo , ma lunghissimo muscolo piantato , e situato alcun poco obliquamente all'insù ed all'inghi sopra la parte anteriore , o nel dinanzi dell'anca . E' quello affisso sopra il lato esteriore dell'anteriore spina superiore dell'osso ilio fra le inserzioni del gluteo medio , e del sartorio . Quindi le sue fibre carnose scorrono , e portansi all'inghi pigrantisi alcun poco obliquamente all'indietro , e vengono a formare un corpo estremamente piatto lungn quelle buone quattro dita , e due dita largo . Questo corpo diae , ed è situato fra le due lamelle della fascia lata , e viene ad essere quivi entro incastrato per mezzo di cortissime fibre tendinose , le quali dileguansi , e scompaiono in quel dato sito , ove la fascia rimane attaccata al trocantero grande , ed al tendine del gluteo massimo . Adunque la fascia non dovrà essere in verun conto considerata come un'espansione tendinosa di questo muscolo . Veggasi Winslow , Anatomia , pag. 221 .

MUSCULUS Latius . Nell'anatomia è così denominato dal Riolo , e da altri Anatomici un muscolo , che all'Albino piacque dinotare coll'espressione *Musculus latissimus colli* , e da altri *Platysma Myoides* , e *Quadratus gena* . Siccome una porzione di questo muscolo vien su , ed ascende , o deriva dalla guancia , così venne anche denominato dal Santorini *Musculus risorius novus* . Veggasi l'Articolo **QUADRATUS** .

Com questa voce *Musculus* viene similmente da alcuni significata quella specie di comune muscolo marino, appellato da altri con maggior proprietà, e più acconciamente *Mytilus*. Veggasi l'Articolo MYTULUS.

MUSCULUS muscatus. Nell' Istologia è questa una denominazione data dal Gesnero non meno, che da alcuni altri Scrittori alla Balena comune, o sia *Balæna Edentula* degli Aurore. Questa dal famoso Artedi vien distinta da tutti gli altri pesci cetacei, col nome di balena avente una specie di zampogna nel mezzo della testa, ed avente la schiena verso la coda rilevata, ed aguzza. Veggasi l'Articolo BALÆNA.

MUSCULUS, finalmente, era presso i Romani una macchina militare sotto la quale difesi, e coperti i soldati appressavansi, e facevano delle mine alle mura delle piazze assediare, oppure riempivano i fossi, che le circondavano. Veggasi *Pitiscus*, *Lexicon Antiq.* in voce *Musculus*.

MUSICA. La voce Musica presso i buoni Antichi veniva presa in un significato molto più esteso di quello prendamla i moderni. Dal Meibomio, (a) che presela da Porfirio, vengono noverate le sue parti per mezzo dei nomi *Armonica*, *Ritmica*, *Metrica*, *Organica*, *Poetica*, ed *Ipoetica*.

L'Alipio (b) similmente, ed il Vossio (c) fanno, che l'armonica, la ritmica, e la metrica sieno altrettante parti della musica. Aristosseno (d) poi v'aggiugne l'Organica. Il Vossio medesimo alle tre specie della musica pratica, armonica, cioè, organica, ed idraulica, v'aggiugne una quarta, cioè l'orchestria, o sia Danzante. Aristide Quintiliano definisce la musica la cognizione di ciò, che è grazioso, ed avvenente nei suoni, e nei moti. (e). Quello che da noi vien detto scienza musicale, gli Antichi amarono meglio appellare musica *Armonica*.

(a) *In Notis ad Euclidem Tetractis Music.* p. 41. (b) p. 1. Edit. Meibom. (c) *De scient. Mathem.* c. XXII. (d) *Περὶ ᾠῆς ἑρμῆος* in *opusc. p. 170.* (e) Veggasi *Wallis Appendix ad Ptolemai Harmoniam.* p. 153. Veggasi l'Articolo ARMONICA.

MUSICA Chromatica. Servonsi gl'Italiani di questa espressione per significare quella specie di musica, in cui hannovi parecchi segni aromatici, come piani, ad acuti, ed

Suppl. Tomo III.

intervalli, e somiglianti. Vegg. l'Articolo CROMATICO.

MUSICA Diatonica. Vegg. l'Art. DIATONICO.

MUSICA Didactica. E' questa quella parte di musica speculativa, dalla quale vien soltanto considerata la quantità, le proporzioni, e le qualità differenti dei suoni.

MUSICA dramatica, *scenica*, *Teatrale*. Tutte queste espressioni vengono usate dai prodi Italiani per dinotare quelle tali composizioni di musica, le quali sono particolarmente fatte, ed adattate al teatro. Vegg. l'Art. RECITATIVO.

MUSICA Enarmonica. Vegg. l'Art. ENARMONICO.

MUSICA Enunciative od *Enarrativa*. Vien presa questa per la cosa medesima, e nello stesso senso, che prendesi l'espressione *musica signatoria*. Vegg. l'Art. MUSICA signatoria, qui appresso.

MUSICA figurata, *figurale*, o *colorata*. La musica figurata, figurale, ec. è quella in cui le note sono di valore differente, e di moti o movimenti vari, ora lenti, ora vivaci, e somiglianti.

MUSICA Armonica. Presso gl'Italiani vien usata questa espressione per significare alcuni pezzi di musica, consistenti di parecchie parti, le quali, tutechè sieno in fra sè totalmente differenti, allorchè vengono suonate, o cantate, ed eseguite tutte insieme, compongono un soavissimo e gustosissimo tutto. Questa da noi altri Inglese addimandasi *Musica in Parti*.

MUSICA Iporchematica. L'espressione di musica Iporchematica, ovvero choralica, viene usata da alcuni Autori di queste materie per una specie particolare di musica acconcia, ed adattata per i Balli ec.

MUSICA Istrumentale. Usasi questa espressione per dinotare quei Componimenti musicali fatti per esser soltanto eseguiti dagli Istrumenti, come sinfonie, e somiglianti.

MUSICA melismatica, ovvero *Melodica*. Servonsi di questa appellazione per dinotare un suono, od una sola, e semplice parte composta unicamente, o per una voce, o per un Istrumento. Vegg. *Bressard*. Vegg. di pari gli Articolo MELODIA, ec.

MUSICA Melispoetica. E' questa la scienza, o per più adeguatamente esprimerci, l'arte d'ordinare, e di disporre i suoni in concorde susseguenza in una maniera, che dia

Ooo

pta-

piacere: oppure, che è lo stesso, l'arte di comporre la Melodia. Vegg. gli Articoli *MELODIA*, e *MELOPOEJA*. (Ciclopedia.)

MUSICA misurata. Presso gli Autori Italiani è questa una specie di musica, le note della quale sono disuguali. Questa è contraria a quella musica, che addimandasi musica piena, o musica corale.

MUSICA Metabolica. Quella presso gl' Italiani importa veramente, e propriamente la musica trasportata, come quando la composizione vien fuori del suo natural tono, o modo, e passa in altro trasportato, affine di meglio esprimere le voci, oppure per rilevare, e per distinguere alcun cambiamento nell'azione, nella passione, nel movimento, e somiglianti.

MUSICA metrica. Servonfi gli Autori Italiani per dinotare per somigliante espressione le cadenze della voce armonica, udite, allorchè alcuno declina, o recita dei versi; oppure un' arietta composta in versi.

MUSICA moderna. Vegg. l'Art. MODERNO.

MUSICA modulatoria. Importa questa presso degl' Italiani, quella parte della musica, che insegna, od addestra altrui a comporre, od a modulare, vale a dire, che fissa, e stabilisce le Regole per l'uso dei modi, o toni, e che ammaestra, od a ben cantare, ed a ben suonare. Vegg. gli Art. *MOD.* e *MODULAZIONE*. (Ciclopedia)

MUSICA Odica. Suona presso gl' Italiani lo stesso, che musica iporchematica, o ochorica. Vegg. qui sopra.

MUSICA Organica. Usano gl' Italiani questa acconciissima espressione per significare della composizioni di musica, che son destinate per essere eseguite soltanto dagli Istrumenti di quest' arte.

MUSICA Patetica. Ella è questa una musica muovente, e toccante l'anima, la quale cagiona, e produce nella medesima dei movimenti, o d'amore, o di tristezza, o di compassione.

MUSICA poetica. E' questa alcuna finta usata per esprimere l'arte d'inventare dei suoni, e di modulare voci concordi, e discordi insieme con diletto e piacere di chi ode, e di far ciò, che da noi addimandasi Composizione, e somiglianti.

MUSICA recitativa, scenica, o d'ammantica. E' questa una specie di musica praticata nelle Opere teatrali, e somiglianti, irregolare in rapporto al tempo, altro in

solanza non essendo, che un declamare cantando per viemaggiormente esprimere le passioni. Dall'esser questa Musica così nel suo tempo irregolare, assai sovente gl' Italiani scrivono, o segnano tempo giusto allorchè termina il Recitativo, e ne seguita un'aria, una cavata, o cantata somigliante, e ciò per mostrare, che allora dee essere rigorosamente e strettamente osservato il tempo.

MUSICA Ritmica. Ci serviamo di questa frase per esprimere l'armonia, o dir la vogliamo la cadenza delle voci in prosa; oppure un suono composto per le voci in prosa. Vegg. *Brossard*.

MUSICA Scenica. Importa lo stesso, che musica recitativa. Vegg. qui innanzi.

MUSICA Signatoria. Viene usata fatta espressione per dinotare quella parte della musica, che ammaestra, e dà la cognizione dei caratteri, delle note, delle figure, delle pause, e di tutti gli altri segni, e cifre, quali esser si vogliono, che vengono praticate nella musica.

MUSICA Vocale. Intendesi quella tal data composizione, o pezzo di Musica composta per la voce, in opposizione alla musica organica, o dire la vogliamo istrumentale, che è destinata, per esser soltanto eseguita, e suonata dagli Istrumenti.

MUSICALE, Numeri Musicali. I numeri musicali sono 2, 3, e 5, insieme con i loro numeri composti. Vengono questi così denominati, perchè ogni, e qualunque intervallo di musica esser può espresso per mezzo di numeri somiglianti. Veggasi l'Articolo *INTERVALLO*.

Questo di presente viene generalmente ammesso, e conceduto dai Musici Teoretici (a). Sembra, che Monsieur Euler supponga, che potrebbe essere eziandio introdotto il 7, oppure altre prime; ma egli ragiona di questa faccenda non altramente che di una materia dubbiosa, e difficilissima. (b)

Dee essere osservato, come il 2 corrisponde all'Ottava, il 3, alla Quinta, o piuttosto alla Duodecima, ed il 5, alla Terza maggiore o piuttosto alla Decimalessima (c). Da questi esser possono rinvenuti gl'altri intervalli tutti. (d)

(a) Vegg. Euler, *Tentam. Nov. Theor. Music.* pag. 62. e 63. Veggasi di pari il *Doutor Pappus*, nelle nostre *Transf. Philos.* n. 481. pag.

267. (b) *Eu'er*, *ibidem*, pag. 163.
(c) *Transfuz.* *Filofof* *ibid.* (d) *Legganfi*
Euler, *or* *Pepulch*, *loc. cit.*

MYTULUS. Così addimandasi dai Naturalisti un genere di pesce testaceo, i caratteri del quale sono gli appresso:

E' questa una specie d'oltrica bivalva, o da' due gusci, o nicchi, di una forma bislunga, terminante in una punta, ed avente le sue due estremità uguali: Questo Testaceo alcuna fiata è liscio, alcun'altra poi è ruvido. In alcune specie egli è piatto, in altre rialzato, ed in altre ha la bocca prominente. La Tellina di mare non meno, che la *Pinna marina*, di cadauno dei quali pesci hannovi parecchie specie, sono propriamente del genere del *Mytulus*, o *Mulcolo*.

Le tre diversissime voci di *Mytulus*, *Musculus*, e *Tellina*, possono nulladimeno servire al Naturalista di grandissimo uso nelle suddivisioni del genere diviso in certe date serie.

In questo senso adunque la voce *Mytulus* può esprimere tutti i mulcoli grossi, quale appunto si è quel Testaceo appellato *Pinna Marina*, ed altri *Muscoli*, i quali sono assai considerabilmente elevati o rialzati nella loro configurazione, ed hanno delle bocche puntute, od aguzzate.

La voce *musculus* poi esser può usata per significare quei tali mulcoli, i quali sono più piccioli, e più piatti: e finalmente la voce *Tellina* per esprimere, siccome generalmente, o per lo più fanno gli Autori, un Testaceo, o conchiglia bivalva della specie del mulcolo; ma assai più sottile, e più tenera, e di una figura bislunga, ma non terminante in una punta.

Il cardine di questi Testacei non è nel centro del nicchio, ma verso una delle sue estremità, e questi hanno comunemente in quella data parte una specie di picciolo becco.

Le Telline rimangono attaccate ai loro gusci, o nicchi, per mezzo di due legamenti, dove per lo contrario i mulcoli rimangono uniti per un ligamento solo.

La specie più grossa del *Mytulus*, che a noi sia nota, si è la *Pinna Marina*: del qual Testaceo noi ne abbiamo tre specie, una più grossa delle altre due, che dentro è rossa. Questa Conchiglia, o *Mulcolo* assai spesso produce, e genera delle perle, ma queste sono a un di presso del medesi-

mo colore rossiccio dell'interna incamiciatura del mulcolo medesimo. Noi abbiamo trovato dei Testacei di questa specie così grossi, che i due gusci, o nicchi dei medesimi son giunti a pesare quelle buone quindici libbre. La *Pinna* picciola, e la *Pinna* ruvida *Echinata* hanno i loro gusci, o nicchi più faticci, e più grossi vicino all'orlo, o contorno, ove apronsi, di quello abbianli nel loro ordine. Hanno queste *Pinne* marine una specie di filamenti usciti dal corpo del pesce; ed attaccantisi alle pietre, oppure ad altre sostanze, quali essersi vogliano. Queste fila dagli Antichi addimandavansi *Bysus*, e venivano lavorate, e fattine de' guanti, ed altre comodità e manifatture di questa specie, ed in alcuni luoghi, come a cagion d'empio in Taranto, in Brindisi, e per altri Paesi di quella Italiana Marina fassene anche a' di nostri l'uso medesimo. I mulcoli comuni posseggono la proprietà medesima di produrre, e formare queste fila; e da questa medesima proprietà il Listero addimandolli non senza dicevolezza *Conche seifera*. La fetta di questi mulcoli comuni è di lunga mano inferiore a quella della *Pinna Marina*, se si consideri la sfozza non meno, che la bellezza. I mulcoli sostentansi nei luoghi medesimi similantemente per mezzo delle loro fila. La *Pinna Marina* caccia la sua aguzza estremità entro la melma, o sabbione, e tutte il rimanente del corpo della conchiglia rimanenti in libertà d'aprirsi nell'acqua. I suoi filamenti, i quali vengono ad essere propagati dal mezzo del suo corpo, servono a tirare intorno a sé la melma, od il sabbione, in evento che accaggia di difendersi dal moto dell'acqua nelle marine tempeste.

Le specie dei mulcoli di presente conosciute, sono le appresso: Della specie piatta, o compressa, che in una delle sue estremità termina in un'acuta punta noi ne abbiamo le seguenti, cioè. 1. *Mulcolo* Magellanico grande scannellato. 2. *Mulcolo* Magellanico minore scannellato. 3. *Mulcolo* magellanico minore variamente macchiato. 4. *Mulcolo* liscio. 5. *Mulcolo* gola di topo. 6. *Mulcolo* Dattero. 7. *Mulcolo* grosso ruvido. Questo vien comunemente trovato tutto coperto di balani, o nicchi centro. 8. *Mulcolo* ruvido minore. Questo vien trovato bene spesso coperto di vermi marini. 9. *Mulcolo* azzurro scannellato in

vicinanza del fondo: E' questo un Testaceo in estremo raro. 10. Muscolo color di rosa variamente macchiato. 11. Muscolo bigio scannellato. 12. Muscolo grande della nuova Terra. 13. Muscolo grande del Canada.

Di quelli poi comunemente conosciuti nei Musei sotto la Denominazione di Pinne Martine, noi abbiamo i seguenti:

1. Pinna grande comune macchiata in varie sogge di grigio e di rosso. 2. Pinna marina minore bianchiccia guernita d'aculeo. 3. Pinna marina picciola guernita d'aculeo rossiccia. 4. Pinna marina della forma di un precintuo, appellata comunemente Pinna garetto, Pinna precintuo. 5. Pinna più grossa filante, appellata Pinna setacea, a motivo della cupia abbondevole di seta, che ella fila. 6. Pinna marina minore denominata dal Rondelezio Pinna Tridacna. 7. *Pinnophila*, *Pinnophylax*. E' questa una grossa specie di Pinna marina così denominata dal Rumfo, dall'etimologia ch'ella fa bene spesso abitazione ad un picciol granchio. 8. Pinna marina becco d'anatra.

Di quei mytili poi, che sono di una figura più rialzata, ed equilatera, noi abbiamo i seguenti:

1. Muscolo tenetro bianco. Questo poichè sia ridotto a pulimento, conservasi nelle raccolte, o Musei dei curiosi sotto il nome di nicchio, o conchiglia argentina. 2. Muscolo Folace nero. 3. Muscolo Folace giallo. 4. Muscolo leggiere, e sottile aperto per ogni, e qualunque verso, ed in cadauna parte, con un tronco. 5. Muscolo meno aperto con un tronco. 6. Muscolo di colore bujo oscuro, proveniente dall' Isola di Paso. Questa conchiglia, allorchè ne è stata tolta via la superficie ed incamiciatura prima esteriore, fa una vaghissima mostra, e vien denaro trovato tutto diversificato, ed ornato di bande, o fasce brune, e paonazzette, ed in questo stato è uno dei più belli, ed appariscenti nicchi, che si veggiano. Veggasi la Tavola dei nicchi, n. 19. Delle rel-line, le quali sono bislunghe, ed hanno i gusci, o nicchi piatti con estremità uguali, noi ne abbiamo le seguenti specie: 1. Tellina di color di viola mammola. 2. Tellina violacea con quattro zone, o fasce bianche. 3. Tellina liscia, vaghi-ssimamente distinta, e diversificata con zone

o fasce rosse pallide, e bianche. 4. Tellina pelosa, o capelluta del Mare Mediterraneo. 5. Tellina pelosa, o capelluta più grossa dell' Oceano. 6. Tellina del Canada. 7. Tellina delle Isole Azoridi. 8. Tellina grande del nuovo mondo. 9. Tellina picciola del Canada. 10. Tellina di San Savignano. Quest' ultima Tellina in contrasti con molta frequenza tidora a pulimento nelle nostre Raccolte, o Musei di cose naturali, ed in tale stato comparisce vaghi-ssimamente distinta, e diversificata di color di rosa, e di un color bianco argenteo. Sono queste tutte le Telline finora note, aventi estremità uguali.

Di quelle poi, che hanno le loro due estremità dissimili, e disuguali, noi ne abbiamo le appresso specie: 1. Tellina rostrata rossiccia, somigliantissima alle forbici di un Cerusico. 2. Tellina forbiciata giallognola. 3. Tellina della forma di un coltello. 4. Tellina dal becco, o rostro lungo. 5. Tellina ruvida, appellata Tellina lingua di gatto. 6. Tellina color di rosa fasciata, e raggiata. 7. Tellina color di arancia raddoppiata in uno de' suoi lati, e dentata nell' orlo. 8. Tellina foglia. Questa Conchiglia assomiglia grandemente ad una foglia di un albero. 9. Tellina bianca granellosa. 10. Tellina rossiccia trasversalmente scannellata. 11. Tellina piatta, e troncata. 12. Tellina del color della viola mammola con apice scannellato. 13. Tellina giallognola con apice scannellata. 14. Tellina rossiccia. E' questo un vaghi-ssimo nicchio, tutto che poco diversificato. Veggasi Histoire naturelle Elaircie, pag. 326.

Il muscolo marino comune, dall'esser sempre mai trovato attaccato agli scogli, è stato da parecchi supposto interamente incapace di movimento progressivo; ma questa è un' opinione manifestamente erronea. Egli si è un' uolo comunissimo in Francia in quelle date stagioni dell' anno, le quali non danno tanto Sole, che basti per fare il sale, l' andare in cerca de' comuni muscoli marini, che dai pescatori vengono trovati intorno alle coste, entro le buche della brina, com' essi dicono. Coloro portano opinione, che quelle fosse di acqua rendano le loro carni più tenere, o più delicate, siccome l' acqua, che vien giù dal Cielo in quelle date stagioni.

onde le fosse medesime molto meno salate di quello facciasi la comune acqua del mare. In questa siffatta occasione i muscoli vengano quivi entro gittati dai pescatori alla rinfusa, e senza cura in varie parti qua, e là della fossa da sale: nulladimeno però, quali sienosi state mai le distanze nelle quali coloro ve gli hanno dapprima gittati dentro, ogni, e qualunque volta, che i pescatori medesimi portansi alla fossa per trarne fuori, sempre, e costantemente trovanveli tutti insieme in un luogo medesimo ammucchiati; e siccome in queste date fosse da sale non havvi la menomissima corrente di acqua, nè altra, qualunque immaginar si possa, facoltà di moto, la quale possa aver ridotti i muscoli, dapprima qua, e là sparpinati, insieme; così ella sembra cosa più che evidente, che di necessità i muscoli, o myrtili medesimi volontariamente, e di per sé abbiano fatto viaggio, e così sienosi di conserva portati, ove son trovati ammucchiati in una sola massa. Questo movimento progressivo viene ad essere totalmente, e pienamente effettuato per mezzo di quella tal cosa, ed organo, cui noi addimandiamo la lingua del muscolo, dalla sua configurazione; ma dal suo uso in siffatto calo egli apparisce che se le addica anzi la denominazione di zampa, o di braccio, come quello che gli sorregge da qualsivoglia distinta sostanza, e quindi contraendo vivacissimamente se stesso di nuovo, lo tira lungo tutto il corpo del pesce: la parte medesima, poichè ha mosso l'animale ad un'alcun loco, serve di pari per fissarvelo, essendo l'organo, pel quale il muscolo compone, o fissa i suoi filamenti, che da noi, siccome anche da altre Nazioni, addimandasi la sua barba, dalla quale vien tenuto, e conservato assiso allo scoglio, oppure ad un'altro muscolo. Il movimento del muscolo per mezzo della divisa parte, è a capello il medesimo, che quello di un'uomo stesso piatto sopra la sua pancia, e che vorrebbe trarsi, e scagliarsi per lo lungo col tenere afferrata alcuna cosa colla mano, e poscia scagliandosi alla medesima. Veggansi *Memoirs Acad. Roy. Scienc. Paris. ann. 1701.*

E' cosa ottimamente conosciuta, che i muscoli hanno la forza, e facoltà di attaccarsi stabilissimamente, e fortissimamen-

te od alle pietre, o scogli, oppure ad altri muscoli in una maniera grandemente gagliarda; ma il come essi si effettuino, ed eleguiscano questa faccenda, non arrivasi a ben intendere, o per meglio esprimerci, non venne mai bene inteso, se non se dopo le Osservazioni in estremo accurate del tanto benemerito delle cose naturali *Monsieur Resaumur*, il quale ce lo appiandì egregiamente. Veggansene *Memoirs Acad. Roy. Scienc. Paris.*

Chicchessia, il quale apra, e facciasi ad esaminare un muscolo comune, troverà, che nel mezzo di questo pesce trovasi piantato un picciol corpo nericio, o brunoastro, che nella sua forma assomiglia ad una lingua. Questo corpicciolo nei muscoli assai grossi è della lunghezza a un di presso di mezzo dito, e della larghezza poco più della metà della parte di un dito, ed è più stretto nella sua origine, o dove trovasi radicato, di quello sia nella sua estremità. Dalla radice di questa specie di lingua, o sia quella parte della medesima, che trovasi aderente al corpo del pesce, vengonsi a produrre serie, o congerie grandi di fila, le quali, allorchè trovanfi attaccate ad alcuna sostanza solida, mantengono il pesce fermo, ed immobile, quasi fissi nel suo luogo. Queste fila sogliono di ordinario essere lunghe da un dito alle due dita, e della grossezza di una delle setole più sottili di un majale. Queste fila scappan fuori del Testaceo in quella parte ove naturalmente è aperto, ed attaccansi ad ogni, e qualunque sostanza parisi loro dinanzi, come a cagion di esempio, alle pietre, a frammenti di nicchi, o conchiglie, oppure, lo che accade comunissimamente, ai gusci, o nicchi di altri muscoli; e quindi è appunto, che assai frequentemente vengono trovati dei muschi di muscoli attaccati insieme. Queste fila vanno spandendosi, e diffondendosi per ogni, e qualunque verso, e sono comunemente numerosissime, avvegnachè è stato trovato uscirne fuori da un solo di questi Testacci per fino cento cinquanta. Fanno queste fila egregiamente bene l'ufficio di altrettanti canapi, o gomme, e cadauna di esse esercitando la propria tensione nella sua adeguata direzione vengono tutte insieme a conservare, ed a mantenere il mitolo assiso contro a qualsivoglia forza, che se gli possa presentare, da ogni, e qua-

e qualunque parte quella si venga. I filamenti sono ottimamente noti a tutti coloro, che si cibano di questi muscoli, i quali con somma diligenza gli disgiungono da essi, e gli chiamano la loro barba: ed è stato rinvenuto dal prede Monsieur Reaumur, che mentre l'animale trovavasi vivente nel mare, e questi filamenti vengono tutti troncati via da alcuno accidente, la creatura possiede benissimo la facoltà di rinuovargli, e di produrne de' novelli, in luogo di quei perduti. Trovò questo Valentuomo, che se una data quantità di muscoli venivano attaccati, e disgiunti l'uno dall'altro, e posti entro un vaso di qualsivoglia specie, e dentro esso vaso medesimo affondati entro il mare, questi in tratto brevissimo di tempo questi medesimi eransi attaccati non meno ai lati del vaso, ma eziandio infra le medesime, siccome prima trovavansi, gli uni agli altri. In questo caso l'estremità di cadaun filamento sembrava, che venisse a servire non altrimenti che una mano per afferre qualsivoglia cosa, alla quale volesse attaccarsi, e l'altra parte, che era più delicata, più forte, e più picciola, l'ufficio faceffe di braccio per guidarla.

Per rilevare la maniera, onde il muscolo conduce a fine simigliante operazione, quello dottissimo, e sommamente diligente Osservatore collocò alcuni muscoli, o mytuli in un vaso entro la propria sua camera, e gli ricoperì con dell'acqua marina: Avvisossi, e conobbe il Valentuomo benissimo come questi animali incontante cominciarono ad aprire i loro nicchi, e cadaun di essi a por fuori subito dopo quel picciolo corpicciolo da noi poc'anzi descritto, che assomigliasi nella sua forma ad una lingua, nella radice della quale vengono su queste fila, e propagansi: questi animali allungarono, ed accorciarono più e più fiato questa loro parte medesima, e cacciarono fuori per ogni, e qualunque verso bene spesso allungandola niente meno di quella due buone dita, e tentando e sperimentando innanzi, indietro, ed in cadauna direzione colla medesima, per conoscere quali fossero i luoghi entro il vaso i più acconci per fissarvi le loro fila. Fatto che ebbero le divise prove, e cimenti, ritennero ferma per alcun tratto di tempo la lingua su quel-

lo spazzo, che essi eransi scelti per impresa, e ciò fatto tirandola con grandissima prontezza, e sveltezza indietro di nuovo entro i suoi nicchi, fu così agevolissima il vedere, che i muscoli trovavansi allora attaccati ed affissi per mezzo di uno di questi filamenti allo spazzo medesimo, che avevano prima toccato, e sopra del quale eransi rimasti fermi per alquanti minuti: e ripetendo questi animali la faccenda medesima, le fila vennero a crescer di numero, ma non più di uno per volta in ogni operazione, e venendo a rimanere affisse queste fila in luoghi differenti, venivano a sostenere il pesce, e mantenerlo fermo, ed immobile contro qualsivoglia forza comune.

Venne trovato, come le parecchie fila erano sommamente differenti infra se l'una dall'altra; conciosiachè quelle, che venivano formate di nuovo, comparissero sempre più bianche, più lustre, e molto più trasparenti delle altre; e sotto una elastissima, e stretta disamina apparve, come non era, siccome molto naturalmente farebbero potuto altri supporre, ufficio della divisa lingua il condurre le nuove fila ad una ad una ai nuovi luoghi, ove di presente dovevano essere affisse, ma che essa lingua in tale lavoro diventava totalmente inutile, e di niuno uso, e che cadaun filamento di quelli, che noi veggiamo di presente formati, è un filamento nuovo formato, e fatto appunto in questo dato tempo; ed ultimamente, che la Natura ha dato ad alcuni marini pesci, non altrimenti, che a parecchi insetti stanziati nella terra, una facoltà di fissarsi, e prodursi le loro fila per gli usi tutti lor necessarii, e per conservamento, e sussistenza loro. E che i muscoli, o mytuli sono sotto acqua, ciò, che sono sopra la Terra le rughe, i langhi, &c. ed i ragnateli. Ma per bene, e viemaggiormente assicurarsi della veracità di questo fatto l'incomparabile Valentuomo Mons. Reaumur, troncò via tutte le barbe, o filamenti di un muscolo il più ferratamente, e rasente, che potè mai, senza perdersi intaccare, o danneggiare la parte ad essi filamenti aderente, e la prova dell'opinione del loro fissarsi novelle fila a loro piacimento, e talento, venne allora ridotta a quella agevolissima esperienza, e cimento, se questi muscoli per simigliante guisa spoglia-

oro primi, o vecchi filamenti, possono sifarsi toftochè ne avellerò gittati de' nuovi, e fe poteffero fpigner fuori quelle medefime novelle fila a diftanze confiderabili. L'efperienza ebbe a provare la veracità della congettura; conciofiachè quei mufcoli, le barbe, o vecchie fila dei quali furono troncate, attaccaronfi colla medefima prontezza, colla quale attaccaronfi gli altri, oei quali fiate erano le fila lasciate intatte, e gittarono, ed allungarono le loro novelle fila ad una diftanza ugualmente grande per ogni, e per qualunque verfo, e direzione.

Poichè nelle maniera divifata venne ad effere ben compreso, e conofciuto il meccanismo di fimigliante manifattura, divenne un defiderio naturaliffimo l'investigare la natura di quella parte, per mezzo della quale la manifattura medefima veniva effettuata. Quell'organo, da noi poc' anzi efattamente defcritto, è ftato finora efpreffo dai Naturalifti fotto la denominazione di lingua, a motivo di fua configurazione fomigliantiffima a quella di una lingua: ma ella fi è quella, anzichè la lingua, veracemente il braccio di quello pelce: ed in evento, ahe quello pelce medefimo per qualsiviegia accidente rimanga difgiunto, e feparato dalla fua compagnia, o che trovafi affifo ad un lungo difaccancio, ferve all'animale per itrafcinare tutto il fuo corpo per lo lungo a fuo piacimento, e ad effettuare tutti i fuoi varj movimenti. Quello fifaffi ad alcun corpo folido, e polcia contraendo gagliardamente la fua lunghezza, furz'è, che tutto il pelce di neceffità lo fequitì, e venga ad effere fpinto verfo quel daro luogn, ove trovafi fifaffo. Egli fi è però quello un' ufo, melfo in opera dal pelce così di rado, che non fembra cofa propria per quello folo, che debba effere ripurato una zampa, od un braccio; ma, fecondo il fuo impiego più frequente, potrebbeffimo molto meglio, e con affai maggior proprietà denominare l'Organo, per mezzo del quale le fila vengono filate, e prodotte.

Tuttochè quello corpo fia pianto nella maniera appunto di una lingua per la mafiffima parte, o tratto di fua lunghezza, egli è però tondeggiato, o dire lo vogliamo cilindrico intorno intorno alla bafe, o fia inferzione, ed è molto più picciolo in quella, che in qualunque altra parte:

hannovi parecchi ligamenti mufcolari al medefimo attaccati, intorno alla radice, o fia bafe, che fufficientano validamente, e fortiffimamente di contro il mezzo del dorfo della Conchiglia o gulfio dell'animale: di quelli ligamenti ve ne ha quattro, i quali fono particolarmente offervabili, e che fervono a muovere il corpo in ogni, e qualfivoglia direzione. Scorre tutto per lo lungo di quello corpo una fpaccatura, o fcrepolo, il quale penetra affai profondamente entro la fua fofianza, e dividendola, per così efprimerli, in due fezioni longitudinali. E' quello, a propiamente parlare, un canale, e lungoheffo quello canale viene fcagliato il liquore, che ferve alla formazione delle divifate fila, ed in quello canale appunto o fpaccatura le fila medefime vengono lavorate nella loro forma, non altramente, che una candela entro una curna o forma o cofa fomigliante. Rifguardandofi quello eftramente, altro non compariffe, che uno fcrepolo, fpaccatura, o condotto piccioliffimo, conciofiachè le due fezioni carnofe delle parti vengono quafi ad incontrarfi, ed a cuoprirlo; ma veracemente egli fi è tondeggiato al di dentro, ed è tutt'all'intorno guernito di fibre circolari. Quello canale adunque vienvi regolarmente condotto dalla punta della lingua, ficcome addimandando, alla bafe di quella, ove appunto diviene cilindrico: altro non effendo il cilindro in quella parte, che un tubo, o cannello ferrato, in cui viene a terminare quello canale aperto, o fpaccato. Il tubo cilindrico contiene dentro di sé un corpo tondo bifulgo, della natura medefima delle fila, falvo che quello è affai di quelle più fattuccio, e più groffo; e dall'eftrimità di quello corpo vengono prodotte tutte le fila, fervendo quello non altramente che una groffa gomena, o canapo, al quale fono attaccate, ed affiffe tutte le altre picciole corde dilperfe qua, e là verfo parti differenti. Quello tubo, o cannello, in cui trovafi fianziato quello groffo filo, fembra il ferbattojo del liquore, del quale formate fono le altre fila; avvegochè tutta la fua fuperficie interiore fia guernita di glandule per la fua fecrezione. Vegganfi *Memories Acad. Roy. Scient. Paris*, ann. 1711.

Il mufcolo, non altramente che parecchi altri marini pelci, abbonda di fimiglian-

giante maggiore; e se in qualsivoglia tempo facciasi altri a toccare con un dito la base di quest'organo nudo, se ritirerà seco il dito medesimo innavardato di un liquore attaccaticcio, e viscoso, in forma di parecchie fila simigliantissime a quelle dei langhi, od altri vermi, dei ragnateli, e d'altri animali terrestri filanti, o producenti fila Attaccarsi, e si filano le fila medesime con uguale agevolezza a' corpi o sostanze sommamente lisce, e lustre, che ai corpi e sostanze più aspre, e più ruvide: se i muscoli vengano conservati in giare, o vasi di vetro ripieni d'acqua marina, colla medesima agilità, e con eguale energia e forza attaccherannosi al vetro, o cristallo, che a qualsivoglia altro corpo.

I muscoli, sieno anche tenerissimi, e di fresco nati, posseggono questa proprietà medesima di filare; e per simigliante mezzo attaccansi in valissime congerie a qualsivoglia sostanza, nella quale s'imbattano perentro il mare. Monsieur Reaumur ha veduto questi animali allorchè non erano più grossi d'un granello di miglio, filare abbondevolmente, tuttochè le loro fila proporzionate al proprio loro peso, sieno assai più fine, e più picciole di quelle dei muscoli più grossi.

Ella si è una questione tuttora indeterminata, se il muscolo possieda una facoltà di rompere, od altrimenti gittar da un lato le proprie fila, in evento, che gli accada di dilungarsi da quel dato luogo, nel quale siasi una volta attaccato per mezzo delle medesime; ma sembra assai probabile, ch'ei non la possieda, e che in quel dato luogo, ove siasi dapprima attaccato, gli sia ginoco forza il rimanersi, tuttochè la lor distruzione sia la conseguenza di ciò. Monsieur Reaumur tentò questa sua esperienza nelle sue giare: dopo che questi muscoli furon ben ben fissati ai lati delle giare, versovvi entro porzione d'acqua; alla di modo ch'era d'interesse dei pesci il saltare i loro sostegno, ed attaccature, e portarsi più basso, ove l'acqua a loro connaturale trovavasi, ma parve, che non possedessero la facoltà di ciò eseguir.

Veggasi *Memoir, Acad. Roy. Paris.* an. 1711.

I muscoli comunemente somministrano al fo osservatore un piacevole e sovrano soggetto di disamina per via del microscopio. Quella membrana pellucida, che lascia vedere immediatamente nell'apertura del nicchio, mostra evidentemente la circolazione del sangue per un lungo tratto di tempo continuato per un numero sorprendentissimo di vasi. Essi curiosissimo Levenoechio in parecchi di questi animali da esso aperti, ed anatemizzati, rinvenne delle congerie d'uova, ed embrioni di muscoli nell'ovvia, comparandogli così evidentemente, come se osservati gli avesse coll'occhio nudo, e tutti risposti colle loro aguzzate estremità attaccate alla fascia, o nastro dei vasi, da quali venivano a ricevere il nutrimento. Le minute uova, o muscoli in embrione vengano dai genitori piantati in un dovuto ordine in una disposizione estremamente unita: sopra l'esterior lato della sua sostanza, o guscio, ove per mezzo di certa materia viscosa rimangono tenacissimamente attaccati, e vanno continuamente crescendo in grossezza non meno, che in forza, finchè divenendo perfettissimi muscoli, cadon giù, e s'induriscono per sé medesimi, lasciando dietro a sé i fori, dove trovavansi piantati dapprima.

Veggasi *Baker, Microscopio*, pag. 242.
L'abbondanza somma dei figliuoli del muscolo fa vedere se stessa evidentissimamente, allorchè è osservata col microscopio, ed alcuna fiata in un solo nicchio trovanse fino a due, ed anche tremila; ma ella non è cosa certa, che tutti sieno ivi stati fissati dentro del muscolo medesimo; conchiessasi che questi pesci usando di starsi in serie e congerie grandissime insieme l'uno all'altro vicino e contiguo, assai sovente gli embrioni d'uno sono attaccati ed affissi al nicchio di un altro. L'orlo, o contorno frangiato del muscolo, che dal Levenoechio vien denominato barba, ha in cadauna minutissima parte di sì tale e tanta varietà di movimenti, che non è concepibile: concio isia che essendo composto di fibre lunghissime, cadauna d'esse fibre ha ad ambedue i suoi lati un immenso numero di particelle fermovanti. Veggasi *Leuwenhoek, Arcana Naturæ*.

I L F I N E.

005636'60

Digitized by Google



